



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

CARL FLÜGGE

GRUNDRISS DER THEORIE

DER KREISLAUFKRAUKHEITEN

LANE MEDICAL LIBRARY STAMFORD
MAY 17 1902
Grundriss der Hygiene : für Studierende



24503300022

Verlag von Veit & Comp. in Leipzig

LANE

MEDICAL



LIBRARY

Library of
Dr. Martin Krotoszyner.



GRUNDRISS
DER
H Y G I E N E

FÜR STUDIRENDE UND PRAKTISCHE ÄRZTE,
MEDICINAL- UND VERWALTUNGSBEAMTE

VON

DR. MED. CARL FLÜGGE,
O. Ö. PROFESSOR UND DIREKTOR DES HYGIENISCHEN INSTITUTS
DER UNIVERSITÄT Breslau.

FÜNFTE, VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE.

MIT 173 FIGUREN IM TEXT.



LEIPZIG
VERLAG VON VEIT & COMP.

1902

VON H. MAJ

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

F 246
1702

Vorwort zur fünften Auflage.

Der „Grundriss“ war einige Jahre vergriffen, weil ich leider nicht Zeit fand, eine neue Auflage zu bearbeiten. In dem längeren Zeitraum seit dem Erscheinen der vierten Auflage sind aber so erhebliche Fortschritte auf den verschiedensten Gebieten der Hygiene zu verzeichnen, dass ich nunmehr eine völlige Umarbeitung habe vornehmen müssen. Manche Abschnitte des Buchs, so die „Einleitung“, Theile der „Mikroorganismen“, der „Wohnung“, der „parasitären Krankheiten“, das Kapitel „Immunität“ u. a. m. sind völlig neu geschrieben; ebenso sind zahlreiche erläuternde Abbildungen, meist nach selbst gezeichneten Vorlagen, neu in den Text eingefügt. An verschiedenen Stellen habe ich bisher nicht veröffentlichte Resultate eigener Untersuchungen sowie Erfahrungen aus meiner praktisch-hygienischen Thätigkeit eingefügt.

Besonderen Werth habe ich auch in dieser Auflage darauf gelegt, die Lehren der wissenschaftlichen Hygiene in streng kritischer Darstellung vorzutragen. Ich halte dies für um so nöthiger, je mehr Versuche gemacht werden, selbst die noch ungenügend geklärten Theile der Hygiene populär darzustellen und dabei unbewiesene oder unrichtige Lehren zu verbreiten oder nebensächliche Dinge über Gebühr aufzubauschen. Die Wirkung chemisch unreiner Luft, der Miasmen- und Parasitengehalt der freien Atmosphäre, die Art der Gesundheitsschädigung durch die Wohnung, der Begriff der kräftigen Kost, die Bedeutung des individuellen Schutzes gegen Infektionskrankheiten sind nur einige Beispiele, bei denen die Darstellungen der popu-

lären und der wissenschaftlichen Hygiene weit auseinanderzugehen pflegten. Die populäre Hygiene dieser Art ist geradezu ein Hemmniss für das Bestreben unserer jungen Wissenschaft, die Wahrheit zu erkennen und durch deren Verbreitung dem Volke wirklich zu nützen.

Möge der „Grundriss“ auch in seiner neuen Gestalt sich Freunde erwerben.

Breslau, Ende Juli 1902.

C. Flügge.

Inhalt.

	Seite
Einleitung	1
Erstes Kapitel.	
Die Mikroorganismen	20
I. Fungi, Faden- (Schimmel-)pilze	26
II. Blastomycetes, Sprosspilze	29
III. Schizomycetes, Spaltpilze, Bakterien	32
a) Morphologisches Verhalten	32
b) Lebensbedingungen der Spaltpilze	37
c) Lebensäusserungen der Spaltpilze	42
d) Absterbebedingungen der Spaltpilze	46
e) Die diagnostische Unterscheidung und systematische Eintheilung der Spaltpilzarten	53
f) Beschreibung der wichtigsten Bakterienarten	56
1. Coccaceae	56
2. Bacillaceae	60
3. Spirillaceae	74
IV. Streptothricheae	78
V. Protozoën	81
Zweites Kapitel.	
Witterung und Klima	90
I. Die einzelnen meteorologischen Faktoren	92
A. Temperatur der Atmosphäre	92
Oertliche und zeitliche Schwankungen der Temperatur	93
Hygienischer Einfluss der beobachteten Temperaturgrade und Temperaturschwankungen	96
a) Die Einwirkung hoher Temperaturen	99
b) Die Einwirkung niedriger Temperaturen	102
B. Die Luftfeuchtigkeit	106
Vertheilung der Luftfeuchtigkeit auf der Erdoberfläche	107
Oertliche Vertheilung der Luftfeuchtigkeit	108
Jahreszeitliche Vertheilung der Luftfeuchtigkeit	109
Hygienische Bedeutung der Luftfeuchtigkeit	110
C. Der Luftdruck	115
Oertliche und zeitliche Vertheilung des Luftdrucks	116
Hygienische Bedeutung der Luftdruckschwankungen	117

	Seite
D. Die Luftbewegung	120
Vertheilung der Luftbewegung auf der Erdoberfläche	121
Hygienische Bedeutung der Luftbewegung	123
E. Die Niederschläge	124
Die hygienische Bedeutung der Niederschläge	125
F. Sonnenscheindauer; Licht; Elektrizität	126
II. Allgemeiner Charakter und hygienischer Einfluss von Witterung und Klima	128
A. Die Witterung	128
Jahreszeitliche Vertheilung der Todesfälle	131
B. Das Klima	134
1. Die tropische (und subtropische) Zone	135
Krankheiten der Tropenzone	136
2. Die arktische Zone	138
Krankheiten des polaren Klimas	138
3. Die gemässigte Zone	139
Krankheiten der gemässigten Zone	140
4. Das Höhenklima	142
Krankheiten des Höhenklimas	143
Acclimatisation	145
Drittes Kapitel.	
Die gas- und staubförmigen Bestandtheile der Luft	149
I. Chemisches Verhalten	149
1. Der Sauerstoff	150
2. Ozon und Wasserstoffsuperoxyd	151
3. Kohlensäure	153
4. Sonstige gasförmige Bestandteile der Luft	155
II. Der Luftstaub	161
1) Grob sichtbarer Staub	163
2) Rauch und Russ	163
3) Die Sonnenstäubchen	164
4) Die Mikroorganismen	164
Viertes Kapitel.	
Der Boden	171
I. Die Oberflächengestaltung und geognostisches Verhalten	171
II. Die mechanische Struktur der oberen Bodenschichten	173
a) Korngrösse, Porenvolum, Porengrösse	173
b) Flächenwirkungen des Bodens	176
III. Temperatur des Bodens	179
IV. Chemisches Verhalten des Bodens	180
V. Die Bodenluft	182
VI. Verhalten des Wassers im Boden	184
A. Das Grundwasser	185
B. Das Wasser der oberen Bodenschichten	190
VII. Die Mikroorganismen des Bodens	193

Fünftes Kapitel.

Das Wasser	197
A. Allgemeine Beschaffenheit der natürlichen Wasser	198
B. Die hygienischen Anforderungen an Trink- und Brauchwasser	202
C. Die Untersuchung und Beurtheilung des Trinkwassers	206
D. Die Wasserversorgung	217
1. Lokale Wasserversorgung	217
2. Centrale Wasserversorgung	220
Eis. Künstliches Selterwasser	228

Sechstes Kapitel.

Ernährung und Nahrungsmittel	230
A. Die Deckung des Nährbedarfs des Menschen	230
I. Die Bedeutung der einzelnen Nährstoffe	230
1. Die Eiweissstoffe	231
2. Die Fette	233
3. Die Kohlehydrate	234
4. Das Wasser	235
5. Die Salze	236
6. Die Genuss- und Reizmittel	236
II. Quantitative Verhältnisse des Nährstoffbedarfs	239
1. Erhaltung des Körperbestandes (Erhaltungskostmaass)	240
2. Eiweiss-(Fleisch-)Ansatz beim Erwachsenen	242
3. Fettansatz	243
4. Fettverlust	244
III. Die Auswahl der Nahrungsmittel zur Deckung des Nährstoffbedarfs	245
1. Die Ausnutzbarkeit und Verdaulichkeit der Nahrungsmittel	245
2. Aufbewahrung und Zubereitung der Nahrungsmittel	248
3. Das Volum der Nahrung	250
4. Die Temperatur der Nahrung	250
Zusammensetzung einer rationellen Kost	251
Verhältniss der animalischen und vegetabilischen Nahrungsmittel	251
Preise der Nahrungsmittel	255
Kost in öffentlichen Anstalten	260
B. Die einzelnen Nahrungsmittel	263
1. Die Kuhmilch	263
a) Die Zersetzungen der Milch	264
b) Die Fälschungen der Milch	267
c) Krankheitserreger und Gifte der Milch	268
Prophylaktische Maassregeln:	
1. Die Untersuchung und Controle der Milch	270
2. Die Ueberwachung der Milchwirtschaften	274
3. Präparation der Milch vor dem Verkauf	274
4. Präparation der Milch nach dem Kauf	278
2. Die Ernährung der Kinder mit Milch und Milchsaurrogaten	278

	Seite
Der Nährstoffbedarf des Kindes	278
a) Die Ernährung des Kindes mit Frauenmilch	280
b) Die Ernährung des Kindes mit Kuhmilch	282
c) Die Ernährung des Kindes mit besonders präparirter Kuhmilch und Milchsurogaten	290
3. Molkereiprodukte	291
Die Rahm-(Milch-)butter	291
Die Kunstbutter	294
4. Fleisch	296
Gesundheitsschädigungen durch Fleischgenuss:	
1. Thierische Parasiten des Fleisches	297
2. Uebertragbare Krankheiten der Schlachtthiere	301
3. Postmortale Veränderungen des Fleisches	303
4. Seltener Anomalien des Fleisches	305
Prophylaktische Maassregeln:	
1. Vorsichtsmaassregeln bei der Viehhaltung	306
2. Fleischbeschau	306
3. Aufbewahrung des Fleisches nach dem Schlachten	309
4. Zubereitung des Fleisches	312
a) Kochen und Braten	312
b) Conservierungsmethoden	313
Leicht verdauliche Fleischpräparate	315
5. Vegetabilische Nahrungsmittel	317
a) Getreide, Mehl, Brot	317
b) Leguminosen	323
c) Kartoffeln	323
d) Die übrigen Gemüse	324
Leicht verdauliche Vegetabilien	325
6. Genussmittel	326
a) Alkoholische Getränke	326
b) Kaffee, Thee, Cacao	331
c) Tabak	332
d) Gewürze	333

Siebentes Kapitel.

Kleidung und Hautpflege	334
Eigenschaften der Stoffelemente der Kleidung	335
Eigenschaften der zu Geweben verarbeiteten Kleiderstoffe	337
Die Beziehungen der Kleidung zur Wärmeabgabe	339
Beziehungen der Kleidung zur Wasserdampfabgabe des Körpers	342
Schutz des Körpers gegen Wärmestrahlen	342

Achtes Kapitel.

Die Wohnung (Wohnhaus- und Städteanlagen)	347
I. Vorbereitungen für den Bau des Wohnhauses	348
A. Wahl und Herrichtung des Bauplatzes	348

	Seite
B. Die verschiedenen Formen des Wohnhauses und ihre hygienische Bedeutung	349
C. Städtische Bebauungspläne	353
D. Bauordnung und Wohnungscontrole	356
E. Der Bauplan für ein Wohnhaus	360
II. Fundamentirung und Bau des Hauses	367
III. Austrocknungsfrist; feuchte Wohnungen	373
IV. Temperatur-Regulirung der Wohnräume	378
A. Temperatur-Regulirung im Sommer	378
B. Temperatur-Regulirung im Winter	382
a) Lokalheizungen	387
b) Centralheizungen	393
Luftheizung	393
Wasserheizung	398
Dampfheizung	400
V. Ventilation der Wohnräume	403
A. Der quantitative Ventilationsbedarf	404
B. Die Deckung des Ventilationsbedarfs	406
1. Natürliche und künstliche Ventilation	406
2. Systeme der künstlichen Lüftung	407
3. Anordnung der Ventilationsöffnungen	408
4. Motoren	409
C. Prüfung der Ventilationsanlagen	415
D. Leistung der Ventilationsanlagen	416
VI. Beleuchtung	419
A. Tageslicht	419
B. Künstliche Beleuchtung	427
VII. Entfernung der Abfallstoffe	438
A. Die Beschaffenheit der Abfallstoffe	439
B. Gesundheitsschädigungen durch die Abfallstoffe	442
C. Die einzelnen Systeme zur Entfernung der Abfallstoffe	445
1. Abfuhrsysteme	445
Das Grubensystem	445
Das Tonnensystem	448
Abfuhr mit Präparation der Fäkalien	451
2. Schwemmcanalisation.	455
a) Anlage und Betriebe der Canäle	456
b) Beseitigung des Canalinhalts	464
Einlauf in die Flüsse	464
Bodenfiltration und Berieselung	467
Das Oxydationsverfahren (Biologisches Verfahren)	470
Mechanische und chemische Klärung	473
3. Die Separationssysteme	481
4. Der Kehrriecht und die Thiercadaver	486
VIII. Leichenbestattung	488

	Seite
IX. Besondere bauliche Anlagen	493
I. Schulen	494
A. Bauliche Einrichtungen	496
B. Mobiliar und Utensilien	500
C. Betrieb der Schulen	503
II. Krankenhäuser	508

Neuntes Kapitel.

Beruf und Beschäftigung (Gewerbehygiene)	516
A. Aetologie und Prophylaxis der Arbeiterkrankheiten	518
I. Gesundheitsschädigungen durch die allgemeinen hygienischen Verhältnisse	518
II. Gesundheitsschädigungen durch die Beschäftigungsweise der Arbeiter	521
1. Die Arbeiterräume	521
2. Die Muskelarbeit und die Körperhaltung	522
3. Schädigung der Sinnesorgane	523
4. Gesteigerter Luftdruck	524
5. Excessive Temperaturen	525
6. Einathmung von Staub	526
7. Einathmung giftiger Gase	530
8. Beschäftigung mit giftigem Arbeitsmaterial	533
9. Gefährdung der Arbeiter durch Contagien	539
10. Unfälle	541
a) Unfälle in Bergwerken	541
b) Unfälle durch explosionsfähiges Material	543
c) Unfälle durch Maschinenbetrieb	543
B. Belästigung und Schädigung der Anwohner durch Gewerbebetriebe	546

Zehntes Kapitel.

Die parasitären Krankheiten	551
I. Die Infektionsquellen	557
A. Die Beschaffenheit der Infektionsquellen	557
B. Fernhaltung, Beseitigung und Vernichtung der Infektionsquellen	560
1. Fernhaltung der Infektionsquellen	560
2. Mechanische Beseitigung der Infektionsquellen	563
3. Vernichtung der Krankheitserreger, Desinfektion	564
Ausführung der Desinfektion	578
II. Die Infektionswege	584
III. Die individuelle Disposition und Immunität	589
A. Wesen und Ursachen der Disposition und Immunität	590
1. Aeussere Ursachen	590
2. Innere Ursachen	591
a) Die Phagocytose	592

Inhalt.

XI

	Seite
b) Schutzstoffe im Blut und in anderen Säften des Körpers	594
Antitoxine	594
Agglutinine und Präcipitine	598
Cytolysine (Bakteriolysine, Hämolysine u. s. w.)	601
B. Die absichtliche Herstellung der Immunität und die Schutzimpfungen	606
1. Erhöhung der allgemeinen Resistenz gegen parasitäre Krankheiten	606
2. Specifische Schutzimpfungen	607
A. Active Immunisirung durch Einverleibung der Krankheitserreger oder ihrer wirksamen Bestandtheile	607
B. Passive Immunisirung durch Uebertragung von Serum hoch immunisirter Thiere	613
C. Combinirte active und passive Immunisirung	615
IV. Die örtliche und zeitliche Disposition zu Infektionskrankheiten	616
<hr/>	
Specielle parasitäre Krankheiten	623
1. Cholera und Diarrhoea infantum	623
2. Diphtherie	626
3. Cholera asiatica	628
4. Abdominaltyphus	637
5. Variola	642
6. Scharlach, Masern, Flecktyphus	650
7. Influenza	652
8. Pest	655
9. Malaria	658
10. Tuberkulose	663

Anhang.

Die wichtigsten hygienischen Untersuchungsmethoden	672
I. Allgemeine Methodik der bakteriologischen Untersuchung	672
A. Mikroskopische Untersuchung	672
B. Culturverfahren	677
II. Specielle parasitologische Diagnostik	680
1. Abdominaltyphus	680
2. Cholera	683
3. Diphtherie	685
4. Tuberkulose	687
5. Pest	688
1. Gewinnung des zur Untersuchung geeigneten Materials	688
A. Vom Lebenden	688
B. Von der Leiche	689
2. Gang der Untersuchung	689
6. Malaria	691

	Seite
III. Bestimmung der Luftfeuchtigkeit mittelst des Schleuderpsychrometers	692
IV. Bestimmung des CO ₂ -Gehalts der Luft	695
A. Genaue Bestimmung	695
B. Approximative Bestimmung	696
V. Chemische Trinkwasser-Analyse	697
1. Organische Stoffe (Sauerstoffverbrauch)	697
2. Ammoniak	698
3. Salpetrige Säure	698
4. Salpetersäure	699
5. Chloride	699
6. Härte	700
VI. Die Bestimmung des Milchfetts mittelst des Laktobutyrometers	701
Register	702
Errata	714

Einleitung.

Zahlreiche statistische Erhebungen über die Sterblichkeitsverhältnisse der jetzt lebenden Menschen liefern uns den Nachweis, dass wir von dem biblischen Ideal „Unser Leben währet 70 Jahr“ weit entfernt sind. Wenn dies Alter die normale Grenze darstellt, an welcher der menschliche Körper im Kampf um's Dasein erschöpft wird, so muss eine ausschliesslich aus solchen normalen Individuen bestehende Bevölkerung eine jährliche Sterblichkeit von 14.3 p. m. zeigen, d. h. auf 1000 Lebende müssen im Jahre 14.3 Gestorbene entfallen. Es befinden sich alsdann unter jenen 1000 Lebenden 14.3 im ersten Lebensjahre, 14.3 im zweiten, und so fort bis schliesslich 14.3 im 70. Lebensjahre. Nur die letzte Altersklasse stirbt im laufenden Jahre fort, und die Zahl der Bevölkerung wird dafür durch 14.3 Lebendgeborene regeneriert, welche wiederum je eine Lebenserwartung von 70 Jahren haben.

Selbstverständlich müssen in Wirklichkeit gewisse Abweichungen von diesem Schema auftreten. Auch bei einer unter den günstigsten Verhältnissen lebenden Bevölkerung wird die Mortalität grösser, die durchschnittliche Lebenserwartung geringer und insbesondere die Verteilung der einzelnen Altersklassen weit weniger gleichmässig sein.

Betrachten wir aber die Bewegung der Bevölkerung in den modernen civilisirten Ländern, so werden wir überrascht durch ihr völlig abnormes und zugleich nach Ländern und Bevölkerungsgruppen wechselndes Verhalten.

Die folgende, für Preussen abgeleitete Sterblichkeitstafel zeigt zwar, dass die absolute Zahl der Todesfälle unter den erwachsenen Lebensaltern bei etwa 70 Jahren am grössten ist (ein gesetzmässiges Verhalten, das auch für andere europäische Länder statistisch festgestellt wurde); dass aber im Gesamtdurchschnitt die Lebenserwartung viel geringer ist, und dass namentlich den niederen Altersklassen bis zum dritten Jahre eine enorm hohe Sterblichkeit zukommt. (Tab. 1.)

In Tabelle 2 ist ferner die Zahl der Todesfälle pro 1000 Menschen in den grösseren europäischen Staaten angegeben. Die Sterblichkeit zeigt danach in verschiedenen Ländern sehr bedeutende, bis 100 Prozent steigende Schwankungen.

Tabelle 1.

Alter in vollen Jahren:	Sterbetafel für Preussen 1890/1891.					
	Zahl der zu Anfang der nebenbezeichneten Alters- stufen Ueberlebenden		Von Tausend ster- ben jährlich bis zur Erreichung der nächsten Alters- stufe:		Wahrscheinliche Lebensdauer in Jah- ren vom Eintritt in die nebenbezeich- nete Altersklasse an gerechnet	
	Absterbeordnung:				Lebenserwartung:	
	M.	W.	M.	W.	M.	W.
0	100 000	100 000	220.9	188.7	45.7	51.5
1	77 911	81 135	65.4	63.0	56.2	60.0
2	72 820	76 027	28.6	28.2	57.4	60.9
3	70 740	73 885	19.1	18.8	57.2	60.7
4	69 390	72 497	13.8	14.0	56.7	60.2
5	68 430	71 486	6.9	7.2	56.1	59.5
10	66 119	68 954	3.2	3.8	51.9	55.3
15	65 068	67 663	4.7	4.2	47.3	50.7
20	63 566	66 244	6.5	5.3	42.9	46.1
25	61 539	64 507	6.9	6.7	38.6	41.6
30	59 454	62 375	8.3	8.1	34.4	37.2
35	57 038	59 898	10.5	9.4	30.2	32.9
40	54 115	57 133	13.6	10.3	26.2	28.7
45	50 544	54 245	16.7	11.7	22.3	24.5
50	46 462	51 147	21.9	15.5	18.6	20.4
55	41 590	47 297	30.1	23.5	15.2	16.4
60	35 702	41 995	41.6	35.3	12.0	12.8
65	28 876	35 081	61.4	56.2	9.1	9.6
70	21 039	26 276	91.7	86.8	6.8	7.1
75	13 005	16 689	140.2	133.4	4.7	4.9
80	6 111	8 156	212.6	198.3	3.6	3.7
85	1 849	2 701	287.3	268.1	3.1	3.2
90	340	567	395.8	342.3	2.7	2.9
95	27	70	388.5	408.1	2.7	2.7
100	2	5				

Tabelle 2.

	Gestorben auf 1000 Einwohner:	
	1874—83	1884—93
Deutschland	26.2	24.6
Oesterreich	30.6	28.8
Ungarn	35.9	32.2
Frankreich	22.4	22.4
England	20.7	19.2
Schweden	18.4	16.9
Norwegen	17.2	16.9
Italien	29.1	26.9
Russland	35.4	34.7

Noch stärkere örtliche Contraste ergeben sich z. B. bei einer Parallele aus den Jahren 1849—57 zwischen 17 ländlichen, relativ gesunden Distrikten Englands und den Distrikten von Liverpool und Manchester (Tab. 3). Am bedeutendsten fallen endlich die Schwankungen aus, wenn die Wohlhabenheit einer städtischen Bevölkerung oder auch, als Ausdruck derselben, die Höhe der Miethe in Rechnung gezogen wird (Tab. 4, Breslau, 1890).

Tabelle 3.

	Von 1000 starben jährlich:		
	In den 51 Healthy Districts	In den Manchester Districts	In den Liverpool Districts
Männer	17.56	35.38	40.97
Weiber	16.23	30.46	36.36

Tabelle 4.

Betrag der Wohnungsmiethe:	Auf 1000 Einwohner Gestorbene:
bis 300 Mk.	20.7
„ 750 „	11.2
„ 1500 „	10.7
über 1500 „	6.5

Diese verschiedene Mortalität der einzelnen Altersklassen; die kolossale Steigerung der Todesfälle in den ersten Lebensjahren; und die

starken Contraste der Sterblichkeit zwischen verschiedenen Ländern und Bevölkerungsklassen lassen die jetzige Absterbeordnung nicht etwa als einfache Folge gewisser unabänderlicher, theils vererbter, theils erworbener krankhafter Abweichungen des menschlichen Körpers erscheinen.

Wir sehen vielmehr, dass in den Healthy-districts Englands und bei den Wohlhabenden Verhältnisse vorliegen, welche dem erreichbaren Ideal sehr nahe kommen. Die Gesamtmortalität hält sich dort zwischen 16 und 17 pro Mille, die vorwiegende Betheiligung des Säuglingsalters tritt ganz zurück, und es ist damit gleichsam eine Norm geliefert, welche den unvermeidlichen Störungen der idealen Absterbeordnung Rechnung trägt und für die Praxis Gültigkeit beanspruchen darf.

Wenn nun die Bewegung der Bevölkerung in den weitaus grössten Theilen der civilisirten Länder auch von dieser Norm so ausserordentlich abweicht, dann berechtigt uns das zu der Annahme, dass allerlei unnatürliche und abnorme äussere Verhältnisse, unter denen der heutige Culturmensch zu leben gezwungen ist, seine Existenz erschweren und sein vorzeitiges Erliegen bewirken. Es ist von vornherein wahrscheinlich, dass manche jener schädigenden Momente vermeidbar und viele der jetzt vorherrschenden Todesursachen durch menschliches Zuthun einer Einschränkung zugänglich sind.

In Tabelle 5 ist angegeben, mit welchem Procentsatz sich die einzelnen Krankheiten an der Gesamtmenge der Todesfälle betheiligen. Trotzdem diese Statistik noch vielfache Mängel aufweist, welche namentlich in der grossen Zahl der unbekannten resp. der unbrauchbar benannten Todesursachen liegen (namentlich „Krämpfe“; vgl. unten Kap. X „Cholera infantum“), so lässt sich aus derselben doch so viel entnehmen, dass allein 28 Procent aller Todesfälle auf Infectionskrankheiten und Ernährungsstörungen der Kinder zu rechnen sind; 10—12 Procent entfallen auf Tuberkulose, 12 Procent auf andere Infectionskrankheiten, 8—13 Procent auf sog. Erkältungskrankheiten. Die grosse Mehrzahl aller Todesfälle ist also auf Infectionen, Anomalieen der Nahrung und Störung der Wärmeregulirung zurückzuführen; d. h. die tödtlichen Erkrankungen kommen zum grösseren Theile durch unmittelbare Einwirkung von schädlichen Einflüssen unserer äusseren Umgebung auf den bis dahin gesunden Körper zu Stande.

Die Bedeutsamkeit der äusseren Umgebung für den Gesundheitszustand einer Bevölkerung kann im Grunde für uns nichts Ueberaschendes haben. Physiologie und Pathologie haben uns längst gelehrt, dass der Mensch nur lebensfähig ist durch einen steten regen Wechselverkehr mit seiner Umgebung, aus welcher er Nahrung, Wasser, Luft u. s. w. aufnimmt, an welche er Wärme, Wasser, Kohlensäure und eine Reihe

Tabelle 5.

Todesursachen.	In Preussen betrafen von den nebenbezeich- neten Todesursachen unter 100 Todesfällen
	1892:
1. Angeborene Lebensschwäche	5.62
2. Atrophie der Kinder	2.50
3. Einheimischer Brechdurchfall	3.10
4. Diarrhoe der Kinder	2.35
5. Krämpfe der Kinder	14.33
6. Pocken	0.01
7. Scharlach	0.88
8. Masern und Rôtheln	1.49
9. Diphtherie und Croup	5.62
10. Keuchhusten	1.96
11. Typhus	0.87
12. Flecktyphus	0.00
13. Ruhr (Dysenterie)	0.14
14. Tuberkulose	10.64
15. Skropheln und englische Krankheit	0.4
16. Lufttröhrentzündung und Lungenkatarrh	4.06
17. Lungen- und Brustfellentzündung	7.31
18. Andere Lungenkrankheiten	1.81
19. Akuter Gelenkrheumatismus	0.22
20. Herzkrankheiten	1.35
21. Gehirnkrankheiten	2.13
22. Nierenkrankheiten	0.98
23. Wassersucht	2.06
24. Krebs	2.13
25. Apoplexie	4.22
26. Altersschwäche (über 60 Jahre)	10.44
27. Selbstmord	0.85
28. Mord und Todsschlag	0.07
29. Unglücksfälle	1.56
30. Andere nicht angegebene u. unbek. Todesursachen	9.66

von anderen Excreten abgiebt; dass aber nur eine Umgebung von bestimmter, in gewissen engen Grenzen schwankender Beschaffenheit einen normalen Ablauf des Lebens ermöglicht. Auf jede zu intensive oder zu anhaltende Abweichung im Verhalten der äusseren Umgebung reagirt der Körper mit krankhafter Störung.

So spielt z. B. die uns umgebende Luft eine wichtige Rolle bei

der Entwärmung des Körpers. Je nach der Temperatur, der Feuchtigkeit und der Bewegung der Luft schwankt die Menge der durch dieselbe dem Körper entzogenen Wärme, und dieser muss fortwährend feine Regulirvorrichtungen in Thätigkeit setzen, um unter der wechselnden Beschaffenheit der Aussenluft seine Eigentemperatur zu bewahren. Er hebt sich aber die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft über einen gewissen Grad hinaus, so stösst die erforderliche Entwärmung des Körpers auf unüberwindliche Schwierigkeiten, und es resultiren schwere Störungen in den Functionen des Organismus. Ebenso wenn zu plötzliche und intensive Schwankungen der Luftwärme eintreten, versagt die sonst schützende Regulirung, und es kommt zu krankhaften Affectionen.

Die Aussenluft ist dann noch in anderer Beziehung wichtig. Im Austausch mit dem Körper verliert sie allmählich Sauerstoff und nimmt dafür Kohlensäure und andere Excrete auf; schliesslich wird sie demnach verändert, dass Störungen des Wohlbefindens und Krankheitssymptome eintreten, wenn der Mensch dauernd in derselben Luft zu athmen gezwungen ist. Nur dann bleiben die Störungen aus, wenn eine stetige Zufuhr reiner Aussenluft in solchem Maasse stattfindet, dass die Veränderung der Luftbeschaffenheit sich innerhalb gewisser Grenzen hält. Ferner bringen wir bei der Athmung sehr grosse Mengen Luft in innige Berührung mit Theilen der Lungenoberfläche, welche für die Ansiedelung gewisser Parasiten besonders empfänglich sind. Sorge wir nicht dafür, dass die Aussenluft frei von solchen parasitären Keimen gehalten wird, so können schwere Erkrankungen die Folge sein.

Weiter gehören zu der Aussenwelt, mit welcher wir täglich in engster Beziehung treten, Boden und Wasser; beide dienen eventuell als Ansiedelungsstätte für Infektionserreger, und dann sind sofort eine Menge von Gelegenheiten zur Uebertragung der pathogenen Keime an den Menschen und unter Umständen zur plötzlichen Ausbreitung von Epidemien gegeben. — Aus der äusseren Umgebung entnehmen wir ferner die Nahrungsmittel, die in bestimmter Quantität erforderlich sind, um den Bestand des Körpers zu erhalten. Auch hier aber bedrohen uns verschiedene Gefahren: eine falsche Zusammensetzung der Kost, ein Ueberwiegen oder ein Fehlen des einen oder anderen Nährstoffs, ein Durchsetzen der Nahrung mit Fäulnisorganismen und deren Produkten, oder gar ein Anhaften von Parasiten kann zur Krankheitsursache werden.

Noch mannigfaltiger gestalten sich die Einflüsse der Aussenwelt in Folge der künstlichen Einrichtungen, durch welche der Culturmensch seine natürliche Umgebung modificirt, zum Theil in der

wussten Absicht, sich gegen die Gefahren der letzteren zu schützen. Er wählt sich zweckentsprechende Kleidung, baut sich Wohnungen, gründet Städte; durch Industrie und Verkehrsmittel macht er sich unabhängig von jeder örtlichen und zeitlichen Beschränkung seiner Bedarfsmittel; er schafft sich von fernher reines Wasser, wo die Oertlichkeit kein solches gewährt; er importirt fehlende Nahrungsmittel und conservirt die überschüssig vorhandenen. Durch die ganze so geschaffene künstliche Umgebung können aber wieder neue schädliche Momente eingeführt werden. Die Wohnung mag gegen Witterungseinflüsse Schutz gewähren; aber leicht hemmt sie auch den normalen Gasaustausch des Körpers, führt zur Anhäufung von Abfallstoffen und zur Aufnahme von Infektionskeimen. Das hergeleitete Wasser mag frisch und rein sein; aber möglicherweise nimmt es giftige Stoffe aus dem Material der Leitung auf. Die Nahrung mag selbst für die grössten Ansammlungen von Menschen in genügender Menge beschafft werden; aber vielfach ist dann die Qualität abnorm, die Conservirung ungenügend, und alljährlich sehen wir in den grossen Städten Tausende von Kindern gerade durch Mängel der dorthin importirten Nahrung zu Grunde gehen. Mag Beruf und Beschäftigung in unserer an Erfolgen reichen Zeit dem Menschen höchste Befriedigung gewähren; es fragt sich, ob nicht auch diese Erfolge oft mit schwerer Schädigung der Gesundheit erkaufte werden müssen.

So birgt denn die ganze natürliche wie künstlich modificirte Umgebung des Menschen vielfache Krankheitsursachen, die eben um so gefährlicher erscheinen, weil der Mensch mit allen seinen Functionen auf einen steten regen Verkehr mit der Aussenwelt angewiesen ist. Tritt daher abnorme Sterblichkeit innerhalb einer Bevölkerung auf, oder kommt es zu auffällig starker Erkrankung einzelner Lebensalter, oder greifen epidemische Krankheiten um sich, — fast ausnahmslos werden wir in den jeweiligen Verhältnissen der äusseren Umgebung die Ursache zu suchen haben.

Hieraus ergibt sich ohne weiteres, dass wir das grösste Interesse an einer gründlichen Durchforschung und genauen Erkenntniss der äusseren Lebenssubstrate und der dort gelegenen Krankheitsursachen haben.

Die medicinische Wissenschaft früherer Jahre hat der äusseren Umgebung des Menschen nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Sie beschäftigte sich vorzugsweise mit den Vorgängen im menschlichen Körper, und wenn sie einmal die Beziehungen der äusseren Lebenssubstrate zum Menschen berücksichtigte, so begnügte sie sich mit einer relativ rohen Empirie und mit ergänzenden Speculationen, exactere

Forschung auf diesem Gebiet anderen Disciplinen, der Meteorologie, Chemie, Botanik, Zoologie überlassend. Da aber erfahrungsgemäss in naturwissenschaftlichen Disciplinen lediglich induktive und experimentelle Methode zu sicheren Erfolgen führt; und da wiederum die Vertreter jener anderen Fächer ihre Arbeiten nicht nach medicinischen Gesichtspunkten wählten und ausführten, war der Fortschritt in der Erkenntnis der uns interessirenden Verhältnisse der Aussenwelt bisher nur ein äusserst langsamer.

Erst vor wenigen Jahrzehnten hat sich — theils in Folge des schnellen Anwachsens der grossen Städte und der dort sich häufenden Gefahren für die Gesundheit, theils unter dem mächtigen Eindruck der verheerenden Cholera Invasionen — in den weitesten Kreisen die Ueberzeugung Bahn gebrochen, dass die Erkenntnis der äusseren Umgebung des Menschen und der in dieser gelegenen Krankheitsursachen eines der wichtigsten Ziele der medicinischen Forschung ist, und dass die hier gewonnenen Untersuchungsergebnisse einen bedeutsamen Theil der medicinischen Lehre ausmachen.

Diese Forschung und diese Lehre bilden die specielle Aufgabe der Hygiene. Kurz definirt ist demnach die Hygiene derjenige Theil der medicinischen Wissenschaft, welcher sich mit den äusseren Lebenssubstraten und der gewohnheitsmässigen Umgebung des Menschen beschäftigt und in derselben diejenigen Momente zu entdecken sucht, welche häufiger und in erheblicherem Grade Störungen im Organismus zu veranlassen oder die Leistungsfähigkeit herabzusetzen im Stande sind.

Begrenzt man das Forschungs- und Lehrgebiet der Hygiene in der angegebenen Weise, so collidirt dasselbe nicht etwa mit einer der übrigen medicinischen Disciplinen, sondern bildet für diese eine nothwendige Ergänzung. Die meisten Berührungspunkte zeigt die Hygiene mit der allgemeinen Pathologie; aber auch dieser gegenüber ergiebt sich eine einfache und natürliche Scheidung. Die allgemeine Pathologie beschäftigt sich zwar ebenfalls mit den Ursachen der Krankheiten; sie verfolgt dieselben indess nur innerhalb des menschlichen Körpers, ihr Studium beginnt erst von dem Moment an, wo die äussere Ursache mit dem Körper in Berührung getreten ist. Das Verhalten der krankheitserregenden Ursachen ausserhalb des menschlichen Körpers; die Entstehung derselben in den den Menschen umgebenden Medien; ihre Entwicklung, Verbreitung und die Wege, auf denen sie zum Menschen Zugang finden, das alles bildet die Aufgabe der Hygiene.

Begreift man freilich unter Hygiene, so wie es früher geschah, die Summe der praktischen Maassnahmen zur Förderung der Volks-

gesundheit, so ist die Hygiene so alt wie die älteste Kultur. Schon im alten Ägypten bestanden hygienische Vorschriften über Nahrungsmittel, über Beschau der Schlachtthiere, ferner über Kleidung und Reinlichkeit. Aehnlich enthält die mosaische Gesetzgebung Vorschriften über Nahrung, Wasserbezug, Reinhaltung des Körpers, der Kleidung, der Wohnung, die ein volles Verständniss des Gesetzgebers für die hygienische Bedeutung solcher Gebote zeigen. Im alten Rom wurde bekanntlich durch ein Netz unterirdischer Kanäle die Entfernung der Abfallstoffe besorgt; der Verkauf von Nahrungsmitteln, die Strassenreinlichkeit, gewerbliche Anlagen wurden von den Aedilen überwacht; und Quellwasserleitungen führten so reichliches Wasser hinzu, dass z. B. zu Trajans Zeit 510 Liter pro Tag auf jeden Einwohner entfielen, eine selbst für unsere heutigen Begriffe ungewöhnlich reichliche und für die Hygiene der Stadt gewiss äusserst förderliche Menge.

Nach dem Untergang des weströmischen Reichs folgen Jahrhunderte, wo die Fortsetzung hygienischer Maassregeln mit wenigen Ausnahmen fehlt; erst sehr allmählich, mit der Kultur der germanischen Völker, gewinnt das Interesse für hygienische Einrichtungen wieder Boden. Selbst die Seuchen des 14. und 15. Jahrhunderts werden Anfangs gar nicht, später mit ganz unzulänglichen Maassregeln bekämpft. Erst im 18. Jahrhundert beginnt man, systematisch Quarantänen und Anzeigepflicht für ansteckende Krankheiten einzuführen, verseuchte Wohnungen durch Räucherungen mit Schwefel oder salzsauren Dämpfen zu reinigen. Ferner werden bei der Bau-, Strassen- und Marktpolizei hygienische Gesichtspunkte berücksichtigt, und es zeigen sich die Anfänge einer Gewerbehygiene und einer Schulhygiene. In PETER FRANK's „System der medicinischen Polizei“, dessen erster Band 1779 erschien, ist uns eine achtbändige Zusammenstellung aller damals für erforderlich gehaltenen hygienischen Maassnahmen überliefert. Auf welch rohe Empirie damals aber die hygienische Kritik angewiesen war, das geht z. B. aus folgenden Worten hervor, mit denen PETER FRANK die Kennzeichen eines guten Trinkwassers schildert: „Man hält dasjenige Wasser für gut, welches in einem kupfernen Gefäss längere Zeit aufbewahrt, keine Flecken darin zulässt, wenn es gekocht keinen Sand oder Leimen abwirft; wenn es helle und rein ist und keine Pflanzengewächse in sich nährt. Da aber alles dies sich dem Ansehen nach so verhalten und doch eine verborgen übele Eigenschaft dahinter stecken kann: so muss man das Trinkwasser selbst aus der gesunden Beschaffenheit der Einwohner eines Orts beurtheilen.“

Einen ganz neuen Impuls bekamen die hygienischen Reformbestrebungen in den Jahren 1830—1850 in England. Einmal war

es das ungeahnt rasche Wachsen der großen Städte, das zu ausserordentlichen hygienischen Missständen führte und Abhülffemaassregeln erforderlich machte. Sodann aber wirkte akut auslösend die Cholera, die 1818 den europäischen Continent und speciell auch England zum ersten Male heimsuchte.

Englische Aerzte leiteten damals zunächst eine genaue medicinische Statistik ein. An der Hand eines grossen Zahlenmaterials wurde z. B. festgestellt, dass die städtische Bevölkerung Englands eine viel höhere Mortalität aufwies als die Landbevölkerung, und dass ein grosser Procentsatz der Erkrankungen und Todesfälle auf sog. „vermeidbare“ Krankheiten entfiel. 1842 wurde eine königliche Untersuchungskommission eingesetzt mit dem Auftrag, den gegenwärtigen Zustand der grossen Städte zu untersuchen und über die Mittel zur Abhülfe der gefundenen Schäden zu berichten. Dieser Enquête folgte 1848 die Public health Act, ein Gesetz zur Beförderung der öffentlichen Gesundheit, und dann die Durchführung grossartiger praktischer Reformen. Enge dicht bewohnte Strassen und Stadttheile wurden niedergerissen, neue Quartiere mit hygienisch einwandfreien Wohnungen erbaut; durch unterirdische Schwemmkanäle oder durch besondere Abfuhrsysteme wurden die Abfallstoffe entfernt, centrale Wasserversorgungen eingerichtet, die Nahrungsmittel einer strengen Controle unterworfen, die Kranken- und Armenpflege besser organisirt. In dem energischen Bestreben nach Besserung der hygienischen Schäden beugte sich das englische Volk einer Menge von lästigen polizeilichen Controlen und Eingriffen in seine kommunale Selbstverwaltung. Der General Board of health hatte beispielsweise eine Anzahl Inspektoren, welche von den Gemeinden Einsicht in alle Dokumente, Pläne, Steuerrollen u. s. w. verlangen konnten, und auf deren Bericht hin die Gemeinden zur Einrichtung eines Ortsgesundheitsamts gezwungen werden konnten, welches das Recht erhielt zur Erhebung von Steuern behufs Deckung aller im Interesse der öffentlichen Gesundheit aufgewendeten Kosten.

Allerdings wurde nach Ablauf einiger Jahre durch diese Reformen eine messbare Wirkung auf den Gesundheitszustand erzielt. Die Mortalitätsziffer sank; die einheimischen infectiösen Krankheiten nahmen in vielen Städten ab oder hörten ganz auf; an Cholerainvasionen schloss sich keine Ausbreitung im Lande an. — Mit Stolz blickten Staatsmänner und Aerzte auf diese Erfolge, und die Hygiene war innerhalb kurzer Zeit nicht nur in England, sondern auch in den übrigen civilisirten Staaten populär geworden.

Trotzdem wir auch heute dem energischen Vorgehen der englischen Hygieniker unsere Anerkennung nicht versagen können, dürfen wir uns

aber doch nicht verhehlen, dass jene Reformen im wesentlichen und in erster Linie eine Besserung der socialen Lage der ärmeren Bevölkerung, und grösstentheils erst auf dem Umwege durch die gebesserten socialen Verhältnisse eine Beseitigung jener Gesundheitsschädigungen bewirkten, die eigentlich den Ausgangspunkt der Reformen gebildet hatten. Specifisch hygienische Reformen waren damals auch gar nicht möglich; und zwar weil man über die Ursachen der hygienischen Schäden, speciell der besonders gefürchteten Infektionskrankheiten, so gut wie nichts wusste, und weil doch diese Ursachen jeder rationellen hygienischen Reform zum Angriffspunkt dienen mussten. In Bezug auf die Ätiologie der Krankheiten und auch der Infektionskrankheiten stand man damals auf einem rein empirischen Standpunkt, der von dem oben gekennzeichneten PETER FRANK's kaum verschieden war. Daneben liess man sich von allerlei, der wissenschaftlichen Begründung noch durchaus entbehrenden Hypothesen leiten. Speciell von den Infektionskrankheiten nahm man an, dass sie ihre Entstehung riechenden Gasen und der Anhäufung von Schmutz und Abfallstoffen verdanken, und dass sie verschwinden durch systematische Reinhaltung von Haus, Boden, Körper und Nahrung — Anschauungen, denen wir ebenso schon in den altägyptischen und mosaischen Hygiene begegnen.

Dass Beseitigung socialer Missstände und systematische Reinhaltung die Volksgesundheit günstig beeinflusst, das ist nicht zu bezweifeln und durch die englischen Reformen auf's Neue bestätigt. Aber es ist auch von vornherein wahrscheinlich, dass diese Art des Vorgehens vom streng hygienischen Standpunkt einen starken Luxusbetrieb darstellt und daß die hauptsächlichsten vermeidbaren Krankheiten durch viel einfachere Mittel beseitigt werden können. Und ebenso ist es wahrscheinlich, dass jene ohne Kenntniss der Krankheitsursachen durchgeführten Reformen die speziellen hygienischen Ziele oft ganz verfehlt haben. In der That haben sich z. B. so manche der damals angelegten Wasserversorgungen nicht bewährt und mussten später durch andere ersetzt werden, weil scheinbar reine, in Wirklichkeit aber sehr verdächtige Wasser gewählt waren. Ebenso kam man, geleitet von übertriebenen Ansichten über die Gefahren verunreinigten Bodens, zu Verfahren der Abfallbeseitigung, die in der Neuzeit von Grund aus geändert werden mussten. In manchen der assanirten Städte zeigten sich trotz allem ausgedehnte Typhusepidemien, als Zeichen, dass man die eigentliche Krankheitsursache nicht in richtiger Weise beseitigt hatte; und eine Reihe wichtiger endemischer Krankheiten blieb in zahlreichen Städten von den eingeführten Reformen völlig unbeeinflusst.

Offenbar lag damals eine klaffende Lücke unserer wissenschaft-

lichen Erkenntniss vor, die erst ausgefüllt werden musste, ehe rationell begründete praktische Reformen auf dem Gebiet der Hygiene möglich waren.

Es fehlte eben damals an einer wissenschaftlichen hygienischen Forschung. — Diese hat erst vor etwa 25 Jahren begonnen. PETTENKOFER war der Erste, welcher eine grössere Reihe von Experimentaluntersuchungen über Fragen der Heizung und Ventilation, über Kleidung, über das Verhalten von Neubauten, über das Grundwasser und die Bodenluft anstellte, und welcher dadurch der Experimental-Hygiene eine erste feste Basis gab. Im Verein mit VORT legte PETTENKOFER ausserdem den Grund zu unseren heutigen Anschauungen über Nahrungsmittel und Ernährung. In späterer Zeit waren es besonders die Entdeckungen KOCH's, welche neue Arbeitsgebiete erschlossen und für die so überaus wichtigen Fragen der Entstehung und Verbreitung der Infektionskrankheiten die Anwendung exakter Forschungsmethoden ermöglichten.

Seitdem hat die Hygiene in kurzer Zeit vielfache Aufklärung über interessante Beziehungen der Aussenwelt zum Menschen gegeben und Erfolge errungen, welche der gesammten medicinischen Wissenschaft im höchsten Grade förderlich gewesen sind, und vor allem sind seitdem messbare praktische Erfolge viel deutlicher zu Tage getreten als früher. Stellt man die Zahl der Todesfälle auf je 1000 Lebende in Preussen vom Jahre 1820 bis 1895 von 5 zu 5 Jahren zusammen, so zeigt sich, dass in den letzten Perioden eine so niedrige Sterblichkeit geherrscht hat, wie nie zuvor, und dass die Abnahme in den letzten Abschnitten progressiv vorgeschritten ist.

Eine solche Mortalitätsstatistik ist freilich ein nicht einwandfreier Indikator für den Erfolg hygienischer Reformen. Sterblichkeitsziffern aus verschiedenen Perioden sind überhaupt schwer vergleichbar; und vor allem sind wirthschaftliche und sociale Momente, ferner die Höhe der Geburtsziffer von erheblichem Einfluss auf die Sterblichkeit. — Einen besseren Indikator haben wir an den infektiösen Krankheiten. An Typhus z. B. starben in Preussen: 1875—79 = 6.2 auf 10000 Lebende; 1880—84 = 5; 1885—89 = 2.8; 1890—94 = 1.9, also eine starke stetige Abnahme, die sicher zum grossen Theil auf Rechnung unserer rationelleren Wasserversorgung und Desinfektion zu setzen ist. — Noch intensiver ist die Abnahme der Diphtherie: in dem Jahrzehnt 1880—90 sind noch die meisten Jahre mit 18—19 Todesfällen auf 10000 Lebende belastet; bis 1894 tritt Abnahme ein, aber noch gering und unregelmässig, 12, 13, 18, 15 Todesfälle; im Jahre 1895 9; 1896 7.6; 1897 nur noch 6.2 Todesfälle; und trennt man Stadt und Land, so

ist die Abnahme in den Städten eine noch erheblich rapidere. Hier haben wir zweifellos zum grossen Theil die Wirkung des BEHRING'schen Serums vor uns; zum Theil ist aber auch sicher die frühzeitige Erkennung der Krankheit durch bakteriologische Diagnose und die bessere Desinfektion betheiligt. — Besonders wichtig ist ferner die Abnahme der Lungenschwindsucht, dieser mörderischen Krankheit, die bei den im Alter von 15—60 Jahren Gestorbenen 30—40% aller Todesfälle verursacht. In den Jahren 1888—90 sehen wir eine allmähliche, von 1891—97 eine rascher vorschreitende Abnahme der Phthise. Hier ist die frühzeitige Erkennung der Krankheit durch den Bacillennachweis, die Erkenntniss der Ansteckungswege und der zur Verhütung der Ansteckung geeigneten Maassnahmen und die Verbesserung der Desinfektion als Ursache der Abnahme anzusehen, wenn auch daneben die Krankenversicherungsgesetze sicher nicht ohne Einfluss gewesen sind.

Ausschliesslicher und unbestrittener ist die Wirkung der neueren hygienischen Lehren und Maassnahmen auf die exotischen Infektionskrankheiten, Cholera und Pest. Das Schreckgespenst der Cholera hielt seinen letzten Einzug in Deutschland 1892. Zufällig betraf damals die erste Einschleppung eine Stadt, die in Bezug auf manche hygienische Einrichtungen und namentlich in Bezug auf Wasserversorgung um Jahrzehnte hinter anderen Städten zurück war; und so entstand jene explosive Hamburger Cholera-Epidemie, die eine weitreichende Panik hervorrief und an vielen Orten ganz vergessen liess, dass wir inzwischen den Choleraerreger genau kennen und sicher vernichten gelernt hatten. Aber nicht lange dauerte diese Panik. Bald erfolgte eine Bekämpfung genau entsprechend den nunmehr erkannten Lebenseigenschaften des Erregers; und diese Bekämpfung war ebenso einfach und für den Verkehr und das wirthschaftliche Leben schonend wie sie erfolgreich war. Achtmal hat seither z. B. in Schlesien eine Einschleppung von Cholera stattgefunden; meist in Oberschlesien von der russischen Grenze her, zweimal aber auch in Niederschlesien von der Oder aus. An die meisten dieser Einschleppungen schlossen sich kleine Epidemien an; es gelang aber jedesmal rasch, dieselben zu begrenzen; und das Publikum hat sich an diese Erfolge bald so gewöhnt, dass eigentlich von den späteren Einschleppungen gar keine Notiz mehr genommen ist. Was ist das für ein Contrast gegen die Aufregung und gegen die Störung von Handel und Verkehr, die sonst durch eine Cholera Invasion hervorgerufen wurde!

Ähnlich steht es jetzt mit der Pest. Diese alte Geissel des Menschengeschlechts war seit mehr als einem Jahrhundert aus Europa verschwunden, als sie plötzlich 1878 in Wetljanka im Gouvernement

Astrachan auftauchte. Diese Nachricht rief damals grosse Bestürzung in ganz Europa hervor. Und als nun gar ein Hausknecht in St. Petersburg unter pestverdächtigen Symptomen erkrankte, da stand die Pest im Centrum des öffentlichen Interesses, die abenteuerlichsten Sperr- und Schutzmaassregeln wurden diskutiert, und allgemein sah man bereits die Schrecken des „schwarzen Todes“ sich wieder wie im Mittelalter über Europa ausbreiten. — Wie anders die heutige Auffassung! Die Pest verlässt seit einigen Jahren Europa und die nächst angrenzenden Länder nicht mehr. In Alexandrien, Beirut, Porto, Lissabon, Plymouth, Glasgow, Triest, Wien, Hamburg sind im vorigen oder in diesem Jahre Pesterkrankungen vorgekommen, und wir haben sicher noch manches neue Auftauchen von Erkrankungen zu erwarten. Aber inzwischen haben wir den Erreger, seine Existenzbedingungen, seine Verbreitungsweise genau kennen gelernt; jetzt können wir die Krankheit mit sicher wirkenden, und doch schonenden, allen überflüssigen Aufwand vermeidenden Mitteln bekämpfen. Und die Erfahrung zeigt uns, dass nun diese Krankheit nicht schwer, sondern relativ leicht zu tilgen oder in Schranken zu halten ist.

Wie unrichtig ist die Vorstellung, von der man nicht selten hört und liest, dass die Entdeckung der Bacillen eine übertriebene Bacillenfurcht und Beunruhigung in's Publikum getragen habe! Gerade im Gegentheil ist die verlässliche und zielbewusste Art, in der wir jetzt die Epidemien zu bekämpfen im Stande sind, gewiss nur geeignet, Ruhe und Vertrauen unter der Bevölkerung zu verbreiten.

Seit dem Beginn ihrer selbstständigen Entwicklung ist die Hygiene auch mannigfaltigen Angriffen und namentlich Einwänden gegen die praktische Leistungsfähigkeit dieser Wissenschaft ausgesetzt gewesen.

Zunächst stellen Manche der praktischen Hygiene deshalb eine schlechte Prognose, weil die Reformen sowohl auf dem Gebiete der individuellen wie der öffentlichen Hygiene zu viel Mittel zu ihrer Durchführung beanspruchen, und weil deshalb die ärmeren Volksschichten für absehbare Zeit von den meisten hygienischen Reformen ausgeschlossen seien.

Zu dieser Anschauung kommt man jedoch nur dann, wenn die hygienischen Maassnahmen, so wie es früher allgemein geschah, mit socialen Reformen verwechselt oder zu sehr verquickt werden. Versteht man unter speciell hygienischen Reformen nur solche, welche manifeste Gesundheitsstörungen unmittelbar zu beseitigen oder

fernzuhalten im Stande sind, und welche gerade deshalb Anspruch auf dringliche Durchführung haben, so lassen sich diese oft durch spezifische, die einzelne Schädlichkeit treffende Vorschriften und Maassregeln relativ leicht durchführen. Wollte man damit warten, bis die ganze sociale Lage der Bevölkerung sich geändert hat, damit auf dieser Basis und vielleicht in etwas vollkommenerer Weise die hygienische Besserung sich etablirt, so würden Jahrzehnte vergehen, ehe gegen die schreiendsten hygienischen Misstände Abhülfe gewährt wird. Man bessert nicht, sondern schadet nur, wenn man bei der Bekämpfung jeder einzelnen Krankheit immer wieder eine günstigere sociale Lage als unerlässliche Vorbedingung hinstellt.

Giebt man statt dessen spezifische Maassregeln an, durch welche auch ohne Aenderung der socialen Lage und innerhalb ärmlicher enger Verhältnisse ein möglicher Schutz gegen die betreffende Krankheit gewährt werden kann, so ist damit oft sehr viel zu erreichen. Gelingt es doch, die Pocken durch Impfung, die Trichinose und Fleischvergiftungen durch öffentliche Schlachthäuser, die Diphtherie durch Desinfection und Schutzimpfung, die Cholera und Pest durch Isolirung und Desinfection wirksam zu bekämpfen, ohne dass die sociale Lage geändert wird. Wohl erschweren schlechte sociale Verhältnisse den Erfolg und machen eine schärfere Anwendung mancher Maassregeln nöthig. Aber selbst in dem Eingeborenenviertel in Alexandrien und in den Proletariatsquartieren in Porto sind sie noch immerhin durchführbar gewesen, und man hat dort nicht zu warten brauchen, bis die ganze Bevölkerung auf eine höhere Kulturstufe gebracht ist.

Aber noch zwei weitere Einwände sind gegen die praktische Leistungsfähigkeit der Hygiene erhoben. — Der erste derselben ist schon vor etwa 100 Jahren von MALTHUS ausgesprochen und begründet. — Nach MALTHUS vermehrt sich jede Bevölkerung, so lange keinerlei Hemmung existirt, in geometrischer Progression, verdoppelt sich also immer in einer bestimmten Reihe von Jahren (z. B. bei 1.3 Prozent jährlichem Zuwachs alle 55 Jahre; bei 1.8 Prozent Zuwachs alle 89 Jahre); die Unterhaltsmittel dagegen können nur in arithmetischer Progression vermehrt werden. Hierdurch ist das Anwachsen einer Bevölkerung stark beschränkt, denn dasselbe kann naturgemäss nicht weiter gehen, wenn das niedrigste Maass von Unterhaltsmitteln erreicht ist, dessen die Bevölkerung zu ihrem Leben bedarf. Jeder intensiveren Vermehrung wirken vielmehr kräftige Hemmnisse entgegen; und diese sind zum Theil vorbeugende (Beschränkung der Nachkommenschaft durch sittliche Enthaltksamkeit, Ehelosigkeit, Vorsicht nach der Heirath), im Wesentlichen aber zerstörende, auf gesundheitsschädliche Einflüsse

aller Art basirte (schlechte Ernährung der Kinder, Epidemieen, Kriege, Hunger u. s. w.). Wirkt eine erfolgreiche Hygiene dahin, dass die Mortalitätsziffer absinkt, der jährliche Bevölkerungszuwachs also grösser wird, so müssen nur um so eher jene hemmenden Einflüsse zur Geltung kommen. Dauernde stärkere Zunahme der Bevölkerung kann also auch durch die hygienischen Reformen gar nicht erreicht werden.

Gegenwärtig ist in Deutschland der Ueberschuss der Geburten über die Sterbefälle bereits so erheblich, dass wir am Ende des jetzt beginnenden Jahrhunderts mehr als 200 Millionen Einwohner zählen werden. Eine ähnliche Bevölkerungszunahme weisen auch die anderen Kulturstaaen, England, Holland, Belgien, Schweden u. s. w. (mit Ausnahme von Frankreich) auf. Angesichts dieser enormen Ziffer ist in der That ein Zweifel darüber wohl berechtigt, ob sich für solche Menschenmassen Unterhaltsmittel werden beschaffen lassen. Aber es ist das eine Frage, die den Hygieniker eigentlich gar nicht berührt. Wir können nicht eine einzige, die Gesundheit der jetzt lebenden Generation fördernde Maassregel unterlassen, weil eventuell kommenden Generationen der Nutzen wieder verloren geht oder gar Schwierigkeiten daraus erwachsen. Ausserdem aber ist es zweifellos, dass gerade in unserer jetzigen Zeit das MALTHUS'sche Gesetz in Bezug auf die langsame und begrenzte Vermehrung des Unterhalts seine Gültigkeit verloren hat. Auf den verschiedensten Wegen gelingt es jetzt, dank den sich häufenden wissenschaftlichen Entdeckungen und technischen Erfindungen, den Kreis der nutzbaren Lebensmittel zu erweitern. Die Landwirtschaft kann eine gesteigerte Produktion in Aussicht stellen durch neue Hülfsmittel für die Regenerirung des Ackers, durch wirksame Bekämpfung der Viehseuchen, durch Verwerthung der neu entdeckten Assimilirung des Stickstoffs der Luft durch gewisse Pflanzen. Schon ist der Chemie die künstliche Herstellung von Kohlehydraten im Laboratorium geglückt, und in nicht zu ferner Zeit werden gewiss die technischen Schwierigkeiten überwunden sein, welche sich einer rentablen künstlichen Herstellung von Nährstoffen noch entgegenstellen. Daneben gelingt es schon jetzt, Abfallprodukte der Industrie in brauchbare Nahrungsmittel umzuwandeln oder hygienisch vollwerthige Surrogate für theuere Nährstoffe aus billigem Material herzustellen. Und schliesslich sind die modernen Verkehrsmittel im Stande, durch reichlichen Import eine ungenügende heimische Produktion in sehr hohem Maasse auszugleichen.

Können wir uns so über die MALTHUS'schen Einwände leicht hinwegsetzen, so fragt es sich weiter, ob wir ebenso leicht Stellung nehmen können gegenüber den Bedenken, die von SPENCER gegen die Lei-

stungen der Hygiene erhoben sind. HERBERT SPENCER stellt sich in seinem Werke: *The study of sociology* (von dem 1875 eine deutsche Ausgabe erschien) im Grossen Ganzen auf den MALTHUS'schen Standpunkt, fügt aber noch die Behauptung hinzu, dass durch die Verminderung der Schädlichkeiten eine Anzahl schwächerer Individuen am Leben erhalten werde, welche sich dann vermehren und so die durchschnittliche Tüchtigkeit herabsetzen. Die schwächlicher gewordene Gesellschaft vermöge dann auch den geringer gewordenen Schädlichkeiten nicht zu widerstehen, und so komme die Sterblichkeit bald wieder auf das frühere Maass, und die hygienische Besserung sei vergeblich gewesen.

Diese Deduction SPENCER's, die seither gern auch von Anderen gegen die hygienischen Reformen in's Feld geführt wird, enthält indess einen logischen Fehler. Wenn Individuen vorhanden sind, die gegenüber bestimmten Schädlichkeiten die Schwächeren sind, und wenn dann diese Schädlichkeiten beseitigt und dadurch jene Individuen am Leben erhalten werden, so sind sie nun gar nicht mehr die Schwächeren, sondern sie waren es nur gegenüber jenen bestimmten Krankheitsursachen. Man kann unter den „Schwächeren“ nicht etwa die allgemein Schwächeren und weniger Leistungsfähigen verstehen; denn diese werden gar nicht von den hauptsächlich in Betracht kommenden Krankheiten mehr ergriffen als andere Individuen, sondern Cholera, Typhus, Diphtherie u. a. suchen ihre Opfer oft gerade unter den kräftigsten Männern und Kindern, die nur in Folge einer besonderen Epithelbeschaffenheit, Giftempfänglichkeit u. dgl. diesen Krankheiten erliegen. Die furchtbare Säuglingssterblichkeit betrifft auch nicht vorzugsweise Kinder, die von Anfang an schwächlich waren und zu kräftigen Menschen nicht heranwachsen konnten, sondern ursprünglich vollgesunde Kinder sehen wir durch unverständige Behandlung und Diätfehler disponirt werden für die Seuchen der heissen Sommermonate, die sie nun in grosser Zahl blitzartig dahinraffen. Und wenn wir die zur Erkrankung an Tuberkulose Disponirten vor der Ansiedlung des Krankheitserregers von Jugend auf wirksam zu schützen vermögen, so conserviren wir uns damit kein schwächliches minderwerthiges Menschenmaterial; sondern die Minderwerthigkeit dieser Menschen bestand eben im wesentlichen nur darin, dass sie für den Tuberkelbacillus empfänglich waren, und sie sind so gut lebens- und leistungsfähig, wie Andere, wenn diese specifische Gefahr beseitigt ist.

Der Behauptung SPENCER's lässt sich mit mehr Recht eine andere entgegenstellen: Die hygienischen Reformen bewirken in der That eine gewisse Auslese der Bevölkerung, aber in dem Sinne, dass die sittlich und intellectuell höher stehenden Menschen vor den übrigen bevorzugt

werden. — Dies ergibt sich, wenn man zweierlei Arten von hygienischen Reformen unterscheidet: erstens generelle, von denen Alle ohne jedes Zuthun des Einzelnen profitieren. Dahin gehören z. B. allgemeine obligatorische Impfungen, wie die Schutzpockenimpfung; Kanalisation und Wasserversorgung, wenn sie möglichst allen Einwohnern in gleicher Weise zugänglich gemacht sind. Zweitens hat aber ein sehr grosser Theil der hygienischen Reformen mehr facultativen Charakter, und durch diese kann dann eine gewisse elective Wirkung ausgeübt werden. Z. B. das Diphtherieserum wirkt erfahrungsgemäss nur dann sicher, wenn es bald nach dem Ausbruch der Krankheit zur Anwendung kommt; ebenso kann Ansteckung nur durch frühzeitige Isolirung verhütet werden. Nur die Eltern, die ihre Kinder sorgsam beobachten und deren Behandlung energisch betreiben, haben den vollen Vortheil von jenen Maassnahmen; während dieselben in nachlässigen indolenten Familien keinen Erfolg haben. Bei der Behandlung und Verhütung der Phthise kommt es auf frühzeitige Erkennung, auf lange und consequent fortgesetzte Kuren, auf Sorgsamkeit im Verhüten der Ansteckung an; für leichtsinnige, liederliche, willensschwache Menschen giebt es bei weitem nicht in dem gleichem Maasse Schutz und Rettung. — Mögen wir den Müttern in der kritischen Zeit der Hochsommerepidemien einwandfreie Kindernahrung unentgeltlich zur Verfügung stellen, immer wird ein Theil derselben durch sonstige nachlässige Behandlung der Kinder oder durch thörichte Behandlung der gelieferten Nahrung trotzdem eine günstige Wirkung nicht aufkommen lassen. Und wenn z. B. in Oesterreich die Schutzpockenimpfung nicht obligatorisch, sondern nur empfohlen ist, so wird derjenige Theil der Bevölkerung sich die Vortheile dieser facultativen Maassregel entgehen lassen, der zu indolent ist oder die Tragweite seiner Unterlassung nicht zu beurtheilen vermag.

Kurz — wir können uns mit der Mehrzahl der hygienischen Reformen stets nur an einen Theil der Bevölkerung wenden; nicht etwa an den bemittelteren, sondern im Gegentheil sind es die ärmeren Klassen, die selbstverständlich vorwiegend unsere Fürsorge erfordern; wohl aber nur an diejenigen, die guten Willen, Eifer und Einsicht in ausreichendem Maasse unseren Reformen entgegenbringen.

Die so durch die hygienischen Bestrebungen zu Stande kommende intellectuelle und moralische Auslese darf man nicht gering veranschlagen. Die Gesundheit ist der Güter höchstes nicht; und wenn schliesslich eine Hebung der Volksgesundheit in noch höherem Grade als jetzt gelänge durch hygienische Reformen von durchweg generellem Charakter, und wenn davon unterschiedslos auch die unlauteren, moralisch und intellectuell minderwerthigen Elemente betroffen würden,

so könnte doch die Zeit kommen, wo gerade begünstigt durch diese Erleichterung der physischen Existenzbedingungen ein cultureller Niedergang und eine Gefährdung von Kunst, Wissenschaft und Sitte drohte. Dem wirkt jener facultative Charakter der meisten hygienischen Maassnahmen entgegen. Und so sehen wir, dass die Hygiene in den Kampf für die idealen Güter kräftig einzugreifen hat, und dass sie sich auch hierin den übrigen wissenschaftlichen Fächern anreihet, von denen jedes in seiner Weise in diesem Kampfe mitzuwirken berufen ist.

Eine übersichtliche und ungezwungene Eintheilung des Inhalts der Hygiene ist durch die Fülle und Ungleichartigkeit des Materials einigermaassen erschwert. Zweckmässig werden zwei grössere Abtheilungen dadurch hergestellt, dass zunächst die allgemeinen, überall in Betracht kommenden Einflüsse der natürlichen Umgebung besprochen werden; diesen gegenüber sind zweitens die speciellen Einflüsse der künstlich durch Eingreifen des Menschen modificirten Umgebung zu erörtern. Es würde jedoch das Verständniss nur erschweren, wollte man diese Gruppierung in rigoroser Weise durchführen. In einzelnen Kapiteln, wie z. B. beim Wasser, ist die Beschreibung der künstlichen Einrichtungen zur Wasserversorgung nicht wohl von der Schilderung der natürlich gegebenen Bezugsquellen des Wassers zu trennen. Demnach wird die angegebene Eintheilung nur im Allgemeinen für die Reihenfolge der einzelnen, im Inhaltsverzeichniss näher aufgeführten Kapitel maassgebend sein.

Erstes Kapitel.

Die Mikroorganismen.

Unter „Mikroorganismen“ begreifen wir zahlreiche kleinste Lebewesen, welche zu den niedersten Pflanzen gehören oder auf der Grenze zwischen Thier und Pflanze stehen. Die Mehrzahl derselben zeigt nur $1\ \mu$ Durchmesser oder weniger. Sie sind ausgezeichnet durch eine enorme Vermehrungsfähigkeit und durch eine besondere Breite der Existenzbedingungen. Es giebt Arten von Mikroorganismen, welche bei 0° wachsen, andere, welche bei 30° , wieder andere, welche bei 50° am besten gedeihen; einige Arten wuchern am üppigsten bei alkalischer Reaction des Nährbodens, andere bei saurerer Reaction. Auch die Art der Nährstoffe ist im Allgemeinen weniger beschränkt als bei Thieren und höheren Pflanzen. Während die Thiere complicirte organische Stoffe aufnehmen müssen und diese in ihrem Körper zerstören, und während die chlorophyllführende Pflanze auf relativ einfache organische Verbindungen (Ammoniak, Kohlensäure, Wasser) angewiesen ist, können die Mikroorganismen sowohl von einfachen Verbindungen aus als auch von complicirten Nährsubstanzen leben. Im Ganzen ziehen sie die letzteren vor und einige Arten vermögen sogar nur von den hochconstituirten Nährstoffen der Thiere zu leben.

Die Mikroorganismen spielen eine wichtige Rolle im Haushalt der Natur, indem sie fortlaufend grosse Massen absterbender vegetabilischer und animalischer Substanz zerstören und die darin enthaltenen Stoffe in jene einfachen Verbindungen überführen, mit welchen die Chlorophyll führenden Pflanzen ihren Aufbau leisten können.

Für die Hygiene haben die Mikroorganismen besonderes Interesse **erstens** dadurch, dass sie Gährung und Fäulniss erregen, d. h. dass sie unter Gasentwicklung in kürzester Zeit sehr bedeutende Mengen organischen Materials zu zerlegen vermögen. Diese Gährungen sind

uns theils nützlich, indem sie uns z. B. bei der Präparation mancher Nahrungsmittel unterstützen (Brot, Käse, Kefyr, Bier, Wein). Theils treten sie uns schädigend gegenüber, indem sie viele Nahrungsmittel rasch in einen ungeniessbaren Zustand überführen; indem ferner in faulenden Gemengen giftige Stoffe und stinkende Gase entstehen, welche die Gesundheit beeinträchtigen können.

Zweitens kommt vielen Mikroorganismen die Fähigkeit zu, den Kreis der für ihre Existenz geeigneten Bedingungen noch mehr auszu dehnen; sie können nämlich in lebenden höheren Organismen, hauptsächlich Thieren, seltener Pflanzen, eine parasitäre Existenz führen. Sehr häufig bringen sie dabei ihren Wirthen Krankheit und Tod. Solche Mikroparasiten sind auch die Ursachen vieler beim Menschen auftretender Krankheiten; so sind bei Milzbrand, Rotz, Abdominal-Typhus, Cholera, Tuberkulose, den verschiedenen Wund-Infektions-Krankheiten u. a. m. Mikroorganismen als die ursächlichen Erreger ermittelt.

Dass in der That die Mikroorganismen die Ursache einerseits von Gährung und Fäulniss und andererseits von parasitären Krankheiten sind, ist neuerdings mit aller Schärfe bewiesen.

Es giebt allerdings Forscher, welche auch heute noch diese Rolle der Mikroorganismen anzweifeln. Dieselben glauben entweder, dass stets eine chemische Veränderung der todtten oder lebenden Substanz der Ansiedelung und Thätigkeitsentfaltung der Mikroorganismen vorausgehen müsse; jene Veränderung soll das Wesentliche, die Rolle der Mikroorganismen etwas Nebensächliches sein. Oder sie nehmen in Anlehnung an die Hypothese der *Generatio aequivoca* an, dass aus absterbenden oder krankhaft veränderten und zerfallenden pflanzlichen oder thierischen Zellen Mikroorganismen entstehen können, so dass es also gar keines Zutritts der letzteren von aussen bedarf, um in einer todtten Substanz Fäulnissorganismen oder im lebenden Körper parasitäre Organismen zu reichlichster Entwicklung kommen zu lassen (BÉCHAMP's Mikrozymatheorie; FOKKER's Heterogenese; WIGAND's Anamorphose).

Diese Ansichten sind nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse in keiner Weise mehr haltbar und durch eine Reihe sorgfältiger Beobachtungen und einwandfreier Experimente widerlegt.

Beweise für die ursächliche Rolle der Mikroorganismen bei der Gährung und Fäulniss.

1) In jeder faulenden Substanz finden sich Mikroorganismen. Wo sie vermist werden, hat man entweder ungenügende Methoden angewandt oder man hat zu spät, nachdem bereits die Mikroorganismen wieder abgestorben waren, die gefaulte Substanz untersucht.

2) In organischen Substanzen, welche keine Erscheinungen von Gährung, Fäulniss oder Zersetzung darbieten, finden sich keine Mikroorganismen, oder doch nur solche, welchenachweislich eine schnelle, leicht wahrnehmbare Aenderung der Substanz nicht zu bewirken vermögen. — Ehe man die einzelnen Arten von Mikroorganismen und ihren äusserst ungleichen Effect gegenüber der gleichen organischen Substanz kennen gelernt hatte, wurde jeder Befund von

irgendwelchen Mikroorganismen in nicht gährenden Substraten gegen ihre Rolle bei der Gährung verwerthet. Jetzt weiss man, dass nur die Abwesenheit von bestimmten gährungserregenden Mikroorganismen in gährfreien Substraten erwartet werden darf.

3) Das überaus verbreitete Vorkommen von Gährung und Fäulniss deckt sich mit der Verbreitung der Mikroorganismen. Dieselben finden sich überall, im Luftstaub, im Wasser, an allen Gegenständen haftend; so dass sie an jedem Ort vorhanden sind und in Aktion treten können, wo immer gährfähige Substanz in Gährung geräth.

4) Hemmt man die Entwicklung von Mikroorganismen durch Zusatz gewisser für sie giftiger Substanzen zum gährfähigen Substrat, so tritt keine Zersetzung ein. Gifte für Mikroorganismen sind z. B. Phenol, Salicylsäure, Essigsäure, grosse Mengen Salz etc. Bekanntlich werden manche von diesen Giften angewendet, um Nahrungsmittel zu conserviren, d. h. vor Gährung und Fäulniss zu schützen. Sobald man aber das Gift aus der conservirten Substanz entfernt, z. B. das Salz mit Wasser auslaugt, oder die Säure neutralisirt, so tritt alsbald Zersetzung ein.

5) Tödtet man die einer gährfähigen Substanz anhaftenden Organismen und hindert den Zutritt neuer Mikroorganismen, so tritt keine Gährung ein. Dieses Experiment kann z. B. so ausgeführt werden, dass man die gährfähige Substanz in einem Glas- oder Blechgefäss stark erhitzt und gleichzeitig das Gefäss zuschmilzt. Durch die Hitze werden alle lebenden Wesen und so auch die anhaftenden Mikroorganismen sicher getödtet; durch das Zuschmelzen ist der Zutritt neuer Mikroorganismen gehindert. So behandelte gährfähige Substanzen halten sich in der That völlig unverändert.

Man hat wohl eingewendet, dass durch das Zuschmelzen der Sauerstoffzutritt zur gährfähigen Substanz gehindert und dadurch die Gährung unmöglich gemacht werde. Das Experiment ist aber leicht so einzurichten, dass man den Luftsauerstoff ungehindert Zutreten lässt. Da die Luft an sich keine Gährung bewirkt, sondern nur die etwa in ihr enthaltenen Mikroorganismen, so müssen nur diese entfernt werden; dann aber darf der Luftzutritt ohne Bedenken gestattet werden. Um die Luft von Mikroorganismen zu befreien, kann man dieselbe durch ein glühendes Glasrohr leiten, oder man filtrirt sie durch ein Filter von lockerer Watte, welches erfahrungsgemäss völlig ausreicht, um alle körperlichen Elemente der Luft und auch die Mikroorganismen zurückzuhalten. Oder man kann das Gefäss mit gährfähiger Substanz in ein offenes Rohr übergehen lassen, dem man nur ein oder zwei Krümmungen nach abwärts giebt; da die Mikroorganismen, wenn sie auch noch so klein sind, doch immer ein gewisses Gewicht besitzen, sind die gewöhnlichen, im Zimmer vorkommenden Luftströmungen nicht im Stande, sie nach aufwärts und über die Krümmungen hinweg in das Innere des Gefässes zu führen. In allen diesen Versuchen bleibt trotz des völligen ungehinderten Zutritts der gasförmigen Bestandtheile der Aussenluft die gährfähige Substanz unzersetzt.

Das Experiment ist dann noch in der Weise zu ergänzen, dass man die conservirte Substanz nachträglich absichtlich mit Mikroorganismen in Berührung bringt (z. B. durch Entfernung des Watterpfropfens oder durch Abbrechen des gekrümmten Rohres). Es tritt dann ausnahmslos binnen kürzester Zeit Gährung ein, und es wird hierdurch bewiesen, dass die gährfähige Substanz durch das vorausgehende Erhitzen nicht etwa ihre Gährfähigkeit verloren hatte.

6) Ein Einwand könnte trotzdem noch gegen die Beweiskraft der geschilderten Experimente erhoben werden. Wenn nämlich, wie es die Anhänger der *Generatio aequivoca* oder der Anamorphose behaupten, aus den thierischen und pflanzlichen Zellen Mikroorganismen entstehen können, so ist selbstverständlich durch das Erhitzen der Substanz resp. durch Zusatz von Giften eine derartige „spontane“ Entstehung von Mikroorganismen unmöglich gemacht. Dass dieselben Substanzen auf Zusatz von Mikroorganismen sich noch gärfähig zeigen, beweist nur, dass die von aussen hereingelangenenden Mikroorganismen auch im Stande sind, Gährung zu erregen; es fehlt aber der Beweis dafür, dass nicht vielleicht ebensowohl ohne Zutritt von Mikroorganismen aus der völlig unveränderten, nicht geschädigten Zellsubstanz Mikroorganismen entstehen können, welche Gährung bewirken.

Um diesen letzten Einwand zu widerlegen, ist es offenbar nöthig, gärfähige Substanzen zu conserviren, ohne dass man sie vorher mit Hitze, Giften oder anderen die Zellen schädigenden Einflüssen behandelt. Auch solche Versuche lassen sich nun leicht ausführen und ergeben stets dasselbe Resultat, sobald der Experimentator die nöthige Uebung sich erworben hat. Will man ein Stück einer Pflanze oder eines Thieres in dieser Weise conserviren, so muss man allerdings von der äusseren Oberfläche der Pflanzen oder Thiere absehen, da an dieser stets Mikroorganismen haften. Im Innern finden sich aber erfahrungsgemäss keine Mikroorganismen und man braucht dann nur in einem Zimmer, dessen Luft und Gegenstände vorher sorgfältig sterilisirt, d. h. von Mikroorganismen befreit sind, mit sterilisirten Händen und mit erhitzten und dann wieder abgekühlten Instrumenten in das Innere des Pflanzen- oder Thierkörpers vorzudringen, dort ein Stück abzuschneiden und in einem vorher sterilisirten Gefäss unter Watteverschluss aufzubewahren. So lässt sich z. B. ein Stück Leber eines Kaninchens, oder ein Stück Muskel, oder ein Stück aus dem Innern einer Kartoffel u. dgl. ohne jede Anwendung von Conservierungsmitteln jahrelang in unverändertem Zustande conserviren. Diese Versuche sind in neuerer Zeit in so grosser Zahl und mit so übereinstimmendem Resultat ausgeführt, dass die hier und da erhaltenen entgegengesetzten Ergebnisse unbedingt auf mangelhaftes Beherrschen der technischen Methoden zurückzuführen sind.

7) Ueberträgt man eine minimale Menge von einem Substrat, welches sich in einer bestimmten specifischen Gährung befindet, und in welchem durch diese Gährung specifische Produkte gebildet werden, oder aber von einer Reincultur der betreffenden specifischen Gährungserreger auf eine neue gärfähige Substanz, so wird die gleiche specifische Gährung (Milchsäure-, Buttersäure-, Alkoholgährung etc.) hervorgerufen und es finden sich auf der Höhe der Gährung nur die übertragenen Organismen in solcher Zahl, dass durch ihre Aktion der ganze Gährungsprocess seine zureichende Erklärung findet.

Neuerdings ist es E. BUCHNER gelungen, alkoholische Gährung nicht nur durch lebende Hefe, sondern auch durch die unter starkem Druck ausgepresste Leibessubstanz der Hefezellen (Zymase) hervorzurufen. Diese Entdeckung ändert nichts an der Auffassung von der Abhängigkeit jeder Gährung von der Lebensthätigkeit bestimmter Mikroorganismen; jene Substanz wird eben nur in den lebenden Organismen gebildet und repräsentirt das Mittel, dessen sich die lebende Zelle zur ausgedehnten Zerlegung des Nährmaterials bedient.

Analoge Beweise für das Zustandekommen zahlreicher Infektionskrankheiten durch Mikroorganismen:

1) Bei vielen Infektionskrankheiten der Menschen und Thiere beobachten wir im Blut und in den Organen Mikroorganismen und zwar in jedem Einzelfall einer bestimmten Krankheit immer die gleiche wohlcharakterisirte Art von Mikroorganismen. Je vollkommener unsere Untersuchungsmethoden werden, um so sicherer und bei um so zahlreicheren Krankheiten gelingt dieser Nachweis.

2) Bei gesunden, von Infektionskrankheiten freien Menschen und Thieren finden wir im Blut und im Innern der Organe keine Mikroorganismen. Es geht dies mit Sicherheit aus den oben beschriebenen Conservierungsversuchen mit thierischen Organen hervor. Ausnahmsweise können sich unschädliche Mikroorganismen, welche zufällig oder durch das Experiment in die Blutbahn gelangt waren, in inneren Organen gesunder Thiere eine Zeit lang lebendig erhalten.

3) Die Verbreitung der Infektionskrankheiten entspricht durchaus der Verbreitung der verschiedenen specifischen Mikroorganismen in unserer Umgebung, so dass stets die Möglichkeit gegeben ist, dass durch die von aussen mittelst Luft, Wasser, Nahrung, oder Berührung oder von der Haut- bzw. Schleimhautoberfläche (z. B. Nasen- und Mundhöhle) in den Körper gelangten Mikroorganismen die Krankheit hervorgerufen wurde.

4) Wird eine Haut- oder Schleimhautwunde, an welcher schädliche Mikroorganismen haften, fortgesetzt mit Substanzen, welche die Vermehrung der Mikroorganismen hemmen (Carbolsäure), behandelt, so bleiben die Symptome einer Wundinfektion, Eiterung und Fieber, aus (Antisepsis).

Unterbricht man die antiseptische Behandlung und erfolgt darauf Vermehrung der Organismen, so tritt alsbald Eiterung oder Fieber ein.

5) Tödtet man die in einer Wunde etablirten schädlichen Mikroorganismen durch Hitze, starke Carbolsäure, Sublimat oder dergleichen, und hindert dann den Zutritt neuer Mikroorganismen durch abschliessende keimfreie Verbände, so tritt keine Eiterung und kein Fieber ein (Asepsis).

Ist der Abschluss unvollkommen und gelangen in irgendwelcher Weise infektiöse Mikroorganismen in die Wunde, so zeigen sich in Kürze die Symptome der Wundinfektion — ein Zeichen, dass nicht etwa die Substanz der Wunde durch jene Eingriffe unfähig geworden war zur Auslösung einer Infektion, sondern dass die letztere nur so lange ausblieb, als es an geeigneten Mikroorganismen fehlte.

6) Auch ohne Anwendung von irgendwelchen die Mikroorganismen oder die Körperzellen schädigenden Substanzen kann eine Wunde vor Infektion geschützt werden, wenn die Wunde in keimfreier Haut mit keimfreien Instrumenten angelegt und durch entsprechende Verbände gegen späteres Eindringen schädlicher Mikroorganismen geschützt wird (Aseptische Operation).

Während früher, ehe man die ursächliche Rolle der Mikroorganismen bei den Infektionskrankheiten richtig erkannt hatte, zahlreiche Operationswunden mit Eiterung, Erysipel, Septicämie oder Pyämie (sog. Blutvergiftung) complicirt waren, vermag jetzt jeder Operateur nur durch sorgfältiges Fernhalten der diese Krankheiten erregenden Mikroorganismen einen reaktionslosen Verlauf der Wunden zu bewirken. Niemals sehen wir eine Wundinfektionskrankheit durch einen „Zersetzungsprocess“ im Körper oder durch Einverleibung chemischer „Gifte“ entstehen; wo Wundinfektion eintritt, ist dieselbe vielmehr mit Bestimmtheit auf das Eindringen specifischer Mikroorganismen zurückzuführen.

7) Viele Infektionskrankheiten lassen sich von Thier zu Thier fortgesetzt übertragen dadurch, dass man minimale Dosen Blut oder Organsubstanz des erkrankten Thieres auf gesunde Thiere überträgt. Solche Uebertragungen hat man durch Reihen von 100 Thieren und mehr fortgeführt. Jedes derselben erkrankt dann an der specifischen Infektionskrankheit und zeigt stets die specifische Art von Mikroorganismen in solcher Zahl und Vertheilung in den Organen, dass alle wesentlichen Krankheitserscheinungen dadurch ihre Erklärung finden.

Man hat früher wohl eingewendet, dass das eigentlich Ursächliche bei diesen Uebertragungen vielleicht eine gewisse Körpersubstanz aus dem kranken Organismus sein könne, welche den Mikroorganismen anhaftet und zusammen mit diesen übertragen wird. Dieser Einwand wird indessen dadurch ausgeschlossen, dass man die Mikroorganismen von Allem befreit, was ihnen etwa noch vom kranken Körper her anhaften kann. Zunächst strebte man dies zu erreichen durch starke Verdünnung des Blutes des erkrankten Thieres; selbst durch weniger als den tausendsten Theil eines Tropfens gelang es dann oft noch, die specifische Krankheit bei einem gesunden Thiere ebenso energisch wie durch enorm viel grössere Dosen auszulösen. Das in solcher Weise wirksame Agens konnte offenbar nur in einem vermehrungsfähigen Etwas, d. h. in lebenden Organismen, bestehen. — Da dies Experiment aber nicht bei allen Infektionserregern gelingt, hat man weiter auch wohl versucht, durch Filtration die Mikroorganismen zu isoliren. Auch diese Experimente stossen auf manche Schwierigkeiten und erst nach vielen vergeblichen Versuchen sind Filter construirt, welche in der That alle Mikroorganismen aus Flüssigkeiten zurückhalten. Dabei hat sich dann gezeigt, dass das keimfreie Filtrat nicht im Stande ist, Infektion auszulösen, sondern nur die auf dem Filter zurückbleibende Masse von Mikroorganismen.

In neuerer Zeit gelingt die Isolirung vieler infektiöser Mikroorganismen in einfachster und sicherster Weise durch die künstliche Cultur. Bringt man etwas Blut aus dem an einer Infektionskrankheit gestorbenen Thier auf ein Substrat, welches den Mikroorganismen als Nährboden dienen kann, z. B. auf durchschnittene Kartoffeln oder in einen grösseren Kolben mit Bouillon, so vermehren sich die betreffenden Mikroorganismen schnell in's Ungemessene. Nach 2 Tagen findet man das ganze Nährsubstrat von der kleinen Impfstelle aus vollständig durchwachsen. Man überträgt nun von dieser ersten Cultur eine minimalste Menge auf einen neuen Nährboden, lässt dort wieder die Mikroorganismen sich massenhaft vermehren und bringt wiederum eine minimale Menge auf ein drittes Substrat; und so fort durch eine Reihe von 100 und mehr „Generationen“. Von der letzten Cultur impft man den Bruchtheil eines Tropfens in eine kleine Wunde eines gesunden Thieres und ruft dadurch mit vollster Sicherheit dieselbe specifische Infektionskrankheit hervor, welche den Ausgangspunkt der Versuchsreihe gebildet hatte. Es ist nicht denkbar, dass etwas Anderes als lebende vermehrungsfähige Mikroorganismen nach dem Durchgang durch die lange Reihe der künstlichen Culturen im Stande gewesen sein sollte, die krankheitserregende Wirkung unverändert zu erhalten. Vielmehr müssen wir in diesen Experimenten einen Beweis dafür sehen, dass specifische von aussen in den Körper gelangte Mikroorganismen die ursächlichen Erreger der Infektionskrankheiten sind.

Viele Infektionserreger sind allerdings dem gesunden Körper gegenüber machtlos, und es bedarf zur Auslösung der Infektionskrankheit

noch einer besonderen Disposition des Körpers (s. im 10. Kapitel). Niemals aber ist die Disposition an und für sich ausreichend für das Zustandekommen der Krankheit, sondern letztere tritt erst ein unter dem specifischen Einfluss der von der Umgebung oder von anderen Menschen aus in den Körper eingedrungenen und in die disponirten Organe gelangten Mikroorganismen.

Die Mikroorganismen gehören grösstentheils zu den niederen Pflanzen, theilweise zu den niedersten Thieren. Für unsere Zwecke erscheint es praktisch, fünf grössere Gruppen zu unterscheiden, nämlich: 1) Fungi, Faden-(Schimmel-)pilze; 2) Blastomycetes, Sprosspilze; 3) Schizomycetes, Spaltpilze; 4) Streptothricheen; 5) Protozoen.

I. Fungi, Faden- (Schimmel-)pilze.

Zellen relativ gross, meist 2—10 μ im Durchmesser; bestehen aus celluloseähnlicher Hülle und anscheinend kernlosem Protoplasma. Sie wachsen durch Verlängerung an der Spitze zu Fäden oder Hyphen aus. Letztere sind meist gegliedert und häufig verzweigt durch Theilung der Endzelle. Die auf dem Nährsubstrat wuchernden Fäden, welche von dort die Nahrung aufnehmen, bezeichnet man als Mycelium. Vor diesem erheben sich aufwärts die Fruchthyphen, welche an ihrer Spitze die Sporen tragen, d. h. rundliche oder längliche, meist mit derber Membran versehene Zellen, ausgezeichnet dadurch, dass sie nach ihrer Abtrennung von den Fruchthyphen auf jedem guten Nährsubstrat zu einem Keimschlauch und demnächst wieder zu einem neuen Mycel auswachsen können. Die Sporen dienen daher zur Fortpflanzung und zur Erhaltung der Art; sie können in trockenem Zustand lange aufbewahrt werden, ohne ihre Keimfähigkeit zu verlieren. — Unter gewissen Umständen bilden die Sporen (Conidien) durch Sprossung neue Conidien, die erst bei Aenderung der Verhältnisse zu Mycelfäden auskeimen.

Die Sporen bilden sich dadurch, dass sie aus der an der Spitze der Hyphe befindlichen Endzelle durch querwandige Theilung sich abschnüren (= Conidien); oder die Endzelle vergrössert sich zum sog. Sporangium oder Ascus, in dessen Innerem durch Theilung des Plasmas die Sporen entstehen. Bei vielen Arten findet sich neben der ungeschlechtlichen eine geschlechtliche Fructification (Oosporen, Zygosporen). — Ausser Sporen kommt vielfach eine andere Dauerform vor, dadurch dass die Mycelfäden in kurze Glieder zerfallen

Idienbildung); oder dadurch, dass sich alternierend ein Glied des Mycelfadens verdickt, während das nächste leer wird (Gemmen- oder Chlamydosporenbildung).

Man begegnet den Schimmelpilzen auf allen möglichen toten Substraten, sie sind im Ganzen in Bezug auf ihren Nährbedarf sehr wenig wählerisch. Im Gegensatz zu den Spaltpilzen können sie auch auf relativ wasserarmem Substrat und bei saurer Reaktion des Nährbodens gut gedeihen. Will man daher bei künstlichen Culturen von Schimmelpilzen die rasch wachsenden Spaltpilze fernhalten, so setzt man dem Nährsubstrat zweckmässig 2—5 Procent Weinsäure zu. Gegerichte Kartoffeln, Brotbrei oder Gelatine-, resp. Agargemische, in solcher Weise angesäuert, sind am geeignetsten zur künstlichen Züchtung. Die Conidienbildung vollzieht sich nur an freier Luft; unter Wasser entwickelt sich höchstens steriles Mycel. — Sehr abhängig zeigen sich die Schimmelpilze von der Aussentemperatur. Das Optimum liegt für die meisten Arten bei $+15^{\circ}$, für andere Arten bei $+40^{\circ}$; je nach der Temperatur gedeiht daher bald diese bald jene Art auf demselben Substrat. Manche kommen parasitisch auf Pflanzen und niederen Thieren vor, so die Brandpilze des Getreides, der Pilz der Kartoffelkrankheit, der Mutterkornpilz, die Rostpilze; die Empusa der Stubenfliegen, der Muskardine- und der Seidenraupen etc.

Der Eintheilung der Fadenpilze wird jetzt allgemein das BREFFELD'sche System zu Grunde gelegt. Nach BREFFELD stehen auf der untersten Stufe die unähnlichen Pilze, bei denen vorzugsweise geschlechtliche Fructification vorkommt; die höheren Stufen umfassen die Pilze, welche nur in Sporangien und Conidien, meistens nur in Conidien (Basidien) fructificiren. —

Von der grossen Menge bekannter Arten seien hier nur einige angeführt, welche entweder wegen ihres verbreiteten Vorkommens unser Interesse beanspruchen, oder welche eine pathogene Wirkung auch auf Menschen ausüben.

Penicillium, namentlich *P. glaucum*, der häufigste Schimmelpilz. Wuchert selbst in destillirtem Wasser, in vielen Arzneien etc. An der Spitze der Sprosshyphen tritt ein Quirl von Aesten pinselförmig hervor, und diese tragen Ketten von kugeligen, 3.5μ grossen Sporen. Flockiges weisses Mycel, nach der Conidienbildung grün. Wächst am besten bei $15-20^{\circ}$, kümmerlt bei 38° . Grosse Massen Sporen, welche Menschen durch Inhalation oder durch Injektion in Blut beigebracht werden, rufen keinerlei Wirkung hervor, sie bleiben ohne Schaden in Milz und Leber liegen, ohne auszukeimen.

Oidium. Als Mehlthau auf lebenden Pflanzen parasitirend; zahlreiche Arten; oft nur die Oidienfructification von Arten, die unter anderen Bedingungen




Fig. 1. *Penicillium*.
200:1.

Sporen bilden. Auf totem Substrat namentlich *O. lactis*, Milchschnitz, Mycel und Sporen weiss. Einfache aufrechte Fruchthyphen mit endständiger Kette von walzenförmigen „Sporen“. Findet sich regelmässig auf saurer Milch. Gedeiht zwischen 19 und 30° am besten, fängt bei 37° an zu verkümmern. Völlig unschädlich, wie *Penicillium*.

Bei Favus, Herpes tonsurans, Pityriasis versicolor, beim sog. Mäuse-Favus finden sich oidiumähnliche Formen: jedoch sind dieselben keinesfalls mit *Oidium lactis* identisch, sondern repräsentieren spezifische Arten, deren botanische Zugehörigkeit noch zweifelhaft ist. Von *Trichophyton tonsurans* scheinen verschiedene Arten oder Varietäten zu existieren. Ebenso soll der Favuspilz (*Achorion Schoenleinii*) nach einigen Beobachtern in mehreren Varietäten auftreten, während Andere stets die gleiche Art gefunden haben. Dieselbe vegetiert in den gewöhnlichen Gelatine- oder Agar-Nährböden namentlich unter der Oberfläche und bildet grau-weiße später gelbliche Rasen, von deren Peripherie sich moosartige Ausläufer in die Tiefe erstrecken.




Fig. 2. *Oidium lactis*.
200:1.

Mucor. Familie von zahlreichen Arten. Sporenbildung in Sporangien. Am häufigsten kommen saprophytisch vor *M. mucedo* und *M. racemosus*. Vier Arten, *M. rhizopodiformis*, *M. corymbifer*, *M. pusillus* und *M. racemosus*, die sämtlich bei 37° am besten gedeihen, bewirken den Tod von Kaninchen, wenn




Fig. 3. *Mucor mucedo*.
200:1. A Unreifes, B reifes, platzendes Sporangium.

ihre Sporen in grösserer Menge in die Blutbahn injiziert werden. Es finden sich dann in den verschiedensten Organen, namentlich in den Nieren, zahlreiche kleine Pilzmycelien ohne Fructifikation. Injiziert man kleinere Mengen von Sporen, so werden diese von Leukocyten umzingelt und es kommt weder zur Bildung von Mycelien, noch zu Krankheitserscheinungen. Auch beim Menschen hat man Ansiedelungen dieser *Mucor*-arten, z. B. im äusseren Gehörgang, gefunden. Die übrigen *Mucor*-arten, darunter auch solche, welche ebenfalls ihr Temperaturoptimum bei 37° haben, sind völlig unschädlich und vermögen auf dem lebenden Warmblüter nicht zu gedeihen.

Aspergillus. Bildet Fruchträger, welche an der Spitze kugelförmig angeschwollen sind, auf dieser entwickeln sich kurze Stiele (Sterigmen) und dann erst

die Ketten von runden Sporen. Das Mycel ist anfangs weiss, nach Eintritt der Sporenbildung je nach der Species gelb, grün, schwarz u. s. w. *A. glaucus*, gelbgrün, gedeiht am besten bei 10–12°, findet sich in Kellern, an feuchten Wänden, auf eingemachten Früchten etc. Völlig unschädlich für Warmblüter. Dagegen sind *A. niger*, *A. fumigatus*, *A. flavescens* und *A. subfuscus*, deren Temperaturoptimum ungefähr bei 37° liegt und die unter natürlichen Verhältnissen z. B. auf besonnten feuchten Bodenstellen, Misthaufen etc. wuchern können, für Warmblüter pathogen. Nach Injektion reichlicher Sporenmengen in die Blutbahn gehen Kaninchen zu Grunde und man findet zahlreiche Mycelien im Herzen, in der Leber und in den Nieren. Nicht selten kommt es zu einer natürlichen Infektion von Warmblütern mit *Aspergillus*-sporen, namentlich mit denen von *A. fumigatus*. So findet man bei Vögeln häufig Wucherungen

solcher Schimmelpilze in den Luftwegen. Auch beim Menschen sind mycotische Erkrankungen durch die genannten Aspergillusarten beobachtet; die Ansiedelungsstätten bildeten die Bronchien und Lungen, der äussere Gehörgang, die Cornea u. s. w.

Erwähnt sei noch der zu den Hymenomyceten gehörige Hausschwamm, *Merulius lacrymans*, der im Bauholz und Mauerwerk wuchert. Er bildet ein farbloses Mycel, dessen Fäden oft Schnallenzellen zeigen (Fig. 5). An be-




Fig. 4. *Aspergillus*.
A Fruchtträger mit Sporen. 150:1. B Schema-
tischer Durchschnitt des Fruchtträgerkopfs mit
Sterigmen und Sporen. 300:1.




Fig. 5. *Merulius lacrymans*, Haus-
schwamm.
A Fruchtträger mit reifen Sporen. 400:1.
B Schnallenbildung an Mycoelfäden. 400:1.

lichteten Stellen bilden sich als Fruchtträger aufrechte keulenförmige Basidien, auf jeder von diesen vier Sterigmen mit ovalen, gelbbraunen Sporen. — Ueber die hygienische Bedeutung des Hausschwamms s. im Kap. „Wohnung“.

Literatur: FRANK, Botanik, 2. Theil von Leunis' Synopsis, Hannover 1882 u. folg. Jahre. — BREFELD, Botanische Untersuchungen, Leipzig. — SIEBENMANN, Die Fadenpilze, Wiesbaden 1883. — FLÜGGE, Mikroorganismen, 3. Aufl. 1896.

II. *Blastomycetes*, Sprosspilze.

Ovale oder kuglige Zellen von 2—15 μ Durchmesser; zeigen eine zuweilen starke, doppelt-contourirte Membran, körniges Protoplasma, in letzterem Vacuolen. Die Vermehrung erfolgt für gewöhnlich durch Hervorsprossen einer Tochterzelle, welche sich schliesslich durch eine Querwand von der Mutterzelle scheidet, und dann entweder noch längere Zeit an dieser haftet (Bildung von Verbänden) oder sich löst. — Viele Sprosspilze, jedoch keineswegs alle, vermögen in Zuckerlösungen alkoholische Gährung zu erzeugen. Es sind zu unterscheiden:

a) Sprosspilze, welche nur eine gelegentliche Wuchsform von Schimmelpilzen darstellen. *Mucor*, *Monilia* u. a. m. können in Zuckerlösungen untergetaucht hefeartige Sprossungen treiben und dann etwas, aber sehr wenig, Alkohol und Kohlensäure bilden. Sobald es dem Pilz (z. B. durch aufsteigende CO_2 -Bläschen) ermöglicht wird, an die Oberfläche zurückzukehren, tritt wieder Fadenbildung ein.

b) *Torula*-Arten. Sprosspilze, welche sowohl in Flüssigkeiten wie auch auf festem Substrat lediglich Sprossungen bilden. Sie vermögen keine oder nur ganz schwache Alkoholgährung hervorzurufen.

Die Culturen auf festem Substrat (Gelatine) zeigen oft lebhafte Farbe, rosa, schwarz u. s. w. Manche Arten, z. B. die rosafarbenen, sind ausserordentlich verbreitet. — Auch die *Torula*-Arten gehören vermutlich zu gewissen höheren Pilzen.

c) *Saccharomyces*, echte Hefepilze. Vermehren sich in Zuckerlösung nur durch Sprossung und erzeugen dabei Gährung, d. h. sie zerlegen Glykosen, namentlich Traubenzucker, in Kohlensäure und Alkohol. Rohrzuckerlösungen gehen langsamer in Gährung über, weil hier erst durch ein von der Hefe producirtes invertirendes Ferment eine Umwandlung des Rohrzuckers in Glykose eintreten muss. Obergährige Rassen von Hefepilzen bewirken sehr lebhafte, mit Emporreissen der Sprossverbände einhergehende Gährung, am besten bei höherer Temperatur. Andere Rassen (Unterhefe) rufen bei niedriger Temperatur sog. Untergährung hervor.

Diese Rassencharaktere erhalten sich constant.

Unter den Zuckerarten sind nach E. FISCHER's Untersuchungen nur diejenigen gährfähig, die in ihrem Molekül eine durch 3 ohne Rest theilbare Zahl von Kohlenstoffatomen enthalten, deren allgemeine Formel also ist: $C_{3n}H_{6n}O_{3n}$; hierzu gehört die Glycerose $C_3H_6O_3$, Traubenzucker, Fruchtzucker, Mannose und Galaktose $C_6H_{12}O_6$ und die Mannononose $C_9H_{18}O_9$; Tetrosen, Pentosen, Heptosen, und Octosen sind für Hefe unvergährbar. Ferner sind




Fig. 6. Hefepilze. 400:1.
A Sprossung. B Sporenbildung. C Deckenbildung.

nur die zur *d*-Reihe gehörigen Zucker gährfähig, während die optisch entgegengesetzten *l*-Zucker unvergohren bleiben. Innerhalb der gährfähigen Gruppen findet dann je nach der Species der betr. Hefe noch eine ganz individuell beschränkte Auswahl des Gährmaterials statt.

Nach Ablauf der Gährung sieht man bei allen echten Hefepilzen innerhalb 6—21 Tagen auf der Oberfläche der Flüssigkeiten Deckenbildung eintreten. Die Sprossungen werden dann undeutlicher und die Zellen länger, so dass sie an Hyphen erinnern. Die Temperaturgrenzen, bei welchen sich die Decken bilden, die Schnelligkeit der Bildung und das mikroskopische Aussehen der Decken liefern diagnostisch brauchbare Merkmale zur Unterscheidung der Arten und Rassen.

Auf festem Nährsubstrat (Gelatine) oder auf Gipsplatten entstehen in den Hefepilzen resistere Sporen, 1—10, gewöhnlich 1—4 an Zahl, und zwar durch freie Zellbildung innerhalb der vergrösserten Mutterzelle (Askosporen). In Bezug auf die Temperaturgrenzen, innerhalb welcher die Sporenbildung vor sich geht, zeigen die einzelnen

Arten und Rassen erhebliche Unterschiede, welche wiederum für die Differential-Diagnose verwertbar werden können.

Von den Lebensbedingungen der Hefepilze sei erwähnt, dass sie ausser Zucker auch stets stickstoffhaltige Nährstoffe, lösliches Eiweiss, Pepton, Amide und dergleichen bedürfen. Ferner ist im Allgemeinen für das Wachsthum der Hefe Zufuhr von Sauerstoff erforderlich. Nur in gährenden Zuckerlösungen kann die Hefe auch bei Luftabschluss sich lange Zeit vermehren, weil dann durch die massenhafte Zerlegung des Zuckers in Alkohol und Kohlensäure soviel Energie frei wird, dass dadurch ein Ersatz geliefert wird für diejenigen Energiemengen, welche sonst bei Zutritt von Sauerstoff durch Oxydation entstehen.

Bezüglich der Concentration und Reaction des Nährsubstrats halten sich die Hefepilze in der Mitte zwischen Schimmel- und Spaltpilzen. Bierwürze, Malzdekot oder Pflaumendekot, eventuell mit Zuckerzusatz, sind zur Cultur am besten geeignet; um Spaltpilze fernzuhalten, kann man zweckmässig etwa 1 Procent Weinsäure zufügen. Gegen freies Alkali sind die Hefepilze empfindlich. Die günstigste Züchtungstemperatur liegt im Allgemeinen bei 25—30°.

Es sind früher viele Arten und Varietäten von Hefe nach der Form und Grösse der Zellen unterschieden. Jedoch schwanken diese Verhältnisse bei der einzelnen Art so sehr, dass keine durchgreifenden konstanten Differenzen bestehen bleiben. Diagnostisch verwertbar sind vielmehr nur die Erscheinungen der Sporenbildung und Deckenbildung. — Praktisch unterscheidet man namentlich Weinhefe und Bierhefe. Erstere bewirkt die „spontane“ Gährung des Mosts u. s. w. oder anderer zuckerreicher Flüssigkeiten. Im Gegensatz dazu wird die Bierhefe nur künstlich gezüchtet, indem immer von der in lebhafter Gährung befindlichen Bierwürze etwas für den nächsten Brau zurückbehalten wird. In ähnlicher Weise wird die in Form des Sauerteigs bei der Brotbereitung benutzte Hefe weiter cultivirt. Vielfach wird Presshefe verwendet, d. h. eine Bierhefe, welche durch mässige Wasserentziehung haltbar gemacht ist.

In allen diesen Hefearten findet man mehrere Rassen vereinigt, darunter oft auch solche, welche für den betreffenden Gährungsprocess unbrauchbar oder sogar schädlich sind und welche also nur zufällige Verunreinigungen darstellen. HANSEN hat durch seine sorgfältigen Forschungen im Laboratorium der Karlsberg-Brauerei in Kopenhagen die Merkmale der guten, technisch verwendbaren Heferassen und andererseits derjenigen „wilden“ Hefen erkennen gelehrt, welche zu den sogenannten Krankheiten des Bieres u. s. w. Veranlassung geben. In Folge dessen wird jetzt meistens rein gezüchtete Hefe in den Gährungsgewerben benutzt.

d) *Mycoderma cerevisiae et vini*, der Kahmpilz (*Saccharomyces Mycoderma*). Bildet auf gegohrenen Flüssigkeiten die sogenannte Kahmhaut, welche erheblich schneller entsteht als die von echten Hefen gebildeten Decken. Die Haut ist matt, grauweiss, gefaltet und besteht wesentlich aus langgestreckten Zellen. Gährung erfolgt nicht, sondern nur Verbrennung des Alkohols.

Statt der Gattung *Mycoderma* stellen FISCHER und BREBECK die neue Gattung *Endoblastoderma* auf, von welcher einige Arten den früheren *Mycoderma*-arten entsprechen. Die Gattung *Endoblastoderma* unterscheidet sich von *Saccharomyces* theils durch die für *Mycoderma* beschriebene Bildungsweise der Kahmhaut, theils durch die (bei *Endoblastoderma* selten beobachtete) Sporenbildung, besonders aber durch einen neben der Sprossung constant vorkommenden eigenartigen Fortpflanzungsprocess durch endogene Zellentstehung.

Viel umstritten ist die Stellung des Soorpilzes. Aus dem Zungenbelag bei Soor lässt sich ein Pilz isoliren, der zahlreiche Sprosszellen und Sprossverbände, daneben aber fadenförmige Zellen und mycelartig gegliederte und verzastete Fäden zeigt; die Sprosszellen sitzen einzeln oder in Gruppen (Rosetten)



Fig. 7. Soorkultur. 250:1.

den Fäden auf. Der Pilz wurde früher den *Oidium*-arten zugerechnet und *Oidium albicans* genannt. Nach PLAUT soll der Soorpilz mit *Monilia candida* identisch sein; Culturen der letzteren, auf die Kropfschleimhaut von Tauben verimpft, sollen Soor hervorrufen. ROUX und LINOSSIER fanden, dass der Soorpilz sich wie ein Schimmelpilz verhält, der für gewöhnlich Hefesprossungen bildet, in zuckerarmen Nährlösungen aber auch Mycel liefert. Nach den neuesten Untersuchungen von FISCHER und BREBECK findet sich dagegen im Soorbelag ein die Bierwürze-Gelatine verflüssigender Pilz (seltener eine nicht verflüssigende Varietät), der durch sein ganzes morphologisches und biologisches Verhalten, namentlich durch die Bildung endogener Sporen, sowie durch die Vergärung von Glykosen zur Gattung *Saccharomyces* gehört. Culturen auf die Hornhaut von

Kaninchen verimpft, bewirkten ausgebreitete Trübung der Cornea durch Pilzwucherung.

Neuerdings sind in Carcinomen und Sarkomen Zelleneinschlüsse beobachtet, die das Aussehen von Blastomyceten haben. Auch sind aus Geschwülsten und aus zufälligen sayrophytischen Ansiedlungen Blastomyceten (*Sacch. neoformans*) isolirt, welche bei Versuchsthiereu Neubildungen (jedoch wie es scheint nur Granulationsgeschwülste) veranlasst haben sollen (BUSSE, SANFELICE, LEOPOLD). Bestätigungen dieser Befunde unter Vermeidung aller der offenbar zahlreich vorhandenen Fehlerquellen stehen noch aus.

Literatur: PASTEUR, *Études sur la bière*, Paris 1876. — HANSEN, *Meddelelser fra Carlsberg Laboriet*, Kjöbenhavn 1878 u. folg. Jahre (mit französischem Résumé). — JÖRGENSEN, *Die Mikroorganismen der Gährungsindustrie*, Berlin 1886. — FISCHER und BREBECK, *Zur Morphologie u. s. w. der Kahmpilze, der Monilia candida Hansen und des Soorerregers*, Jena 1894. — BUSSE, *Die Hefen als Krankheitserreger*, Berlin 1897. — SANFELICE, *Zeitschr. f. Hygiene*, Bd. 21, 22, 29. — LEOPOLD, *Arch. f. Gynäkol.* Bd. 71.

III. Schizomycetes, Spaltpilze, Bakterien.

a) Morphologisches Verhalten.

Kleinste chlorophyllfreie Zellen. Bei einigen Arten lässt sich eine zarte Rindenschicht und ein Centrankörper unterscheiden, erstere besteht aus einer Plasmamodification, letzterer aus Kernsubstanz; meist

umschliesst eine dünne Zellmembran einen Protoplasmaschlauch mit centraler Flüssigkeit. In concentrirten Salzlösungen tritt Wasserentziehung, Schrumpfung des Protoplasmaschlauchs und dadurch Ablösung von der Zellwand ein (Plasmolyse). Sie vermehren sich durch Quertheilung, indem die Zelle sich streckt und dann in zwei selbstständige Individuen theilt. Bei manchen Arten verläuft zwischen der Beendigung der ersten Theilung und dem Anfang der Theilung der neu entstandenen Individuen nur eine Zeit von 20 bis 30 Minuten. Bei anderen Bakterienarten dauert diese Frist mehrere Stunden. Rechnet man 1 Stunde als Durchschnittswerth, so entstehen aus jedem Spaltpilzindividuum innerhalb 24 Stunden 16 Millionen Individuen; bei 20 Minuten Theilungsdauer liefert 1 Individuum in 24 Stunden 4700 Trillionen, deren trockene Masse ca. 150 000 Kilo wiegen würde. Einer so gewaltigen Vermehrung wirken indess stets die unten zu besprechenden hemmenden Einflüsse entgegen.

Die Spaltpilze begegnen uns in verschiedenen Formen, welche grossentheils erst durch gefärbte mikroskopische Präparate deutlich erkennbar werden.

Die basischen Anilinfarben werden von Bakterien (und Zellkernen) besonders leicht aufgenommen und zurückgehalten, und es gelingt daher mit Hülfe dieser Farben eine isolirte Bakterien- (und Kern-)färbung; bei vielen Bakterien lassen sich sogar Färbemethoden anwenden, durch welche ausschliesslich die Bakterien stark gefärbt bleiben. Derartige Präparate können dann mit hellstem Licht (Abbé's Condensor) untersucht werden, so dass die Körperform der Bakterien viel deutlicher hervortritt als im ungefärbten Präparat. (Näheres s. im Anhang).

Die beobachteten Formen sind im Wesentlichen folgende:

a) Kugelige oder ovale Zellen, welche bei der Theilung stets wieder Kugeln ergeben. Diese Wuchsform bezeichnen wir als *Micrococcus* oder *Coccus*. Die Kugeln bleiben nach der Theilung entweder zu zweien aneinander haften = *Diplococcus*; oder sie erscheinen, in Folge Kreuzung der Wachstumsrichtung, zu vierten tafelförmig nebeneinander gelagert = *Merista*; oder sie bilden Würfel von je acht Individuen = *Sarcina*; oder die Kugeln halten stets die gleiche Wachstumsrichtung ein und haften in Kettenform aneinander = *Streptococcus*; oder endlich sie bilden regellose Haufen = *Staphylococcus*. Sind sie durch zähe Schleimmasse untereinander verbunden, so bezeichnet man die Haufen als *Zoogloea*.




Fig. 8. *Micrococcus*.
A Einzelne Kokken. B *Diplococcus*.
C *Merista*. D *Sarcina*. E *Streptococcus*. F *Staphylococcus*. G *Zoogloea*.

b) Stäbchen, bei welchen der Längsdurchmesser den Querdurchmesser erheblich übertrifft = *Bacillus*. Die Theilung der Stäbchen

erfolgt mit seltensten Ausnahmen stets im Querdurchmesser. Oft bleiben sie nach der Theilung aneinander haften und bilden dann Fäden (Scheinfäden) = *Leptothrix*. Diese Fäden zeigen zum Unterschied von den Schimmelpilzfäden mit wenigen Ausnahmen keine echten Verzweigungen, sondern höchstens Pseudo-Verzweigungen durch Aneinanderlagerung zweier Fäden. — Zuweilen zeigen die Bacillen eine Anschwellung




Fig. 9. *Bacillus*.
A Einzeln und in Theilung. B Schleimfäden mit Pseudo-Verzweigung. C *Clostridium*.




Fig. 10.
A *Spirillum*. B *Vibrio*.

in der Mitte oder an der Spitze, so dass sie Spindelform oder Kaulquappenform annehmen; diese Wuchsform bezeichnet man als *Clostridium*.

c) Schraubenförmig gewundene Fäden oder als Bruchstücke solcher Schrauben = *Spirillum*, *Spirochaete*. Bei flach gewundener Schraube = *Vibrio*.

d) Kugelige oder ovale meist stark lichtbrechende Zellen, welche nicht durch Theilung aus gleichbeschaffenen Kugeln hervorgegangen sind resp. solche produciren, sondern im Inneren der meist anders geformten Bakterienzelle entstehen und demnächst zu einer der Mutterzelle gleichen Zelle auswachsen können = Sporen. Sie sind im Ganzen resistenter als die übrigen Wuchsformen der Bakterien und dienen vorzugsweise der Erhaltung der Art.

e) Längliche, kugelige, oft unregelmässig begrenzte und sich lückenhaft färbende Zellformen verschiedenster Art ohne bestimmten Typus, die durch Schrumpfung oder Schwellung aus normalen Zellen hervorgehen und sich unfähig erweisen zu irgend einer Art der Vermehrung = Involutions- und Degenerationsformen.

Die gleiche Spaltpilzspecies kann sich oft in verschiedener Wuchsform präsentieren. Allerdings kennen wir Spaltpilzarten, welche nur in Kokkenform vorkommen, oder höchstens noch Involutionsformen bilden. Andere Arten jedoch kommen für gewöhnlich als Bacillen vor, können aber ausserdem in Form von langen Fäden auftreten oder in Form von kugeligen Sporen oder als verschieden gestaltete Involutionsformen. Alle diese Wuchsformen gehören dann zum Entwicklungskreis der betreffenden Art.

Innerhalb der gleichen Wuchsform finden sich vielfach kleine, jedoch deutliche Differenzen, sog. Speciescharaktere, welche bei allen Individuen derselben Species nahezu konstant hervortreten. So zeigt die eine Art stets grosse, die andere kleine, diese runde, jene ovale oder lancettförmige Kokken; ebenso giebt es schlanke und dicke Bacillen, solche mit abgerundeten und solche mit abgestutzten Enden u. s. w. (Fig. 11). Wir erhalten auf diese Weise eine Reihe von Artcharakteren, welche in diagnostischer Beziehung äusserst werthvoll sind.

Endlich kommen auch bei derselben Species gewisse individuelle Schwankungen der Form vor, namentlich in Folge von Alters- und Ernährungsdifferenzen. Bacillen derselben Species sind im Jugendzustand kürzer, bei schlechten Nährverhältnissen oft auch dünner. Jedoch sind alle derartigen Schwankungen im Ganzen gering, so dass trotz derselben jene morphologischen Artcharaktere meist bestehen bleiben.



Fig. 11.
Bacillus- und Spirillum-Wuchsform verschiedener Species.

Vielfach zeigen die Bakterien nach der Färbung um die Zellsubstanz noch eine Art Hülle oder Kapsel, welche ungefärbt oder nur schwach gefärbt bleibt.

Viele Bacillen und Spirillen sind schwärmfähig, d. h. wir können unter dem Mikroskop beobachten, dass sie lebhaft Eigenbewegungen ausführen. Unter ungünstigen biologischen Bedingungen hören die Bewegungen zeitweise auf. Mikrokokken sind nur ausnahmsweise schwärmfähig, sondern zeigen gewöhnlich nur zitternde Molecularbewegung. Als Ursache der Bewegungen sind bei vielen Bakterien Geisseln erkannt, die durch besondere Färbemethoden nachweisbar werden. Entweder befindet sich an einem oder an jedem Ende ein ganzes Büschel von Geisseln; oder nur eine einfache oft sehr lange Geissel; oder die Bakterien sind an ihrer ganzen Peripherie mit feinen Wimpern besetzt.




Fig. 12.
Geisseltragende Bakterien. 1000 : 1.

Von PFEFFER ist nachgewiesen, dass die beweglichen Bakterien durch gewisse chemische Stoffe angelockt werden (Chemotaxis). Füllt man sehr feine an einem Ende zugeschmolzene Glaskapillaren mit Lösungen (z. B. von Chlor-

kalium oder mit Kartoffelsaft) und legt dieselben in einen Tropfen Wasser mit den betreffenden Bakterien, so wandern verschiedene Bakterienarten sehr lebhaft in die Kapillare hinein. Dabei lässt sich die Mitwirkung von physikalischen Momenten, Diffusionsströmen u. dgl. vollkommen ausschliessen; vielmehr ist nur der anlockende Reiz des Chemismus der Lösungen entscheidend (positive Chemotaxis). Von anderen Lösungen werden dieselben Bakterien abgestossen (negative Chemotaxis); manche chemische Substanzen äussern gar keinen richtenden Einfluss.

Von besonderer Bedeutung ist die Sporenbildung der Bakterien. Echte endospore Fructification findet man bei vielen Bacillen und bei einigen Spirillen. Bei Mikrokokken, aber auch bei vielen Bacillen ist sie noch nicht beobachtet. Die Bildungsweise der endogenen Sporen ist verschieden je nach der Species; entweder wachsen die Bacillen zu Fäden aus, in den Fäden entstehen lichtbrechende Körnchen, welche schliesslich in perlschnürartig angeordnete, runde oder ovale Sporen übergehen (so z. B. bei den Milzbrand-Bacillen). Oder




Fig. 13.
Sporenbildung (a) und Sporen-
keimung (b).

die einzelnen Bacillen schwellen vor der Sporenbildung zu Spindelform auf und in dem entstandenen Clostridium bildet sich die runde oder ovale stark lichtbrechende Spore (Buttersäure-Bacillen). Oder aber es bildet sich ohne erhebliche morphologische Aenderung des Bacillus im Verlauf desselben oder an einem Ende eine als Spore aufzufassende kugelige Anschwellung. — Die meisten Sporen zeigen eine relativ dicke Membran. Oft sind sie grünlich glänzend und stark lichtbrechend. Farbstoffe dringen schwer ein, haften dann aber um so hartnäckiger.

Charakteristisch für jede Spore ist, dass aus derselben ein dem mütterlichen gleicher Organismus hervorgehen kann. Das „Auskeimen“ erfolgt bei den ovalen Sporen entweder in der Längs- oder in der Querrichtung oft unter tanzender Bewegung. — Eine fernere Eigenthümlichkeit aller endogen gebildeten Sporen ist es, dass sie die Erhaltung der Art resp. Varietät unterstützen, indem sie gegen die in der Natur den Mikroorganismen hauptsächlich drohenden Gefahren resistenter sind als die Bacillen- oder Spirillenform. Allerdings zeigt auch hier wieder jede Art ein besonderes Verhalten. Die Sporen mancher Bacillenarten können jahrelang in völlig trockenem Zustande oder auch z. B. unter absolutem Alkohol aufbewahrt werden, ohne ihre Lebensfähigkeit einzubüssen, während bei den Sporen anderer Arten die Widerstandsfähigkeit bei weitem nicht so stark ausgesprochen ist.

Die Eigenschaft, Sporen zu bilden, kommt nach neueren Untersuchungen derselben Art nicht immer zu. Durch gewisse schädigende Momente (Züchtung

in karbolsäurehaltiger Bouillon) kann z. B. den Milzbrandbacillen die Fähigkeit Sporen zu bilden, dauernd genommen werden, während sie im übrigen ihre morphologischen und biologischen Merkmale beibehalten (asporogene Rassen).

Neben der endosporen hat man noch eine arthrospore Fruktifikation unterschieden. Arthrosporen entstehen dadurch, dass einzelne Glieder einer Kette, oder eines Haufens oder eines Fadens von Bakterien sich lebensfähiger zeigen als die übrigen Theile, so dass sie nach dem Absterben der letzteren zum Ausgangspunkt neuer Zellen und Zellverbände werden können. Zuweilen scheinen diese Reste durch Grösse und Lichtglanz sich auszuzeichnen, im Ganzen fehlt es jedoch an typischen Merkmalen für dieselben, und ebenso scheint die höhere Widerstandsfähigkeit dieser Sporen nur in ganz geringem Grade vorhanden zu sein.



Fig. 14.
Involutionsformen.

Involutionsformen sehen wir unter den verschiedensten schädigenden Einflüssen, namentlich bei Erschöpfung des Nährbodens, bei Eintritt abnormer Reaction, bei abnormer Temperatur u. s. w., meist in nicht typischer Weise sich bilden, bei einigen Arten treten aber unter bestimmten Bedingungen so rasch und in so charakteristischer Weise Involutionsformen auf, dass wir dieselben zur diagnostischen Erkennung verwerthen können (Pest, Diphtherie).

b) Lebensbedingungen der Spaltpilze.

Die Zellsubstanz der Spaltpilze besteht zu ca. 80% aus Wasser; die Trockensubstanz hauptsächlich aus Eiweissstoffen (ca. 80%), Fett und Salzen. Nach CRAMER ist die chemische Zusammensetzung der Bakterien nicht konstant, sondern ändert sich je nach den Züchtungsbedingungen und dem Gehalt des Nährbodens an Wasser, Aschenbestandtheilen, stickstoffhaltiger Substanz etc. in entsprechendem Sinne; hierdurch werden die Bakterien zu einer weitgehenden Anpassung an die verschiedenartigsten Existenzbedingungen befähigt. — Sie bedürfen im Allgemeinen für ihren Stoffwechsel ausser anorganischen Nährstoffen stickstoffhaltiger und nebenbei auch stickstofffreier Substanzen. Die beste stickstoffhaltige Nahrung liefern ihnen lösliches Eiweiss, Pepton und Leim, die beste stickstofffreie Nahrung Zucker und Glycerin; doch können Stickstoff- und Kohlenstoffbedarf eventuell auch durch viel einfachere Verbindungen Deckung finden, z. B. durch Asparagin, milchsaures Ammon, Leucin, Tyrosin u. a. m. Der zum Aufbau des Bakterienleibes erforderliche Schwefel wird ebenso aus organischen Schwefelverbindungen entnommen.

Vor allem beachtenswert ist, dass der Nährstoffbedarf je nach der Species ausserordentlichen Schwankungen unterliegt. Manche Arten vermögen mit den minimalsten Spuren organischer Substanz, welche sich

in reinem destillirten Wasser finden, noch üppigste Vermehrung zu leisten. Andere Arten verschmähen alle Nährsubstrate mit Ausnahme von Blutserum oder Mischungen von Fleischsaft und Blutserum; wieder andere gedeihen und proliferiren nur im lebenden Körper des Warmblüters.

Als Beispiel einfachster Ernährungsverhältnisse seien die Nitrobakterien WINOGRADSKY's angeführt, welche ihren Kohlenstoffbedarf einzig und allein aus der atmosphärischen CO_2 decken, sowie die sog. stickstofffixirenden Mikroben in den Wurzelknöllchen der Leguminosen, welche befähigt sind, den freien Stickstoff aus der Luft zu assimiliren und so den Gehalt des Ackerbodens an nutzbarem Stickstoff anzureichern.

Im Allgemeinen sind ferner die Spaltpilze sehr empfindlich gegen saure Reaktion des Nährmediums, weniger gegen einen Alkali-Ueberschuss. Jedoch kommen auch in dieser Beziehung zahlreiche Ausnahmen vor, indem manche Arten gerade gegen Alkali empfindlich sind oder bei saurerer Reaktion am besten wachsen.

Ebenso verschieden ist das Verhalten der einzelnen Arten gegenüber dem Sauerstoff. Eine Gruppe von Arten, die sog. obligaten Aëroben, verlangen zu ihrem Fortkommen unter allen Umständen freien Sauerstoff. Ihnen stehen diametral gegenüber die obligaten Anaëroben, eigenthümliche Spaltpilze, die nur wachsen und sich vermehren, wenn aller freier Sauerstoff möglichst vollständig aus dem Nährsubstrat entfernt ist. Einige dieser Anaëroben vermögen Gährung zu erregen, und — nach Analogie der Hefe — bei Anwesenheit gährfähiger Stoffe das Fehlen des Sauerstoffes leichter zu ertragen. Viele aber führen ihre anaërobiotische Existenz ohne einen Ersatz durch Gährung, und scheinen also die nothwendigen Energiemengen durch Zerlegung geeigneter Nährstoffe (Glycose) liefern zu können. — Sehr zahlreiche Bakterien sind endlich facultative Anaëroben, d. h. sie gedeihen am besten bei Sauerstoffzutritt, können aber auch ohne Sauerstoff besonders dann leben, wenn sie gleichzeitig Gährung erregen.

Schwankungen des Luftdrucks sind für alle Spaltpilze so gut wie indifferent. — Durch Belichtung tritt dagegen eine sehr erhebliche Schädigung der Mikroorganismen ein (s. unten); und sogar gute Nährsubstrate können durch Stehen im Sonnenlicht ungeeignet zur Kultur werden (Wasserstoffsuperoxyd-Bildung).

Von sehr grosser Bedeutung für das Leben aller Spaltpilze ist die Temperatur; auch hier aber zeigen die einzelnen Arten wieder einen ausserordentlich verschiedenen Bedarf. Der erste Anfang des Wachstums und der Vermehrung liegt für einige Arten bereits bei 0° , für andere erst zwischen 30 und 40° , für einige sogar zwischen 40 und 50° . Die obere Wachsthumsgrenze finden wir für die meisten

Arten bei etwa 40°, für einige bei 50°; ja es sind sogar Arten beobachtet, welche bei 70° und mehr noch Wachsthum zeigen.

Aus der Kenntniss der Lebensbedingungen der Spaltpilze lässt sich ohne Weiteres die Art und Weise ableiten, in welcher die Spaltpilze am besten künstlich zu züchten sind.

Als Nährlösung benutzt man Fleischinfus, Heuinfus, Milch, Harn, Blutserum u. dgl. Alle saueren Substrate werden durch Sodazusatz schwach alkalisch gemacht. Da aber diese Nährsubstrate, sowie die Flaschen und Gläser, in welchen sie aufbewahrt werden sollen, von vornherein zahlreichste Bakterien enthalten, welche als störende Verunreinigungen sich bemerklich machen und die Kennzeichen der beabsichtigten Culturen nicht rein zum Vorschein kommen lassen würden, ist es erforderlich, sämtliche Gefässe und Nährsubstrate vor dem Gebrauch zu sterilisiren, d. h. von anhaftenden lebenden Bakterien zu befreien. Das Sterilisiren der Gefässe geschieht durch ein bis zweistündiges Erhitzen im Trockenschrank auf 160°, das Sterilisiren der in die Gefässe eingefüllten Nährsubstrate durch Kochen im PAPIN'schen Topf oder in strömendem Wasserdampf.

Alle flüssigen Nährsubstrate bieten nun aber grosse Schwierigkeiten, sobald man die Cultur einzelner bestimmter Arten beabsichtigt. Sie können sehr wohl gebraucht werden, wenn die einzelne Art bereits in reinem isolirten Zustande vorliegt. Das ist aber nur ganz ausnahmsweise der Fall, für gewöhnlich muss man bei der Anlage von Culturen von einem Gemenge mehrerer resp. vieler Spaltpilzarten ausgehen; z. B. findet man in der Leiche eines an einer Infektionskrankheit Gestorbenen zur Zeit der Sektion neben den Infektionserregern, welche man zu cultiviren wünscht, auch noch zahlreiche Fäulnissbakterien. Eben solche Gemenge findet man im Inhalt des Choleradarms, in verdächtigem Trinkwasser u. s. w. Bringt man ein derartiges Gemenge in eine Nährlösung, so wachsen alle die verschiedenen Bakterien durcheinander, und die Merkmale der einzelnen Art werden durch die übrigen Bakterien völlig verwischt.

Um in Flüssigkeiten eine Isolirung der einzelnen Art zu ermöglichen, hat man früher das Verfahren der fraktionirten Cultur empfohlen, welches darin besteht, dass man in bestimmten Zwischenräumen (24—48 Stunden) jedesmal eine kleine Menge der Cultur in ein neues Culturglas überträgt; wiederholt man diese Uebertragungen sehr häufig, so erhält man schliesslich allerdings eine reinere Cultur; aber meistens besteht diese vorzugsweise aus denjenigen Spaltpilzarten, welche sich unter den gewährten Bedingungen am schnellsten vermehren; und das sind gewöhnlich nicht etwa die uns interessirenden pathogenen Bakterien, sondern die Fäulnisspilze. Nur unter Anwendung bestimmter, einer pathogenen Bakterienart besonders adäquater Nährsubstrate und Culturbedingungen gelingt es neuerdings auch manche Krankheitserreger zur Ueberwucherung der begleitenden Bakterien zu veranlassen.

Auch mit dem sogenannten Verdünnungsverfahren hat man zuweilen gute Resultate erzielt. Bedingung für die Anwendbarkeit desselben ist jedoch, dass der gesuchte Spaltpilz in dem Gemenge nicht in erheblicher Minderzahl vorhanden ist. Man verdünnt dann die zu untersuchende Flüssigkeit so stark mit keimfreiem Wasser, dass in je 1 ccm nur ungefähr ein Spaltpilz enthalten ist. Darauf bringt man in eine grössere Zahl von Gläsern mit Nährlösung je 1 ccm der Verdünnung und hat nun relativ gute Chancen, dass wenigstens in einigen Gläsern eine Reincultur des interessirenden Pilzes zu Stande kommt.

Immerhin ist dieses Verfahren sehr umständlich. Ausserdem ist es schwer, in flüssigen Nährsubstraten Culturen rein zu erhalten; bei jeder Probenahme zum Zweck der mikroskopischen Untersuchung und bei jeder Uebertragung in ein neues Culturglas kommen sehr leicht einige der überall verbreiteten saprophytischen Pilze hinein; diese wachsen in der Nährlösung meist viel lebhafter als die pathogenen Bakterien und verdrängen letztere nach einiger Zeit. Es gehört daher eine ganz besonders subtile Technik dazu, um in Nährlösungen reine Culturen herzustellen; und nur wenigen Forschern ist es geglückt, in solcher Weise an zuverlässig reinen Arten Beobachtungen über ihr morphologisches und biologisches Verhalten zu machen.

Völlig anders sind diese Verhältnisse geworden, seit Koch seine Methoden zur Cultur der Spaltpilze mitgetheilt hat. Diese Methoden sind so einfach und geben so sichere Resultate, dass seither die künstliche Cultur der Bakterien in allen medicinischen Disciplinen ausgedehnteste Anwendung finden konnte.

Koch ging von der Ueberlegung aus, dass in den flüssigen Nährsubstraten der hauptsächlich störende Umstand darin liegt, dass sich immer alle Bakterien in kürzester Zeit durch die ganze Flüssigkeit vertheilen, so dass in jedem Tropfen, den man zur Untersuchung oder zur weiteren Cultur entnimmt, nicht etwa Exemplare der einen Art, sondern Exemplare aller verschiedenen überhaupt vorhandenen Arten sich finden. Wenn es gelänge, die einzelnen Bakterien an einen bestimmten Platz zu fixiren und das Durcheinandermischen zu hindern, dann würde offenbar eine isolirte Cultur viel leichter sein.

In dieser Richtung ist nun schon viel zu erreichen dadurch, dass man irgend welche feste Nährböden benutzt, wie die Schnittfläche gekochter Kartoffelscheiben. Breitet man einen Tropfen Flüssigkeit, in welchem z. B. vier verschiedene Bakterien enthalten sein mögen, auf einer solchen Kartoffel aus, so kommt wahrscheinlich jede Bakterie an einen besonderen Platz zu liegen und wächst dort zu einer Colonie aus. Man bekommt also auf der Kartoffel vier räumlich getrennte Colonieen, deren jede eine Reincultur repräsentirt. Diesen Charakter werden dieselben auch dann bewahren, wenn etwa ein saprophytischer Keim auf die Kartoffel gerathen sollte; ein solcher wird muthmasslich wiederum einen besonderen Platz occupiren, räumlich getrennt von den anderen Colonieen und diese daher in keiner Weise beeinträchtigen.

Sind allerdings zahlreiche und mannigfaltigere Bakterien vorhanden, dann wird die Vertheilung auf dem festen Substrat nicht immer gleichmässig gelingen; es wird leicht vorkommen, dass auf dieselbe Stelle mehrere Bakterien gerathen, während andere Stellen relativ frei bleiben. Besser wäre es, wenn man flüssiges und festes Substrat combiniren und das flüssige plötzlich in ein festes verwandeln könnte; dann würde in der Flüssigkeit sehr leicht eine völlig gleichmässige Vertheilung der Keime gelingen und bei dem plötzlichen Erstarren würde eine räumliche Trennung der einzelnen Exemplare, selbst wenn diese in grosser Zahl vorhanden sind, erreicht werden.

Ausserdem entziehen sich kleine Colonieen auf dem undurchsichtigen festen Substrat leicht der Beobachtung. In dieser Beziehung müsste es vortheilhaft sein, durchsichtige Nährböden zu verwenden, welche in dünner Schicht sogar eine Durchmusterung mit dem Mikroskop gestatten.

Beiden Forderungen können wir nun gerecht werden, wenn wir den Nährlösungen einen Zusatz von Gelatine oder Agar-Agar geben, so dass die

schungen bei 25 bis 30° resp. 35 bis 40° noch flüssig sind, bei rascher Abkühlung er schnell erstarren.

Am häufigsten benutzt man Nährgelatine, d. h. ein schwach alkalisches Gemenge von Bouillon, Pepton, Kochsalz und 10 Procent Gelatine. Bringt man ein Glas mit solcher Nährgelatine, nachdem man sie vorher auf 30° erwärmt und dadurch verflüssigt hat, ein beliebiges Gemenge von Bakterien, mischt man die Flüssigkeit ordentlich durch und giesst dann die Gelatine auf horizontal gelagerte Glasplatten, oder in ganz flache Glasschälchen in dünner Schicht aus, so werden die einzelnen Keime von der sofort erstarrenden Gelatine in deutlichen Zwischenräumen fixirt. Aus jedem Keim entwickelt sich eine fortgesetzte Vermehrung an der bestimmten Stelle eine aus vielen Millionen ähnlicher Keime bestehende Colonie, welche gewöhnlich schon nach 1—2 Tagen makroskopisch sichtbar wird; und wenn man eine solche Colonie weiter studirt, findet man namentlich auch mikroskopische Präparate davon anfertigt, so zeigt sich, dass sie nur Individuen derselben Art enthält, d. h. dass sie eine Reincultur einer Spaltpilzart darstellt.

Die auf solchen „Platten“ gewachsenen Colonieen lassen sich auch gut mit schwacher (40—80facher) Vergrößerung beobachten und zeigen dann in der Regel allerlei makroskopisch nicht wahrnehmbare Eigenthümlichkeiten, welche mit Vortheil zur diagnostischen Unterscheidung der Arten benutzt werden können. — Man lässt sich die Zahl der auf einer Platte vorhandenen Colonieen leicht mitteln; und da jede Colonie aus einem Spaltpilzindividuum hervorgegangen ist, so gelangen wir auf diese Weise zu bestimmten Vorstellungen über die Zahl der Bakterien, welche in dem untersuchten Probeobject vorhanden waren.

Auch auf den Platten dürfen selbstverständlich nicht zu viel Colonieen vorhanden sein, da dieselben sonst zu dicht gelagert sein und in einander wachsen würden. Kennt man daher die Zahl der im Probematerial enthaltenen Bakterien nicht, so werden stets mehrere Platten mit verschiedenen Verdünnungsstufen angelegt. (Genaueres s. im Anhang.)

Mit Hilfe der geschilderten Methode ist in den meisten Fällen eine Isolirung und Reincultur der interessirenden Bakterien zu erreichen. Jedoch giebt es manche Fälle, wo die Methode versagt. Einige Bakterien erfordern für ihre Cultur durchaus höhere Temperatur; die Gelatineplatten darf man aber höchstens bei 22—24° halten, da bei einer Temperatur, die 25° überschreitet, die Gelatine flüssig werden und also der Vortheil des festen Nährbodens verloren gehen würde. In solchen Fällen verwendet man Agargemische, welche noch bei 38° starr bleiben. — Andere Bakterien verlangen aber durchaus auch noch andere Nährsubstrate; sie wachsen z. B. auf Bouillongemischen gar nicht, dagegen in Blutserum. Wieder andere Bakterien erfordern eine Entfernung des Sauerstoffs, die z. B. durch Aufgiessen einer hohen Schicht Gelatine über den Agar, oder besser durch Verdrängen der Luft mittelst Wasserstoffgases und Zerschmelzen der Culturegefäße, ferner auch durch Zusatz gewisser reduzierender Körper, wie Dextrose, Brenzcatechin, ameisensaures Natrium, Schwefelnatrium, indigschwefelsaures Natrium u. a. m., erreicht wird. Manche Bakterien endlich, welche wir mikroskopisch beobachten können, sind bisher durch keine Modifikation der Methode in künstlicher Cultur zu erhalten.

Eine vielfache Variirung der Züchtungsmethoden ist schon deshalb empfehlenswerth, weil erst dabei die sämmtlichen einer Spaltpilzart zukommenden

biologischen Eigenthümlichkeiten in ihrem vollen Umfang erkannt werden können. Auch die Züchtung in flüssigen Nährsubstraten darf, nachdem erst eine Isolirung erfolgt ist, nicht versäumt werden; namentlich ist die sogenannte Cultur im hängenden Tropfen wichtig, um das morphologische Verhalten und den Formenkreis der betreffenden Art kennen zu lernen (s. Anhang).

c) Lebensäusserungen der Spaltpilze.

Allen Spaltpilzen kommt die Fähigkeit zu, gewisse Nährstoffe des Substrats zu assimiliren und diese theils für ihr Wachsthum und ihre Vermehrung zu verwenden, theils aber zu zerlegen, in Oxydationsprodukte überzuführen, und so die für ihre Leistungen erforderlichen Energiemengen zu gewinnen. Ein wie grosser Theil der assimilirten Nährstoffe für das Wachsthum verwandt wird, darüber ist noch wenig bekannt. Wahrscheinlich ist dieser Antheil bei den verschiedenen Spaltpilzarten sehr wechselnd; manche Bakterien vermögen aber jedenfalls ausserordentlich schnell einen Theil der Nährstoffe in Körpersubstanz überzuführen und dadurch ausgebreitete, makroskopisch sichtbare Colonien zu bilden.

Unter den Stoffwechselprodukten der Spaltpilze haben viele für uns ein besonderes Interesse.

Kohlensäure ist wichtig als allgemeinstes Stoffwechselprodukt und als echtes, mit seltenen Ausnahmen (s. S. 38) nicht wieder assimilirbares Excret. Bei starker Anhäufung vermag sie auf viele Bakterienarten einen schädigenden, die weitere Vermehrung hemmenden Einfluss auszuüben.

Oft wird durch wuchernde Bakteriencolonien die Reaction des Nährsubstrats verändert; durch manche Arten, bei Gegenwart von Zucker wohl durch alle Arten, wird freie Säure, z. B. Milchsäure, Essigsäure u. s. w., producirt, während andere die Alkalescenz erheblich erhöhen. Besondere Wichtigkeit erlangen diese Stoffwechselprodukte dadurch, dass sie in viel höherem Grade als die Kohlensäure bakterienfeindliche Eigenschaften entfalten. 0.11 bis 0.3 Procent der genannten Säuren und 0.5 bis 1.0 Procent Ammoniumcarbonat reichen hin, um viele Bakterienarten in ihrem Wachsthum und ihrer Vermehrung zu hemmen; etwas stärkere Concentrationen tödten sogar manche Arten ab. Im Kampf verschiedener Bakterien um ein Nährsubstrat sind diese Stoffwechselprodukte daher oft von ausschlaggebender Bedeutung. Steigt die producirt Säure- oder Alkalimenge noch weiter an, so kann schliesslich eine Wachsthumshemmung auch für die producirende Art selbst zu Stande kommen; so wird z. B. die weitere Vermehrung der Milchsäurebacillen und der Fortgang der Milchsäuregährung durch die

gesammelte Säure sistirt, ähnlich wie die Hefegährung durch einen gewissen Alkoholgehalt. — Bei manchen Bakterien sind auch Reduktsprossesse beobachtet; hierher gehört z. B. die Bildung von Schwefelwasserstoff, von Merkaptan, von Leukoprodukten aus Methylenblau und Iod, die Denitrifikation (Reaktion der Nitate und Nitrite) u. s. w.

Bei vielen Arten beobachten wir ferner lebhaft rothe, blaue, gelbe und grüne Pigmente, welche die Masse der Colonie und oft noch einen inneren Bezirk des Nährsubstrats färben. Dadurch wird das Aussehen der Colonie sehr charakteristisch, und oft ist daher die Farbstoffproduktion für diagnostische Zwecke verwertbar. — Die meisten Pigmentbakterien scheinen nur eine chromogene Substanz zu bilden, welche erst bei Sauerstoffzutritt in den Farbstoff übergeht.

Zahlreiche Bakterien liefern ausserdem Fermente, d. h. lösliche organische Körper, welche namentlich die Eigenschaft haben, gewisse complicirte unlösliche Verbindungen, z. B. Eiweiss, Stärke u. s. w., in leicht lösliche Substanzen überzuführen. Offenbar dienen diese Fermente den Bakterien zu einer Erweiterung ihres Nahrungsbereichs und sie spielen damit dieselbe Rolle, wie im höheren Organismus das Ptyalin, Amylase u. s. w. Bei vielen Bakterien finden wir diastatisches, bei anderen invertirendes, bei sehr vielen peptonisirendes Ferment; manche liefern auch Labferment. Die peptonisirenden Bakterien versetzen die Nährgelatine und liefern damit ein wiederum für diagnostische Zwecke verwertbares Merkmal.

Zahlreiche Spaltpilze bewirken eine quantitativ bedeutend gesteigerte Zersetzung gewisser Nährstoffe, oft unter Produktion reichlicher Mengen von Gas, d. h. sie versetzen ein bestimmtes gährfähiges Substrat in Gährung.

Auf diese Weise kann gebildet werden:

α) aus Zucker = Milchsäure; die Erreger dieser Gährung sind der *B. acidilactici*, der *B. acidiparalactici*, der *B. acidivolactici* und der *Mic. ac. paralactici*, die überall verbreitet sind und für gewöhnlich die saure Milchgährung veranlassen. Ausserdem vermögen aber auch zahlreiche andere Bacillen und Mikrokokken die gleiche Gährung zu leisten, wenn auch in quantitativ geringerem Grade.

β) aus Stärke und Zucker = Buttersäure und Nebenprodukte. Als Erreger sind bis jetzt mehrere anaerobe und aerobe Bacillen bekannt.

γ) Einige weniger häufige Gährungen sind die sogenannte schleimige Gährung, die Dextrangährung des Zuckers, die Sumpfgasgährung der Cellulose. Ferner Vergährungen der Fettsäuren und verschiedene eigenthümliche Vergährungen des Glycerins, bei welchen namentlich Aethylalkohol entsteht.

δ) aus Alkohol = Essigsäure. Die Erreger sind zwei oder mehr Bacillengattungen, ausserdem ist reichlicher Sauerstoffzutritt für den rege Ablauf dieser

Gährung erforderlich. — Eine Oxydationsgährung ist auch die Nitrifikation im Boden durch die Nitrobakterien.

a) Die Vergährung eiweissartiger Stoffe = Fäulniss. Es lassen sich verschiedene Stufen der Zersetzung unterscheiden; zunächst erfolgt Peptonisirung, dann tiefere Spaltung des Moleküls; es entstehen theils Ammoniakderivate, theils Benzolderivate, theils Fettsäuren. Immer bilden sich diese oder jene stinkenden Gase, z. B. Schwefelammonium, Indol, Skatol, flüchtige Fettsäuren, Trimethylamin u. a. m. Die Zerlegung des Eiweissmoleküls im Sinne der Fäulniss vermögen zahlreiche Bakterienarten zu leisten, nur erfolgt durch die einen eine tiefere Zerstörung mit charakteristischen Endprodukten, als durch die anderen. Bei der spontan verlaufenden Fäulniss, welche uns vorzugsweise interessiert, finden wir stets eine Menge verschiedener Bakterienarten an dem Zerstörungswerk, theils gleichzeitig, theils in einer gewissen Aufeinanderfolge betheiligt. Im Anfange pflegen namentlich Aëroben in den Vordergrund zu treten; in späteren Phasen und tieferen Schichten des Substrats Anaëroben. Ist das Substrat der Art, dass während des ganzen Fäulnissprocesses reichlich Sauerstoff zutreten kann, wie z. B. im porösen, für Luft durchgängigen Boden, dann erfolgt Verwesung, d. h. die eigentlichen Fäulnissprodukte und namentlich die stinkenden Gase werden sehr rasch oxydirt zu Wasser, Kohlensäure, salpetriger Säure und Salpetersäure.

Bemerkenswerth ist, dass einige Gährungserreger durch Einwirkung schädigender Momente ihr Vermögen, Gährung zu erregen, auf kürzere oder längere Zeit einbüssen.

Eine weitere äusserst interessante Gruppe von Stoffwechselprodukten der Bakterien bilden die **Toxine**. Dahin gehören:

1. Die Amine, Diamine und Ammoniumbasen (Cholin). Diese Verbindungen werden von zahlreichen Bakterien geliefert, namentlich im Anfangsstadium der Fäulniss; sie sind theils ungiftig (Ptomaine, Leichenalkaloide), theils giftig (besonders Aethylendiamin). Letztere können durch zersetzte Nahrung eingeführt werden und Fleisch-, Wurst-Käsevergiftung hervorrufen (s. unter „Fleisch“)

2. Die Bakterienproteine, sind in den Leibern der Bakterien enthalten, werden erst beim Absterben derselben theilweise löslich in den Körpersäften bezw. durch mehrstündiges Kochen mit dünner Kalilauge extrahirt. Sie haben positiv chemotaktische Wirkung gegenüber den Leukocyten und können daher zu Eiteransammlung führen (phlogogene Wirkung). Ausserdem wirken sie fiebererregend (pyrotoxisch); und bei intraperitonealer Einverleibung grösserer Mengen können sie den Tod der Versuchsthiere durch Lähmung der Cirkulations- und Athmungscentren herbeiführen. — Die zur Wirkung gelangende Quantität der Proteine ist je nach der Bakterienart sehr verschieden; ebenso ist auch die Art der Wirkung der Gifte nicht gleich. — Die Bakterienproteine sind relativ hitzebeständig.

3. Die specifischen Toxine, früher Toxalbumine genannt. Werden schon durch Temperaturen zwischen 40 und 60° zerstört. Einige sind leicht extrahirbar z. B. durch vorsichtiges Erwärmen der Kultur unter Phenolzusatz; oder durch Filtration mittelst Chamberland-Filter (Porzellanthon-Filter); andere sind schwer von der Leibessubstanz der Bakterien zu trennen. Am vollständigsten und schonendsten scheint dies zu gelingen durch Auspressen der Bakterienzellen unter hohem Druck (Bakterioplasmene, E. und H. BUCHNER). Die gelösten Toxine sind fällbar durch Zinkchlorid und Ammonsulfat. Nach möglichster Reinigung resultiren Körper ohne Eiweissreaktion, so dass die frühere Annahme, es handele sich um Toxalbumine, nicht aufrecht erhalten werden kann. — Die specifischen Toxine sind der betreffenden Bakterien-species eigenthümlich. Die meisten sind von unvergleichlich höherer Wirksamkeit, als die giftigen Aminbasen und die Bakterienproteine: die von ihnen hervorgerufenen Vergiftungserscheinungen entsprechen der Wirkung der lebenden Bakterienart. Oft liefert dieselbe Bakterien-species mehrere specifische Gifte, von denen die einen rasch, die anderen erst nach wochenlanger Inkubation wirken können.

Eine besonders wichtige Lebensäusserung der Spaltpilze besteht endlich in der **Krankheitserregung** im thierischen und menschlichen Körper, die zum Theil auf der Produktion der eben besprochenen Toxine, zum Theil auf massenhafter Vermehrung der eingedrungenen Spaltpilze im Blut und in den Organen des lebenden Thieres beruht. In einem der folgenden Capitel wird auf diese parasitäre Existenz speciell einzugehen sein; hier sei nur hervorgehoben, dass auch bezüglich der Befähigung zu dieser die durchgreifendsten Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Spaltpilzen bestehen. Wir unterscheiden exquisite Saprophyten, welche stets nur auf abgestorbenem Material wuchern und schlechterdings nicht befähigt sind, im lebenden Körper des Warmblüters sich zu vermehren oder dort irgend eine Störung hervorzurufen. Von solchen saprophytischen Arten kann man viele Millionen direkt in die Blutbahn eines Thieres injiciren, ohne dass irgend welche Reaction seitens des Körpers auftritt. Tödtet man das Thier kurze Zeit nach der Injektion, so sind bereits alle injicirten Bakterien abgestorben.

Gegenüber diesen harmlosen Saprophyten giebt es obligate Parasiten unter den Bakterien, welche ausschliesslich im lebenden Körper sich vermehren und jedes todte Nährsubstrat verschmähen.

Drittens haben wir noch facultative Parasiten zu unterscheiden, die zwar auf todttem Material gut fortkommen, in unserer Umgebung also gelegentlich sich vermehren und leicht künstlich zu cultiviren

sind, die aber andererseits auch im lebenden Körper gedeihen und in demselben Krankheiten erregen können.

Auch die Energie der parasitären Wucherung, die sogenannte Virulenz der Bakterien, erhält sich bei derselben Art nicht konstant. Durch verschiedenste Einflüsse können vielmehr pathogene Bakterien ihre Virulenz ganz oder theilweise einbüßen.

d) Absterbebedingungen der Spaltpilze.

Die niedrigste Stufe der Schädigung von Bakterien besteht darin, dass sie in einen Zustand latenten Lebens übergeführt werden. Es tritt dann eine Hemmung des Wachstums und der Vermehrung, oder eine Hemmung des Auskeimens der Sporen ein, welche aber zunächst nur so lange anhält, wie das schädigende Moment einwirkt. Sobald rechtzeitig Beseitigung des schädigenden Einflusses erfolgt, beginnt sogleich wieder lebhafte Vermehrung.

Eine solche **Entwicklungshemmung** kann z. B. hervorgerufen werden durch das Fehlen oder die Beschränkung irgend eines nothwendigen Nährstoffs, z. B. durch mässige Wasserentziehung (praktisch verwendet zum Conserviren vieler Nahrungsmittel). Ferner wird die Vermehrung zum Stillstand gebracht durch niedrige Temperatur, und zwar ist der in dieser Weise wirksame Temperaturgrad je nach der Spaltpilzart und nach den jeweiligen sonstigen Bedingungen verschieden. Das Wachstum der Tuberkelbacillen sistirt bei einer Abkühlung unter 25° ; für andere pathogene Bakterien liegt die kritische Temperatur unter $15\text{--}16^{\circ}$; für Saprophyten unter 5° , für einige erst unter 0° .

Ausserdem kann eine Entwicklungshemmung durch Zusatz sehr kleiner Mengen von gewissen chemischen Substanzen zum Nährsubstrat oder auch durch Stoffwechselprodukte der Bakterien (s. S. 42) erreicht werden; die nebenstehende Tabelle giebt — soweit eine vergleichende Uebersicht aus den verschiedenen, nicht nach einheitlicher Methode ausgeführten Versuchen überhaupt entnommen werden kann — ungefähre Zahlen dafür, in welcher Concentration dieselben auf verschiedene Bakterienarten wirken.

Die Wirksamkeit dieser Gifte lässt sich quantitativ dadurch feststellen, dass man verschiedene Mengen des Mittels der Nährgelatine, resp. Bouillon oder Serum zufügt und nun beobachtet, ob das Wachstum der betreffenden Bakterienart vollständig oder theilweise behindert ist. Man findet dabei oft ein ganz verschiedenes Verhalten der einzelnen Bakterienarten; ferner ist aber sehr wohl auf die gesammten übrigen Lebensbedingungen zu achten; z. B. auf die Temperatur, Nährstoffe, Reaktion u. s. w.; werden die Bakterien auf dem Temperatur-

Bakterienhemmende Mittel	Hemmt die Entwicklung von:		
	Milzbrand-bacillen	Fäulnis-bakterien (in Bouillon)	anderen Bakterien
Wasserstoffsuperoxyd		1 : 20000	
Chlor	1 : 1500	1 : 4000	
Brom	1 : 1500	1 : 2000	
Jod	1 : 5000	1 : 5000	
Jodkalium		1 : 7	
Chlornatrium	1 : 60		
Schwefel- oder Salzsäure . .	1 : 3000	1 : 400	{ Cholera 1 : 6000 Diphtherie 1 : 3000 Rotz 1 : 700 Typhus 1 : 500 Cholera 1 : 1000
Schweflige Säure		1 : 6000	
Arsenige Säure		1 : 200	
Borsäure	1 : 800	1 : 100	
Borax		1 : 40	
Kalilauge	1 : 700		{ Diphtherie 1 : 600 Cholera } Typhus } 1 : 400
Ammoniak	1 : 700		{ Cholera } Typhus } 1 : 500
Soda			{ Cholera } Typhus } 1 : 45
Aetzkalk			{ Cholera } Typhus } 1 : 1100
Silbernitrat	1 : 60000	1 : 10000	{ Cholera } Typhus } 1 : 50000
Quecksilberchlorid	1 : 100000	1 : 20000	Typhus 1 : 60000
Kupfersulfat		1 : 1000	
Eisenvitriol		1 : 90	
Kaliumpermanganat	1 : 1000	1 : 500	
Formalin (40% Formaldehyd)			{ Cholera 1 : 20000 Staphyl. 1 : 5000
Alkohol	1 : 12	1 : 10	
Essigsäure, Oxalsäure u. s. w.		1 : 400	
Senföl	1 : 30000	1 : 3000	
Carbolsäure	1 : 800	1 : 500	{ Diphtherie 1 : 500 Typhus 1 : 400 Cholera 1 : 600
Benzoësäure	1 : 1000		
Salicylsäure	1 : 1500	1 : 1000	
Thymol	1 : 10000	1 : 3500	
Campher	1 : 1000		
Chinin	1 : 600		
Terpentinöl	1 : 8000		
Pfeffermünzöl	1 : 3000		
Kaliseife	1 : 1000		

optimum gehalten, so ertragen sie manche schädliche Momente reaktionslos, die bei ungünstigerer Temperatur schon merklichen Einfluss äussern.

Von der Entwicklungshemmung wesentlich verschieden ist die **Tödtung** der Bakterien, welche jedes Leben derselben unmöglich macht, auch nachdem die schädigenden Mittel wieder entfernt und die besten Lebensbedingungen hergestellt sind. Eine solche Tödtung kann aus der Entwicklungshemmung hervorgehen und durch die gleichen Mittel wie diese bewirkt werden, wenn die Dauer der Einwirkung verlängert wird; sie kann ferner in relativ kurzer Zeit erreicht werden dadurch, dass das hemmende Mittel concentrirter und energischer angewendet wird. Concentration und Dauer der Einwirkung sind daher bei jeder Abschätzung eines bakterientödtenden Mittels genau zu berücksichtigen. Die Wirksamkeit variirt je nach der Bakterienart; dann auch je nach dem Alter der Individuen und nach ihrem Entwicklungszustand. Jüngere Individuen scheinen resistenter zu sein als ältere, der Involution nahe; Sporen sind oft enorm viel widerstandsfähiger als die vegetativen Formen. Von grossem Einfluss sind ausserdem auch hier die übrigen gleichzeitig vorhandenen Lebensbedingungen, Temperatur, Nährsubstrat u. s. w.; durch gleichzeitige geringe Erhöhung der Temperatur ist der Effekt der schädigenden Mittel meist erheblich zu steigern. — Endlich ist zu beachten, dass bei Anwendung chemischer Agentien der Zusammensetzung des Nährsubstrats eine besondere Bedeutung zukommt, insofern das gleiche Mittel in dem einen Substrat vielleicht unverändert bleibt und zur vollen Wirkung gelangt, während es in anderen eine theilweise Zersetzung erfahren und dadurch wesentlich geschwächt werden kann.

Bei der Prüfung und Vergleichung der bakterientödtenden Mittel sind alle diese Verhältnisse in Rechnung zu ziehen. — Die Prüfung geschieht in der Weise, dass eine gewisse, annähernd gleiche Menge einer frischen, feuchten, oder auch an Deckgläsern, Granaten, Sandkörnern u. s. w. angetrockneten Cultur eine gemessene Zeit mit den zu prüfenden Mitteln in Berührung gebracht wird. Dann wird das Material mit Nährgelatine gemischt in Platten ausgegossen oder besser in Bouillon oder Serum bei 35° gehalten. Werden chemische Substanzen geprüft, so müssen die Deckgläser resp. Granaten, nachdem sie aus der Giftlösung herausgenommen sind, mehrfach in destillirtem Wasser abgespült werden, damit keine Spur des Giftes in die Nährgelatine übertragen wird und dort etwa hemmend auf das Wachsthum wirkt. Die Culturen werden mehrere Tage im Brütoven gehalten; ist dann auf denselben jede Bildung von Colonieen ausgeblieben, so sind die betreffenden Bakterien als getödtet anzusehen.

Von besonderer Bedeutung sind diejenigen schädigenden Einflüsse, welche innerhalb unserer natürlichen Umgebung ein Absterben von Bakterien in grösserem Umfange zu bewirken vermögen. Dahin gehört fortgesetztes Fehlen von Nährstoffen, in Folge dessen sporen-

Bakterientödtende Mittel	Vernichtet:			
	Strepto- und Staphylokokken	Milzbrand-, Typhus-, Cholera bacillen		Milzbrandsporen
	innerh. 5 Min.	innerh. 5 Min.	in 2—24 St.	
Wasserstoffsuperoxyd	conc.	1 : 200	1 : 500	1 : 100 n. 1 St.
Chlor	0·1 %	0·1 %		0·2 % in 1 St.
Jodtrichlorid	1 : 200	1 : 1000		1 : 1000 (1/2 Tg.)
Jodkalium			1 : 10	
Schwefel- od. Salzsäure	1 : 10	1 : 100	1 : 1500	1 : 50
Schweflige Säure . .			Typhus 1 : 700	n. 10 Tagen
			1 : 300	
			Gas: 10 Vol. % (nur oberfl.)	
Borsäure			1 : 30	conc.
				unvollständig
Kalilauge	1 : 5		1 : 300	
Ammoniak			1 : 300	
Soda			1 : 40	
Ammoniumcarbonat .			1 : 100	
Aetzkalk			1 : 1000	
Silbernitrat	1 : 1000		1 : 4000	
Quecksilberchlorid . .	1 : 10000—1000	1 : 2000	1 : 10000	1 : 2000 (26 St.)
Kupfersulfat				1 : 20 (5 Tage)
Kaliumpermanganat .	1 : 200			1 : 20 a. 1. Tag
Chlorkalk		1 : 500		1 : 20 (1 St.)
Alkohol	70 % n. 15 Min.	70 % n. 10 Min.		
Essigsäure, Oxals. etc.			1 : 2—300	
Chloroform			1 : 14	
Formalin	1 : 10	1 : 20	1 : 1000	1 : 20 in 6 St.
Carbolsäure	1 : 60	Cholera 1 : 200 Typhus 1 : 50	1 : 300	1 : 20 in 4—45 Tagen (bei 40° in 3 Stunden)
Salicylsäure	1 : 1000			
Kreselseifenlösung .	1 : 40	1 : 40		1 : 10 n. 12 St.
Kreolin		1 : 100	1 : 3000	
Lysol	1 : 300	1 : 300	(Typh. 1 : 250)	
				10 % in 5 St.
				1 : 100 n. 10 T.
Chinin				conc. 5 Tage
Terpentinöl				

freie Bakterien den Inanitionstod erleiden, und zwar einige Arten schon nach Stunden, andere erst nach Monaten und Jahren. Ferner ist dahin zu rechnen Schädigung durch gleichzeitig auf demselben Substrat wuchernde andere Bakterienarten und deren Stoffwechselprodukte (Säure und Alkali); sodann Temperaturen von 45—60°, wie sie namentlich an der besonnten Bodenoberfläche häufig vorkommen. Weiter der Einfluss des Lichts, besonders des directen Sonnenlichts; durch letztere werden bei Gegenwart von Luft und Wasser sogar Milzbrandsporen innerhalb einiger Stunden bis Tage getödtet; auch diffuses Tageslicht ist im Stande, nach mehrtägiger Einwirkung auf die Culturen z. B. Tuberkelbacillen zum Absterben zu bringen. Nur auf manche Schimmel- und Hefenpilze übt Belichtung einen günstigen Einfluss aus. — Besonders bedeutungsvoll und in grossem Maassstabe in der Natur wirksam ist noch die Wasserentziehung, das Austrocknen der Bakterien. Zahlreiche Mikrokokken, Spirillen und Bacillen vertragen in sporenfreiem Zustand durchaus keine intensivere Wasserentziehung. Die an trockenen Objecten etwa haftenden Bakterien, namentlich die im Ganzen empfindlicheren pathogenen, sind oft nicht mehr lebensfähig. Alle Bakterien, welche durch Austrocknen getödtet werden, können ferner niemals durch Luftstaub verbreitet werden, da in letzteren nur völlig trockene Organismen übergehen. Für die Infektionsgefahr, welcher wir durch eine bestimmte Spaltpilzart ausgesetzt sind, ist es daher von grosser Bedeutung, ob die Individuen der betreffenden Art beim völligen Austrocknen sich lebensfähig erhalten.

Die künstlich anwendbaren Tödtungsmittel sind auch praktisch wichtig, weil sie zur Desinfektion von Kleidern, Wohnungen, Latrinen u. s. w. benutzt werden. Welche bakterientödtende Mittel hier am besten Verwendung finden, und wie sich im Einzelfall die Technik der Desinfektion gestaltet, das ist in einem späteren Kapitel zu erörtern; hier sei nur eine Uebersicht der desinficirenden Mittel gegeben. Zunächst ist hohe Temperatur zu erwähnen. In flüssigen Substraten sind 50—60° im Allgemeinen ausreichend, um bei einer Einwirkungsdauer von 10—60 Minuten sporenfreie Bacillen und Mikrokokken zu tödten. Einige Arten erfordern höhere Wärmegrade oder längere Einwirkung. Sporen gehen vielfach erst durch eine Temperatur von 100° zu Grunde, welche 2—15 Minuten, bei einzelnen saprophytischen Arten sogar 5—16 Stunden einwirken muss.

Ein erheblicher Unterschied besteht darin, ob die Erhitzung im trockenen Zustand und in relativ trockener Luft oder aber in Flüssigkeiten resp. in Wasserdampf erfolgt; bei trockenen Sporen ist das Eindringen durch die Sporenmembranen erschwert und die das Ab-

sterben begleitenden Aenderungen des Protoplasmas kommen nicht so leicht zu Stande, als wenn dieselben einen gewissen Wassergehalt besitzen. Trockene Luft tödtet daher dieselben Sporen erst bei dreistündiger Einwirkung von 140—160°, welche in kochendem Wasser oder Wasserdampf innerhalb 5—10 Minuten zu Grunde gehen.

Niedere Temperaturen, auch unter 0°, wirken nur in geringem Grade schädigend. Manche besonders empfindliche Bakterienarten gehen durch Gefrieren zu Grunde; von anderen Arten sterben die älteren, weniger widerstandsfähigen Individuen ab; die Mehrzahl der sporenfreien und wohl alle sporenhaltige Bakterien werden dagegen in Eis lebensfähig erhalten.

Ferner sind zur Tödtung der Bakterien zahlreiche chemische Substanzen geeignet und zwar im Wesentlichen die gleichen wie die zur Entwicklungshemmung benutzten. Die umstehende Tabelle giebt über die Wirksamkeit der wichtigsten chemischen Tödtungsmittel gegenüber vorsichtig angetrockneten Bakterien Auskunft, jedoch nur in ganz annähernder Weise, da die Einzelzahlen nicht nach einheitlicher und den auf S. 48 präcisirten Forderungen entsprechender Methode gewonnen sind.

Chlor, Brom und Jod desinficiren sehr energisch, sind aber in der Praxis der Desinfection wenig anwendbar, weil sie alle Gegenstände zu stark beschädigen. Ozon wirkt erst in grösserer Concentration bakterientödtend (s. Kapitel „Luft“). Wasserstoffsuperoxyd desinficirt in 1 proc. Lösung kräftig und ist praktisch verwendbar. — Die Mineralsäuren sind unter einander ziemlich gleichwerthig; sporenfreie Bakterien vernichten sie in 1 proc. Lösung schon in wenigen Minuten. Die Alkalien wirken in Form der Aetzalkalien zwei- bis dreimal schwächer als Säuren, erheblich geringer in Form der Carbonate. Die Ammonverbindungen stehen hinter den übrigen Alkalien zurück. Seifenlösungen sind nur bei gleichzeitiger Erwärmung wirksam; 10 proc. Schmierseifenlösung von 75° tödtet in 20 Minuten Milzbrandsporen ab. — Energetisch desinficirende Wirkung kommt ferner dem Aetzkalk zu. Diesem weit überlegen sind aber Kupfer-, Silber-, Gold- und Quecksilbersalze. Letztere repräsentiren unser wirksamstes und am meisten anwendbares Desinfektionsmittel.

Unter den organischen Verbindungen ist das Chloroform als gutes Desinficiens zu nennen; mit Chloroform gesättigtes Wasser tödtet sporenfreie Bakterien rasch ab. Jodoform wirkt auf fast alle Bakterien gar nicht schädigend (Ausnahme: Cholerabacillen); zur Wundbehandlung ist es trotzdem verwendbar, weil anscheinend unter dem Einfluss gewisser Bakterien und Zersetzungen in der Wunde Abspaltung von Jod erfolgt. Formaldehyd in 40%iger wässriger Lösung (Formalin) hemmt in 1 p. m.-Lösung die Bakterienwucherung; bei höheren Concentrationen tödtet es Bakterien, selbst Sporen. In Gasform ist Formaldehyd bei Einhaltung einer bestimmten Concentration und Zeitdauer der Einwirkung im Stande, alle auf den Flächen und in der Luft eines Zimmers vorhandenen pathogenen Bakterien abzutöden.

Formaldehyd spielt daher in der Praxis der Desinfektion eine sehr wichtige Rolle (s. Kap. „Bekämpfung der parasitären Krankheiten“). — Auch der Aethylalkohol wird praktisch als Desinfektionsmittel verwendet, besonders zur Händesterilisation vor aseptischen Operationen. Absoluter Alkohol wirkt unvollkommener als 60–70%iger Alkohol.

Verbreitete Desinficientien finden sich unter den Körpern der aromatischen Reihe. Bis vor einigen Jahren hielt man die Carbolsäure für besonders wirksam; es zeigte sich aber, dass wirksamere Körper gegeben sind in den Kresolen (Oxytoluolen) und anderen homologen Phenolen, die neben Carbol im Theer und in der rohen Karbolsäure enthalten sind. Um die schwer löslichen, resp. unlöslichen Kresole löslich zu machen, wird entweder Schwefelsäure zu roher Karbolsäure zugesetzt, so dass sich Kresolsulfosäuren bilden; oder die Kresole werden mit Seifenlösung emulgirt (Kresolseifenlösung); oder die Kohlenwasserstoffe und Kresole des Theers werden durch Harzseife emulgirt (Kreolin); oder aus einem an Kresolen reichen Theeröl wird durch Leinölseife eine Lösung hergestellt (Lysol); oder die Kresole sind durch kresotinsaures Natrium (Solveol) bezw. durch Kresolnatrium (Solutol) in Lösung gebracht; oder endlich rohes Carbol ist mit Mineralöl gemischt, so dass die Mischung auf Wasser schwimmt; allmählich lösen sich dann von oben her Kresole in den zu desinficirenden Flüssigkeiten (Saprol). — Von diesen Präparaten ist das praktisch wichtigste die officinelle Kresolseife, *Liquor Cresoli saponatus*, ein Gemisch von gleichen Theilen Rohkresol und Kaliseife, das in 5%iger Lösung zur Verwendung kommt.

Bemerkenswerth sind unter den organischen Desinficientien noch die ätherischen Oele, die in vielen Parfüms enthalten sind; ferner die Anilinfarbstoffe, wie Methylviolett (Pyoktanin) und Malachitgrün, die in Verdünnungen von 1:1000 und weniger sporenfreie Bakterien rasch abtöden.

Werden schädigende Einflüsse nicht so intensiv auf Bakterien applicirt, dass deren Tödtung erfolgt, sondern kürzt man die Dauer der Einwirkung etwas ab oder mässigt man den Temperaturgrad, resp. die Concentration, so entsteht bei vielen Arten eine gewisse **Abschwächung**, die sich eine längere Reihe von Generationen hindurch erhält. Dieselbe äussert sich meist durch eine Verlangsamung der Vermehrung und in einer geringeren Resistenz gegen Schädlichkeiten. Besonders wichtig ist es, dass manche pathogene Arten gleichzeitig einen theilweisen oder gänzlichen Verlust der Virulenz erfahren; für einige Gährungserreger ist in ähnlicher Weise eine Einbusse ihres Gährungsvermögens constatirt. Solche „Abschwächung“ kann z. B. bei Milzbrandbacillen erzielt werden durch 15 Minuten dauernde Einwirkung von 52°, durch 4stündige Erwärmung auf 47°, durch 6tägige Erwärmung auf 43°, durch 28tägige auf 42.5°, ferner durch längere Einwirkung dünner Lösungen von Carbolsäure oder Kaliumbichromat; auch durch Insolation von bestimmter Dauer u. s. w. — Die „abgeschwächten“ Infektionserreger können als Impfstoffe bei der Schutzimpfung Verwendung finden, welche neuerdings in so grossem Um-

fange als prophylaktisches Mittel gegen Infektionskrankheiten empfohlen und unten ausführlicher zu besprechen ist.

e) Die diagnostische Unterscheidung und systematische Eintheilung der Spaltpilzarten.

Früher haben einige Botaniker wohl die Ansicht geäußert, dass die Spaltpilze ein derartiges Anpassungsvermögen besitzen, dass sie ihre Form und ihre Funktionen je nach dem Substrat ändern, auf welchem sie gerade leben. Diese Ansicht hat jedoch durch die zahlreichen Forschungen der letzten Jahre keine Bestätigung gefunden. Wir sehen vielmehr, dass wohl charakterisirte, distinkte Species und Varietäten bei den Spaltpilzen in der nämlichen Weise existiren, wie bei den Schimmelpilzen und bei den höheren Pflanzen. Manche Spaltpilze bewahren sogar ihre Artcharaktere mit ganz besonderer Zähigkeit. Bei anderen dagegen treten allerdings mit der Variirung der Lebensbedingungen kleine Abweichungen von ihrem sonstigen Verhalten ein, namentlich geringe morphologische Aenderungen, oder auch gewisse Differenzen im Aussehen der Colonieen und Culturen. So liefern manche Bacillen (z. B. Proteus-, Typhusbacillen) bei günstigsten Lebensbedingungen, Temperatur von 37° u. s. w. kurze, kugelähnliche Elemente, so dass sie Kokken gleichen, während sie bei niedriger Temperatur zu langen Bacillen und Fäden auswachsen. Verlust der Farbstoffproduktion, des Peptonisirungsvermögens, der Gährungserregung oder der Virulenz werden nicht selten bei fortgesetzter künstlicher Züchtung als Folge einer Anpassung an die veränderten Lebensbedingungen beobachtet; und dieser Verlust gleicht sich unter adäquaterem Verhalten entweder rasch wieder aus, oder bleibt längere Zeit bestehen.

Alle diese Abweichungen halten sich indess innerhalb gewisser Grenzen. Sie führen keineswegs zu einem völligen Verwischen aller Artcharaktere, sondern sie bilden vielmehr einen Theil der Arteigenthümlichkeiten, und je vollständiger sie erkannt werden, um so besser wird die Abgrenzung einer Art gelingen.

Für die praktische Verwerthung unserer Kenntnisse über die Mikroorganismen ist die relative Beständigkeit der wesentlichen Artcharaktere von ausserordentlicher Bedeutung. Wäre dieselbe nicht vorhanden, so würde weder jemals eine diagnostische Unterscheidung und Erkennung von Spaltpilzen möglich sein, noch könnten wir mit irgend welcher Aussicht auf Erfolg mit Spaltpilzen experimentiren und zu wirklichen Fortschritten in der Erkenntniss des Verhaltens der Infektionserreger gelangen.

Im Grossen und Ganzen stehen uns folgende Mittel zur diagnostischen Unterscheidung und zur Eintheilung der Spaltpilze zu Gebote: **Erstens** morphologische Merkmale. Unter diesen scheint sich der Modus der Fruktifikation, also der Sporenbildung und Sporenkeimung, am constantesten zu erhalten und am besten als Classifikationsprincip zu eignen. Da indessen der Vorgang der Sporenbildung sehr schwierig zu beobachten und für viele Bakterien noch gar nicht erforscht ist oder überhaupt nicht vorliegt, müssen vorläufig andere morphologische Merkmale zur Classification benutzt werden. Vor allem ist die verschiedene Wachstumsform der Bakterien als *Micrococcus*, resp. *Bacillus* (*Bacterium*) oder *Spirillum* in Betracht zu ziehen, da dieselbe mit wenigen Ausnahmen von der einzelnen Art zäh festgehalten wird. Die systematische Eintheilung der Spaltpilze stützt sich daher zweckmässig zuvörderst auf drei grosse Abtheilungen: *Coccaceae*, *Bacillaceae* (*Bakteriaceae*), *Spirillaceae*, wobei unter die *Coccaceae* nur solche Bakterien gerechnet werden, welche bei ihrer Vermehrung ausschliesslich kugelige Individuen bilden; unter die *Bacillaceae* solche, welche für gewöhnlich als Stäbchen oder Fäden, zuweilen als Sporen, niemals aber als Mikrokokken, d. h. mit fortgesetzter Vermehrung in Kugelform vorkommen; und unter die *Spirillaceae* solche Bakterien, welche stets als kürzere oder längere Stücke von Schrauben erscheinen und bei ihrer Vermehrung immer wieder solche Schrauben produciren. — (Die durch echte Verästelungen ausgezeichneten Bakterien werden als eine besondere, zwischen Faden- und Spaltpilze einzureihende Gruppe „*Streptothricheae*“ zusammengefasst, s. unten.)

Zweitens können wir biologische Merkmale zur Differenzirung benutzen. Wenn auch die morphologischen Kennzeichen wohl ausreichen, um jene grossen Abtheilungen zu begründen, so ist es doch unmöglich, eine weitere Unterscheidung nach solchem Princip durchzuführen. Dazu sind die unter den verschiedenen Arten hervortretenden Formdifferenzen viel zu geringfügig.

Offenbar sind manche biologische Eigenschaften der Spaltpilze weit besser zu einer Charakterisirung und vorläufigen Classification geeignet. Vor allem bietet das Aussehen der Colonieen auf einem bestimmten Nährboden zahlreiche augenfällige Differenzen.

Berücksichtigt man zunächst nur einen sog. normalen Nährboden, nämlich die mehrerwähnte Nährgelatine, so zeigen sich bereits auf dieser die Colonieen verschiedener Arten von ganz ungleichem Aussehen. Auf den Platten bildet die eine Art weisse trockene Häufchen, die andere weisse schleimige Tropfen, eine dritte Colonie verflüssigt die Gelatine in ihrem Umkreis und sinkt auf den Boden des hergestellten Verflüssigungskraters; wieder andere Colonieen zeigen lebhaft gelbe, grüne, rosaroth, dunkelrothe Farbe. Ferner zeigt das mikro-

skopische Bild der jüngsten Colonieen sehr charakteristische Differenzen. Dieselben erscheinen bald als runde, scharf contourirte, bald als unregelmässige Scheiben mit vielfach gezacktem und gezähneltem Contur. Bald sind sie weisslich oder hellgelb von Farbe, bald dunkelbraun bis schwarz; bald zeigen sie eine homogene Oberfläche, bald ist dieselbe von tiefen Furchen durchzogen. — Auch die sogenannten „Stichculturen“ in Nährgelatine bieten manches interessante Merkmal. Dieselben werden dadurch angelegt, dass man in ein Röhrchen mit starrer Nährgelatine mittelst Platindrahts, welcher kurz vorher mit einer Colonie der betreffenden Art in Berührung gebracht wurde, einen Einstich macht; entlang dem Impfstich entwickelt sich dann die Cultur als weisslicher oder gelblicher Faden, bald nur zart angedeutet, bald dick hervortretend, bald im ganzen Umkreis die Gelatine verflüssigend, und so eine Röhre bildend, in deren flüssigem Inhalt die Reste der Cultur schwimmen. Oder man legt auch Strichculturen an, d. h. man lässt die Gelatine bei schräger Lage des Röhrchens erstarren, so dass eine relativ grosse Oberfläche entsteht, und über diese Fläche führt man den Platindraht mit losem Strich. Es entwickelt sich dann von diesem Strich ausgehend bald nur eine zarte Auflagerung, bald ein dicker schleimiger Belag, und bald entfernt sich dieser nur wenig vom Impfstich, bald wuchert er schnell über die ganze Fläche der Gelatine.

Sollte schliesslich die Art des Wachstums auf Nährgelatine keine Differenzirung zwischen zwei Arten ermöglichen, so bietet doch vielleicht das Wachstum auf anderen Nährsubstraten brauchbare Unterschiede. Z. B. wachsen manche Bakterien auf Nährgelatine gleich, aber auf Kartoffeln völlig verschieden. Auch die übrigen Lebensbedingungen, oder aber die Absterbebedingungen gewähren Unterscheidungsmerkmale, wenn die Culturmethoden versagen. Manchmal zeigt uns ferner das Thierexperiment noch Unterschiede zwischen zwei Arten, welche im Uebrigen als völlig gleich erscheinen.

Ist eine kleine Gruppe unter sich sehr ähnlicher Bakterienarten aus der Menge der übrigen abgegrenzt, so lassen sich innerhalb dieser Gruppe oft mit Vortheil wieder morphologische Differenzen oder Besonderheiten in der Aufnahmefähigkeit für Farbstoffe verwerthen (GRAM'sche Färbung; s. im Anhang).

Hervorgehoben sei noch, dass wir zuweilen zwischen zwei Bakterienarten, von denen verschiedenartige Wirkungen auszugehen scheinen, keine morphologische oder biologische Differenzen finden. Offenbar ist man nicht berechtigt, in Folge eines solchen Mangels von merklichen Differenzen die Bakterien als identisch und beide Krankheiten als ätiologisch einheitlich anzusehen. Unsere Mittel zur Untersuchung und Unterscheidung der Bakterien sind gegenüber deren unendlichen Kleinheit noch so grob und unzulänglich, dass sehr wohl typische Differenzen existiren können, welche sich bis jetzt unserer Wahrnehmung völlig entziehen.

Unter Anwendung der aufgezählten Hilfsmittel gelangen wir schliesslich zu einer systematischen Eintheilung der Spaltpilze, welche zwar durchaus den Charakter eines provisorischen Versuchs trägt, aber doch einigermaassen eine Orientirung auf dem grossen und sonst unentwirrbaren Gebiet der Mikroorganismen gestattet.

f) Beschreibung der wichtigsten Bakterienarten.

1. Coccaceae.

Staphylococcus pyogenes aureus (Fig. 15).

Der häufigste Eiterpilz, wird in 50 Procent und mehr aller eiternden Wunden u. s. w. gefunden; er ist fast regelmässig als einzige Bakterienart in Acnepusteln, Furunkeln, akuten Abscessen, im Eiter von Phlegmonen enthalten; ferner kann er vom Blut aus pyämische Processe hervorrufen und erzeugt dann Eiterherde in den verschiedensten Organen. Er findet sich gewöhnlich als einzige Bakterienart im Knochenmark bei akuter Osteomyelitis.




Fig. 15. *Staphylococcus pyogenes aureus*.
Culturpräparat.
800:1.

Kleine unter 1μ messende, in regellosen Haufen liegende Kokken; nach GRAM färbbar. Bilden auf Gelatineplatten am zweiten Tag punktförmige Colonieen, die bei 80facher Vergrösserung, so lange sie in der Tiefe liegen, rund oder oval, scharfrandig, feinkörnig und dunkelgelb bis braun erscheinen. Sobald sie bis zur Oberfläche durchgewachsen, verflüssigen sie die Gelatine im Umkreis von 1 bis 2 mm.

Wächst auch auf Kartoffeln als goldgelber Belag; ferner in Milch unter Gerinnung derselben. Hält sich sehr lange lebensfähig, in Culturen oft über ein Jahr.

In unserer Umgebung ist er sehr verbreitet; er findet sich auf der Nasen- und Rachenschleimhaut sowie im Darm bei gesunden und kranken Menschen, wird durch Berührungen auf die äussere Haut und die Kleider übertragen; kann auch durch trockenen Staub weiter verbreitet werden. — Die Cultur des Pilzes auf die gesunde Haut der Menschen fest eingerieben, erzeugt ausgebreitete Furunkel; in Wunden der Haut gebracht, erregt er Eiterung. Unter den gebräuchlichen Versuchsthiere reagiren nur Meerschweinchen auf subcutane Einverleibung mit Eiterung und Abscessen. Injicirt man die Cultur Kaninchen in's Blut oder in die Peritonealhöhle, so bilden sich reichliche Kokkenherde in verschiedenen Capillargebieten, namentlich in den Nieren, und die Thiere gehen wesentlich in Folge der embolischen Nephritis zu Grunde. Werden nach der intravenösen Injektion Knochen des Thieres gebrochen, so entstehen in diesen osteomyelitische Processe.

Neben dem *Staph. aureus* kommt eine citronengelbe Varietät mit ähnlichen Wirkungen vor.

Staphylococcus pyogenes albus.

Dem vorigen morphologisch und biologisch gleich, nur dass die Colonieen, Stich- und Strichculturen weiss bleiben. Ein Uebergang der weissen in die gelb wachsende Art oder umgekehrt wird bei sorg-

fältiger Reinhaltung der Culturen anscheinend nicht beobachtet. Ausser der Farbe liegen auch noch andere wichtige Differenzpunkte zwischen beiden Arten vor: 1) bezüglich des Fundorts. *St. p. aureus* wird relativ selten und in geringer Menge auf der menschlichen Haut gefunden, auf deren Oberfläche er gelegentlich von den Schleimhäuten aus verschleppt wird. *St. p. albus* wuchert dagegen regelmässig in der Haut, wächst in Schweiss- und Talgdrüsen hinein und wird daher bei schichtweisem Abtragen der Haut noch in tiefen Schichten reichlich gefunden. Bei der Desinfektion der Hände wird er von den Desinficientien schwer erreicht. 2) Bezüglich der Wirkungen in Wunden der menschlichen Haut erscheint der *St. p. albus* ungleich harmloser. Er erzeugt meist nur Stichkanalleitung an den Wundnähten nach aseptischen Operationen; gefährlichere Eiterungen, Sepsis, Osteomyelitis werden durch ihn selten hervorgerufen, und wo dies beobachtet wurde, ist es noch zweifelhaft, ob nicht andere Eitererreger zugegen waren, die bei der Cultur von dem *St. albus* verdeckt wurden.

Streptococcus pathogenes longus (Fig. 16).

Diplokokken und Kokkenketten häufig von mehr als 6 Gliedern.

Nach GRAM färbbar. Bildet auf Gelatineplatten erst am dritten bis vierten Tage kleine Colonien, weiss, ohne Verflüssigung der Gelatine; unter dem Mikroskop zeigen sich die Colonien rund, graugelblich, fein granuliert. Im Stich und Strich nur zarte Entwicklung meist nicht confluirender Colonien; auf Kartoffeln kein merkliches Wachstum.



Fig. 16. *Streptococcus pathogenes longus*. Culturpräparat. 800:1.

Findet sich ebenfalls sehr häufig im Eiter und ist in unserer Umgebung sehr verbreitet, besonders auf den menschlichen Schleimhäuten; auf der Rachenschleimhaut gesunder Menschen bei 70—80% der Untersuchten. Erzeugt in Hautwunden Eiterung; ausserdem gelegentlich Lymphangitis, Erysipel, Puerperalfieber und andere septische Erkrankungen; er wird ferner bei Angina, Scharlachdiphtherie, Gelenkentzündungen nach Scharlach, Endocarditis, Meningitis, Otitis u. s. w. häufig gefunden, und muss als Erreger dieser Krankheiten angesprochen werden. Vielfach gesellt er sich anderen Krankheitserregern hinzu und erzeugt Mischinfektionen, so bei Diphtherie und Phthise. Die Unterschiede, welche die bei diesen verschiedenen Affektionen herausgezüchteten Streptokokken im morphologischen und culturellen Verhalten unter einander zeigen, sind zum Theil äusserst geringfügig oder es sind solche überhaupt nicht wahrnehmbar. Die Verschiedenheiten der Invasionsstätte und der individuellen Empfänglichkeit sowie Differenzen der Virulenz reichen aus, um die

Verschiedenartigkeit der Erkrankung zu erklären. Die Virulenz ist je nach dem Ausgangsmaterial sehr wechselnd; sie schwankt ausserdem nach den Züchtungsbedingungen. Durch fortgesetzte Thierpassage lässt sich die Virulenz für die betreffenden Versuchsthiere sehr steigern; nachweislich ist aber die Virulenz gegenüber Thieren durchaus nicht maassgebend für die Virulenz gegenüber dem Menschen, und der gleiche Stamm hat sogar auf verschiedene Menschen ganz ungleiche Wirkung.

Ausser dem *Strept. pathog. longus* kommen noch andere Streptokokken zur Beobachtung, die Unterschiede im morphologischen und biologischen Verhalten erkennen lassen. So bilden die einen Streptokokken vorwiegend lange Ketten (*Str. longus*), wachsen in Bouillon ohne diffuse Trübung, nur mit Flöckchenbildung, verflüssigen die Gelatine nicht, bilden keinen sichtbaren Belag auf Kartoffeln; andere bilden kurze Ketten (*Str. brevis*), trüben die Bouillon, verflüssigen langsam die Gelatine, wachsen merklich auf Kartoffeln; eine dritte Gruppe von höchst virulenten Streptokokken wächst auf Gelatine unter Verfärbung derselben; die in Scharlachfällen gefundenen Streptokokken bilden in Bouillon zusammengeballte Flöckchen (*Str. conglomeratus*).

Es kommen indessen zwischen allen diesen Streptokokken Uebergänge vor, indem die morphologischen und biologischen Kennzeichen der einzelnen Spielart Variationen unterliegen können.

Diplococcus Pneumoniae (*Streptococcus lanceolatus*) (Fig. 17).

Diplokokken, die bei croupöser Pneumonie in dem erkrankten Organ und im rostfarbenen Sputum regelmässig vorkommen, sehr häufig auch bei Bronchopneumonien. Secundäre Ansiedlungen der Kokken bewirken Meningitis, Pleuritis u. s. w. Eitrige Otitis media, Endocarditis ulcerosa, Abscesse und Gelenkeiterungen sind oft auf den *Dipl. pneum.* zurückzuführen. — Die Kokken sind eiförmig, häufig mit zugespitzten Enden, und zeigen in Sputum- resp. Blutpräparaten eine sich scharf abzeichnende ungefärbte Schleimhülle. (*Diplococcus lanceolatus capsulatus*). Nach GRAM färbbar. — In den Culturen kurze, 4—6gliedrige Ketten. (*Streptococcus brevis*).



Fig. 17. *Diplococcus Pneumoniae*. (FRÄNKEL). Mäuseblut 800:1.

Die Kokken gedeihen am besten auf Agar oder Blutserum bei 35°, wo sie einen thautropfenähnlichen grauweissen Belag bilden. Die Culturen sterben rasch ab und gehen durch Austrocknen (in Culturen rasch, nicht so leicht in schleim- und eiweisshaltigen Medien) zu Grunde. Mäuse und Kaninchen sterben zuweilen schon nach Einimpfung kleiner Dosen an Septikämie, regelmässig nach Injektion in die Blutbahn und man findet die Kokken dann reichlich in Blut und Organen. Bei directer Injektion in die Lunge, zuweilen auch nach subcutaner Impfung, entsteht fibrinöse oder eitrige Pleuritis, Endocarditis u. dgl. Bei fortgesetzter Cultur tritt bald Verlust der Virulenz ein. — Da danach eine längere Haltbarkeit virulenter Diplokokken in unserer Umgebung so gut wie ausgeschlossen ist, da die Kokken aber auf der normalen Mund- und Rachen-

schleimhaut vieler Menschen gefunden werden, nimmt man an, dass sie von dort unter gewissen Umständen und namentlich unter Mitwirkung von „Erkältungskrankheiten“ in die Lunge eindringen.

Seltener beobachtet man in pneumonischen Lungen eine Bakterienart, die von FRIEDLÄNDER als Erreger der Pneumonie angesprochen und als *Micrococcus Pneumoniae* bezeichnet wurde. Diese Art bildet jedoch in Culturen wesentlich Bacillen und sogar Fäden und wird daher richtiger als *Bacillus Pneumoniae* bezeichnet. Im mikroskopischen Präparat lassen sich leicht Kapseln sichtbar machen. Er wächst üppig in Gelatine in Form eines weissen schleimigen Belags (ähnlich wie *Bac. aerogenes*, s. u.). — Für Kaninchen ist er völlig unschädlich, für Mäuse nur, wenn ihnen übergrosse Mengen durch Inhalation oder mittelst Injektion der Culturen durch die Thoraxwand in die Lunge gebracht werden. — Er scheint regelmässiger Epiphyt der menschlichen Nasen- und Rachenschleimhaut und ohne ätiologische Bedeutung für Pneumonien zu sein.

Staph. pyog. aureus und *albus*, *Strept. path. longus* und der *Diploc. pneumoniae* sind die häufigste Ursache der Eiterung, Sepsis und Pyämie. — Eiterung kann im Experiment auch z. B. durch isolirte Toxine bewirkt werden, in der Praxis kommen aber nur die genannten Kokken- und einige später zu beschreibende Bacillenarten (nam. *B. coli*) in Betracht. — Akute Sepsis und Pyämie, sog. Blutvergiftung, entsteht nie durch Eindringen eines Giftstoffs in eine Wunde (z. B. sog. Leichengift, giftige Farbe, Phosphor, Dinte und dgl.), sondern stets durch eine Invasion derartiger lebender Bakterien. Häufig fällt zeitlich diese Invasion nicht mit der Verletzung zusammen, sondern erfolgt nachträglich durch Finger, Speichel, Verbandzeug u. s. w., an denen die Bakterien haften.

Diplococcus intracellularis meningitidis.

Semmelförmige Diplokokken, vorzugsweise in Leukocyten eingelagert, dem *Gonococcus* ähnlich. Meist, aber nicht immer, nach GRAM färbbar. Züchtung gelingt nur bei 37° auf Glycerinagar. Neuerdings in fast sämtlichen Fällen von epidemischer Genickstarre im Exsudat der Pia und im Nasenschleim der Erkrankten nachgewiesen.

Micrococcus Gonorrhoeae (*Gonococcus*) (Fig. 18) finden sich regelmässig in gonorrhoeischem Sekret, so lange dasselbe noch contagiös ist.

Diplokokken, die in kleinen Haufen auf und namentlich in den Zellen des Sekrets liegen. Messen im Längsdurchmesser 1.25 μ , im Querdurchmesser 0.6



Fig. 18. *Micrococcus* der *Gonorrhoe*. 800:1 (nach BUMM). *a* = frei liegende Kokken. *b* = Kokken in Eiterzellen. *c* = Epithelzelle mit Kokken.

bis 0.8μ . Nach GRAM nicht färbbar. Wachsen auf künstlichem Substrat schwierig; die Cultur gelingt auf menschlichem Blutserum und auf Serumagar bei 37° . Für Thiere völlig indifferent; der Diplococcus ist ein nur für den Menschen angepasster obligater Parasit.

Micrococcus tetragenus.

Häufig im menschlichen Sputum; ist ferner mehrfach als einziger Mikroorganismus in Abscessen der Mundhöhle beobachtet, so dass ihm eitererregende Eigenschaften zugesprochen werden müssen. Bildet Tafeln von je vier nebeneinander liegenden Individuen, welche von einer Gallerthülle kapselartig umschlossen sind; nach GRAM färbbar; wächst leicht auf Gelatine. Die Culturen sind nur für weisse Mäuse, nicht aber für graue Hausmäuse und Feldmäuse virulent. Bringt man einer weissen Maus eine kleine Menge in eine Hautwunde, so geht dieselbe nach 3 bis 10 Tagen an Sepsis zu Grunde und zeigt im Blut und in allen Organen reichliche Mengen der Mikrokokken. Wegen seines charakteristischen mikroskopischen Bildes ist der Pilz zu allerlei Experimenten im Laboratorium besonders geeignet.



Fig. 19. *Micrococcus tetragenus*, Milzausstrich. 500:1.

Saprophytische Kokken.

Als *Micrococcus ureae* wurde früher ein Coccus beschrieben, dessen Culturen die spezifische Leistung zukommen sollte, in Harn- oder Harnstofflösungen rasche Ueberführung des Harnstoffs in Ammoniumcarbonat zu bewirken. Derselbe war indessen vermuthlich identisch mit einem der ziemlich zahlreichen Kokken oder Sarcinen, denen die gleiche Eigenschaft zukommt, z. B. dem *Staph. pyog. aur. und albus*. Auch Bacillen wie *B. coli*, *Proteus* u. s. w. bewirken dieselbe Zersetzung.



Fig. 20. *Sarcina*, schematisch. 500:1.

Sarcina. Mehrere Arten und Varietäten, alle charakterisirt durch die kubische Zusammenlagerung von je acht Kokken in ein Packet; oft sind mehrere kleine Packete zu einem grösseren gruppiert. Wachsen in Form trockener Häufchen auf Gelatine, die einen weiss, andere gelb, wieder andere orange. Sehr verbreitet. Werden häufig aus der Luft aufgefangen. Bei pathologischen Zuständen des Magens oft in grossen Mengen im Mageninhalt, jedoch anscheinend ohne pathogene Wirkung.

2. Bacillaceae.

Bacillus anthracis, Milzbrandbacillus (Figg. 21—25).

Findet sich im Blut und in den Organen jedes am Milzbrand gefallenen Thieres. Relativ grosse Stäbchen von $5-20 \mu$ Länge und $1-1.25 \mu$ Breite, ohne Eigenbewegung. Im lebenden Thierkörper und im uneröffneten Cadaver erfolgt nur fortgesetzte Vermehrung durch Theilung und Bildung von Scheinfäden. Dagegen erfolgt bei Luftzutritt und bei Temperaturen zwischen 16 und 42° im todtten Substrat

und in Culturen Sporenbildung. Die Bacillen wachsen zunächst zu Fäden aus und in diesen bilden sich in perlschnurartiger Reihe glänzende Sporen (Figg. 23, 24). Schliesslich zerfällt der Faden, die Sporen werden frei und können unter günstigen Bedingungen wieder von neuem zu Bacillen auskeimen.

Die Bacillen wachsen leicht auf Nährgelatine; sie bilden auf Platten nach 24 bis 48 Stunden kleine weisse Pünktchen, welche sich bei 80facher Vergrösserung als ein unregelmässig contourirtes Knäuel aus gewellten Fadensträngen darstellen. Erreicht die Colonie die Oberfläche, so treten die einzelnen lockigen Fadenstränge am Rande deutlicher hervor (Fig. 25) und wuchern auf weite Strecken über die Gelatine hin. Gleichzeitig tritt in der Umgebung der Colonielangsame Verflüssigung ein. Dies mikroskopische Bild der Milzbrandcolonie ist so charakteristisch, dass dasselbe für die Diagnose verwerthet werden kann. — Auf Kartoffeln wachsen die Bacillen in Form einer weisslichen Auflagerung; in Bouillon entstehen wolkige Massen am Boden des Gefässes.

Impft man Mäusen, Kaninchen, Meerschweinchen die minimalsten Mengen einer Cultur in eine Hautwunde, so sterben dieselben nach



Fig. 21. Milzbrandbacillen. Mäuseblut (nach Koch). 700:1.



Fig. 22. Milzbrandbacillen. Meerschweinchenblut (nach Koch). 650:1.




Fig. 23. Milzbrandfäden, drei Stunden alte Cultur von Meerschweinchenblut in humor aqueus (nach Koch). 650:1.




Fig. 24. Milzbrandfäden mit Sporen, 24 stündige Cultur (nach Koch). 800:1.

22 resp. 40 Stunden am Milzbrand. Ferner sind Schafe, Rinder Pferde ausserordentlich empfänglich und in den Heerden dieser Thiere kommt es nicht selten zum Ausbruch von Epizootien. Nach dem Tode des Thieres findet man alle Capillaren der Leber, Milz, Nieren u. s. w. wie austapeziert mit enormen Mengen von Milzbrandbacillen, so dass jedes Ausstrichpräparat, namentlich aus der Milz, mit Sicherheit die Diagnose

auf Milzbrand zu stellen gestattet. Hühner, Tauben, weisse Ratten sind unempfindlich. Auch der Mensch zeigt eine relativ geringe Empfänglichkeit, da er häufig nur mit örtlicher Affektion reagirt. —



Fig. 25. Milzbrand-colonie. 60:1. Bei a der Rest der tiefliegenden Colonie, b oberflächliche Ausbreitungen.

Durch manche schädliche Einflüsse büssen die Culturen ihre Virulenz ganz oder theilweise ein (s. S. 52).

Bacillus Typhi abdominalis.

Durch Cultur nachweisbar in der Milz, der Leber und den Mesenterialdrüsen jeder Typhusleiche. In den Dejectionen Typhuskranker ist der *Bacillus* meist nur spärlich vorhanden und wird in den Culturen leicht durch die viel zahlreicheren *Coli*-Bakterien verdeckt (s. unten); in manchen Fällen gelingt es aus dem Harn, oder auch aus dem Blut, besonders der Roseolaflecke, die Typhusbacillen während des Lebens zu züchten. Mikroskopisch stösst der Nachweis auch in der Typhus-Milz auf grosse Schwierigkeiten; dagegen gelingt hier der Nachweis durch das Culturverfahren mit voller Sicherheit (GAFFKY). — Bei irgend



Fig. 26. Typhusbacillen aus Gelatinecultiv. (nach LOEFFLER). 600:1.

welchen anderen Krankheiten sind niemals die gleichen Bacillen gefunden. Die Bacillen müssen daher als Erreger des Abdominaltyphus angesehen werden.

In den Schnittpräparaten erscheinen die Bacillen als kurze, plumpe, an den Enden abgerundete Stäbchen, welche meist in grösseren Haufen zusammenliegen. Aus den Culturen entnommen erscheinen sie je nach den Culturbedingungen verschieden, von Agarcultur bei 37° sehr kurz, von Kartoffel bei 22° länger und mit Neigung Fäden zu bilden. Oft zeigen sich in den gefärbten Bacillen ungefärbte Lücken, die jedoch nicht als Sporen aufzufassen sind. Die künstlich gezüchteten Bacillen sind trotzdem sehr resistent; sie erhalten sich im ausgetrockneten Zustande bis zu drei Monaten lebensfähig. — Im Bouillontropfen untersucht zeigen die Bacillen lebhaftes Eigenbewegung; durch besondere Färbemethoden (s. Anhang) sind an jedem *Bacillus* 8—12 um die ganze Peripherie angeordnete Geisseln sichtbar zu machen.

Die jüngsten Colonieen auf Gelatineplatten erscheinen bei schwacher Vergrösserung rund, oder oval, oder wetzsteinförmig, von scharfem Contour und gelblichgrüner Farbe. Charakteristisch wird das Bild der Colonie, sobald sie bis zur Oberfläche durchgewachsen ist. Es entsteht dann rasch eine flache Auflagerung, welche unter dem Mikroskop einen stark ausgebuchteten Contour,

eine grauweissliche Farbe und auf der Oberfläche ein System von Furchen und Faltungen zeigt, welche sich nach dem Rande zu verästeln (weinblattartige Zeichnung). Verflüssigung der Gelatine tritt nicht ein.

Eigenthümlich ist auch das Wachstum auf Kartoffelscheiben. Es entsteht hier über die ganze Fläche eine Art Haut, welche kaum wahrnehmbar ist, weil sie die Farbe der ursprünglichen Kartoffel völlig unverändert lässt; mikroskopische Präparate von irgend einer Stelle zeigen aber grosse Mengen beweglicher Bacillen. Auf Kartoffeln mit stärker alkalischer Reaction kommt dieses typische Wachstum nicht zu Stande, sondern es entsteht dann eine gelbliche oder gelbbraunliche schmierige Auflagerung. — Auf Fleisch, in Bouillon, Milch u. s. w. können sich die Typhusbacillen lebhaft vermehren, auf letzterer ohne sichtbare Veränderungen hervorzurufen. In Wasser findet zwar für gewöhnlich keine Vermehrung statt, wohl aber halten sich die hineingebrachten Bacillen Monate lang. — Ueber die Differenzial-Diagnose der Typhusbacillen, die sich gegenüber zahlreichen ähnlichen Bakterien (namentlich *Bact. coli*-Arten) ziemlich schwierig gestaltet, siehe im Anhang.




Fig. 27. Typhuscolonie. 60:1.
a oberflächliche, b tieflegende.

Thiere sind für Uebertragungen des Typhus-Bacillus wenig empfänglich. Eine Vermehrung erfolgt erst, wenn sehr grosse Mengen der Bacillen injicirt werden; es scheint aber, als ob eine allmähliche Gewöhnung der Bacillen an gewisse Versuchsthiere stattfinden könne. — Sehr leicht gelingt es, bei verschiedensten Versuchsthiern durch Einbringung hinreichend grosser Mengen sterilisirter oder filtrirter Culturen in kurzer Zeit ausgesprochene Intoxikationserscheinungen hervorzurufen.

Wird Menschen oder Versuchsthiern (Meerschweinchen, Ziegen) Cultur von Typhusbacillen subcutan injicirt, so zeigen sich im Blutserum der Geimpften nach kurzer Zeit Schutzstoffe, darunter solche, welche eine Aufschwemmung von Typhusbacillen zu agglutiniren, d. h. Verkleben und Häufchenbildung der Bacillen zu bewirken vermögen. Anderen Bakterien gegenüber zeigt sich diese Wirkung des Serums nicht. Die gleiche specifische Wirkung beobachtet man auch an dem Serum von Typhuskranken und Typhusrekonvalescenten (WIDAL'sche Reaction). Darin liegt ein Beweis für die ätiologische Bedeutung der Typhusbacillen. Ausserdem bietet die WIDAL'sche Reaction das beste Mittel zur Erkennung einer verdächtigen Erkrankung als Typhus; andererseits kann eine fragliche Cultur durch ihr Verhalten gegenüber zweifellosem Typhusserum als Typhuscultur erkannt werden. (Näheres s. in Kap. X und im Anhang.)

Bacillus aërogenes und Bacillus coli.

Dem Typhusbacillus in vielen Beziehungen ähnlich sind zwei Gruppen von sehr verbreiteten Bacillenarten, denen man gemeinsam die obenstehende Bezeichnung gegeben hat. Zur Gruppe des *B. aërogenes* rechnet man verschiedene Arten und Varietäten, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie im Gegensatz zum Typhusbacillus unbeweglich sind und dass sie auf Gelatineplatten ohne Verflüssigung meist als dickere, porzellanweisse Tröpfchen wachsen. Einzelne Arten bilden indess auch flache häutenartige Auflagerungen. Aërogenesarten kommen regelmässig im Darm vor. Ferner gehört hierher ein Erreger der Milchsäuregährung, der bei Blutwärme unter den spontan in der Milch sich entwickelnden Gährungserregern in den Vordergrund tritt, Linksmilchsäure bildet und zuweilen, aber nicht regelmässig, nach GRAM gefärbt bleibt.

Auch pathogene Wirkungen gehen von Aërogenesarten aus. Namentlich gehören die häufigsten Erreger von Cystitis zu dieser Gruppe; ferner die Erreger des Rhinoskleroms. — KRUSE hat es neuerdings wahrscheinlich gemacht, dass der Erreger der einheimischen epidemischen Ruhr ein plumper unbeweglicher Bacillus ist, der oft in die Eiterzellen der eitrig-schleimigen Dejecte eingelagert ist, und der auf Gelatineplatten Colonieen bildet, die von Typhuscolonieen kaum zu unterscheiden sind. Das Serum von Ruhrkranken schien auf diese Bacillen specifisch agglutinierend zu wirken.

Einige Arten zeichnen sich dadurch aus, dass die Bacillen im Thier- und Menschenkörper mit sog. Kapseln auftreten; gleichzeitig pflegen sie üppiger zu wachsen und dicke schleimige Auflagerungen in den Culturen zu bilden. Zu diesen „Kapselbakterien“ gehören z. B. der Pneumobacillus FRIEDLAENDER's (s. S. 59) und die Ozaena-Bacillen.

Zur Gruppe *B. coli* rechnet man zahlreiche Arten, die darin übereinstimmen, dass sie plumpe oder schlanke kurze, bewegliche Stäbchen bilden, mit mehreren perithrichen Geisseln, ohne Sporen, nach GRAM nicht färbbar. Auf Gelatineplatten bilden die Colonieen flache Auflagerungen, meist etwas dicker als bei den Typhusbacillen, stärker gefärbt und ohne deutliche weinblattartige Zeichnung. Jedoch kommen starke Annäherungen an das Aussehen der Typhuscolonieen vor. Ueber die sonstigen Culturdifferenzen s. im Anhang.

Coliarten findet man regelmässig im Darm des Menschen und der Thiere. Bei den verschiedensten Darmaffektionen des Menschen zeigen die Dejecte fast Reincultur von Colibakterien, so bei Kinderdiarrhoe, Cholera nostras, Cholera asiatica, Typhus u. s. w., ohne dass daraus eine

ätiologische Bedeutung der Bacillen für die betreffende Krankheit gefolgert werden darf. Manchen Arten kommen aber zweifellos pathogene Wirkungen zu; sie vermögen z. B. Entzündung der Gallenwege, Peritonitis, Cystitis, Pyelitis und Nephritis, allgemeine Sepsis zu veranlassen. Auch bei den sog. Fleischvergiftungen (s. unten) sind Coliarten ätiologisch betheiligt.

Bacillus tuberculosis.

1882 von KOCH entdeckt. — Findet sich in allen tuberculösen Organen und Sekreten da, wo der tuberculöse Process im Entstehen oder Fortschreiten begriffen ist, niemals dagegen bei nicht tuberculösen Individuen. Schlanke, meist leicht gekrümmte Bacillen von $1.5-3.5\ \mu$ Länge. Charakterisirt durch das Verhalten gegen Anilinfarben; die-




Fig. 28. Sputum mit Tuberkelbacillen (und vereinzelt Diplo- und Streptokokken). 600:1.



Fig. 29. Colonieen von Tuberkelbacillen auf Blutserum (nach KOCH). 700:1.

selben dringen ohne besondere Zusätze schwer in die von einer wachsartigen Hülle umgebenen Tuberkelbacillen ein, dagegen leichter, wenn ihnen Alkali, Anilin oder Carbolsäure zugefügt ist und die Einwirkung längere Zeit hindurch oder bei Siedehitze erfolgt. Die einmal eingedrungenen Farbstoffe haften dann aber sehr fest und widerstehen lange Zeit der Entfärbung z. B. durch Säure (Säurefestigkeit der Tuberkelbacillen). Färbt man zuerst mit alkalischem Farbstoff und lässt dann Säure einwirken, so bleiben alle Bakterien ohne Färbung mit Ausnahme der Tuberkelbacillen; die übrigen Bakterien und die Zellkerne können dann mit einer Contrastfarbe nachgefärbt werden (s. Anhang). — In den gefärbten Bacillen treten oft 2—6 helle Stellen auf, die aber nicht auf Sporenbildung zu beziehen sind.

Die Cultur der Tuberkelbacillen gelang KOCH auf erstarrtem Blutserum, aber nur bei 37° und auch dann zeigte sich erst nach 10—14 Tagen deutliches Wachsthum in Form von trockenen Schüppchen und Bröckchen. Da Platten nicht anwendbar sind und da die Cultur so lange Zeit gebraucht, bis die Tuberkelbacillen sich ausbreiten, lässt sich für gewöhnlich kein Material zu Züchtungsversuchen verwerthen, welches noch andere saprophytische und schneller wachsende Bakterien enthält; diese occupiren sonst das ganze Nährsubstrat längst, ehe die Tuberkelbacillen sich zu vermehren beginnen. Am

besten geht man daher zum Zwecke der Anlage von Culturen von Leichen theilen aus, welche mit allen Cautelen entnommen sind, oder aber besser von den Organen eben gestorbener resp. getödteter inficirter Thiere. — Neuerdings sind viele Nährsubstrate construiert, auf welchen die Tuberkelbacillen schneller und üppiger wachsen. Besonders empfiehlt sich ein Zusatz von 4% Glycerin zu Agar oder Bouillon. Ferner wirken Zusätze von Eidotter, Gehirn, Nährstoff HEYDEN (Hesse'scher Nährboden) günstig. Mit solchen Gemischen gelingt auch die Cultur aus Sputum von Phthisikern, wenn man den inneren eitrigen Kern des Sputums erst mehrfach in sterilisirtem Wasser abspült und dann auf dem zu Platten ausgegossenen Nährboden austreicht. — Auch auf pflanzlichem Nährboden (Kartoffeln) wachsen die Tuberkelbacillen gut; es genügt sogar ein künstliches Gemisch, welches nur Ammonsalze, 1,5% Glycerin, Wein- oder Milchsäure und Magnesiumsulfat und Kaliumphosphat enthält.

Die Uebertragung von den Culturen aus auf Thiere gelingt am sichersten bei Meerschweinchen. Diese sind durch subcutane Impfung und durch Inhalation versprayer Aufschwemmungen oder trockenen Staubes von Cultur oder Sputum mit constantem Erfolg zu inficiren; Kaninchen schon schwieriger; alle Versuchsthiere gehen indess an typischer Tuberculose zu Grunde, wenn Cultur oder phthisisches Sputum in die Bauchhöhle resp. in eine Vene injicirt wird. Nach diesen Resultaten sind die Tuberkelbacillen zweifellos als die Erreger der Tuberculose anzusehen.

Die Bacillen sind sehr lange haltbar; im trockenen Zustand bleiben sie 6—9 Monate lebensfähig, im feuchten Zustand können sie trotz der Anwesenheit anderer Bakterien sich bis zu 6 Wochen erhalten.

In den Culturen zeigen die Tuberkelbacillen häufig ein Auswachsen zu Fäden mit echten Verzweigungen; manche Fäden enden mit keulenförmigen Anschwellungen. Auf Grund dieser Merkmale rechnet man den Tuberkelbacillus jetzt zur Gruppe der Streptothricheen bezw. zu den Fadenpilzen (ebenso wie die sich ähnlich verhaltenden Rotz- und Diphtheriebacillen). Die praktisch ausschliesslich in Betracht kommende Wuchsform ist indess die des Bacillus.

Varietäten des Tuberkelbacillus. Eine eigenthümliche Differenz fanden KOCH und SCHÜTZ zwischen den aus tuberculösen Erkrankungen (Perlsucht) der Rinder und den vom Menschen stammenden Tuberkelbacillen. Während die Perlsuchterreger letzteren in Bezug auf mikroskopisches Aussehen, Culturverhalten und Wirkung gegenüber kleineren Versuchsthiere, Meerschweinchen und Kaninchen, vollkommen gleichen, unterscheiden sie sich dadurch, dass sie auch Rinder, Schafe und Schweine leicht zu inficiren vermögen, während dies mit den Erregern der menschlichen Tuberculose nicht gelingt. Ob auch umgekehrt die Erreger der Perlsucht Menschen nicht zu inficiren vermögen, ist noch durch weitere Beobachtungen und Untersuchungen zu ermitteln.

Eine erheblich weiter abweichende Art bilden die Erreger der Geflügel(Hühner-)tuberculose. Diese wird durch Bacillen verursacht, die vorzugsweise in der Leber wuchern, in Culturen leichter wachsen, hier feuchte, speckige Auflagerungen liefern, und Meerschweinchen nicht inficiren. Andererseits sind Hühner gegen menschliche Tuberkelbacillen nur ausnahmsweise empfänglich.

Starke Veränderungen sollen die Tuberkelbacillen in Kaltblütern (Fischen, Blindschleichen, Fröschen) erfahren; nach längerem Aufenthalt in diesen Thieren sollen Culturen entstehen, die schon bei Zimmertemperatur als zusammenhängender Belag wachsen. Verwechslungen mit einer der im Folgenden beschriebenen Arten sind bei diesen Versuchen nicht immer mit Sicherheit ausschliessen.

Die Säurefestigkeit der Tuberkelbacillen ist für dieselben nicht ganz specifisch. Sie kommt auch den Leprabacillen, ferner den Smegmabacillen (in geringerem Grade) zu. Ausserdem ist neuerdings eine Gruppe von „säurefesten“ Bacillen bekannt geworden, zu der zahlreiche Arten zu gehören scheinen, welche in Butter, Kuhexkrementen, auf Futtergräsern (Thimotee) und in der Ackererde sehr verbreitet sind. Ihre Aehnlichkeit mit den Tuberkelbacillen erstreckt sich ausser auf die Säurefestigkeit auf das Vorkommen von Verästelungen und Keulenformen in den Culturen (vgl. „Streptothricheen“), und auf Pathogenität gegenüber Meerschweinchen und Kaninchen, gelegentlich gekennzeichnet auch durch das Auftreten tuberkelähnlicher Affektionen. Deutliche Differenzen treten aber sowohl in den Culturen hervor, die sämtlich bei Zimmertemperatur rasch wachsen und zusammenhängende, oft farbige, dicke Auflagerungen bilden; als auch im Thierexperiment, insofern z. B. die Impfung in die vordere Augenkammer beim Kaninchen ohne Erfolg bleibt.

Bacillus Leprae.

Bei allen Formen des Aussatzes finden sich in den erkrankten Organen, z. B. in den Tumoren der Haut und auf den ulcerirenden Schleimhäuten (besonders der Nase), ausserordentlich zahlreiche Bacillen, meist in Gruppen gelagert und oft in eigenthümliche Zellen eingebettet. Die Bacillen messen 3—6 μ , nehmen Farbstoffe auch ohne Alkalizusatz auf, widerstehen aber der Entfärbung in ähnlicher Weise wie die Tuberkelbacillen. In künstlichen Culturen kommt kein Wachsthum, oder höchstens Wachsthum nicht säurefester Bacillen zu Stande, deren Bedeutung zweifelhaft ist. Auch bei Uebertragungen auf Thiere hat man bisher nur ausnahmsweise ein beschränktes Wachsthum der eingebrachten Knoten beobachtet. — Aus der Verbreitung der Bacillen in den erkrankten Organen, aus der Constanz und Anschliesslichkeit ihres Vorkommens dürfen wir auf ihre ätiologische Bedeutung schliessen.



Fig. 30. Leprabacillen im Unterhautszellgewebe. 600:1.

Bacillus Mallei, Rotz-Bacillus.

Von LOEFFLER in frischen Rotzknoten nachgewiesen. Die Bacillen sind etwas grösser und dicker als Tuberkelbacillen, lassen sich schwierig färben; die gefärbten Bacillen zeigen unregelmässige Lücken; ausserdem lassen sich durch Doppelfärbung Sporen nachweisen. Die Bacillen sind




Fig. 31. Rotzbacillen. Schnitt aus einem Rotzknoten. 700:1.

ziemlich leicht cultivierbar, wachsen auf Blutserum in Form von glasigen Tropfen, auf Kartoffelscheiben in Form eines charakteristischen, anfangs gelben, später braunen Belags. Unter 25° findet nur spärliches Wachstum statt. Mit den Culturen lässt sich bei Thieren typischer Rotz hervorrufen; am empfänglichsten sind Feldmäuse, junge Hunde und Meerschweinchen (Erkrankung der Hoden).— Die Culturen

halten sich im trockenen Zustand einige Wochen lebensfähig; bei fortgesetzter Cultur geht die Virulenz der Bacillen verloren. Gegenüber den üblichen Desinfektionsmitteln (Hitze, Kresol) zeigen sie mässige Resistenz. — Auch in Rotzculturen finden sich verästelte Fäden, durch welche die Zugehörigkeit der Bacillen zu den Streptothricheen dargethan wird.

Bacillus Diphtheriae.

Durch Untersuchungen von LOEFFLER ist festgestellt, dass bei diphtherischen Processen, speciell bei der epidemisch auftretenden Rachendiphtherie, stets eine bestimmte Art von Bacillen vorkommt, die nicht sowohl durch ihr culturelles Verhalten als vielmehr durch Form und Lagerung der Einzelindividuen charakterisirt ist. Es sind zwei Stadien zu unterscheiden; die jungen Bacillen, d. h. solche, die auf gutem Nährboden in 5—8 Stunden gewachsen sind; und die älteren Individuen, 9—24 Stunden alt.

Die Gestalt der jungen Individuen ist die eines kurzen Keils, das eine Ende ist häufig deutlich, zuweilen nur andeutungsweise dicker als das andere. Oft zeigt dabei der Bacillus eine leichte Krümmung. Die Lagerung verschiedener Individuen ist fast stets so, dass sie divergiren oder sich kreuzen; in Haufen sind sie regellos durcheinander geworfen, nicht parallel aneinander gereiht. Nicht selten lagern sich die Bacillen in V-Form, oder gar in Y-Form.

Die älteren Individuen sind ähnlich gelagert; der einzelne Bacillus

zeigt aber grössere Länge, stärkere keulige Auftreibung des einen Endes oder beider, manchmal auch Verdickungen an anderen Stellen, oft aber auch Zerfall in einzelne Segmente. Diese Formen entsprechen offenbar einer sehr früh eintretenden Involution. — Die Bacillen sind unbeweglich, bilden keine Sporen. Sie sind mit den gewöhnlichen Färbemitteln (bes. gut mit Fuchsin), ferner auch nach GRAM färbbar.

Die Cultur gelingt leicht bei einer Temperatur über 25° auf verschiedenen Nährböden. Auf Platten von Glycerin-Agar entstehen Colonieen, die bei 60facher Vergrösserung unregelmässig begrenzt und ganz grob gekörnt erscheinen, an verstreuten Schnupftaback erinnernd. Am schnellsten wachsen sie auf LÖFFLER'scher Blutserummischung (3 Theile Serum + 1 Theil Dextrose-Peptonbouillon), die in flachen Schälchen durch Erhitzen auf 100° zum Erstarren gebracht ist, und auf welcher das Untersuchungsmaterial oberflächlich ausgestrichen wird. Schon nach 4—6 Stunden bilden die Diphtheriebacillen kleine graue Tröpfchen. Dieser „elektive“ Nährboden kann daher zum Herauszüchten der Diphtheriebacillen aus Gemengen besonders gut benutzt



Fig. 32. Diphtheriebacillen, junge Cultur. 800:1.



Fig. 33. Diphtheriebacillen, ältere Cultur. 600:1.



Fig. 34. Diphtheriebacillen, Neisser'sche Doppelfärbung. 600:1.

werden (s. im Anhang). — In Bouillon wachsen die Bacillen unter anfänglicher Trübung und unter starker Säurebildung; später lagert sich die Cultur als Anflug an Boden und Wand des Gefässes, die Bouillon klärt sich und nimmt alkalische Reaction an.

Die Resistenz der Bacillen gegen schädigende Einflüsse ist gering. Starkes Eintrocknen, so dass sie in Staubform durch die Luft transportabel werden, tödtet sie ab; in dickeren Schichten und gegen Licht geschützt können sie dagegen Monate lang lebendig bleiben. Hitze und chemische Desinficientien tödten sie sehr rasch ab.

Die Uebertragung der Culturen auf Versuchsthiere gelingt bei Kaninchen, Tauben etc., wenn die Trachea geöffnet und die Cultur auf die Schleimhaut eingerieben wird. Es entstehen dann ausgebreitete Membranen, aber oft auch schwere Allgemeinerscheinungen und bei chronischem Verlauf Lähmungen. Bei Meerschweinchen genügt die subcutane Einimpfung einer kleinen Culturmenge (1 ccm Bouillon-cultur), um die Thiere innerhalb 2 Tagen zu tödten; bei der Section finden sich Oedeme, pleuritische Ergüsse, Hyperämie der Nebennieren u. s. w. — In den inneren Organen finden sich, ebenso wie nach tödtlichem Verlauf beim Menschen, meist keine Bacillen, sondern die ganzen

Wirkungen sind auf Rechnung löslicher Gifte zu setzen, die von den lediglich an der Impfstelle gewucherten Bacillen producirt sind.

Für die Verbreitung der Diphtherie ist es von Bedeutung, dass in der Reconvalescenz oft noch mehrere Wochen, in einzelnen Fällen sogar Monate, Diphtheriebacillen im Mundschleim gefunden werden; häufig sind diese Bacillen im Thierversuch avirulent, manchmal bleibt aber die Virulenz erhalten. — Ferner lassen sich auch im Munde gesunder oder von kaum merklicher Angina befallener Menschen (namentlich Erwachsener) aus der Umgebung von Diphtheriekranken häufig Diphtheriebacillen nachweisen.

Pseudo-Diphtheriebacillen, d. h. Bacillen, welche in ihrer Form den Diphtheriebacillen ähnlich sind, werden vorzugsweise in der Nase beobachtet. Sie zeigen nicht so ausgesprochene Keilform, mehr parallele Lagerung und anderes Verhalten bei der Cultur auf Glycerinagar und in Bouillon. Genaueres über ihre Unterscheidung s. im Anhang.

Durch Einverleibung allmählich gesteigerter Dosen von Diphtheriegift kann Thieren ein sehr hoher Grad von Unempfindlichkeit gegen das Diphtheriegift verliehen werden. Das Serum solcher Thiere vermag bei an Diphtherie erkrankten Menschen Schutz gegen die Giftwirkung der Bacillen und damit Heilung der Krankheit herbeizuführen (BEHRING).

Bacillus Influenzae.

Von PFEIFFER zuerst beobachtet. Aus dem Secret des Nasenrachenraums, besser aus dem eitrigen Kern des zähen, hellgelblich-grünlichen Bronchialsecrets lassen sich bei Influenzkranken Präparate herstellen, in welchen nach Färbung mit dünner Carbofuchsinlösung Massen von feinen Bacillen zu erkennen sind. Die Bacillen haben etwa die Dicke der Mäusesepitakiembacillen, sind aber kürzer; sie färben sich zuweilen an den Polen stärker als in der Mitte. Oft findet man in Theilung begriffene Bacillen, die mit Diplokokken verwechselt werden können. In allen Culturen und bei beginnender Involution treten längere Scheinfäden auf. Die Bacillen haben keine Kapseln; keine Eigenbewegung; keine Sporen; sind nicht nach GRAM färbbar.

Fig. 35. Bacillen der Influenza. Reincultur. 1000:1 (nach PFEIFFER).

Eine Züchtung gelingt nur auf einem Nährsubstrat, das Hämoglobin enthält. Nähragar wird mit Blut oder Hämoglobulinlösung bestrichen; und dann wird in Reagensgläser mit diesem Nährsubstrat Bronchialsputum gebracht, das vorher mit Bouillon zur Emulsion verrieben war. Die Influenzabacillen bilden feine Tröpfchen von glasartiger Transparenz. Sie wachsen nur zwischen 27 und 42° und sind streng aërob.

In der Cultur halten sie sich nur 14—18 Tage lebensfähig. Austrocknen in dünnen Schichten tödtet sie rasch; im Auswurf halten sie sich länger lebendig, aber in völlig trockenem, verstäubbarem Sputum sind sie abgestorben.

Versuchsthiere sind für die Infektion unempfindlich; nur bei Affen gelingt es, durch Einbringen von Reincultur in die Nase oder Trachea infektiöse Prozesse zu erzielen. — Grössere Mengen der Cultur erzeugen bei Kaninchen schwere Intoxicationserscheinungen.

Bei Bronchopneumonie im Kindesalter sind Pseudo-Influenza-Bacillen beobachtet, welche den echten Influenzaerregern in allen Beziehungen ähnlich, aber wesentlich grösser sind und viel häufiger längere Scheinfäden bilden.

Bacillus pestis.

Bei Pestkranken zuerst von KITASATO und YERSIN nachgewiesen. Die Bacillen finden sich bei Bubonepest in der die Infektionsstelle darstellenden Pustel und im Inhalt des künstlich eröffneten Bubo; bei Pestsepsis im Blut; bei Pestpneumonie im Sputum. Es sind kurze, plumpe, unbewegliche, sporenfreie Stäbchen; meist nur an den Polen die Farbe behaltend, so dass in der Mitte eine ungefärbte Lücke bleibt (vgl. unten die B. der Hühnercholera). Nicht nach GRAM färbbar. — Leicht zu züchten, am besten bei 32°, aber auch bei 37° und bei 5° wachsend.

Die Colonieen auf Agar sind wenig charakteristisch; auf Gelatineplatten zeigen sich bei 60facher Vergrösserung warzenförmige Colonieen, die von einer



Fig. 36. Ausstrich von Pestbubo. 800:1.



Fig. 37. Involutionsformen der Pestbacillen auf Salzagar 800:1.




Fig. 38. Pestcolonieen auf erstarrter Gelatine, 100:1.



unregelmässig gezackten, hellen, fein granulirten Randzone umgeben sind. In den Culturen fehlt die Polfärbung; zuweilen entstehen Fäden, unter anderen Verhältnissen Ketten von ganz kurzen Gliedern. Auf Agar mit 1—2% CINa-zusatz bilden die Bacillen aufgequollene Degenerationsformen, die in ähnlicher Weise bei anderen Bakterien nicht beobachtet werden.

Die Resistenz der Bacillen ist gering. In flugfähigen Staub können sie nicht lebend übergehen; unter schützenden Schichten von Sputum, Schmutz u. dergl. können sie dagegen Wochen und Monate infektiös bleiben. Durch Hitze und Chemikalien werden sie leicht abgetödtet. — Die Infektion mit Culturen gelingt am leichtesten bei Ratten; dieselben sind schon durch Aufstriche auf die Conjunctiva und per os zu inficiren. Meerschweinchen reagiren am besten auf intraperitoneale Einverleibung. Auch Mäuse, Affen u. s. w. sind empfänglich.

Werden Menschen oder Versuchsthiere vorsichtig abgetödtete Culturen (1 stündiges Erhitzen auf 65°) subcutan injicirt, so bekommt

ihr Serum spezifisches Agglutinationsvermögen gegenüber Pestbacillen. Solches Serum kann zur Verificirung verdächtiger Culturen benutzt werden. Auch bei vielen Pestkranken zeigt das Blut spezifische Agglutination; aber meist erst spät (vom 9. Tage an) und unregelmässig (nur etwa in der Hälfte der Fälle), so dass die Probe zur Feststellung der Krankheit nicht so verwendet werden kann wie bei Typhusfällen die WIDAL'sche Reaction.

Bacillus des malignen Oedema.

Etwas schlanker als Milzbrandbacillen, bildet häufig Fäden, ferner Sporen unter Aufschwellung des Bacillus zum Clostridium; exquisite Anaëroben.



Fig. 39. Bacillen des malignen Oedema; links aus der Milz eines Meerschweinchens, rechts aus der Lunge einer Maus (nach KOCH). 700:1.

In unserer Umgebung sind sie sehr verbreitet und vermehren sich wahrscheinlich in Fäulnissubstraten während der anaëroben Phase der Fäulniss, im Darminhalt der Pflanzenfresser u. s. w. Regelmässig findet man sie in Erde, welche mit Faulflüssigkeit oder Dünger imprägnirt war, z. B. in Garten- oder Ackерerde. Bringt man Thieren, namentlich Meerschweinchen, etwas Gartenerde unter die Haut, so entsteht ausgebreitetes Oedem mit starkem, blutig-

serösem Exsudat. In diesem, ausserdem auf dem Peritoneum und der Pleura, selten im Inneren der Organe, finden sich die Bacillen. Von den gestorbenen Thieren aus lassen sich Culturen in Gelatine oder Agar anlegen, bei welchen jedoch für vollständige Entfernung des Sauerstoffs gesorgt werden muss. — Beim Menschen erzeugen die Bacillen eine Wundinfektionskrankheit, das rasch zum Tode führende gangränöse Emphysem der Haut.

Bacillus Tetani.

Die Erreger des Wundstarrkrampfes finden sich ähnlich wie die Oedembacillen hauptsächlich in Erde, aber auch im Staub und Kehrriecht aus unsauberen Wohnungen u. s. w.

Bringt man solche Erde oder Kehrriecht Versuchsthiere (namentlich Mäusen und Kaninchen) in eine Hautwunde, so entsteht nach 1–2 Tagen ausgesprochener Tetanus, der meist rasch zum Tode führt. Bei der Untersuchung menschlicher Tetanusfälle hat sich gezeigt, dass der Eiter der betreffenden Wunden bei Mäusen und Kaninchen genau die gleichen Symptome hervorruft, wie die Erdimpfung. Ausserdem ist nachweislich Tetanus beim Menschen sehr oft in Fällen zu beobachten, wo Erde in die Wunde eingedrungen war. Genauere bakteriologische Untersuchungen haben dargethan, dass die gleichen in der Erde und im Stubenkehrriecht verbreiteten Erreger sowohl den thierischen Impftetanus, als auch den Wundtetanus der Menschen bewirken (inclusive des Trismus neonatorum, bei welchem eine Verunreinigung der Nabelwunde die Schuld trägt). — Die Erreger sind feine gerade, bewegliche Bacillen mit grossen

endständigen Sporen. Sie sind Anaëroben, bilden auf Gelatine in einer H-Atmosphäre Colonieen mit dichtem Centrum und feinem Strahlenkranz; allmählich verflüssigen sie die Gelatine unter Gasentwicklung. Am besten wachsen sie bei 37°. — Die Reinculturen, auf Versuchsthiere übertragen, erzeugen keine Eiterung, nur locale Hyperämie; nach 24—36 Stunden Tetanus. Weder im Blut, noch in den Organen der erkrankten oder gestorbenen Thiere sind die Bacillen nachweisbar. — Das sterile Filtrat von Reinculturen wirkt durch seinen Gehalt an specifischem Giftstoff (Tetanotoxin) gleichfalls tetanisirend auf Versuchsthiere und zwar schon in Dosen von 0,1 Milligr. des Filtrats und weniger (vgl. S. 45).

Nur für gewisse Thierracen pathogene
Bacillen.

Bacillus des Rauschbrands, einer Krankheit, welche unter dem Rindvieh grosse Verheerungen anrichtet. Die Bacillen sind denen des malignen Oedems ähnlich, auch in Bezug auf Anaërobiose, haben aber weniger Neigung zu Fadenbildung, und die spindelförmig aufgetriebenen Bacillen haben die Sporen nahe dem Ende. Meer-schweinchen sehr empfänglich, Kaninchen wenig. Die Virulenz der Bacillen lässt sich in den Culturen graduell abschwächen (Schutzimpfung).

Bacillus des Schweinerothlaufs. Aeusserst feine, kurze Bacillen 0.6—0.8 μ lang und etwa 0.2 μ dick. Finden sich in grosser Menge im Blute und in den Capillaren aller Organe von an Rothlauf verendeten Schweinen.




Fig. 40. Tetanusbacillen, sporentragend, aus Agarcultur (nach KITASATO). 1000:1.




Fig. 41. Bacillen der Mäusesepsikämie (nach KOCH). 750:1. Links weisse Blutkörperchen mit Bacillen; rechts rothe Blutkörperchen mit zwischengelagerten Bacillen.



Fig. 42. Bacillen der Kaninchensepsikämie aus Sperlingsblut (nach KOCH). 700:1.

Oft liegen sie in Leukocyten des Blutes, welche unter dem Einfluss der Bacillen zu zerfallen scheinen. Sie wachsen leicht in Nährgelatine. Die Colonieen auf Platten erscheinen als rundliche, weisse Trübungen der Gelatine; auch im Stich entsteht nur eine zarte, wolkige Trübung. — Sehr ähnlich sind die Bacillen der sogenannten Mäusesepsikämie, die man nicht selten erhält, wenn man Mäuse mit beliebigen Faulfäuligkeiten impft.

Bacillus der Kaninchensepsikämie und der Hühnercholera. Kurze, nur an den Polen sich färbende Bacillen, ähnlich den Pestbacillen. Wachsen leicht auf den verschiedensten Nährsubstraten; tödten Mäuse, Kaninchen, Tauben u. s. w. nach Einimpfung der minimalsten Culturmengen. Auch bei der sogenannten Schweineseuche und bei der Wildseuche sind ähnliche Bakterien beobachtet, die vielleicht sämmtlich einer Art angehören, vielleicht aber verschiedene Racen darstellen.

Saprophytische Bacillen.

Manche sind nicht harmlos, sondern können, wenn sie in grösserer Menge subcutan oder intravenös in den Thierkörper gelangen, entweder durch Toxinwirkung (Bakterienprotein) schädigen oder zur Wucherung gelangen.

Zunächst seien einige chromogene Arten erwähnt:

Bacillus prodigiosus. Wächst in schön roth gefärbten Colonieen und wird vielfach zu Experimenten benutzt; früher als *Micrococcus* bezeichnet; doch kommen neben kugeligen Gliedern deutliche Langstäbchen und Fäden vor. *Bacillus pyocyaneus*, im grünblauen Eiter enthalten; mehrere Varietäten. Kleine bewegliche Bacillen, wachsen in Gelatine unter Produktion eines blaugrünen Farbstoffes und unter Verflüssigung. Bildet giftige Stoffwechselprodukte und vermag sich im Körper mancher Thiere (Kaninchen, Meerschweinchen) zu vermehren. *Bacillus* der blauen Milch. Längere Bacillen, liefern in der Gelatine, welche nicht verflüssigt wird, und in nicht gesäuerter Milch einen graubraunen Farbstoff, der bei saurerer Reaktion in einen tiefblauen übergeht.

Ferner verschiedene Gährungserreger: Milchsäure- und Buttersäureerreger s. S. 43 und unter „Milch“.

Unter den zahlreichen Fäulnisbacillen sei hervorgehoben: *Proteus vulgaris*. Bacillen, welche mit Verflüssigung der Gelatine wachsen und unter gewissen Bedingungen schwärmende Colonieen auf den Platten bilden. Kann unter besonderen Bedingungen, namentlich unter Beihülfe oder nach Vorbereitung durch andere Bakterien, im Lebenden wuchern, z. B. auf der Rachenschleimhaut. — Eine Abart, der *B. proteus fluorescens* ist für Tauben und Mäuse pathogen und beim Menschen der Erreger der sog. Weil'schen Krankheit. — *Bacillus phosphorescens*. Auf Fischen, Fleisch, in Salzwasser, aber auch in Nährgelatine wachsend. Die Culturen leuchten intensiv im Dunkeln. Mehrere Arten oder Varietäten. — Ohne bekannte Gährungserregung ist: *Bacillus subtilis*, der sogenannte Heu-Bacillus. Ebenfalls eine aus mehreren Arten und Varietäten bestehende Gruppe. Enorm verbreitet, in grosser Menge im Heustaub. Morphologisch dem Milzbrand-Bacillus einigermaassen ähnlich, aber durch seine Beweglichkeit, sein Wachsthum in Gelatine u. s. w. unterschieden. Die Sporen sind noch erheblich resistenter als die Milzbrandsporen; daher erhält man Bacillen aus dieser Gruppe häufig als Verunreinigung von Substraten, welche ungenügend sterilisirt sind. Viele Arten peptonisiren das Kasein der Milch und einige liefern Toxine, welche Versuchsthiere nicht nur nach intravenöser Injektion, sondern auch nach Verfütterung der Bacillen tödten. Die giftige Substanz ist in den Bakterienkörpern enthalten (s. unter „Milch“).

3. Spirillen.

Spirochaete Obermeieri, Recurrens-Spirillen.

Finden sich im Blut der an Febris recurrens Erkrankten, jedoch nur während der Fieberanfälle; niemals in den Exkreten. Lange, wellige Fäden mit 10—20 Schraubenwindungen, lebhaft beweglich. Leicht färbbar, nicht nach GRAM. Ausserhalb des Körpers behalten sie in

physiologischer Kochsalzlösung noch mehrere Stunden ihre Beweglichkeit, Vermehrung tritt aber weder hier noch in anderen künstlichen Culturen ein. Spirillenhaltiges Blut auf Affen oder Menschen übertragen ruft Febris recurrens hervor; von Spirillen freies Blut ist wirkungslos. — Die natürliche Verbreitung unter den Menschen erfolgt vermuthlich durch Vermittelung von Flöhen und Wanzen.

Spirillum Cholerae asiaticae.

Von Koch 1883 entdeckt. In akuten Fällen asiatischer Cholera können die Spirillen regelmässig aus den Entleerungen des Kranken oder aus dem Darminhalt der Leiche gezüchtet werden; weniger leicht, aber dennoch sicher gelingt der Nachweis in den späteren Entleerungen eines langsam verlaufenden Falles; nicht mehr auffindbar sind sie oft in dem auf den eigentlichen Choleraanfall folgenden Typhoid. Niemals werden in den Organen Choleraspirillen gefunden; ihre einzige Wohnstätte ist der Darm; und von da dringen sie höchstens in die obersten Schichten der Darmschleimhaut ein. — Durch directe mikroskopische Untersuchung gelingt der Nachweis weniger sicher als durch die Cultur auf Gelatineplatten. Auch ganz vereinzelte Choleraeolonien lassen sich nachweisen, wenn man Schleimflöckchen aus den Dejekten untersucht. — Ist die Zahl der Choleraeolonien gering, so stösst das Herausfinden derselben aus den Colonien der übrigen darmbewohnenden Bakterien auf Schwierigkeiten. In dem Fall bringt man zunächst einige Schleimflöckchen in Reagensgläser mit alkalischer 2% iger Peptonlösung und hält diese bei 37°. Nach 8 Stunden sind dann die Kommabacillen in grösserer Zahl an der Oberfläche angehäuft, und von da aus angelegte Gelatineplatten lassen zahlreiche Colonien erkennen. (Genaueres s. im Anhang.)




Fig. 43. Recurrenspirillen im Blut, 500:1.

Durch dieses Verfahren sind von guten Beobachtern die Choleraspirillen ausnahmslos in jedem typischen Cholerafall jeder seither aufgetretenen Epidemie nachgewiesen; auch bei zahlreichen leichten diarrhoeischen Erkrankungen, die während einer Choleraepidemie vorkommen. Vom Tage der Erkrankung ab sind sie meistens 8—10 Tage lang, in vereinzelt Fällen bis zu 23 Tagen in den Dejectionen nachweisbar. — Dagegen hat man niemals beim normalen Menschen oder während irgend einer anderen Krankheit, oder irgendwo in unserer Umgebung zu cholerafreier Zeit die gleichen Spirillen auffinden können; diese Constanz und Ausschliesslichkeit des Vorkommens lässt keine andere

Erklärung zu, als die, dass die Spirillen die Erreger dieser Krankheit darstellen.

Die Choleraspirillen erscheinen meist in der Form kurzer, schraubenförmig gekrümmter Stäbchen; an den jüngsten Individuen ist die Krümmung kaum sichtbar, später werden nicht selten lange Schrauben von 10—20 Windungen und mehr gebildet. Sie führen lebhaft, theils drehende, theils vorwärts schießende Bewegungen aus und zwar mit Hilfe eines am einen Ende haftenden Geisselfadens. In späteren Stadien kommt es leicht



Fig. 44. Choleraspirillen in Fleischbrühe meist Kommaformen, bei a lange Spirillen (nach Koch). 600:1.

zur Bildung von Involutionsformen; theils quellen die Stäbchen, theils zerfallen sie unter Bildung von Kügelchen.

Auf Gelatineplatten bilden sie nach 24 Stunden kleinste Colonieen, welche bei 60facher Vergrößerung als helle, fast farblose Scheiben mit gebuchtem welligen Contour und glänzend-höckeriger Oberfläche erscheinen. Am zweiten Tage beginnt Verflüssigung der Gelatine, die aber langsam fortschreitet und sich nicht weiter als 1—2 mm von der Colonie aus erstreckt. Sticheulturen in Gelatine zeigen Anfangs nur eine weissliche Trübung entlang dem Stichcanal, dann bildet sich eine dünne, mit Flüssigkeit gefüllte Röhre aus, welche sich nach oben etwas erweitert, aber in den ersten Tagen nie bis zum Glasrande vorschreitet; erst nach 8—14 Tagen erstreckt sich die Verflüssigung über den ganzen oberen Theil der Gelatine.



Fig. 45. Cholera-colonieen, 60:1.

Auch auf anderen Nährsubstraten wachsen die Choleraspirillen leicht, auf Kartoffeln nur bei höherer Temperatur von 30—35° in Form einer graubraunen Auflagerung. In Milch vermehren sie sich lebhaft ohne sichtbare Veränderung, namentlich ohne Coagulation der Milch.

Setzt man zu einer 12 Stunden alten Cultur in peptonhaltiger Bouillon einige Tropfen Schwefelsäure, so entsteht innerhalb der nächsten 30 Minuten eine schöne, rosa violette Färbung (Cholera-ros). Die Reaktion kommt dadurch zu Stande, dass die Choleraspirillen Indol und salpetrige Säure als Stoffwechselprodukte liefern, während andere Bakterien gewöhnlich nur entweder Indol oder salpetrige Säure bilden; sie ist jedoch nicht völlig charakteristisch für die Cholera-culturen, da einige Bakterien und auch einzelne Vibrionen dieselbe Farbenreaktion zeigen.

Die Choleraspirillen halten sich bzw. wachsen noch in Wasser mit geringen Mengen organischer Stoffe. — 0.1 Procent freier Säure und 0.2 Procent Aetzkali genügen zu ihrer Abtödtung. Die untere Temperaturgrenze, von welcher ab sie bei künstlicher Cultur gedeihen, liegt bei 16°, reichliche Vermehrung erfolgt erst zwischen 22 und 25°; das Temperatur-Optimum liegt bei 35°. Hitze von 60° tödtet sie bei 10 Minuten langer Einwirkung; dasselbe wird erreicht durch kurz dauerndes Aufkochen einer Flüssigkeit. Durch 2 Procent Carbonsäure oder 1:2000 Sublimatlösung werden sie binnen wenigen Minuten getödtet.

Sehr empfindlich sind die Choleraspirillen auch gegen das Austrocknen; in dünner Schicht völlig getrocknet, sind sie bereits nach 2—24 Stunden nicht mehr lebensfähig. Durch trockene Gegenstände oder auch durch Luftströmungen können daher die Choleraspirillen nicht verbreitet werden. In dicken Schichten, z. B. in Agarculturen können dagegen noch nach Monaten lebensfähige Individuen gefunden werden. — An der menschlichen Hand sind die Cholera bacillen binnen 2 Stunden, auf Papier binnen 24 Stunden, auf trockenen Waaren und Nahrungsmitteln binnen 24 Stunden, auf feucht aufbewahrten Nahrungsmitteln binnen 8 Tagen abgestorben. In Wasser können sie unter Umständen über 8 Tage, in feuchter Wäsche über 14 Tage lebendig bleiben.

Bei Thieren lässt sich eine der menschlichen Cholera ähnliche Erkrankung bei ganz jungen Kaninchen, Katzen und Hunden reproduciren. Eine Art Infektion gelingt bei Meerschweinchen dadurch, dass man ihnen zunächst Opiumtinktur in die Bauchhöhle, dann erst Sodaaflösung (zur Neutralisirung des Magensaftes) und darauf Cholera culture in den Magen injicirt. — Ferner entsteht durch Injectionen von Cultur in die Bauchhöhle von Meerschweinchen heftige Toxinwirkung, die sogenannte Meerschweinchencholera, gekennzeichnet durch rapiden Temperaturabfall, allgemeine Muskelschwäche, partielle Muskelkrämpfe, Lähmung der Centren der Circulation und der Temperaturregulirung, so dass in wenigen Stunden Collaps und Tod eintritt. Von einer vollvirulenten Cultur auf Agar bei 37°, die nicht älter als 18 Stunden ist, genügt $\frac{1}{12}$ Platinöse (1 Oese = 2 mg Culturmasse, enthaltend 200 Millionen lebende Individuen) zur tödtlichen Wirkung. — Zahlreiche andere Bakterien erzeugen durch ihre Proteine ähnliche Krankheitserscheinungen; jedoch ist durch die PREIFFER'schen Immunisirungsversuche der specifische Charakter der Wirkung der Cholera bakterien erwiesen. Werden nämlich Versuchsthiere (Meerschweinchen, Ziegen) mit steigenden Dosen Cholera culture vorbehandelt, so erlangen sie eine specifische Immunität gegen Cholera, nicht aber gegen andere Bakterien bezw. ähnliche Vibrionen; und umgekehrt schützt Vorbehandlung mit anderen Bakterien die Thiere nur unvollkommen und vorübergehend gegen Cholera infection. — Dem Blutserum solcher gegen Cholera immunisirter Versuchsthiere kommt agglutinirende Wirkung specifisch für Cholera bakterien zu; ferner zeigt solches Blutserum die Fähigkeit, Cholera bakterien rasch aufzulösen, wenn es mit der Cultur in die Bauchhöhle von Meerschweinchen gebracht wird.

Die gleiche Wirkung hat auch das Serum von cholera reconvalescenten Menschen; ein weiterer Beweis für die ätiologische Bedeutung der Cholera bacillen (vgl. Kap. X und im Anhang).

Uebertragungen von Choleraeultur auf Menschen haben theils aus Unachtsamkeit, theils absichtlich mehrfach stattgefunden (Selbstinfektionsversuche von v. PETTENKOFER und EMMERICH, METSCHNIKOFF, STRICKER u. A.). Der Erfolg war das Auftreten leichter, schwerer und z. Th. sehr schwerer Choleraerkrankungen. Ein Fall von zufällig im Laboratorium acquirirter Cholera verlief tödtlich.

Dem Cholera vibrio ähnliche Spirillenarten.

Am längsten bekannt sind die von FINKLER und PRIOR bei Cholera nostras gefundenen Spirillen. Dieselben verflüssigen die Gelatine energischer, wachsen anders auf Kartoffeln und zeigen kleine morphologische Differenzen gegenüber den Choleraspirillen. Sie finden sich fast nie im Darm normaler und kranker Menschen, werden auch bei Cholera nostras neuerdings stets vermisst und sind also für die Aetiologie dieser Krankheit sowohl, wie für die Cholera asiatica bedeutungslos. — Ferner *Spirillum tyroenum*, in Käse gefunden, den Choleraspirillen ähnlich, aber durch das Wachsthum auf Kartoffeln, in Milch und durch das Thierexperiment leicht zu unterscheiden. — *Vibrio Metschnikoff*, in den Colonieen den FINKLER'schen Spirillen, zuweilen aber, namentlich in den Stichculturen, den Cholera vibriionen ähnlich; von letzteren hauptsächlich unterschieden durch die Virulenz des *Vibrio M.* gegen Tauben, die gegenüber der Cholera wenig empfänglich sind, nach Impfung mit *Vibrio M.* aber an schwerer Septikämie mit Massen von Bakterien im Blut und in den Organen erkranken. *V. M.* ist vermuthlich identisch mit einem im Nordhafen in Berlin gefundenen und als *V. Nordhafen* bezeichneten Bakterium. — Als wesentlichste Fundstätte der verschiedensten Spirillenarten ist die Düngerjauche (und der Schweinekoth) bekannt geworden. Von da gelangen dieselben in das Wasser von Bächen und Flüssen, und in diesem findet man namentlich im Spätsommer und Herbst eine reiche Ausbeute an choleraähnlichen Vibriionen. Mehr als 30 Arten und Varietäten, von denen manche ausser durch ihre Herkunft sich nur durch die Phosphorescenz der Culturen und durch geringe Abweichungen im Aussehen der Colonieen auf Gelatine von Cholera vibriionen unterscheiden, sind in den letzten Jahren beschrieben.

IV. *Streptothricheae.*

Eine Gruppe von Mikroorganismen, die zwischen den Fadenpilzen und den Spaltpilzen steht. In den Culturen können manche Arten Mycelien und Fruchthyphen mit Sporenketten bilden, so dass sie mit Schimmelpilzen die grösste Aehnlichkeit haben. Mikroskopisch sind aber die Fäden oft von Bacillenfäden nicht zu unterscheiden, nur dass sie echte Verästelung zeigen; und die Fäden zerfallen häufig in bacillen- und kokkerartige Glieder, die auf frischem Nährsubstrat zunächst nur durch Theilung sich vermehren. — Vielfach entstehen ausserdem durch Vergallertung der Membran der Fäden keulenförmige Anschwellungen, die als Degenerationsprodukte aufzufassen sind.

Zahlreiche Arten; die meisten sind saprophytisch weit verbreitet,

icht selten kommen aber auch pathogene Wirkungen (nekrotisirende und granulirende Processe) durch Streptothricheae zu Stande. Die Diphtheriebacillen, Rotzbacillen, Tuberkelbacillen, sowie die den letzteren nahestehenden säurefesten Bakterien müssen wegen der in ihren Culturen beobachteten echten Verästelungen und Keulenbildungen eigentlich den Streptothricheae oder gar den Fadenpilzen eingereiht werden. Da sie aber in dem uns interessirenden menschlichen Material nur in Bacillenform vorkommen, werden sie aus praktischen Gründen weckmässiger bei den Bacillen besprochen.

Als Hauptvertreter der Streptothricheae ist anzusehen:

Der Actinomyces oder Strahlenpilz.

Bewirkt beim Menschen die verschiedenartigsten Abscesse und Eiterungen und wird besonders häufig beim Rindvieh als Ursache von Abscessen in Zunge und Kiefer beobachtet. Im Eiter derartiger Abscesse findet man gelbe Körnchen, die auf leichten Druck in einzelne Pilzrasen zerfallen. Letztere bestehen aus hyphenähnlichen ablig verzweigten Fäden, die von einem Centrum radiär ausstrahlen und nach der Peripherie zu in keulenartige Anschwellungen auslaufen. — Zuweilen findet man solche Actinomyces-Drüsen in den Krypten der Tonsillen, ohne dass Krankheitserscheinungen sich daran knüpfen.

Die Erfahrungen über das Vorkommen der Actinomyces-Erkrankungen lassen daraufschiessen, dass der Pilz an vegetabilischen Nahrungsmitteln zu haften vermag und zuweilen mit diesen (Getreidegrannen) in den Körper eindringt. Als Eintrittsweg beim Menschen betrachtet man vorzugsweise Verletzungen der Mundschleimhaut und cariöse Zähne; ferner die Lunge, wesentlich nach Aspiration von Keimen aus der Mundhöhle; in selteneren Fällen den Darm oder Verletzungen der Haut.

Culturen gelingen auf den verschiedensten Substraten, auf Agar, Blutserum, Kartoffeln (Boström). Impfversuche an Thieren hatten noch kein unzweifelhaftes Ergebniss.




Fig. 46. Actinomyces. 700:1.

Bemerkenswert ist, dass Culturen von Tuberkelbacillen, von den diesen verwandten säurefesten Bakterien und von Rotzbacillen nach gewisser Einverleibung in Thiere, z. B. Injektion in die Niere, Bildungen liefern, die dem Strahlenpilz gleichen. Vielleicht liegt auch den natürlich vorkommenden Actinomyceserkrankungen nicht immer derselbe Erreger zu Grunde.

Streptothrix Israeli. Aus 2 Fällen von Actinomykose beim Menschen isolirt. Wachsen nur anaërob auf Agar, in Eiern u. s. w. Zeigen in den Culturen vorzugsweise Stäbchen, die den Diphtheriebacillen ähnlich sind. Durch intraperitoneale Uebertragung der Culturen konnten bei Kaninchen und Meerschweinchen Tumoren mit Actinomycesdrusen hervorgerufen werden. — Ferner sind zu erwähnen: *Streptothrix Madurae*, Erreger des sog. „*Madurafusses*“. — *Streptothrix alba*, häufig in Luft und Wasser, wächst auf Gelatine aerob unter Verflüssigung und mit reichlicher Bildung von Luftfäden.

Angereicht sei hier eine Gruppe von Mikroorganismen, deren einfachste Elemente die verschiedenen Wuchsformen der Spaltpilze aufweisen, die aber dadurch, dass diese Elemente zu Verbänden von relativ bedeutender Größe vereinigt sind, theils gewissen Algen, theils Fadenpilzen nahestehen.

Dahin gehört:

1) Die Gattung *Cladothrix*; Fäden, deren einzelne Elemente durch die Möglichkeit der Eigenbewegung und das Vorkommen einer echten endogenen




Fig. 47 a u. b. *Cladothrix dichotoma*, a 100:1, b 500:1.

Sporenbildung sich als Bacillen ausweisen. Charakterisirt durch falsche Astbildung; zwei in ihrem Verband gelockerte Bacillen wachsen jeder für sich weiter und die beiden Fäden bleiben dann an der Ursprungsstelle eine Strecke mit einander in Berührung. — Häufig in verunreinigten Wässern. Auch

in reineren Brunnenwässern kommt oft eine *Cladothrix*art vor, welche die Gelatine in der Umgebung der Colonie braun färbt.

2) Gattung *Crenothrix*. Fäden, welche an festem Substrat haften; der Inhalt der Fäden theilt sich innerhalb der umgebenden Scheide in kurze Querstücke und diese zerfallen in kleinere runde Segmente; aus solchen kugeligen Elementen können neue Fäden hervowachsen. — Häufig in Brunnen und in Wasserleitungsröhren, besonders wenn das Wasser eisenhaltig ist.

3) Gattung *Beggiatoa*. Der vorigen morphologisch ähnlich. In den

llen finden sich Einlagerungen von Schwefel in Form stark lichtbrechender Körper. — Vielfach in Fabrikabwässern.

Die beiden vorgenannten Gattungen gehören dadurch, dass sie ein ausgesprochenes Spitzenwachstum zeigen, sowie durch ihre Vermehrungsverhältnisse zu den Sulfatgalgen.

Literatur: C. FLÜGGE, Die Mikroorganismen, 3. Aufl., 1896. — HEMANN & NEUMANN, Atlas und Grundriss der Bakteriologie, 2. Aufl. 99. — C. FRÄNKEL Grundriss der Bakterienkunde, 3. Aufl., 1890. — HUTHNER, Einführung in das Studium der Bakteriologie, 4. Aufl. — HENNING, Lehrbuch der bakteriologischen Untersuchung und Diagnostik, 1894. — HUEPPE, Die Methoden der Bakterien-Forschung, 1. Aufl. — FRÄNKEL und PFEIFFER, Mikrophotographischer Atlas der Bakterienkunde, 1889—92. — LOEFFLER, Vorlesungen über die geschichtliche Entwicklung der Lehre von den Bakterien. — BAUMGARTEN, Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, von 1885 an.




Fig. 48. Kleine Rasen von *Crenothrix polyspora* nach F. Cohn. 350:1.



Fig. 49. *Beggiatoa alba* nach Winogradsky. 600:1. 1. Mit Schwefelkörnern, 2. Faden, der seinen Schwefelgehalt verbraucht hat, mit deutlichen Scheidewänden.

V. Protozoën.

Mit diesem Namen bezeichnet man die niedersten (einzelligen) tierischen Lebewesen. Eine scharfe Abgrenzung derselben gegenüber den einfachsten Pflanzen ist unmöglich, und so kommt es, dass einzelne Formengruppen bald diesem, bald jenem Reiche zugerechnet werden. Dies gilt besonders von den Myxomyceten oder Mycetozoen, den Schleimpilzen oder Pilzthieren, sowie von den Chytridiaceen. Namentlich die letzteren haben für uns ein gewisses Interesse, da sie eine parasitische Lebensweise, und zwar meist in höheren oder niederen Pflanzen führen. Nur im Jugendstadium bewegen sie sich frei als mit einer Geißel versehene protoplasmatische Körper, dringen dann nach Verlust ihrer Geißel unter amöboiden Formveränderungen in ihre Wirtszellen ein und gelangen innerhalb derselben zum Wachstum und schließlich durch successiv wiederholte Zweitheilung (Sporenbildung) zur Vermehrung.

Als eigentliche Protozoën kann man mit BÜTSCHLI vier Klassen einzelliger Organismen bezeichnen: die Sarcodinen, Mastigophoren, Infusorien und Sporozoen.

In allen vier Klassen der Protozoën giebt es parasitische Vertreter, die Sporozoen interessieren uns aber hauptsächlich, weil sie durch-

aus auf das Leben als Schmarotzer angewiesen sind. Künstliche Züchtung ist bei allen diesen Formen, im Gegensatz zu dem, was wir bei den pflanzlichen Parasiten gesehen haben, noch nicht gelungen.

1. Sarcodina (Rhizopoden).

Meist einfache Protoplasmaklumpchen ohne Differenzirung. Amöboide Fortbewegung durch Aussenden und Einziehen von Pseudopodien. Vermehrung durch Zweitheilung; oder Sprossung; oder Sporulation. Letztere geschieht durch successiv erfolgende wiederholte Zweitheilung, so dass der Inhalt der Zelle schliesslich in eine grössere Anzahl von Tochterzellen zerfällt, die frei werden und im Jugendzustand entweder eine Geissel tragen oder sich nur amöboid bewegen. — Können in Pflanzen und Thieren schmarotzen; in letzterem Fall bewohnen sie meistens die Körperflüssigkeiten oder wandern zwischen die Gewebeelemente, seltener in dieselben ein. Dahin gehören:

Amoeba coli. Häufig in normalem menschlichem Stuhl. In Strohhinfus züchtbar.

Amoeba dysenteriae. Bei der ägyptischen Dysenterie in den Dejekten und in Schnitten durch die Darmschleimhaut; ferner im Eiter der die Krankheit nicht selten begleitenden Leberabscesse. Die Amöben sind 1 bis 5mal so gross wie Leukocyten, enthalten Vacuolen und oft Fremdkörper. Züchtung ist nicht gelungen; dagegen die Uebertragung der Krankheit auf Katzen durch Injektion von amöbenhaltigem Stuhl oder Abscesseiter in's Rectum.

Leydenia gemmipara Schaudinn. In der Ascitesflüssigkeit bei Carcinomkranken beobachtet. Grosse mit fettartigen Tropfen und Pigment gefüllte Zellen mit strahlenförmigen Ausläufern. Vermehrung durch Theilung oder Abschnürung von Knospen, die grosse Conglomerate bilden können.

Cytoryctes vaccinae et variolae. Inhalt von menschlichen Pockenpusteln oder von Kuhpocken bzw. menschlichen Impfpusteln erzeugt bei vorsichtiger Einbringung unter die oberen Schichten der Hornhaut bei Kaninchen (und anderen Thieren) in den Hornhautzellen kleine, die Kernfärbungen annehmende rundliche Einlagerungen, die sog. Vaccinekörperchen (GUARNIERI). Durch abgeschabte Theilchen der Hornhaut lässt sich derselbe Process immer wieder bei neuen Kaninchen hervorrufen. Nach vielfachen (46) Uebertragungen war die Ein-




Fig. 50.
Cytoryctes vaccinae. Vaccinekörperchen in Hornhautepithelzellen 300:1 (nach v. WASILEWSKI).

impfung von Abschabseln der Hornhaut auf Kälber und auf Kinder erfolgreich, so dass diese gegen spätere Impfungen mit animaler oder humanisirter Lymphe immun waren (v. WASILEWSKI). Andere Substanzen oder unwirksam gewordene Lymphe ruft die Vaccinekörperchen nicht hervor. Muthmasslich sind letztere organisirte Gebilde, an denen

Einige auch amöboide Bewegungen gesehen haben wollen, und deren Zahl mit dem Alter des Impfstichs deutlich zuzunehmen scheint. Manche sehen daher in dem „Cytoryctes“ den Erreger der Variola und Vaccine. Andere halten den eigentlichen Erreger für noch unbekannt und unsichtbar, und erklären das regelmässige Entstehen der Vaccinekörperchen nur aus einer specifischen Beeinflussung der Hornhautzellen durch das Virus der Pocken bzw. Kuhpocken.

2. Mastigophora (Flagellaten).

Während der Hauptperiode des Lebens durch Geisseln beweglich; daneben Bewegung durch Pseudopodien. Vermehrung durch Zweitheilung, zuweilen auch Sporulation.

Im Magendarmcanal bei Menschen und Thieren, im Vaginalsekret u. s. w.: *Cercomonas*, mit einer Geissel; *Trichomonas* (intestinalis und vaginalis, erstere Art erheblich kleiner) mit drei Geisseln und einer undulirenden Membran; *Megastoma* mit napfförmig ausgehöhltem Körper und sechs Geisseln.

Im Blutplasma von Ratten und Hamstern: *Herpetomonas Lewisii*, zugespitzter, 20 bis 30 μ langer Körper mit Geissel von der Länge des Körpers. Vermehrung durch Längstheilung. Bewirkt keine ausgesprochenen Krankheitserscheinungen.

Trypanosoma sanguinis, bis 80 μ lang, mit Geissel und undulirender Membran, im Blut von Fröschen, Schildkröten, Fischen, im Darm der Auster u. s. w.

Trypanosoma Evansi, 15 bis 20 μ lang, mit dickem Kopf, zarter undulirender Membran und Geissel. Ruft eine bei Pferden, Kameelen, Rindern durch Fieber und Anämie zum Tode führende Krankheit hervor, die in Indien und Birma als Surra, in Afrika als Nagana oder Tsetsefliegen-Krankheit bekannt ist. Die natürliche Verbreitung scheint nur durch die Tsetsefliege zu erfolgen.

3. Infusoria.

Ausgebildete, mit Wimpern besetzte Cuticula, Ekto- und Entosark. Vermehrung durch Zweitheilung oder Sporulation. Leben im Wasser, einige schmarotzen im Darm von Thieren. Beim Menschen (vorzugsweise in diarrhoeischen Stühlen) häufiger beim Schwein, findet sich im Darm *Balantidium* (*Paramaecium*) *coli*, etwa 70 μ lang, mit grossem bohnenförmigen Kern und zwei Vacuolen.

4. Sporozoa.

Vermehrung nur durch Sporulation; Sporen meist sichel- oder nierenförmig. Leben ausschliesslich parasitisch. Von den sechs Ordnungen der Sporozoën seien nur kurz erwähnt die:

Sarcosporidia. MIESCHER'sche Schläuche, Psorospermien der Säugethiere. In den quergestreiften Muskeln zwischen und innerhalb der Primitivbündel als lange Schläuche mit Massen von Sporoblasten (Muttersporen) bzw. sichel- bis nierenförmigen, stark lichtbrechenden Sporen. Häufig bei Pferden, Rindern, Schafen, Mäusen, selten beim Menschen. Als Eingangspforte des Parasiten, der wenig Störungen hervorruft, wird der Verdauungstractus angesehen. Künstliche Infektionen sind misslungen.

Myxosporidia. Leben als Amöben in Körperflüssigkeiten und im Gewebe (Epithel der Kiemen, Gallen- und Harnblase) ihrer Wirthes; als letztere fungiren vor allem Fische, unter denen die Parasiten Epizootien hervorrufen können. An einzelnen Punkten des Leibes erfolgt Bildung eigenthümlicher Sporen: dieselben enthalten 1—8 ovale, glänzende sog. Polkapseln, die auf Zusatz von Reagentien (Alkali) einen spiralig aufgerollten langen Faden hervorschiessen lassen.

Microsporidia. Psorospermien der Arthropoden. Im Inneren der Gewebe. Bilden kleine glänzende Sporen. Dahin gehören die Erreger der Pebrine der Seidenraupen. Die Sporen des Parasiten, die sog. *CORNALIA*-schen Körperchen, 4 μ lang, 2 μ breit, finden sich in allen Organen der erkrankten Thiere und gehen in die Eier der aus inficirten Raupen entwickelten Schmetterlinge über. Durch die von PASTEUR eingeführte „Zellengrainage“, mikroskopische Untersuchung der Eier auf Sporen und Ausschluss der inficirten Eier von der Zucht, kann die Weiterverbreitung der Pebrine gehemmt werden.

Coccidida. Bei Mollusken und Vertebraten in fixen Zellen des Wirths, besonders in den Epithelien. Entweder erfolgt in der befallenen Zelle directe Sporulation; die gebildeten sichelförmigen Keime können andere Zellen desselben Wirths befallen und so die Krankheit in diesem ausbreiten; oder es bilden sich nach Encystirung erst hartschalige Muttersporen, und nachdem diese eine Zeit lang ausserhalb des Wirths sich aufgehalten haben, kommt es zum Austritt der freien Sporen, und durch diese zur Infektion eines anderen Wirths, so dass diese indirecte Sporulation die Ausbreitung des Processes auf neue Individuen veranlasst. — Dahin gehört: *Coccidium oviforme*. Bewirkt kleine, mit blossem Auge sichtbare, gelbliche Knoten in der Leber von Kaninchen, seltener im Darm. In den Epithelzellen der Gallengänge zahlreiche Parasiten, theils direct sichelförmige Sporen liefernd. — *Adelea ovata* (mit Dauersporen) und *Eimeria Schneideri* (directe Bildung von Sichelkeimen) im Darm des Tausendfuss. — *Clossia octopiana* in Organen des Tintenfisches. *Clossia soror* in der Niere von Schnecken.

Gregarinida. Parasiten von wurmähnlichem Aussehen, meist Darm-schmarotzer bei Insecten und Würmern; einzelne auch in anderen Organen, z. B. im Hoden der Regenwürmer. Cuticula, Ekto- und Entoplasma; eigenthümliche Fortbewegung (Gleitbewegung durch Absonderung einer gallertartigen Substanz am hinteren Körperende, die den Körper stielartig vorschiebt). Vermehrung häufig eingeleitet durch Copulation zweier „Gameten“ zu einer „Syzygie“; dann Encystirung. Bildung von Muttersporen (der Kahnform wegen „Pseudonavicellen“ genannt) und sichelförmigen Tochtersporen (Sporozoiten). Letztere werden erst im Darmsaft eines anderen Wirths frei.

Die wichtigsten menschlichen Parasiten finden sich in der Ordnung

Haemogregarinida (Haemosporidia).

Bei Fröschen, Reptilien, Vögeln und Menschen. Parasitiren in den rothen Blutkörperchen. Bilden in diesen zunächst sehr kleine Einschlüsse, die allmählich wachsen, amöboide Bewegungen zeigen, dabei oft Melanin in sich ablagern. Vermehrung a) durch directe Sporulation im ursprünglichen Wirth (endogene Entwicklung). b) durch Gameten- und Syzygienbildung, dann Produktion von Sporoblasten und Sporozoiten unter Zuhülfenahme eines Zwischenwirths (exogene Entwicklung).

— Bei den meisten Arten ist die endogene oder die exogene Entwicklung nur lückenhaft bekannt.

Von Hämogregarinen bei Kaltblütern seien genannt:

Haemogregarina ranarum (Drepanidium). Häufig in den Blutkörperchen namentlich von *Rana esculenta*. Die jüngsten, $4\ \mu$ langen wurmartigen Parasiten runden sich später allmählich ab und liefern dann directe Sporulation; Zahl und Grösse der rosettenähnlich angeordneten Sporen schwankt erheblich. Daneben finden sich kleinere und grössere langgestreckte Würmchen, theils in den rothen Blutkörperchen, theils frei, deren endogene Sporulation nicht beobachtet ist und die vermuthlich exogen unter Syzygienbildung sich vermehren.

Hämogregarinen bei Eidechsen und Schildkröten. Würmchen von der Länge eines rothen Blutkörperchens oder grösser. Direkte Sporulation in intraglobulär gelagerten Cysten.

Die Hämogregarinen der Warmblüter werden auch als „Malaria-parasiten“ im weiteren Sinne bezeichnet.




Fig. 51. Froschblutkörperchen mit Drepanidium, 500:1. a. runde Form. b. Sporulation. c. längliche Form.

Fig. 52. Blut mit *Pyrosoma bigeminum*, 600:1.

Zu ihnen rechnen manche Autoren den Parasiten des Texasfiebers, *Pyrosoma bigeminum*. Die Krankheit verläuft bei Rindern mit hohem Fieber, Anämie und Blutharnen. In den rothen Blutkörperchen findet man sehr kleine, meist zu zweien gelagerte birnförmige Körperchen, $3\ \mu$ lang, die mit den spitzen Enden convergiren. Eine weitere Entwicklung im Blute ist nicht beobachtet. Die Uebertragung erfolgt durch eine blutsaugende Zecke (*Ixodes bovis*); die vollgesogene Zecke fällt von den Rindern ab, deponirt im Boden ihre Eier, die nach 2 bis 6 Wochen auskommenden jungen Zecken kriechen auf neue Rinder und inficiren diese. — Da Sporulation und geschlechtliche Vermehrung für den Parasiten nicht bekannt ist, ist seine Zugehörigkeit zu den Malariaparasiten zweifelhaft.

Zu diesen gehören:

a) *Halteridium Danilewskyi*.

Findet sich in unserem Klima während des Sommers in zahlreichen Thurmfalken und Buchfinken; in der tropischen und subtropischen Zone auch in Tauben, Sperlingen u. s. w. Selbst bei reichlichem Parasitengehalt zeigen die Vögel wenig Krankheitserscheinungen. Künstliche Uebertragung auf gesunde Vögel misslungen. — In den rothen Blutkörperchen trifft man zahlreiche Parasiten verschiedener Grösse; die älteren bilden lange Würmchen, die sich um den Kern herumlagern, oft in Hantelform, ohne dass der Kern verschoben wird. — Endogene Sporulation konnte nicht beobachtet werden; dagegen die Anfänge der

geschlechtlichen Entwicklung: Untersucht man das Blut nach Mischung mit 1 Theil Serum von Taubenblut und 9 Theilen 0,6 proc. Kochsalzlösung im hängenden Tropfen, so tritt der Parasit aus den Blutkörperchen heraus, die Hantelform geht in Kugelform über; man kann dann mit der ROMANOWSKY'schen Färbung (s. unten) zwei Kategorien von runden Körpern unterscheiden, solche mit blassblauem Plasma und compakter Chromatinmasse, an deren Rand bald 4—8 fadenförmige Gebilde auftreten, die sich losreißen und frei in der Blutflüssigkeit bewegen; und




Fig. 53. Entwicklung von Halteridium. 1000:1 (nach Koch).

A = Taubenblutkörperchen mit jungen (1) und älteren (2) Parasiten. B = Frei gewordene Parasiten, 1 = Männchen, 2 = Weibchen. C = Aussendung der Spermatozoen; 1 = zwei aus dem Chromatin-körper hervorgehende Sp.; 2 = Parasit mit vollständig entwickelten Sp.; 3 = abgetrenntes Sp. E = Würmchenbildung; 1 = weiblicher Parasit mit beginnender Würmchenbildung; 2 = fertiges Würmchen.

zweitens solche mit kräftig blauem Plasma und aufgelockertem Chromatin. Erstere sind als männliche, letztere als weibliche Gameten anzusehen. Treffen die spermatozoenähnlichen Gebilde auf einen weiblichen Gameten, so entsteht an diesem binnen etwa 20 Minuten eine Vorwölbung, dann ein spitzer Zapfen, aus dem schliesslich ein freies, wenig bewegliches Würmchen hervorgeht. Dieses muss vermuthlich in einem noch unbekannten Zwischenwirth seine weitere Entwicklung durchmachen.

b) Proteosoma Grassii.

Kommt hauptsächlich in südlichen Ländern in Stieglitzen, Sperlingen u. s. w. vor. Verursacht schwere Erkrankung, die sich durch Bluteinimpfung




Fig. 54. Entwicklung von Proteosoma. 1000:1 (nach Koch).

A = Sperlingblutkörperchen mit Parasiten. B = Sporulation. C und D = Frei gewordene Parasiten, nehmen sphärische Form an, der männliche mit Spermatozoen. E = Würmchenbildung. F = Cysten in der Magenwand von Culex, secundäre Kugeln mit Sichelkeimen enthaltend. G = Freie Sichelkeime.

und durch gewisse Mücken experimentell auf gesunde Vögel übertragen lässt. Meist findet sich reichlich Halteridium neben Proteosoma im

Blut der Vögel. Letzterer Parasit zeigt nur runde oder ovale Formen; ferner verdrängt er den Kern des befallenen Blutkörperchens, indem er ihn nach einem Pole zu verschiebt und dabei um seine kurze Achse dreht. Bei den herangewachsenen Parasiten tritt Sporulation ein, indem 16 kleine Sporenelemente das im Centrum zusammengezogene Pigment rosettenartig umlagern. Neben dieser endogenen Vermehrung beobachtet man die Anfänge der geschlechtlichen Entwicklung wie bei *Halteridium* in Serummischungen, nur dass es nicht bis zur Würmchenbildung kommt. Diese finden sich vielmehr erst im Mageninhalt von *Culex nemorosus*, 12—15 Stunden nachdem die Mücke Blut der erkrankten Vögel eingesogen hat. Nach 48 Stunden sind die Würmchen verschwunden, es bilden sich aber an der Aussenseite des Magens von *Culex* kugelförmige, durchsichtige Gebilde (Coccidien), deren Inhalt sich in Sporoblasten und am 6.—7. Tage in zahlreiche Sichelkeime verwandelt. Letztere überschwemmen den ganzen Körper, sind aber vom 9. bis 10. Tage an nur noch in den Speicheldrüsen. Von diesen aus gelangen die Keime beim Stechen gesunder Vögel in deren Blut und vermehren sich dort zunächst wieder durch Sporulation.

c) *Malariaparasiten der Affen.*

Runde kleine Parasiten, zeigen bei *ROMANOWSKY*-Färbung um das runde oder stäbchenförmige Chromatinkorn eine ungefärbte Zone. — Endogene Sporulation nicht beobachtet. Nach Serummischung Bildung von Körpern mit fadenförmigen Fortsätzen; Befruchtung und Würmchenbildung noch nicht klar.

d) *Malaria hominis.*

In frischen ungefärbten Blutpräparaten sind die Parasiten durch ihre Pseudopodienbildung leicht kenntlich. — Färbung dünner Ausstrichpräparate nach KOCH: 15 Theile Borax, 6 Methylenblau, 300 Wasser: darin wenige Sekunden färben und in Wasser spülen, bis ein grünlicher Farbenton sich zeigt. — Oder Doppelfärbung: Vorfärbung mit alkoholischer Eosinlösung, dann alkoholisches Methylenblau. — Oder nach *ROMANOWSKY*: einprocentige wässerige Methylenblaulösung und einprocentige wässerige Eosinlösung werden zu gleichen Theilen in flachen Schalen gemischt. Die entstehenden glänzenden Häutchen werden wiederholt mit dem Glasstab verrührt. Vor dem Einlegen des Deckglases wird das letzte Häutchen mit Fliesspapier entfernt. Dann wird das Deckglas für 3 bis 7 Stunden eingelegt, in Wasser gespült, getrocknet. Das beste Mischungsverhältniss der Farblösungen muss nach frischer Bereitung und auch jedesmal nach längerem Stehen ausprobiert werden.

Die jüngsten Parasiten haben Napf- oder Ringform und füllen nur $\frac{1}{10}$ des rothen Blutkörperchens. Allmählich wachsen sie, dabei wird, oft unter auffälligem Ablassen des Blutkörperchens, Melanin gebildet, das sich in bald kleineren, bald grösseren Stäbchen und Körnchen zerstreut in den Körper des Parasiten einlagert. Schliesslich kommt

zur Sporulation, die ähnlich verläuft wie bei *Proteosoma*; das Pigment sammelt sich im Centrum, und der umliegende Körper des Parasiten theilt sich in 8—20 kleine Elemente, die zunächst noch rosettenartig das Pigmentcentrum umlagern (Gänseblümchenstadium), schliesslich aber sich lösen, frei im Plasma treiben und von da aus neue rothe Blutkörperchen befallen. Die Zeit der Auflösung des sporulirenden Parasiten fällt mit dem Fiebereintritt zusammen, wohl in Folge des Freiwerdens pyrogener Stoffwechselprodukte.

Ausser dieser endogenen Sporulation kann man nicht selten die Anfänge exogener geschlechtlicher Entwicklung beobachten. Am häufigsten treten bei der Tropenmalaria, wenn die Krankheit längere Zeit bestanden hat und eine gewisse Immunität eintritt, halbmondförmige Gebilde auf, die zuerst noch am rothen Blutkörperchen haften, später frei werden. Unter ihnen kann man ähnlich wie bei *Halteridium* nach der Färbung des Plasmas und nach der Chromatinvertheilung zwei Kategorien unterscheiden: männliche und weibliche Gameten. Erstere ver-



Fig. 55. Entwicklung des Malariaparasiten. 1000:1 ($F = 600:1$), theilweise schematisch. A = Menschliche Blutkörperchen mit Parasiten. B = Sporulation. C = Halbmondförmige Parasiten, sphärische Form annehmend. D = Spermatozoën-Aussendung. E = Würmchen aus dem Darm von *Anopheles*. F = Cyste („Amphiont“) in der Magenwand von *Anopheles*, mit Sichelkeimen. G = Freie Sichelkeime. E—G nach GRASSI.

wandeln sich im entnommenen Blutropfen binnen wenigen Minuten in sphärische Körper, die sich mit geisselartigen Fäden umgeben können. Die schwächer färbbaren Halbmonde sollen sich in ovoiden Körper umformen. Die Befruchtung der letzteren und eine Würmchenbildung ist aber in den Blutpräparaten nicht beobachtet. Dagegen wollen ROSS und nach diesem GRASSI und CELLI verfolgt haben, dass die Copulation und die Entstehung von Würmchen im Intestinaltractus einer Stechmücke, *Anopheles claviger* s. *maculipennis*, stattfindet. Die Würmchen sollen sich in die Magenwand einbohren und hier die Bildung eines „Amphionten“ mit Sporoblasten und schliesslich sichelförmigen Sporen veranlassen, die sich vorzugsweise in der Speicheldrüse ansammeln. Von da aus soll durch Stiche des Insects die Krankheit auf gesunde Menschen übertragen werden.

Sowohl durch zahlreiche Beobachtungen in Malaria- und malaria-freien Gegenden sowie durch Experimente mit Stechmücken, die man am Kranken hat saugen und nach circa 10 Tagen (der Zeit, die bis zur Ausbildung der Sichelkeime verfliesst) Gesunde hat stechen lassen, ist sichergestellt, dass vorzugsweise, wenn nicht ausschliesslich, *Anopheles claviger* als Zwischenwirth bei der Verbreitung der Malaria eine Rolle spielt, während *Culex*-arten nicht in Betracht kommen.

Genus *Culex* unterscheidet sich von *Anopheles* z. B. durch die kurzen Fühlhörner, die wenig gefiederten Antennen und den complicirten Stechapparat; bei *Anopheles* sind Fühlhörner und Stechapparat ungefähr gleich lang und die Antennen stark gefiedert. *Anopheles claviger* ist speciell gekennzeichnet durch vier auf jedem Flügel befindliche in Form eines T gestellte dunkle Flecke.

Die Malaria tritt in mindestens 3 verschiedenen Typen auf, denen ebensoviele Abarten des Malariaparasiten entsprechen:



Fig. 56 a. Quartana. 1000:1.

1 = Junger, 2 = älterer Parasit, 3 = Sporulation.



Fig. 56 b. Tertiana. 1000:1.

1 = Junger, 2 = älterer Parasit, 3 = Sporulation.

Der Parasit der Febris quartana (mit Wiederholung des Frost- und Fieberanfalls nach je 72 Stunden) zeigt grobe Pseudopodien, grobes Pigment, bei der Sporulation 8—12 Sporen.

Bei Febris tertiana (Fieber alle 48 Stunden) erscheint der Parasit zarter, das Pigment feiner; auch er füllt vor der Sporulation das Blutkörperchen ganz aus; die Zahl der Sporen beträgt 16—20; ihre Lagerung ist meist nicht regelmässig rosettenartig.




Fig. 56 c. Malaria tropica. 1000:1.

1 = Kleiner Ring. 2 = Grosser Ring. 3 = Sporulation. 4 = Halbmondförmige Parasiten.

Die Malaria tropica (oder Aestivo-Autumnalfieber der Italiener) ist eine Tertiana, bei der zwar auch alle 48 Stunden der Anfall sich wiederholt, bei der aber das Fieber circa 40 Stunden andauert, die Remission nur 6—8 Stunden. Zu Anfang des Fiebers findet man hier den Parasiten in Form kleiner Ringe mit deutlichem Chromatinkorn; zu Ende und während der Remission grössere Ringe, aber immer nicht mehr als $\frac{1}{3}$ der rothen Blutkörperchen einnehmend, mit einer Verbreitung gegenüber dem Chromatinkorn. Einzelne Pigmentkörner sind

nicht sichtbar, nur braune Verfärbung. Sporulation ist im Blut aus der Fingerkuppe nicht zu beobachten; dieselbe erfolgt nur in inneren Organen, namentlich in der Milz. Von dort entnommene Blutproben zeigen Bilder ganz ähnlich wie bei der Sporulation von *Proteosoma*. — Ueber Halbmonde und Geisselkörper s. oben.

Die beschriebenen Parasiten sind zweifellos als die Erreger der Malaria anzusehen, weil sie in jedem Einzelfall von Malaria mit Sicherheit nachgewiesen werden, nie aber bei gesunden Menschen oder anderen Kranken gefunden sind; weil ferner die Menge der Parasiten der Intensität der Krankheit entspricht; weil wirksame Chininbehandlung auch die Parasiten zum Verschwinden bringt; und weil intravenöse Injektion kleiner Mengen parasitenhaltigen Blutes — aber auch nur solchen Blutes — bei Gesunden typische Malaria hervorruft.

Literatur: LEUCKART, Die Parasiten des Menschen, 2. Aufl., 1879—86. — BÜTSCHLI, Protozoa, 1882. — BALBIANI, Leçons sur les sporozoaires, Paris 1884. — KEUSE, Protozoën in FLÜGGE, Mikroorganismen, 3. Aufl., Bd. II. — v. WASSILIEWSKI, Sporozoënkunde, 1900. — LAVÉLAN, Nature parasitaire des accidents de l'impaludisme, Paris 1881. — COUNCILMAN und ABBOT, American Journ. of the medical sc. 1885. — MARCHIAFAVA und CELLI, Atti della R. Accademia dei Lincei, 1884 ff. — GOLGI, Sulla infezione malarica, Torino 1886. — Zeitschr. f. Hygiene, Bd. X. — KOCH, Zeitschr. f. Hyg., Bd. 34.

Zweites Kapitel.

Witterung und Klima.

In der unsern Erdball umgebenden Atmosphäre laufen eine Reihe von Erscheinungen ab, welche in hohem Grade hygienisches Interesse beanspruchen; und zwar kommen sowohl physikalische Vorgänge, die Temperatur-, Druck-, Feuchtigkeitsschwankungen und die Bewegung der Atmosphäre in Betracht; als auch das chemische Verhalten der Luft, ihr Gehalt an Sauerstoff, Ozon, Kohlensäure und fremden Gasen; und drittens die Beimengung staubförmiger Bestandtheile.

Zunächst interessieren uns hier die physikalischen Processe, welche in den Ausdrücken „Witterung und Klima“ zusammengefasst werden. Die Lehre von diesen Vorgängen bezeichnet man gewöhnlich als Meteorologie und Klimatologie. Unter Witterung versteht man

speciell die betreffenden physikalischen Vorgänge in der Atmosphäre während einer bestimmten kürzeren Zeit; unter Klima dagegen das mittlere Verhalten der meteorologischen Faktoren, welches für irgend einen Ort durch längere Beobachtung sich ergeben hat.

Beide, Wetter und Klima, sind von Alters her als hygienisch bedeutungsvoll erkannt; beide werden noch jetzt von Aerzten und Laien gern als Ursache zahlreicher geringer oder schwererer Störungen der Gesundheit angeschuldigt.

Statistische Erhebungen haben in der That gezeigt, dass gewisse Krankheiten nur in einem bestimmten Klima vorkommen, dass andere eine wesentlich verschiedene Energie und Ausbreitung zeigen, je nach den klimatischen Verhältnissen des Landes. — Ferner hat sich herausgestellt, dass die Mortalität an verschiedenen Krankheiten variiert je nach dem Wechsel der Jahreszeiten und der gleichzeitig wechselnden Witterung.

Manche von Alters her behauptete Einflüsse von Klima und Witterung haben sich freilich noch nicht statistisch mit voller Bestimmtheit beweisen lassen, sind aber durch vielfache praktische Erfahrung zu begründen. So die Abhängigkeit katarrhalischer und rheumatischer Leiden, gewisser Ernährungsstörungen und nervöser Affektionen von Witterung und Klima; so die Heilkraft mancher Klimate für diese oder jene Leiden.

Vielfach wird der Einfluss von Klima und Witterung auch überschätzt. Namentlich können die steten Schwankungen der Witterung leicht ausgenutzt werden, um in fehlerhafter Weise Causalverbindungen mit der ebenfalls vielfach wechselnden Häufigkeit gewisser Krankheiten herzustellen. Ebenso begegnen wir oft dem Bestreben, namentlich an Bade- und Kurorten, minimalste klimatische Differenzen zu wichtigen Heilfaktoren aufzubauschen.

Um über die wirkliche Bedeutung der meteorologischen und klimatischen Einflüsse ein zuverlässiges Urtheil zu gewinnen, wird es zunächst erforderlich sein, die Faktoren, welche Klima und Witterung zusammensetzen, nämlich Lufttemperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung u. s. w. im Einzelnen zu analysiren, die örtlichen und zeitlichen Schwankungen des einzelnen Faktors zu ermitteln, deren Wirkung auf den Menschen zu präcisiren, und dann erst den Gesamteinfluss von Witterung und Klima auf die Frequenz verschiedener Krankheiten zu erörtern.

I. Die einzelnen meteorologischen Faktoren.

A. Temperatur der Atmosphäre.

Methode der Beobachtung. Gewöhnlich benutzt man empfindliche Quecksilberthermometer mit kleinen Gefässen, welche in gewissen Zwischenräumen geeicht werden müssen; zuweilen Metallthermometer; für grosse Kältegrade Weingeistthermometer.

Speciell für meteorologische Beobachtungen werden vielfach Maximal- und Minimalthermometer gebraucht. Die jetzt gebräuchlichste Konstruktion ist das U-förmige Thermometer von SIX und CASELLA, ein Weingeistthermometer mit Einschaltung eines Quecksilberfadens, der an jedem Ende einen Index vorschiebt, so dass Maximum und Minimum beobachtet werden können.

Die Aufstellung des Thermometers muss, da nur die Lufttemperatur gemessen werden soll, in solcher Weise erfolgen, dass es gegen die Strahlung vom Boden und von erwärmten Hauswänden, ebenso auch gegen Regen u. s. w. geschützt ist. Daher muss das Thermometer an der Nordwand des Hauses, mindestens vier Meter über dem Boden und in einem Gehäuse angebracht werden, welches keine Bestrahlung, sondern nur eine Einwirkung der zutretenden Luft auf das Thermometer gestattet.

In einfacher und meist hinreichend genauer Weise lässt sich die Lufttemperatur bestimmen durch das „Schleuderthermometer“, d. h. durch ein gewöhnliches Thermometer, welches an einer 1 Meter langen Schnur einige Male im Kreise geschwungen wird. Diese Methode der Messung der Lufttemperatur ist gerade für hygienische Zwecke, in Wohnräumen u. s. w., gut anwendbar. — Für meteorologische Stationen empfiehlt sich die Anwendung des ASSMANN'schen Aspirationsthermometers. Das Thermometer befindet sich in einem dünnwandigen Metallgehäuse; im Kopf des Gehäuses liegt ein Federkraft-Laufwerk, durch welches ein Exhaustor-Scheibenpaar in schnelle Umdrehung versetzt wird; letzteres unterhält einen konstanten Luftstrom, der mit 2,3 m pro Sec. Geschwindigkeit am Thermometergefäss vorbeistreicht.

Soll auch der Erwärmung durch die Sonnenstrahlung Rechnung getragen werden, so sind — da an den gewöhnlichen Thermometerkugeln eine fast vollständige Reflexion der Strahlen stattfindet — Thermometer mit geschwärzten Gefässen zu verwenden, die in eine luftleere Glashülle eingeschlossen sind (Vacuumthermometer). Sie geben in der Differenz gegenüber der Lufttemperatur ein annäherndes Maass der Strahlungsintensität.

Die Thermometerbeobachtungen zu meteorologischen Zwecken erfolgen am vollkommensten durch selbstregistrirende Thermometer, welche den Gang der Temperatur vollständig aufzeichnen. Auch stündliche Ablesungen ergeben fast ebenso brauchbare Resultate, werden indess nur an wenigen Stationen ausgeführt. Addirt man die Stundenbeobachtungen eines Tages und dividirt durch 24, so erhält man das Tagesmittel der Temperatur. Die Tagesmittel addirt und durch die Zahl der Tage des Monats resp. Jahres dividirt ergeben das Monatsmittel resp. Jahresmittel. — Ein richtiges Tagesmittel wird auch erhalten, wenn man nur dreimal täglich, 8 Uhr Früh, 2 Uhr Nachmittags, 10 Uhr Abends beobachtet und die Summe der erhaltenen Zahlen durch 3 dividirt; oder wenn man um 7 Uhr Früh, 2 Uhr Nachmittags, 9 Uhr Abends abliest, die für die Abendstunde erhaltene Zahl doppelt setzt und durch 4 dividirt;

oder wenn man aus den Daten für 8 Uhr Früh, 2 Uhr Nachmittags, 7 Uhr Abends und für das Minimum das Mittel bildet. Auch das allein aus Maximal- und Minimaltemperatur entnommene Mittel giebt ein annähernd richtiges, im Ganzen jedoch zu hohes Tagesmittel.

Oertliche und zeitliche Schwankungen der Temperatur.

Ueber die Temperaturverhältnisse der bewohnten Erdoberfläche erhalten wir Aufschluss durch die an zahlreichen Orten gesammelten meteorologischen Daten.

Dieselben beschränken sich allerdings bis jetzt nur auf die Beobachtung der Lufttemperatur. Für hygienische Zwecke ist ausserdem die Temperatur der umgebenden Gegenstände (Boden, Hauswände u. s. w.) von Interesse, da die Wärmeabgabe von unserem Körper auch durch die Strahlung und Leitung zwischen diesem und den verschiedenen temperirten Gegenständen beeinflusst wird. Ebenso ist die directe Bestrahlung des Körpers durch die Sonne bedeutungsvoll für die Temperaturempfindung desselben.

a) Am häufigsten wird die mittlere Monats- und Jahrestemperatur der klimatischen Charakteristik zu Grunde gelegt.

Sie wird vielfach dargestellt in Form der Monats- und Jahresisothermen, d. h. Linien, welche die Orte gleicher mittlerer Monats- resp. Jahreswärme mit einander verbinden. Aus denselben lässt sich indessen nichts über die wirklichen Temperaturverhältnisse eines einzelnen Ortes entnehmen, da bei der Construction die lokalen Einflüsse, welche auf die Temperatur wirken, nach Möglichkeit künstlich eliminirt werden. In dieser Beziehung kommt vor allem die Höhenlage des Ortes in Betracht; je weiter man sich von der gesammten wärmespendenden Erdoberfläche entfernt, um so niedriger wird naturgemäss die Lufttemperatur, und zwar nimmt dieselbe im Mittel für je 100 Meter um etwa 0.54° (in grösserer Höhe langsamer) ab. Bei der Construction der Isothermen werden die an höher gelegenen Orten beobachteten Zahlen auf das Meeresniveau reducirt.

Die wirkliche Höhe der Temperatur an verschiedenen Orten ist daher nur aus den Resultaten fortgesetzter Specialbeobachtungen zu entnehmen. Die umstehende Tabelle giebt in der dritten Columnne die mittlere Jahrestemperatur von 25 aus allen Zonen ausgewählten Städten. Die Höhenlage jedes Ortes ist in der zweiten Columnne verzeichnet; dieselbe ist z. B. beim Vergleich von Veracruz und Mexico, Calcutta und Darjeeling, Berlin und München sehr zu berücksichtigen.

b) Die absoluten und mittleren Extreme. Unter absoluten Extremen versteht man die höchste resp. niedrigste Temperatur, welche überhaupt während der gesammten Beobachtungsjahre zu verzeichnen war; die mittleren Extreme findet man, indem man die höchsten resp. niedrigsten Temperaturen der einzelnen Beobachtungsjahre addirt und durch die Zahl der Jahre dividirt.

Geograph. Breite	Höhe über dem Meeresniveau in Met.	Mittlere Jahres- Temperatur		Mittlere Extreme		Absolute Extreme		Mittlere Tages- schwankung	Mittlere Tem- peratur des		Mittlere Jahres- schwankung	Unperiod. mittlere Jahresschwankung	Veränderlichkeit von Tag zu Tag
		Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.		wärmsten Monats	kältesten Monats			
Chartum	15°36'	388	28.6	46.6	10.0	—	—	—	34.5	22.7	11.8	36.6	—
Sanaibar	6°10' S.	—	26.7	31.7	21.7	32.6	20.4	4.1	28.1	23.2	2.4	10.0	—
Calcutta	22°32'	6	24.8	38.6	12.1	41.1	9.3	7.1	28.4	18.1	10.3	26.5	—
Darjeeling	27° 8'	2107	12.3	25.8	—	—	—	—	16.7	4.9	11.8	27.4	—
Veracruz	19°12'	—	25.4	37.0	13.8	—	—	—	27.7	22.1	5.6	23.7	—
Mexico	19°26'	2266	16.4	29.4	—	—	—	—	19.6	12.5	7.1	30.5	—
Madrid	40°25'	655	13.5	49.5	—	—	—	13.2	24.5	4.9	16.6	46.5	1.0
Rom	41°54'	50	15.3	35.0	—	—	—	8.0	24.8	6.7	18.1	38.5	1.5
Paris	48°50'	34	10.3	33.5	—	—	—	—	18.8	2.0	16.3	43.3	—
Köln	50°55'	60	10.1	32.2	—	—	—	—	18.7	1.6	17.1	44.0	—
München	48° 9'	528	7.5	30.4	—	—	—	—	17.3	3.0	20.3	48.9	—
Berlin	52°30'	48	9.0	33.0	—	—	—	7.3	18.8	0.8	19.6	48.4	1.6
Wien	48°12'	197	9.7	33.5	—	—	—	8.0	20.5	—	22.2	48.0	1.9
Dublin	53°22'	58	9.5	24.7	—	—	—	—	15.4	4.7	11.3	29.8	—
London	51°33'	37	10.3	31.3	—	—	—	—	17.9	8.5	14.4	39.4	1.8
Hammerfest	70°42'	10	1.9	24.0	—	—	—	—	11.8	5.2	17.0	38.2	—
St. Petersburg	59°56'	10	3.6	29.3	—	—	—	4.7	17.7	9.4	27.1	57.8	2.2
Moskau	55°46'	160	3.9	31.4	—	—	—	—	18.9	—	30.0	61.9	2.6
Astrachan	48°21'	—	9.4	36.3	—	—	—	—	25.5	—	32.6	62.3	—
Jakutsk	62° 1'	160	—	33.0	—	—	—	—	18.8	—	24.2	50.7	—
Washington	38°53'	27	12.0	34.9	—	—	—	9.0	24.4	—	14.6	50.7	1.5
Reykjavik	64° 8'	—	3.3	—	—	—	—	—	12.1	—	27.3	—	—
Spitzbergen	79°53'	—	8.9	12.8	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—
N.-W. Grönland	72°48'	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—

Die niedrigste, in Sibirien (Werchojansk) beobachtete Temperatur betrug -68° . Die höchsten Wärmegrade finden sich in der Nähe des rothen Meeres und sollen dort bis $+65^{\circ}$ betragen. In Chartum ist das mittlere Maximum $+46.6^{\circ}$; in Lahore das absolute Extrem $+50.9^{\circ}$, in Multan $+52.8^{\circ}$. Zwischen höchster und niedrigster Temperatur der von Menschen bewohnten Stätten findet man also eine Differenz von 133° ; während die mittlere Temperatur um etwa 40° differirt.

c) Die **mittlere Tagesschwankung**, d. h. die mittlere Differenz zwischen der Maximal- und Minimaltemperatur eines Tages. Ueber dem Meere ist die Tagesschwankung selbst unter dem Aequator, wo die Theilung des Tages in Tag und Nacht am schärfsten hervortritt, sehr gering, inmitten der grossen Continente selbst in polarer Region bedeutend. Ausserdem sind die örtlichen Lageverhältnisse, die Neigung zur Bewölkung u. s. w. für die Temperaturschwankung des einzelnen Ortes von Wichtigkeit.

Die intensivsten Contraste innerhalb 24 Stunden treten in der Sahara, im westlichen Tibet, im westlichen Hochplateau Nord-Amerikas hervor. Dort finden sich Tagesschwankungen von $40-42^{\circ}$. Die Temperatur kann dort Nachmittags 2 Uhr bis 38° betragen, des Nachts aber durch intensive Ausstrahlung gegen den völlig klaren Himmel bis unter den Gefrierpunkt sinken. — In denselben Breiten ist dagegen über dem atlantischen Ocean die mittlere tägliche Schwankung zu 1.6° gefunden.

In unseren Breiten verläuft die Tagesschwankung der Temperatur im Allgemeinen so, dass das Minimum kurz vor Sonnenaufgang (im Winter näher an Mitternacht) liegt, das Maximum zwischen 2 und 3 Uhr. Zwischen 1 Uhr und 5 Uhr Nachmittags ändert sich die Temperatur wenig; bis 1 Uhr und von 5 Uhr ab tritt rasches Steigen resp. Fallen ein. — Die Intensität der Schwankung beträgt im Jahresmittel: in Wien 8° , in Berlin 6.4° . Im November, Dezember, Januar beträgt sie im Mittel nur $4-5^{\circ}$; in den Sommermonaten $9-10^{\circ}$. Die niedrigsten Schwankungen kommen an trüben Wintertagen vor; sie können weniger als 1° ausmachen. Den höchsten Tagesdifferenzen begegnet man an heiteren Sommertagen, wo Schwankungen von $15-20^{\circ}$ (Morgens früh $+13^{\circ}$, Nachmittags $+31^{\circ}$) nicht selten sind; ferner zuweilen im Winter und Frühjahr, wenn Windrichtung und Wetter eine plötzliche Aenderung erfahren. So gehört ein rasches Ansteigen der Temperatur von -7° auf $+6^{\circ}$ in unserem Klima zu den alljährlichen Vorkommnissen.

d) Die **mittlere Jahresschwankung**. Inmitten der grossen Continente finden wir die stärksten Contraste der Temperatur im Laufe eines Jahres, und zwar um so stärker, in je höhere Breiten wir kommen;

während im tropischen See- und Küstenklima die Jahresschwankung minimal wird.

Man registriert eine unperiodische und eine periodische Jahresschwankung (Columnne 8 und 9). Die absolute, unperiodische Jahresschwankung ergibt sich aus der Differenz zwischen den absoluten Extremen (Columnne 6 und 7); die periodische mittlere Jahresschwankung wird erhalten aus der Differenz zwischen den mittleren Jahresextremen (Columnne 4 und 5); oder einfacher aus der Differenz zwischen den mittleren Temperaturen des heissesten und des kältesten Monats. Man gewinnt so einen Ausdruck für den durchschnittlichen Contrast der Jahreszeiten, und unterscheidet nach diesem 1) das Aequatorial- oder Seeklima, mit einer mittleren Jahresvariation der Temperatur bis höchstens 15° . 2) das Uebergangsklima, mit einer mittleren Schwankung von $15-20^{\circ}$. 3) das Landklima, mit $20-40^{\circ}$ Jahresschwankung. 4) das excessive Landklima, mit $40-60^{\circ}$ Jahresschwankung.

Wie wichtig es für die Charakterisirung eines Klimas ist, dass neben der mittleren Jahrestemperatur auch die mittlere Jahresvariation der Temperatur angegeben wird, das geht z. B. aus einem Vergleich zwischen Dublin und Astrachan hervor. Beide Orte zeigen gleiche mittlere Jahreswärme; der Unterschied zwischen heissestem und kältestem Monat beträgt aber in Dublin nur 11° , in Astrachan 33° ; die unperiodische Jahresschwankung beziffert sich in Dublin auf 30° ; in Astrachan auf 62° .

e) Die interdiurne Veränderlichkeit, d. h. der unperiodische Temperaturwechsel, der sich von einem Tag zum anderen vollzieht. Bei starkem derartigen Wechsel sprechen wir von „veränderlichem Wetter“, und wenn sich derselbe in einem grösseren Abschnitt des Jahres wiederholt bemerkbar macht, von „veränderlichem Klima“.

Die mittlere Veränderlichkeit eines Monats erhält man dadurch, dass man die Differenzen zwischen der Mitteltemperatur je zweier auf einander folgender Tage bildet, die für den ganzen Monat gefundenen Differenzen addirt und durch die Zahl der Monattage dividirt. Aus den Monatswerthen erhält man die mittlere Veränderlichkeit des Jahres.

Ueber die Veränderlichkeit der Temperatur liegen erst aus neuerer Zeit zahlreichere Beobachtungen vor. Dieselbe nimmt im Allgemeinen nach dem Polen hin zu, jedoch in sehr unregelmässiger Weise; die Maxima liegen z. B. im nördlichen Theil der Vereinigten Staaten und in Westsibirien. Landeinwärts wird die Veränderlichkeit im Ganzen grösser; ferner steigt sie mit der Höhenlage. Jedoch sind lokale Momente und namentlich die herrschenden Windrichtungen von bedeutendem Einfluss. — Zeitlich findet sich die höchste Veränderlichkeit im Winter, die geringste im Sommer.

Hygienischer Einfluss der beobachteten Temperaturgrade und Temperaturschwankungen.

Directe Störungen der Gesundheit durch die Temperatureinflüsse der Atmosphäre müssen vorzugsweise die Wärmeregulirung unseres

örpers betreffen, und es ist daher erforderlich, zunächst auf die Art und Weise, wie die Eigenwärme des Körpers unter den verschiedensten äusseren Verhältnissen erhalten wird, etwas näher einzugehen.

Die Wärmeregulierung des Körpers. Im Allgemeinen findet die Abfuhr der 3000 W.-E., welche im Mittel der Körper des Erwachsenen in 24 Stunden abducirt, auf folgenden Wegen statt:

1) Durch die Speisen, welche indess für gewöhnlich nur 40—50 Wärmeheiten aufnehmen. 2) Durch die Erwärmung der Athemluft und durch Wasserverdunstung an der Lungenoberfläche, 200—400 W.-E. 3) Durch Wärmeabgabe an der Haut, 2000 W.-E. und mehr.

Die letztere überwiegend wichtige Wärmeabfuhr erfolgt theils durch Leitung, theils durch Strahlung, theils durch Wasserverdunstung. Diese drei Abfuhrwege können in der freien Atmosphäre sämmtlich ausserordentlich kräftig funktionieren und jeder für sich den ganzen Wärmebetrag abführen. Andererseits aber kann es auch im Freien zu einem völligen Abschluss des Wärmeverkehrs durch einen oder des anderen oder sogar auch aller drei Wege kommen.

Durch Leitung giebt der menschliche Körper Wärme vor allen Dingen an die umgebende Luft ab, umso mehr, je grösser die Temperaturdifferenz zwischen Haut und Luft ist und je rascher die Luft wechselt. Hat die Luft z. B. eine Temperatur von 17°, so lässt sich berechnen, dass 1 cbm Luft bei seiner Erwärmung auf Körpertemperatur höchstens 6 W.-E. aufnimmt; in einem geschlossenen Raume wird daher die gesammte Wärmeabgabe durch Leitung bedeutend sein; sie kann nur erheblich werden bei bewegter Luft, und da im Freien gewöhnlich eine Luftbewegung von mindestens 2—5 Meter pro Secunde steht, so wird dort diese Art der Wärmeabgabe relativ viel leisten können. Immerhin ist auch hier die Menge der abgeleiteten Wärme sehr wechselnd; in kalten heftigen Winden sehr gross, bei warmer ruhiger Luft äusserst geringfügig.

Die Wärmeabgabe durch Strahlung ist theils von der Grösse und dem Ausstrahlungsvermögen der Körperoberfläche, von der Temperaturdifferenz gegenüber den umgebenden Gegenständen und von einigen anderen weniger einflussreichen Faktoren abhängig. Dieser Weg der Wärmeabgabe funktioniert ausserhalb innerhalb geschlossener Räume, wo durch die Ausstrahlung gegen kältere Wände, Möbel u. dgl. unter Umständen die hauptsächlichste Wärmeabgabe des Körpers erfolgen kann. Derselbe Weg gelangt auch im Freien zur Benutzung, wenn z. B. kältere Hauswände, namentlich aber Bäume oder Sträucher, die durch ihre stete reichliche Wasserverdunstung eine relativ niedrige Eigentemperatur haben, in der Umgebung sich finden. Andererseits kann die Wärmeabgabe durch Strahlung minimal werden, wenn z. B. stark erwärmte Felswände, Hausnauern oder andere Menschen die Umgebung des Körpers bilden.

Durch Wasserverdunstung können ebenfalls sehr grosse Mengen Wärme dem Körper entzogen werden. Bei der Verdunstung von 1 g Wasser werden 0.51 W.-E. latent. Da nun der Mensch für gewöhnlich 900 g, bei stärkerer Körperanstrengung 2000—2600 g Wasser durch Verdunstung von der Haut verlieren kann, so beträgt die Wärmeentziehung auf diesem Wege allein 500 bis 1500 W.-E.; jedoch ist das Maass der Wasserverdunstung durchaus abhängig theils von gewissen im Körper gelegenen Momenten, theils von der Lufttemperatur, der Lufttrockenheit, der Luftbewegung und dem Luftdruck (s. unter „Luftfeuchtigkeit“).

Gegenüber dieser ausserordentlich variablen Zahl und Breite der Wege der Wärmeabfuhr ist es von grosser Bedeutung, dass durch Abänderungen der äusseren wärmeentziehenden Faktoren stets eine derartige Reaktion der im Körper gelegenen regulirenden Faktoren angeregt wird, dass der Wärmezustand des Körpers der gleiche bleibt; und zwar wird theils die Wärmeproduktion, theils die Wärmeabgabe des Körpers beeinflusst.

Eine Vermehrung oder Verminderung der Wärmeproduktion kann einmal erfolgen durch Vermittelung der Hautnerven. Je nachdem diese in stärkerem oder geringerem Grade abgekühlt werden, regen sie reflektorisch den Verbrennungsprocess in den Muskeln mehr oder weniger an (chemische Wärmeregulation). Für je 1° Temperatursteigerung sinkt die CO₂-Ausscheidung und die Wärmeproduktion um etwa 2 Procent. Bei einer Aussentemperatur von mehr als 20° sistirt aber die weitere Herabsetzung. — Zweitens kann durch Vermehrung oder Einschränkung der willkürlichen Muskelbewegungen die Wärmeproduktion geändert werden. Bei starker Abkühlung tragen ausserdem unwillkürliche Muskelbewegungen (Zittern, Frostschauder) zu vermehrter Wärmebildung bei. — Drittens kann durch Variirung der Quantität und Qualität der Nahrung die Wärmeproduktion beeinflusst werden. Namentlich wird durch Fettaufnahme die Wärmebildung vermehrt; bei ruhendem Körper steigert in erster Linie reichliche Eiweisszufuhr den Umsatz der Zellen.

Die Wärmeabgabe wechselt nach dem Athemvolum; zweitens je nach der Vergrösserung oder Verringerung der Wärme abgebenden Körperoberfläche (Strecken und Spreizen der Beine u. s. w.); vor allem aber nach der Blutfülle und Blutcirculation des vorzugsweise für die Wärmeabgabe in Betracht kommenden Organs, der Haut, und nach der Intensität der Wasserverdampfung von der Haut. — Diese physikalische Wärmeregulation, bei der in erster Linie die Haut activ ist, setzt namentlich dann ein, wenn die chemische Wärmeregulation versagt, also bei Aussentemperaturen über 20°. Unter gewissen Verhältnissen, z. B. bei lebhaftem Wind, tritt sie erst bei erheblich höheren Temperaturen in Action (RUBNER, WOLPERT).

Für den unbedeckten Körper würden indess alle diese regulirenden Vorrichtungen nicht ausreichen, um demselben unter allen klimatischen und Witterungsverhältnissen die Erhaltung der normalen Körperwärme zu garantiren. Erst durch Einschaltung der Kleidung und Wohnung, und durch entsprechende Abwechselung sowohl in Zahl und Dicke der Kleidungshüllen wie in Heizung und Lüftung der Wohnung gelingt es dem Menschen, sich gegen die starken Variationen der Lufttemperatur ausreichend zu schützen.

Selbst wenn diese künstlichen Vorrichtungen zu Gebote stehen, kommt es noch häufig zu Störungen der Wärmeregulirung, weil die richtige Handhabung und Anpassung jener Vorrichtungen unter Umständen schwierig ist und weil viele Menschen gezwungen sind, einen Theil des Tages ausserhalb der Wohnung zuzubringen, lediglich auf den Schutz der Kleidung angewiesen.

Es ist somit begreiflich, dass die Temperaturverhältnisse der Atmosphäre trotz aller der geschilderten natürlichen und künstlichen Regulirvorrichtungen nicht selten zu Gesundheitsstörungen führen.

Entweder kann durch zu hohe Temperatur die Entwärmung des Körpers behindert werden, so dass eine Art Wärmestauung entsteht;

oder niedere Temperaturgrade führen zu starke Abkühlung und dadurch Erfrierungen oder Erkältungen herbei.

a) Die **Einwirkung** hoher Temperaturen.

Die akuten Krankheitserscheinungen, welche durch Wärmestauung zu Stande kommen, bezeichnet man als **Hitzschlag**.

Im Anfangstadium erscheint das Gesicht geröthet, die Augen glänzend; es stellt sich Kopfschmerz, ein Gefühl von Beklemmung, Trockenheit im Halse und heisere Stimme ein. Weiterhin wird die Haut trocken und brennend; dazu gesellt sich Flimmern vor den Augen und Ohrensausen; die Herzaktion wird stürmisch; dann tritt ohnmachtähnliche Schwäche, oft Zittern der Glieder ein und schliesslich bricht der Kranke bewusstlos zusammen. Von da datirt dann der eigentliche Krankheitsanfall, auf dessen Symptome hier nicht einzugehen ist.

Wir begegnen dem Hitzschlag vorzugsweise in den tropischen und subtropischen Ländern. Aber auch in gemässigten Klimaten und in Mitteleuropa sind in heissen Sommern Fälle von Hitzschlag nicht selten, namentlich bei militärischen Märschen und bei Feldarbeitern.

Die Bedingungen für den Hitzschlag sind namentlich dann gegeben, wenn die Luft ruhig und mit Feuchtigkeit nahezu gesättigt ist; so in den Tropen namentlich im Anfange der Regenperiode, in gemässigterem Klima an Sommertagen vor dem Ausbruch von Gewittern. Besondere Gefahr bieten ferner Oertlichkeiten, an welchem auch eine Abstrahlung unmöglich wird, z. B. erwärmte Felswände und Engpässe. Ferner liegt eine besondere Gefahr in der Umgebung mit Menschen, z. B. bei militärischen Märschen in geschlossener Colonne. Disponirend wirken ausserdem auf das Zustandekommen des Hitzschlags Muskelbewegungen; je angestregter die militärischen Märsche daher sind, um so grösser wird die Gefahr des Hitzschlags. Eine sehr vollständige Behinderung der Wärmeabgabe kommt bei Tunnelarbeiten zu Stande; auch hier treten aber die Erscheinungen von Beklemmung, grosser Mattigkeit, bedeutender Pulsfrequenz und Steigerung der Eigenwärme auf 39—42° weit eher bei Arbeitsleistung ein, als bei ruhigem Aufenthalt; unter letzterer Bedingung kann die Temperatur etwa 20° höher liegen, bis die gleiche Intensität der Erscheinungen eintritt, welche bei Arbeit beobachtet wird. — Disponirend wirken ferner: reichliche Nahrung, welche erhöhte Wärmeproduktion veranlasst; ungenügendes Getränk, so dass nicht fortwährend Wasserverdunstung von der Haut unterhalten werden kann; ferner Alcoholica, und eng anliegende warme Kleidung. — In ausgesprochenem Grade wird ausserdem eine individuelle Disposition und eine Gewöhnung an hohe Temperaturen beobachtet.

Um dem Hitzschlag vorzubeugen, muss versucht werden, auf irgend einem Wege eine Wärmeabgabe des Körpers zu erreichen. In den Tropen sind, ausser zweckmässiger Kleidung und Wohnung, Vermeiden von Körperbewegungen, mässige Nahrung, Bewegung der Luft durch Fächer u. s. w. und häufigere kalte Uebergiessungen indicirt. Bei den militärischen Märschen ist, falls gefahrdrohende Witterungsverhältnisse vorliegen, die Kleidung, Nahrung und Getränkeaufnahme zu reguliren, die Märsche sind nicht zu forciren und so viel als möglich auf die Nachtzeit zu verlegen, die Colonnen sind möglichst weit auseinander zu ziehen, um eine Circulation von Luft und so die Möglichkeit einer gewissen Wärmeabgabe für die im Innern der Colonne marschirenden Mannschaften herzustellen.

Abweichende Symptome kommen an sonnigen Tagen dadurch zu Stande, dass nicht sowohl eine allseitige Hemmung der Wärmeabgabe eintritt, sondern eine zu intensive Erhitzung des Körpers durch directe Sonnenstrahlung. Diese ruft den sogenannten **Sonnenstich** hervor. In leichteren Fällen entsteht durch starke Insolation an den unbedeckten Hautstellen eine kurz verlaufende Hyperämie oder eine Dermatitis mit Entzündung und Transsudation. In schweren Fällen kommt es zu meningitischen Erscheinungen, zu excessiver Steigerung der Körpertemperatur und zum Tod durch Wärmestarre des Herzmuskels.

Der Sonnenstich tritt um so eher ein, je intensiver die Wirkung der Strahlen auf den Körper ist; also namentlich bei senkrecht auffallenden Strahlen, ferner bei klarem Himmel und bei möglichst dünner Schicht der Atmosphäre. In den tropischen Continenten und auf höheren Bergen ist er daher am häufigsten; ferner auch beim Aufenthalt auf Wasser oder auf Gletschern, wo die reflektirten Strahlen mit zur Wirkung gelangen.

Es ist relativ leicht, gegen die directen Insolationswirkungen Schutz zu finden, und zwar durch Einschaltung irgend einer Bedeckung, welche zur Absorption der Strahlen ungeeignet ist. Am besten giebt man den Bekleidungsstücken weisse Farbe; ausserdem ist namentlich für locker sitzende, mit Oeffnungen für Luft versehene und gleichzeitig den Nacken schützende Kopfbedeckungen zu sorgen.

Chronische partielle Wärmestauung kann durch länger anhaltende Einwirkung mässig hoher Temperatur zu Stande kommen. Eine Periode mit Tagesmitteln über 25°, namentlich wenn die nächtliche Abkühlung gering und die Luft feucht und wenig bewegt ist, wird bereits von vielen Menschen schlecht ertragen. Derartige Temperaturen kommen auch in unseren Breiten fast in jedem Sommer vor und führen bei manchen empfindlichen Individuen zu ausgesprochenen Störungen. Innerhalb der Wohnungen kann es in Folge der Insolationswärme der Mauern zu besonderer Steigerung der Wärme und Erschwerung der Wärmeabgabe kommen (s. Kap. Wohnung).

In tropischen Klimaten stellt sich als erste Folge einer andauernden Erschwerung der Wärme- und Wasserdampfabgabe durch warme

und feuchte Luft eine Erschlaffung und ein Schwächegefühl des Körpers her („Tropenanämie“). Worauf dieser Zustand beruht, ist noch unentschieden. Neuere Untersuchungen haben Unterschiede in der Zahl der rothen Blutkörperchen, im Gehalt des Bluts an Hämoglobin, im spec. Gewicht und Wassergehalt des Bluts nicht erkennen lassen.

Bei längerer Dauer der Anämie stellt sich fast regelmässig eine Vergrösserung der Leber und auch wohl der Milz ein. Ausserdem werden beim Aufenthalt in den Tropen noch folgende Symptome beobachtet: Die Zahl der Athemzüge ist etwas gesteigert, die Tiefe derselben geringer; der Puls ist weniger voll und kräftig; die Körperwärme ist häufig, namentlich Nachmittags und Abends, um Bruchtheile eines Grades über die Norm erhöht. Die Urinsekretion ist stark vermindert; die Haut wird in Folge der massenhaften Sekretion von Schweiss und der ersten Durchfeuchtung erschlafft. Der Schlaf ist unruhig und ungenügend. Die Verdauung ist oft gestört, und es besteht grosse Neigung zu Diarrhoe und schwereren Darmerkrankungen. Für diese Abnormitäten des Intestinaltrakts wird von den Colonialärzten theils die massenhafte Aufnahme von Getränk, theils die reichliche Entziehung von Chloriden durch den Schweiss, und die daraus resultirende Verarmung des Magensaftes an Salzsäure verantwortlich gemacht. Wahrscheinlich führt aber auch die erwähnte Veränderung der Blutbeschaffenheit zu Abnormitäten der Verdauungssäfte.

Unter dem Einfluss der Anämie, der Verdauungsstörungen und Appetitlosigkeit tritt eine Erschlaffung des ganzen Körpers und ein Resistenzmangel desselben ein. Infektiöse Krankheiten werden unter solchen Verhältnissen besonders leicht acquirirt und nehmen ungünstigen Verlauf. — Ferner stellt sich in Folge der Erschlaffung der Haut eine ausserordentliche Empfindlichkeit gegen die geringfügigsten Temperaturschwankungen her, und die Menschen sind daher sehr disponirt zur Acquirirung von Erkältungskrankheiten.

Indirect werden hohe Temperaturen dadurch hygienisch bedeutungsvoll, dass sie die Vermehrung saprophytischer und infektiöser Mikroorganismen in unserer Umgebung befördern. Daher werden in heissen Klimaten resp. im Hochsommer zahlreiche Bakterien in den Verdauungstraktus eingeführt, die um so leichter zu Störungen Anlass geben, weil die persönliche Empfänglichkeit durch die oben betonte schlechtere Qualität der Verdauungssäfte gesteigert ist.

Die **Schutzmaassregeln** gegen die aus anhaltend heisser Witterung entstehenden Gesundheitstörungen stimmen zum Theil mit den gegen den Hitzschlag empfohlenen Maassregeln überein. Für mässige, eben ausreichende Nahrungsaufnahme, mässige Muskularbeit, leichte Kleidung ist in erster Linie zu sorgen; Lage und Einrichtung des

Wohnhauses ist so zu wählen, dass dasselbe Schutz gegen excessive Temperaturen gewährt; durch häufige kalte Waschungen und den Gebrauch grosser Fächer ist die Wärmeabgabe zu unterstützen (vgl. Kap. „Wohnung“). — Gegen die Aufnahme schädigender Mikroorganismen ist durch Kochen der Nahrung, kühle Aufbewahrung derselben, durch tadellosoes Wasser u. s. w. Schutz zu suchen (vgl. Kapitel X).

b) Die Einwirkung niedriger Temperaturen.

Erfrierungen einzelner Körpertheile oder des ganzen Körpers kommen nicht zu Stande, so lange die Möglichkeit zu genügender Bekleidung, ausgiebigen Muskelbewegungen und reichlicher Nahrungsaufnahme gegeben ist. Erst wenn einer dieser Faktoren versagt, z. B. im Schlaf, ferner wenn Störungen des Verdauungsapparates vorliegen und nicht reichlich Nahrung assimiliert werden kann, droht Gefahr für die Gesundheit und das Leben.

Zunächst entsteht dann eine merkliche Abkühlung der peripheren Körpertheile. Die Blutgefässe der Haut erscheinen hier Anfangs contrahirt; dann aber tritt Gefässlähmung, Hyperämie und Schwellung und gleichzeitig um so stärkere Entwärmung ein. Bei weiterer Kälteeinwirkung erfolgt dann Erfrieren der peripheren Theile und damit eine Zerstörung der zelligen Elemente und mehr oder weniger ausgedehnte Nekrose. Während dieser Process an den Extremitäten abläuft, macht sich gleichzeitig in Folge der ausgedehnten Contraction der Hautgefässe Congestion in Lunge und Gehirn geltend, und in Folge dessen Beklemmung und Kopfschmerz. In späteren Stadien steigern sich die Cerebralsymptome; es tritt Schwindel, Betäubung ein und schliesslich der Tod durch Lähmung der nervösen Centralorgane.

Am leichtesten kommt eine derartige Kältewirkung zu Stande bei stark bewegter kalter Luft; eine Temperatur von -30° bei Windstille ist weniger empfindlich als eine Temperatur von -10° bei starkem Wind. Ferner kann bei relativ hoher Luftwärme starke Abkühlung des Körpers erfolgen durch intensive Ausstrahlung; bei völlig heiterem Himmel vermögen selbst Tropennächte zum Erfrieren zu führen. In hohem Grade unterstützt wird der schädigende Einfluss der Kälte durch Alkoholgenuss, der zwar Hyperämie der Haut und dadurch zunächst Wärmegefühl, aber dann auch um so vermehrte Wärmeabgabe herbeiführt.

Bei geringerem Grade der Einwirkung können durch niedere Temperaturen **Erkältungskrankheiten** hervorgerufen werden.

Ueber das Wesen der Erkältung haben wir noch wenig sichere experimentell begründete Vorstellungen. Wir dürfen annehmen, dass Erkältungen wesentlich durch intensive oder anhaltende Wärmeentziehungen von der Haut zu Stande kommen, die zu fühlbarer Abkühlung der Hautnerven führen. Eine directe Schädigung der Schleimhäute des Respirationstractus durch kalte Luft scheint gar nicht oder selten Ursache von Erkältungen

dieser Organe zu sein, da das Hinaustreten aus dem 20° warmen Zimmer in kalte Winterluft bei genügendem Hautschutz keine Störung zu veranlassen pflegt. Betrachtet man die Wirkung eines Kältereizes auf die Haut, so resultirt zunächst allerdings Zusammenziehung der Blutgefäße und Anämie der Haut, aber dieser Zustand dauert nur sehr kurze Zeit; normaler Weise tritt sehr rasch eine Reaktion ein: die Haut röthet sich und wir bekommen Wärmeempfindung, d. h. es haben die vom Kältereiz getroffenen Hautnerven vasomotorische Centren zur Wiedererweiterung der Hautgefäße angeregt. In dieser Reaktion liegt vermuthlich unser normaler Schutz gegen Kältewirkung; ihr ist es zu danken, dass ein eigentliches Kältegefühl in den Hautnerven gar nicht zu Stande kommt. In typischer Weise sehen wir einen solchen Reaktionsvorgang verlaufen z. B. bei einer kalten Uebergiessung des Körpers.

Nun aber können die Hautnerven durch Verweichlichung, d. h. durch Mangel an Uebung erschaffen; sie dürfen nicht für zu lange Zeit des Kältereizes und der Auslösung der Reaktion entwöhnt werden. Es tritt das besonders hervor bei solchen Körpertheilen, welche für gewöhnlich bedeckt und gegen Kältewirkung geschützt gehalten werden. Während Hände und Gesicht sich stets reaktionsfähig zeigen, vermögen die Hautnerven einer Halapartheie, welche durch warme Kleidung vor Kältereizen bewahrt war, keine Reaktion zu zeigen, sobald der Hals ausnahmsweise entblösst und von kalter Luft getroffen wird. Andererseits wird die Reaktion unterstützt durch Uebung der Haut, durch systematische Gewöhnung an normale Kältereize, z. B. kalte Abwaschungen. — Ferner kann durch Körperbewegung einem schädlichen Einfluss der Kältewirkung vorgebeugt werden, weil dann durch die beschleunigte Circulation und die Gefässerregung der Haut mehr Wärme zugeführt und die Kälteempfindung gehindert wird. Bei Körperruhe dagegen, und besonders im Schlaf, kommt es viel leichter zu einem Versagen der schützenden Reaktion.

Eine schädliche Kältewirkung entsteht, sobald fühlbare Abkühlung der Haut eintritt. Diese Erscheinung tritt ein bei jeder zu lange anhaltenden Kältewirkung auf ausgedehntere Hautparthien. In Folge der Hauthyperämie kommt es zu gesteigerter Wärmeabgabe, schliesslich fehlt für die massenhafte Abfuhr der entsprechende Ersatz und es kommt eine fühlbare Abkühlung der Haut zu Stande, die dann wieder eine Contraction der Blutgefäße herbeiführt. — Weit häufiger kommen aber lokale Wärmeentziehungen von kleineren empfindlichen Hautbezirken aus in Betracht. Die vorerwähnten, gewöhnlich geschützten und an Kälte nicht gewöhnten Körpergegenden; ferner die peripher gelegenen Theile und namentlich die Füße, die relativ am schwersten auf normaler Wärme zu erhalten sind, können bei sonst warmem Körper eine fühlbare Abkühlung erfahren.

Eine besondere Gefahr liegt ferner dann vor, wenn vorher durch Aufenthalt bei hoher Temperatur oder durch starke Muskelarbeit Hyperämie der Haut und Schweisssekretion eingetreten war und nun bei Körperruhe stärkere theilweise Abkühlung eintritt. Unter solchen Verhältnissen pflegt die schützende Reaktion völlig zu versagen; um so leichter, je ausgiebiger der schwitzenden Haut durch Verdunstung Wärme entzogen wird. — Ferner löst eine allmähliche, aber anhaltende locale Wärmeentziehung, wie sie z. B. durch feuchte Kleidung und Schuhwerk zu Stande kommt, bei vielen Menschen Kältegefühl aus. Manche zeigen endlich eine besondere Empfindlichkeit gegen die durch bewegte und auf beschränkte Stellen des Körpers auftreffende Luft erfolgende Wärme-

entziehung („Zugluft“). Zuweilen können Neuralgien innerhalb weniger Stunden nach vorübergehender Einwirkung solcher Zugluft sich einstellen.

Sobald diese Kältereize ein Erkalten der Nervenenden der Haut herbeiführen, resultiren von diesen aus reflektorisch Störungen in den vasomotorischen Centren. In welcher Weise dann die bei den katarrhalischen Krankheiten beobachteten pathologischen Aenderungen der Schleimhäute zu Stande kommen, darüber fehlt es noch an begründeten Vorstellungen. An den sich entwickelnden Krankheitsprocessen betheiligen sich schliesslich in hervorragender Weise die Mikroorganismen, welche in den normalen Sekreten vorhanden und nur gegenüber der völlig intakten Schleimhaut ohne Gefahr sind. Ausbreitung und Verlauf des Krankheitsprocesses pflegen ganz von der Art der zufällig vorhandenen Bakterien abhängig zu sein.

Diejenigen Witterungsverhältnisse, welche am leichtesten zu Erkältungskrankheiten Anlass geben, sind:

1) heftige, kühle Winde. Dieselben können im Freien trotz aller Schutzvorkehrungen zu starke Entwärmung des Körpers veranlassen, sie können selbst in den Wohnräumen sich fühlbar machen und eventuell Zugluft bewirken;

2) plötzliche Temperaturschwankungen. Nicht etwa die Schwankungen, die sich im Laufe eines Jahres oder eines Monats vollziehen, und denen wir durch unsere künstlichen Regulireinrichtungen vollauf begegnen können; sondern Schwankungen, die so rasch zu Stande kommen, dass eine entsprechende Regulirung der künstlichen Einrichtungen zur Erhaltung der Eigenwärme, Kleidung, Heizung u. s. w., auf Schwierigkeiten stösst. In dieser Beziehung ist nicht nur plötzlicher Abfall der Temperatur bedeutungsvoll, sondern auch plötzliche Steigerung; denn diese führt dann leicht zu einer Ueberhitzung des Körpers und im Gefolge davon zu einer um so leichteren Schädigung durch kühlere Winde.

3) Niederschläge, welche zu Bodennässe und zur Durchnässung des Schuhzeugs, oder zur Durchfeuchtung der Kleidung und damit zu abnormer Wärmeentziehung führen.

Als besonders für Erkältungskrankheiten disponirende Klimate werden wir bezeichnen dürfen:

1) ein feuchtes tropisches Klima, in welchem es während des grössten Theils des Jahres an normalen Kältereizen fehlt, und in welchem daher eine Verweichlichung der Haut zu Stande kommt. In solchem Klima kann eine Temperaturerniedrigung von 30° auf 24°, namentlich wenn gleichzeitig die Luft bewegt ist, schon Frostschaer und Erkältungen auslösen;

2) ein Klima, in welchem heftige kalte Winde und Niederschläge mit Bodennässe vorherrschen;

3) ein Klima, welches vielfache plötzliche Schwankungen der Temperatur darbietet. Zwar lässt sich schliesslich allen Schwankungen durch genaue Anpassung der künstlichen Schutzvorrichtungen begegnen, und bei fehlerfreier Handhabung dieser Vorrichtungen braucht auch ein an Schwankungen reiches Klima nicht zu Erkältungen zu führen. Aber je vielseitiger der anzuwendende künstliche Apparat ist, je häufiger eingreifende Regulirungen erforderlich sind, um so leichter werden Missgriffe und schädigende Temperatureinflüsse zu Stande kommen. Besonders bedenklich sind Perioden abnormer Witterung — Eintritt grösserer Wärme zur Winterszeit, Rückfall von Kälte während des Sommers —, weil sie in überraschender Weise eine völlige Aenderung unserer Gewohnheiten erfordern.

Die bisherigen meteorologischen Daten geben uns leider einen nur sehr unvollkommenen Aufschluss über diese hygienisch interessanten Schwankungen der Temperatur. Die am sorgfältigsten registrirten Jahreschwankungen und Monatschwankungen sind für uns nur von sehr geringem Interesse. Weit wichtiger erscheint die Veränderlichkeit der Temperatur im Laufe des Tages und die Veränderlichkeit von Tag zu Tag.

Auch diese Ausdrücke kommen aber nicht zur richtigen Darstellung, wenn nur die Mittelwerthe angegeben werden. Die durchschnittliche tägliche Amplitude bewegt sich z. B. in München zwischen 4° und $9,4^{\circ}$; an einigen Tagen kommen dagegen Tagesschwankungen von $22-23^{\circ}$ vor. Gerade diese mehr vereinzelt excessiven Schwankungen sind es aber, die uns interessiren. Ebenso müssen wir auch bei der Veränderlichkeit von Tag zu Tag die Intensität der Schwankungen unverwischt zum Ausdruck zu bekommen suchen.

Ferner sind Schwankungen von gleicher Intensität nicht gleichwerthig, wenn sie in verschiedener Temperaturlage und zu verschiedener Tageszeit verlaufen. Ein Temperaturabfall von 26° auf 16° erfordert bei weitem nicht so eingreifende Aenderung unserer Gewohnheiten und das Inangsetzen so neuer Regulirvorrichtungen, wie ein solcher von 16° auf 6° ; und wiederum ist die Wirkung auf den Menschen viel leichter störend, wenn die Aenderung etwa zwischen Mittag und Abend, als wenn sie über Nacht sich vollzieht. Ebenso sind Schwankungen unter 0° weit weniger bedenklich, als solche, die von 0° in die Temperaturlage von $+ 8^{\circ}$ bis $+ 10^{\circ}$ heraufreichen; ohne sehr aufmerksame Regulirung der Kleidung und Wohnung führen diese letzteren äusserst leicht zu Ueberhitzung des Körpers.

Vor allem ist es aber für die Beurtheilung der einzelnen Schwankung noch sehr wichtig, in welcher Weise sich gleichzeitig die übrigen klimatischen Faktoren verhalten. Es ist oben hervorgehoben, dass in erster Linie der Wind und daneben die Feuchtigkeit eine wesentliche Rolle beim Zustandekommen der Erkältungskrankheiten spielen. Gleiche Temperaturen haben einen ganz verschiedenen entwärmenden Effekt, je nachdem sie das eine Mal von heftigen Winden, das andere Mal von ruhigem und trockenem Wetter begleitet sind. Es wäre dringend erwünscht, den entwärmenden Einfluss namentlich des Windes so zu berücksichtigen, dass der jeweiligen Entwärmung unseres Körpers dadurch Rechnung getragen wird. — Auch bei den Wirkungen excessiv

hoher und niedriger Temperaturen sind, wie wir oben gesehen haben, stets andere klimatische Faktoren gleichzeitig betheiligt.

Erst durch eine wesentlich andere Art der Registrirung können daher die hygienisch interessanten Beziehungen der Lufttemperatur richtig erkannt werden (vgl. S. 128).

B. Die Luftfeuchtigkeit.

Verhalten des Wasserdampfes in der Luft. Der beim Verdunsten des Wassers gebildete Wasserdampf vertheilt sich gleichmässig in der Luft und übt dort einen gewissen Druck aus, so dass das Barometer um einige Millimeter fallen müsste, wenn die Luft plötzlich getrocknet würde. Die Menge des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes kann durch den von demselben ausgeübten Druck (Spannung, Tension) gemessen werden; man giebt daher die Wasserdampfmenge gewöhnlich in Millimetern Quecksilbersäule an. — Mit steigender Temperatur vergrössert sich das Aufnahmevermögen der Luft für Wasserdampf; je heisser daher die Luft, um so höher kann der Druck des Wasserdampfes steigen. Für jeden Temperaturgrad ist aber die Aufnahmefähigkeit der Luft für Wasserdampf scharf begrenzt, es existirt für jeden Grad ein Zustand der Sättigung mit Wasserdampf oder der maximalen Tension des Wasserdampfes; sobald Temperaturerniedrigung eintritt, muss Condensation von Wasserdampf oder Thaubildung eintreten, da nunmehr die der höheren Temperatur entsprechende Wasserdampfmenge nicht mehr von der kälteren Luft in Dampfform behalten werden kann (vgl. die Tabelle im Anhang).

Für gewöhnlich aber ist die Luft nicht mit Wasserdampf gesättigt, sondern enthält eine geringere Menge, so dass bei der betreffenden Temperatur noch mehr in Dampfform aufgenommen werden könnte. Um den daraus resultirenden Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre zu beurtheilen, bestimmt oder berechnet man folgende Grössen:

1) Die absolute Feuchtigkeit, d. h. diejenige Menge Wasserdampf in Millimetern Hg oder in Gramm oder Liter pro 1 cbm Luft ausgedrückt, welche zur Zeit wirklich in der Luft enthalten ist. Dieser Ausdruck bildet gewöhnlich die Grundlage für die Berechnung der übrigen Faktoren.

2) Die relative Feuchtigkeit oder die Feuchtigkeitsprocente geben die vorhandene Feuchtigkeit an in Procenten der für die betreffende Temperatur möglichen maximalen Feuchtigkeit. Bezeichnet man die maximale Feuchtigkeit mit F , die absolute mit F_0 , so sucht die relative Feuchtigkeit das Verhältniss $\frac{F_0}{F}$ anzugeben oder in Procenten berechnet $\frac{100 F_0}{F}$.

3) Das Sättigungs(Spannungs-)deficit; misst die Differenz zwischen maximaler und wirklich vorhandener absoluter Feuchtigkeit, also $F - F_0$; dasselbe wird ausgedrückt entweder in Millimeter Quecksilber (Spannungsdeficit) oder in Gramm Wasserdampf auf 1 cbm Luft (Sättigungsdeficit). Beide Ausdrücke zeigen geringe, für gewöhnlich zu vernachlässigende Differenzen; im Folgenden wird der Ausdruck Sättigungsdeficit auch für die Spannungsdifferenz gebraucht.

4) Der Thaupunkt, d. h. diejenige Temperatur, für welche augenblicklich die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist, oder: für welche F_0 die Bedeutung von F hat. Sobald diese Temperatur um ein Minimum erniedrigt wird, muss Condensation, Thaubildung eintreten. Die Thaupunktsbestimmung dient wesentlich zur Wetterprognose.

Methoden zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.

1) **Bestimmung durch Wägung des Wasserdampfs**, welcher aus einem gemessenen Luftvolum durch Schwefelsäure oder Calciumchlorid absorbiert ist.

2) **Condensationshygrometer**; bestimmen den Thaupunkt und aus diesem mit Hilfe der oben gegebenen Tabelle die absolute Feuchtigkeit. Ein kleines cylindrisches Gefäß, welches aussen mit einer glänzend polirten Silberkleidung versehen ist, wird künstlich abgekühlt; mit Hilfe von empfindlichen Thermometern wird genau beobachtet, bei welcher Temperatur Thaubildung auf der Silberfläche eintritt. (DANIEL, REGNAULT.)

3) **Haarhygrometer**; entfettete Haare oder Strohfasern oder Streifen hierischer Membranen verkürzen sich bei relativ trockener Luft und verlängern sich mit steigender relativer Feuchtigkeit. Sie können leicht in passender Weise aufgehängt und mit einem Zeiger verbunden werden, der sich auf einer Skala bewegt; die Zahlen der empirisch geachteten Skala geben dann direct die Feuchtigkeitsprocente an. Die Instrumente sind sehr veränderlich und müssen häufig controlirt werden.

4) **Atmometer**; messen das in der Zeiteinheit von einer bekannten Fläche verdunstete Wasser und, da dieses in ruhiger Luft und bei gleichem Luftdruck von dem Sättigungsdeficit abhängt, liefern sie directe Bestimmungen dieses Ausdrucks. Mit den bisher construirten Atmometern sind jedoch zuverlässige Angaben nicht zu erhalten.

5) **Psychrometer**. Man beobachtet zwei Thermometer, von welchen die Kugel des einen mit Musselin umhüllt und mit Wasser befeuchtet ist; an dem feuchten Thermometer wird Wasser verdunstet und zwar um so energischer, je trockener die Luft und je niedriger der Barometerstand ist; entsprechend dem Grade der Wasserverdunstung wird mehr oder weniger Wärme latent und das feuchte Thermometer muss eine um so niedrigere Temperatur gegenüber dem trockenen Thermometer zeigen, je austrocknender die Luft wirkt. Man wartet bis das feuchte Thermometer seinen tiefsten Stand erreicht hat, liest dann ab und berechnet aus der Temperatur des trockenen und des feuchten Thermometers nach einer einfachen Gleichung oder mit Hilfe von Tabellen die absolute Feuchtigkeit.

Das Psychrometer liefert ungenaue Angaben, sobald die Windgeschwindigkeit, welche die Verdunstung gleichfalls energisch beeinflusst, wechselt. Vergleichbare Werthe erhält man daher sowohl im Freien, wie besonders in der Zimmerluft nur dann, wenn man stets einen Luftstrom von gleicher Geschwindigkeit über die feuchte Kugel streichen lässt. Dies lässt sich erreichen durch ASSMANN'S Aspirationspsychrometer, bei welchem neben dem S. 92 beschriebenen trockenen Thermometer sich noch ein solches mit befeuchteter Kugel befindet. — Oder man befestigt das feuchte Thermometer an einer 1 m langen Schnur und schwingt es einmal pro Sekunde im Kreise. Mit einem solchen Schleuder-Psychrometer, das für hygienische Untersuchungen das brauchbarste Instrument ist, erhält man ausreichend genaue Werthe (s. Anhang).

Vertheilung der Luftfeuchtigkeit auf der Erdoberfläche.

1) Die Menge der absoluten Feuchtigkeit hängt vor allem ab von der Temperatur, sodann von der Möglichkeit zu reichlicher Wasser-

verdunstung. Maximal ist sie z. B. im mexikanischen Meerbusen bei windstillem Wetter; das Minimum finden wir in den Polargegenden.

Oertliche Vertheilung der Luftfeuchtigkeit.

	Mittlere absolute Feuchtigkeit (in mm)	Mittlere relative Feuchtigkeit (Procente)	Mittleres Sättigungs- deficit (in mm)
Archangel	3.8	80	0.9
St. Petersburg	4.8	82	1.1
Königsberg	6.4	80	1.8
Kiel	6.7	82	1.5
Borkum	7.8	86	1.4
Berlin	6.8	74	2.6
Darmstadt	7.0	75	2.7
Breslau	6.6	75	2.5
Basel	6.7	75	2.2
Wien	6.9	72	2.1
Athen	9.1	62	5.6
Odessa	6.8	76	2.1
Tiflis	8.0	67	3.9
Bombay	19.3	77	5.8
Lahore	11.5	52	10.6
New York	6.6	67	3.2
Philadelphia	7.0	68	3.3

Die Tagesschwankung der absoluten Feuchtigkeit verläuft in unseren Breiten an klaren Sommertagen so, dass kurz vor Sonnenaufgang das Minimum liegt, und zwar weil während der Nacht gewöhnlich Thaubildung eingetreten ist; dann steigt die absolute Feuchtigkeit in Folge der zunehmenden Wasserverdunstung bis etwa 9 Uhr Morgens, darauf erfolgt Abnahme bis 4 Uhr Nachmittags, weil sich unter dem Einfluss der stärkeren Erwärmung ein aufsteigender Luftstrom ausbildet, welcher einen Theil des Wasserdampfs mit sich fortführt. Von 4 Uhr ab sinkt die erkaltende Luft allmählich wieder abwärts und damit tritt Steigerung der Luftfeuchtigkeit ein bis etwa 9 Uhr Abends. Von diesem zweiten Maximum ab ist dann wieder ein Sinken der Feuchtigkeit in Folge von Condensation zu bemerken, so dass vor Sonnenaufgang das Minimum eintritt. Bei trübem Wetter wird der Gang dieser Curve mehr oder weniger verwischt; im Winter ist nur eine maximale Erhebung etwa um 2 Uhr Nachmittags und ein tiefster Stand zur Zeit des Sonnenaufgangs ausgeprägt.

Die Jahresschwankung verläuft so, dass wir im Januar die geringste, im Juli die höchste absolute Feuchtigkeit haben (s. Tab.).

2) Die relative Feuchtigkeit zeigt eine Tagesschwankung der Art, dass das Maximum (im Mittel 95 Procent Feuchtigkeit) zur Zeit des Sonnenaufgangs liegt. Von da nimmt sie allmählich ab, erreicht zwischen 2 und 4 Uhr das Minimum (50—60 Procent), um gegen Abend wieder zu steigen. Die Jahresschwankung zeigt im Ganzen nur geringe Differenzen; in unserem Klima haben wir im Winter die höchste relative Feuchtigkeit von 75—85 Procent; in den Sommermonaten das Minimum mit 65—75 Procent Feuchtigkeit. — Den geringsten Sättigungsprocenten, zwischen 20 und 40 Procent, begegnen wir im Frühjahr und Sommer zur Mittagszeit und bei östlichen Winden.

Jahreszeitliche Vertheilung der Luftfeuchtigkeit.

	Borkum			Königsberg			Darmstadt		
	Absol. Feucht.	Relat. Feucht.	Sätt.-Deficit	Absol. Feucht.	Relat. Feucht.	Sätt.-Deficit	Absol. Feucht.	Relat. Feucht.	Sätt.-Deficit
Januar . . .	4.5	90	0.5	3.5	88	0.4	4.2	83	0.9
Februar . . .	5.1	91	0.5	3.4	86	0.6	4.6	81	1.1
März . . .	5.2	86	0.8	3.8	82	0.8	4.7	73	1.7
April . . .	6.4	84	1.3	5.1	75	1.7	5.7	66	2.9
Mai . . .	7.8	81	1.8	7.0	71	2.9	7.4	64	4.2
Juni . . .	10.6	82	2.4	9.6	72	3.7	9.6	66	4.9
Juli . . .	12.0	82	2.6	10.9	74	3.8	11.1	68	5.3
August . . .	12.0	83	2.5	10.7	75	3.6	10.7	70	4.6
September . .	10.4	86	1.8	7.3	80	1.8	9.3	74	3.3
October . .	8.0	87	1.2	6.7	83	1.4	7.0	80	1.7
November . .	6.1	89	0.7	4.6	87	0.7	5.6	84	1.1
December . .	5.1	92	0.5	3.8	88	0.5	4.3	87	0.7

Die örtliche Vertheilung weist ebenfalls nur geringe Differenzen auf. Ueber den Continenten finden wir im Allgemeinen ein Jahresmittel von 70—80 Procent relativer Feuchtigkeit, an den Meeresküsten 80—90 Procent. — An der bekanntlich sehr trockenen Ostküste von Nordamerika beträgt die mittlere relative Feuchtigkeit noch nahezu 70 Procent. Die niedrigsten Zahlen, 25—30 Procent, werden beobachtet in Aegypten während der Chamsin weht; ferner an der Riviera in den Wintermonaten, wo sogar nur 15—20 Procent beobachtet werden, wenn der föhnartige, vom kälteren Hinterland aus die ligu-

rischen Alpen übersteigende und beim Absinken sich stark erwärmende Nordwind herrscht.

3) Das **Sättigungsdeficit** zeigt eine tägliche Periode, welche derjenigen der relativen Feuchtigkeit ähnlich ist, aber etwas grössere Excursionen macht. Die Jahresschwankung lässt ungeheuerere Differenzen hervortreten (s. Tabelle S. 109); im Juni und Juli ist das Sättigungsdeficit um 500—700 Procent grösser, als im December und Januar. An warmen Sommertagen mit östlichen Winden erhebt es sich nicht selten bis zu einer Höhe von 20 mm. — Auch örtlich treten sehr starke Differenzen hervor; schon auf unserem Continent ist die Lage an der Küste gegenüber dem Inneren durch ein erheblich geringeres Sättigungsdeficit ausgezeichnet; Darmstadt z. B. zeigt ein fast doppelt so grosses mittleres Sättigungsdeficit als Borkum.

Hygienische Bedeutung der Luftfeuchtigkeit.

Es liegt der Gedanke nahe, dass eine directe Wirkung der Luftfeuchtigkeit auf den menschlichen Organismus dadurch zu Stande kommt, dass die Wasserdampfabgabe und durch Vermittelung dieser auch die Wärmeabgabe vom Körper quantitativ abhängig ist vom Verhalten der Luftfeuchtigkeit.

Das vom Organismus abgegebene Wasser verlässt den Körper ungefähr zu gleichen Theilen in Form von Dampf, und in flüssiger Form im Schweiss, Harn und Koth. Ist die Verdampfung behindert, so steigert sich die Menge des im Schweiss und Harn ausgeschiedenen Wassers; ist die Verdampfung reichlich, so werden jene Sekrete spärlicher.

Ist der Ersatz des durch die Haut, den Harn oder den Darm ausgeschiedenen Wassers unzureichend, so tritt zunächst ein Gefühl der Trockenheit an der Zungenwurzel und am Gaumen auf; durch diese „Durstempfindung“ erfolgt vorzugsweise die Regulierung der Wasserzufuhr. Dieselbe Trockenheitsempfindung kann aber auch durch örtliche Eintrocknung hervorgerufen werden.

Die Wasserdampfabgabe vollzieht sich theils von den Athmungsorganen, theils von der Haut aus. Von den 1300 g (im Mittel) in Dampfform ausgeschiedenen Wassers entfallen etwa 400 g (in warmen Klimaten weniger) auf die Lunge, der Rest auf die Haut.

Bisher nahm man an, dass die Wasserdampfabgabe von der Haut abhängig sei von der Verdunstungsintensität der Luft; dass also die Haut sich nicht anders verhalte wie die todte feuchte Fläche des Atmometers, deren Wasserabgabe vom Sättigungsdeficit, vom Barometerstand und von der Luftbewegung abhängt.

Ein abweichendes Verhalten wurde nur für die Athmungsluft berechnet. Man nahm an, dass diese im Mittel mit einer Temperatur von 36—37° und gesättigt mit Wasserdampf ausgeathmet wird, einerlei, welche Temperatur und Feuchtigkeit die Aussenluft hat. Bei dieser Annahme enthält die Ausathmungsluft stets circa 41 g Wasserdampf pro 1 Cubikmeter, und die Menge des in den Lungen verdampften und der Einathmungsluft zugefügten Wassers ergibt

ch sonach, wenn die absolute Feuchtigkeit der Einathmungsluft von jenen l_g subtrahirt wird. Die Wasserdampfabgabe durch die Athmung ist daher nach der absoluten Feuchtigkeit der Luft zu bemessen.

Neuere Experimente von RUBNER zeigen aber, dass wir uns die Wasserdampfabgabe von den Flächen des lebenden Körpers nicht als einen passiven Vorgang vorstellen dürfen ähnlich der Verdunstung von todttem Substrat, sondern der Körper ist dabei ganz wesentlich aktiv betheilig. Auch die Abhängigkeit der Wasserabgabe seitens der Lungen von der absoluten Feuchtigkeit ist nicht als genau zutreffend anzusehen; die ganze mit der verdunstenden Oberfläche in Berührung kommende Athmungsluft wird nicht immer gleichmässig erwärmt und mit Wasserdampf gesättigt, und ausserdem muss die bei verschiedenen Körperzuständen sehr erheblich schwankende Menge der Athmungsluft die Grösse der Wasserabgabe alteriren.

Aus den physiologischen Versuchen ergibt sich bezüglich des Einflusses der äusseren Verhältnisse, dass die Gesamt-Wasserdampfabgabe *cet. par.* und namentlich bei gleichbleibender Temperatur von der relativen Feuchtigkeit abhängig ist. Bei gleicher relativer Feuchtigkeit ist dagegen die Wasserdampfabgabe vor allem von der Temperatur abhängig. Von 15° abwärts steigt sie, aber nur in Folge der Zunahme der Lungenabscheidung. Mit höherer Temperatur steigt die Wasserdampfausscheidung durch die Haut, und zwar von etwa 25° in steilerer Curve. — Wind setzt die Wasserdampfabgabe von der Haut bei 20 bis 35° erheblich herab; erst bei sehr hoher Temperatur wird sie gesteigert (WOLPERT). Der Luftdruck hat wenig Einfluss.

Neben den äusseren Verhältnissen ist von grosser Bedeutung der jeweilige Zustand des Organismus; und zwar haben den stärksten Einfluss Muskelarbeit und Ernährung. Durch Muskelarbeit kann die Wasserdampfabgabe auf das Mehrfache gesteigert werden. Die Ernährung zeigt ihren Einfluss namentlich bei höherer Temperatur. Bis $+15^\circ$ hat die relative Feuchtigkeit den wesentlichsten Einfluss, gleichgültig welcher Art die Ernährung ist. Von 25° aufwärts zeigt sich eine unbedingte Steigerung der Wasserdampfabgabe mit der Temperatur, selbst beim hungernden und wenig genährten Organismus. Für die zwischenliegenden Wärmegrade, bei denen wir uns gewöhnlich befinden, gilt aber das Gesetz, dass bei stärkerer Ernährung resp. überschüssiger Nahrung eine Steigerung der Wasserdampfabgabe mit der Temperatur schon von 15° ab beginnt und so bedeutend wird, dass die Temperatur das bestimmende Moment für die Wasserdampfabgabe ausmacht. Die Haut kommt dann früher in den sog. „aktiven“ Zustand.

Eine unter allen Umständen normale relative Feuchtigkeit kann in Folge dieser verschiedenartigen mitwirkenden Faktoren nicht angegeben werden. Indessen ist ein Ueberschuss der Wasserdampfabgabe vom Körper zweifellos von viel geringerer hygienischer Bedeutung als

eine Hemmung. Erstere führt höchstens zu vermehrtem Durstgefühl. Eine Hemmung der Wasserdampfabgabe ist dagegen mit einer Wärmerestauung verbunden, die bei höheren Temperaturgraden belästigend und gefährlich werden kann; und ausserdem erzeugen hohe Sättigungsprocente ein specifisches Gefühl der Beklemmung und Beängstigung; 70—80 Procent Feuchtigkeit werden schon bei 24° sehr schlecht ertragen, vollends bei Muskelarbeit und reichlicher Nahrung. — Bei 18—20°, Ruhe, gemischter Kost, fehlender Luftbewegung scheinen 40—60 Procent Feuchtigkeit am günstigsten zu sein; bei höheren Temperaturen 30—40 Procent. — Nur bei niederen Temperaturen unter 15° bewirkt feuchte Luft eine Vermehrung der Wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung im Vergleich zu kalter trockener Luft; erstere macht daher bei gleichem Temperaturgrad einen viel kälteren Eindruck. Eine Schwankung der Luftfeuchtigkeit um 12 $\frac{1}{2}$ Procent erzeugt eine ähnliche Vermehrung des Wärmeverlustes durch Leitung wie eine Verminderung der Temperatur um 1° (RUBNER). — Extrem niedrige Feuchtigkeitsprocente sind bei niedriger Temperatur ohne erhebliche Wirkung. Bei höheren Wärmegraden sind sie willkommen zur Erleichterung der Wärmeabgabe; störende Erscheinungen kommen nur vor, wenn bei sehr hohen, tropischen Temperaturen und heftigen Winden ein ungewöhnliches Austrocknen der unbedeckten Haut und der exponirten Stellen der oberflächlichen Schleimhäute eintritt, und durch starken Staubgehalt der Luft unterstützt wird.

Abgesehen von der geschilderten Beeinflussung der Wasserdampfabgabe und Wärmeabgabe des Körpers zeigt die Luftfeuchtigkeit aber noch eine Reihe von ausgesprochenen hygienischen Beziehungen, welche mit gewissen alltäglichen Beobachtungen über die Wirkung feuchter oder trockener Luft zusammenfallen. Wenn wir im gewöhnlichen Leben von trockener oder feuchter Luft sprechen, so wollen wir damit die austrocknende, das Wasser von freien Flächen zum Verdunsten bringende Kraft der Luft bezeichnen. Durch eine trockene Luft wird die Feuchtigkeit unserer Kleidung, der Schweiss, die Feuchtigkeit der Bodenoberfläche rasch verdunstet, es bildet sich Staub; Holz, Nahrungsmittel, die Vegetation vertrocknen. Gleichzeitig empfinden wir eine stärker austrocknende Luft daran, dass die Lippen und die Haut spröde werden, und dass bei offenem Munde und bei anhaltendem Sprechen Zunge und Gaumen eintrocknen und Durstempfindung auslösen.

Diese austrocknende Wirkung der Luft hat eine vielfache indirecte hygienische Bedeutung dadurch, dass die Bildung und Verbreitung von Luftstaub, die Lebensfähigkeit, die Vermehrung und Ver-

breitung der Mikroorganismen, die Wasserverhältnisse des Bodens u. a. m. von derselben abhängig sind. Bei trockener Luft hört die Vermehrung der auf dem Boden oder in irgend welchen feuchten Substraten lebenden Mikroorganismen auf; viele Arten werden sogar durch das Trocknen getötet; dafür werden aber die resistenteren mit dem Staub in die Luft übergeführt und durch Winde verbreitet. Stellt sich ferner an der Bodenoberfläche eine trockene Zone von einiger Mächtigkeit her, so sinkt das Grundwasser und jedes Tiefspülen von Niederschlägen oder Verunreinigungen in die unteren Bodenschichten hört auf. Auch die Bewohnbarkeit von Neubauten und Kellerwohnungen, die Conservirbarkeit mancher Nahrungsmittel u. s. w. ist wesentlich von der austrocknenden Kraft der Luft abhängig.

Es ist daher für die Hygiene auch von Interesse festzustellen, welcher unter den verschiedenen Ausdrücken für das Verhalten der Luftfeuchtigkeit die verdunstende Kraft der Luft gegenüber toten Flächen am richtigsten kennzeichnet.

Aus den oben gegebenen Zahlen für die örtliche und zeitliche Vertheilung der absoluten Feuchtigkeit geht ohne Weiteres hervor, dass dieselbe uns den gewünschten Maassstab nicht giebt, dass sie sich vielmehr eher gegensätzlich verhält.

Ebensowenig wird die austrocknende Wirkung der Luft durch die relative Feuchtigkeit gemessen. Wir machen stets die Erfahrung, dass die trocknende Wirkung der Luft im Hochsommer der des Winters um ein ganz Bedeutendes überlegen ist, viel mehr als dies in den S. 109 aufgeführten zeitlichen Differenzen der relativen Feuchtigkeit hervortritt. Ferner weisen vielfache Erfahrungen der Bewohner der westlichen Vereinigten Staaten (z. B. das schnelle Austrocknen der Neubauten, der Wäsche, aufbewahrten Brodes u. s. w.) darauf hin, dass dort eine ganz erheblich trocknere Luft herrscht als auf unserem Continent; trotzdem ist die relative Feuchtigkeit dort kaum geringer als z. B. in Wien. — Die eminent austrocknende Wirkung des Chamsin ist vollauf bekannt, und doch zeigt hier die Luft immer noch höhere relative Feuchtigkeit als in den Wintermonaten an der Riviera, wo weder Menschen noch Vegetation unter austrocknender Luft zu leiden haben.

Für diese austrocknende Wirkung der Luft giebt vielmehr das Sättigungsdeficit einen richtigen Ausdruck. Die Intensität der Wasserverdunstung ist *cet. par.* der Grösse des Sättigungsdeficits proportional; je grösser der noch nicht mit Wasserdampf gefüllte Raum ist ($P - F_s$), um so energischer austrocknend wirkt die Luft. Im Grunde

sind zwar für die Verdunstung noch zwei andere Faktoren in Betracht zu ziehen, die Luftbewegung und der Luftdruck. Abgesehen vom Höhenklima kommen aber bedeutende Differenzen des Luftdrucks auf der Erdoberfläche nicht vor; und es sind daher im Freien nur Sättigungsdeficit und Wind, in geschlossenen Räumen und bei Windstille sogar das Sättigungsdeficit allein maassgebend für die Verdunstung.

Die zeitliche und örtliche Vertheilung des Sättigungsdeficits harmonirt in der That mit allen unseren Erfahrungen über die Verschiedenheiten in der austrocknenden Wirkung der Jahreszeiten und Klimata. Die starken zeitlichen Differenzen stimmen mit der Thatsache überein, dass wir im Sommer ein viel schnelleres Austrocknen beobachten als im Winter; die starken örtlichen Differenzen entsprechen den Unterschieden des continentalen und des Seeklimas in Bezug auf trocknende Wirkung der Luft.

Auch das aus der relativen Feuchtigkeit in keiner Weise erklärliche Verhalten der Luftfeuchtigkeit im Westen der Vereinigten Staaten, an der Riviera und in Aegypten findet volle Erklärung, sobald man die Luftfeuchtigkeit nicht durch die relative Feuchtigkeit, sondern durch das Sättigungsdeficit misst. Der Unterschied beider Ausdrücke liegt eben wesentlich darin, dass bei gleicher relativer Feuchtigkeit, aber wechselnder Temperatur, das Sättigungsdeficit ausserordentlich verschieden ausfällt und dass im Sättigungsdeficit der Einfluss der Temperatur gleichsam mitgehalten ist. Bei $+5^{\circ}$ repräsentirt eine relative Feuchtigkeit von 70 Procent eine gar nicht austrocknende Luft von 2 mm Sätt.-Def., bei 35° dagegen eine sehr stark trocknende Luft von 12 mm Sätt.-Def.

Im Osten der Vereinigten Staaten haben wir zwar ungefähr gleiche relative Feuchtigkeit wie bei uns, aber durchschnittlich erheblich höhere Temperatur, und daraus ergibt sich ein erheblich grösseres Sättigungsdeficit. Bei uns haben wir im Juli eine mittlere Temperatur von 18° und 68 Procent Feuchtigkeit, in Philadelphia dagegen 24.4° und 60 Procent Feuchtigkeit; das Sättigungsdeficit beträgt dann bei uns 4.9 mm, an letzterem Orte 9.1 mm; dementsprechend ist die austrocknende Wirkung der Luft etwa doppelt so gross. — Ebenso erklärt sich jetzt das paradoxe Verhalten Aegyptens und der Riviera. Der Chamsin zeigt bei 25—30 Procent Feuchtigkeit eine Temperatur von circa 40° , das Sättigungsdeficit beträgt alsdann 40 mm; eine Zahl, welcher man eben nur in der vegetationslosen Wüste begegnet; dazu kommt noch die Wirkung der lebhaften Windbewegung. An der Riviera beobachten wir dagegen 20 Procent Feuchtigkeit bei einer gleichzeitigen

Durchschnittstemperatur von etwa 10° ; das Sättigungsdeficit beträgt alsdann 7 mm, d. h. dasselbe ist immerhin noch so gering, dass von einer stark austrocknenden Wirkung nicht die Rede sein kann. — Wie schon erwähnt, sind übrigens die belästigenden Wirkungen des Chamsin und des Sirocco zu einem wesentlichen Theile durch die ungeheuren Staubmassen bedingt, mit denen die Luft während des Herrschens jener Winde erfüllt zu sein pflegt.

Im hygienischen Interesse ist somit eine Messung und Registrirung der absoluten Feuchtigkeit kaum indicirt; Bedeutung kommt dagegen für die Funktionen der Wasserdampf- und Wärmeabgabe vom Körper der relativen Feuchtigkeit zu; und neben dieser ist das Sättigungsdeficit maassgebend für die austrocknende Wirkung der Luft.

Die bisherige Registrirung der Luftfeuchtigkeit leidet unter ähnlichen Fehlern wie die der Wärme. Dadurch, dass stets nur Mittelwerthe berechnet werden, tritt ein Verwischen der einzelnen bedeutungsvollen Phasen ein; und bei jeder Einzelbeobachtung müsste die gleichzeitige Wirkung anderer einflussreicher Faktoren, z. B. des Windes, mit zum Ausdruck gebracht werden.

C. Der Luftdruck.

Messung des Luftdrucks. Wir messen den Druck der Luft gewöhnlich durch die Höhe einer Quecksilbersäule, welche der auf uns lastenden Luftsäule das Gleichgewicht hält (Quecksilberbarometer); oder durch sogenannte Holosteric-(Aneroid-)Barometer, bei welchen eine flache Dose aus elastischen Metall-Lamellen einen barometrischen Cylinder bildet, dessen Wandungen je nach der Stärke des Luftdrucks Excursionen ausführen. Die Barometerablesungen an verschiedenen Orten und zu verschiedener Zeit sind nur bei derselben Temperatur unter einander vergleichbar. Nach jeder Ablesung ist dementsprechend eine Reduction der Barometerangabe auf 0° , am einfachsten mit Hilfe von Tabellen, vorzunehmen.

Höhe einer Luftsäule, deren Druck 1 mm Hg das Gleichgewicht hält.

Barometerstand	+ 30°	+ 20°	+ 10°	0°	- 10°
760 mm	11.5 Meter	11.1 Meter	10.7 Meter	10.2 Meter	9.8 Meter
760 „	11.8 „	11.4 „	10.9 „	10.5 „	10.1 „
740 „	12.1 „	11.7 „	11.2 „	10.8 „	10.4 „
720 „	12.4 „	12.0 „	11.6 „	11.1 „	10.7 „
700 „	12.8 „	12.3 „	11.9 „	11.4 „	11.0 „
680 „	13.2 „	12.7 „	12.2 „	11.8 „	11.3 „

Will man, wie es bei meteorologischen Beobachtungen gewöhnlich der Fall ist, aus den Barometerbeobachtungen verschiedener Orte auf die augenblicklich vorhandenen Gleichgewichtsstörungen im Luftmeer schliessen, so muss vorher

noch ein wichtiger lokaler Einfluss eliminirt werden, nämlich die Höhenlage des Ortes. Mit der Erhebung über die Erdoberfläche nimmt der Luftdruck in geometrischer Progression ab; und um daher vergleichbare Zahlen zu erhalten, müssen die sämtlichen Beobachtungszahlen auf das Meeresniveau reducirt werden. Dies geschieht entweder mit Hilfe von complicirten Formeln, oder einfacher durch Tabellen, welche wenigstens eine annähernde Reduktion auszuführen gestatten. Als Beispiel sei auf die obenstehende, stark abgekürzte Tabelle verwiesen, welche angiebt, wie hoch eine Luftsäule ist, deren Druck 1 mm Hg beträgt, und zwar bei verschiedenem Barometerstand und bei verschiedenen Wärmegraden. Je nach der Temperatur und dem Luftdruck, welche während einer Ablesung geherrscht haben, sucht man in der Tabelle den Werth für die Höhe einer Luftsäule, welche im concreten Falle eine Druck-Zu- oder Abnahme um 1 mm Hg bewirkt. Dividirt man dann die Höhenlage des Ortes durch die so gefundene Zahl von Metern, so findet man diejenigen Millimeter Quecksilber, welche dem abgelesenen Barometerstand hinzu zu addiren sind, um den Barometerstand im Meeresniveau zu erhalten.

Oertliche und zeitliche Vertheilung des Luftdrucks.

Die Tagesschwankung des Luftdrucks ist in der gemässigten und kalten Zone geringfügig und unregelmässig. In den Tropen stellen sich zwei Maxima ein, am Vormittag und Abend, und zwei Minima, um 4 Uhr Früh und um 4 Uhr Nachmittags, ein. Dieser Gang der Tagesschwankung stimmt überein mit der Curve der absoluten Feuchtigkeit, und ist wesentlich dadurch bedingt, dass mit zunehmender Wärme ein aufsteigender Luftstrom und ein seitliches Abfliessen der Luft in die oberen Schichten sich einstellt, dass dagegen am Abend wieder ein Absinken der erkaltenden Luft erfolgt.

Die Monats- und Jahresschwankung zeigt in unserem Klima das Minimum im Sommer, das Maximum im Winter. Die monatliche Amplitude beträgt bei uns etwa 12—20 mm; die Jahresamplitude macht in maximo 30—40 mm aus; zwischen den Extremen mehrerer Jahre können 46—50 mm Differenz liegen, die aber immerhin erst eine Excursion um 6 Procent des gesammten Luftdrucks repräsentiren.

Die örtliche Vertheilung des Luftdrucks wird registrirt durch Isobaren, d. h. Linien, welche die Orte mit gleichem Luftdruck resp. mit gleichem Monatsmittel des Luftdrucks verbinden (die Barometerstände auf Meeresniveau reducirt). Eine Karte der Isobaren zeigt nicht wie eine Isothermenkarte Linien, welche im Allgemeinen den Breitengraden parallel laufen, sondern einzelne geschlossene Kreise, um welche concentrisch in grösserem oder geringerem Abstand die übrigen Isobaren erfolgen. Es existiren sonach lokal begrenzte Maxima und Minima, und von diesen Centren aus steigt oder fällt der Luftdruck nach allen Richtungen hin. Auch die örtliche Vergleichung lässt

indessen nur eine geringe Amplitude der Schwankungen erkennen; dieselben bewegen sich zwischen 740 und 770 mm, betragen also höchstens 2—3 Procent des gesammten Luftdrucks.

Weitaus stärkere Schwankungen resultiren aus der Höhenlage des einzelnen Ortes. Im Mittel bewirkt jede Erhebung um 11 m eine Druckabnahme um 1 mm, jedes Hinabsteigen unter das Meeresniveau eine entsprechende Steigerung.

Folgende mittlere Barometerstände sind an dauernd bewohnten hochgelegenen Ortschaften beobachtet:

Mexico	2270	Meter	586	mm	Hg
Quito	2850	"	549	"	"
Pikes Peak (Colorado, N.-Am.)	4300	"	451	"	"
Dorf S. Vincente (bei Portugalete, Bolivia)	4580	"	436	"	"
Kloster Hanle (Tibet)	4610	"	433	"	"

Bei vorübergehendem Aufenthalt wurden noch niedrigere Ablesungen erhalten: so von Gebr. SCHLAGINTWEIT im Himalaya bei 6780 m Höhe = 340 mm Hg; von GLAISHER im Luftballon bei 8840 m Höhe = 248 mm Hg.

Andererseits sind Menschen in tiefen Bergwerken bei oft langdauerndem Aufenthalt und anstrengender Arbeit einem um 50 mm und mehr über das Normale gesteigerten Luftdruck ausgesetzt. Noch höherer Druck kommt in den sogenannten Caissons zu Stande, mit deren Hilfe Arbeiten unter Wasser ausgeführt werden. Die Arbeiter sind hier stundenlang einem Druck von 2—3 Atmosphären ausgesetzt; ferner kommt es in den Taucherglocken zu einem Druck von 6 bis 7 Atmosphären (vgl. im IX. Kap.). Die oben aufgeführten örtlich und zeitlich wechselnden Druckschwankungen des Luftmeeres verschwinden fast gegenüber diesen enorm grossen Excursionen.

Hygienische Bedeutung der Luftdruckschwankungen.

1) **Stark gesteigerter Luftdruck** ruft zunächst eine Verlangsamung und Vertiefung der Athmung hervor; gleichzeitig wird das Blut von der Peripherie des Körpers zu den inneren Organen hingedrängt; der Puls wird ein wenig verlangsamt. Bei geschlossener Tube wird das Trommelfell eingewölbt und dadurch das Gehör beeinträchtigt. Sprechen und Pfeifen ist erschwert, auch die sonstige Muskelarbeit etwas behindert. Alle diese Erscheinungen gleichen sich unter normalem Luftdruck bald wieder aus, nur bei längerem Aufenthalt bleibt abnorme Ausdehnung der Lunge leicht bestehen.

Ausser der Druckwirkung kommt noch der Einfluss der vermehrten Sauerstoff-Aufnahme in Frage. Da comprimirt Luft in 1 cbm eine dem stärkeren Druck entsprechend grössere Gewichtsmenge Sauerstoff enthalten muss, als weniger dichte Luft; da aber das eingeathmete Luftvolum mindestens das gleiche bleibt, so müsste eine stärkere Sauerstoffaufnahme erfolgen.

In der That wird beim Aufenthalt in comprimirt Luft das Venenblut heller; zu einer erheblichen Vermehrung des Blutsauerstoffs kommt es jedoch nicht, da das Hämoglobin schon bei etwa 400 mm Hg-Druck mit Sauerstoff gesättigt ist und eine vermehrte Aufnahme von Sauerstoff daher nur mittelst einfacher Absorption im Plasma erfolgen kann.

Bedeutendere Schädigungen werden daher selbst durch sehr stark vermehrten Luftdruck nicht ausgelöst. Dagegen muss der Uebergang aus der comprimirt Luft in gewöhnliche mit grösster Vorsicht erfolgen; bei zu raschem Wechsel können durch plötzlichen Austritt der im Blut absorbirten Gase in Form von Gasblasen gefährliche Gefässverstopfungen entstehen. Ferner führt der Andrang des schnell in Haut und Schleimhäute zurückströmenden Blutes zu Gefässzerreissungen und eventuell zu Blutungen der Nase, der Lungen, des Magens u. s. w.

2) **Stark verminderter Luftdruck** wirkt theils durch die Druckabnahme, theils durch Verminderung der Sauerstoffzufuhr. Erstere verursacht Erweiterung der Haut- und Schleimhautgefässe. Dieselben können sogar zerreißen und Blutungen aus Zahnfleisch, Nase, Lungen hervorrufen. Das Trommelfell wölbt sich nach aussen, Athmung und Muskelbewegungen sind erleichtert. — Nicht ohne Bedeutung ist vielleicht unter manchen Verhältnissen die mit der Abnahme des Luftdrucks sich einstellende Erleichterung der Wasserverdampfung von der Haut, wenn dieselbe auch nicht gerade hohe Werthe erreicht.

Einflussreicher ist die verminderte Sauerstoffzufuhr (nach einigen Autoren ausserdem die Herabsetzung des CO_2 -Gehalts im Blute). In 2000—2500 m Höhe ist die im gleichen Luftvolum enthaltene Sauerstoffmenge schon um mehr als ein Viertel verringert; in 5000 m Höhe ist sie fast auf die Hälfte reducirt, so dass das gleiche Quantum Sauerstoff unter gewöhnlichem Luftdruck bei einem Gehalt der Luft von nur 11 Procent Sauerstoff aufgenommen werden würde; man kann also mit einem kurzen Ausdruck sagen, dass die Luft in 5000 m Höhe nur noch 11 Procent O enthält.

Diese rasche Sauerstoffverminderung müsste schon in ~~niedriger~~ Höhe von Einfluss auf den Körper sein, wenn sie nicht durch Be-

sohleunigung der Blutcirculation und Vermehrung der Athemfrequenz ausgeglichen würde. Der Puls steigt bei 1000 m Erhebung um 4—5, in 4000 m Höhe um 12—20 Schläge pro Minute (einige Beobachter behaupten, dass diese Zunahme sich bei längerem Aufenthalt in gleicher Höhe wieder verliere); die Athemfrequenz ist bei 4000 m nahezu verdoppelt; die Expirationsfähigkeit ist deutlich vermehrt. Ausserdem scheint aus den vielfach sich widersprechenden Versuchsergebnissen doch hervorzugehen, dass eine Zunahme der rothen Blutkörperchen und eine Vermehrung des Hämoglobingehalts des Blutes sich einstellt. In Folge dessen treten erfahrungsgemäss keine Symptome verminderter Sauerstoffzufuhr bis zu einer Höhe von circa 2000—2500 m auf.

Selbst in grösserer Höhe scheint aber noch ein dauernder Aufenthalt ohne Benachtheiligung des Körpers möglich zu sein in Folge einer allmählich sich ausbildenden, noch nicht genauer erkannten Anpassung des Organismus.

Erst in 4—5000 m Höhe ist schwächliche Constitution und verminderte Leistungsfähigkeit der Bewohner unausbleiblich; die Gesichtsfarbe wird blassgelb, die Muskeln sind schlaff, die Resistenz vermindert (Anoxyhémie JOURDANET's).

Bei vorübergehendem Aufenthalt in grösseren Höhen kommt es leichter zu Gesundheitsstörungen, weil den betreffenden Individuen jene Anpassung des Körpers fehlt. Es tritt dann hochgradige Ermüdung, Herzklopfen, Athemnoth, Schwindel, schliesslich Bewusstlosigkeit ein, oft kommt es zu Hämorrhagieen. An diesen Wirkungen ist sowohl die Druck- wie die Sauerstoffabnahme (vielleicht auch die geringere CO_2 -Spannung des Blutes) theilhaftig; die O_2 -Abnahme wohl am wesentlichsten, da bei Ballonfahrten die Erfahrung gemacht wurde, dass durch zeitweises Einathmen von reinem Sauerstoffgas die meisten störenden Erscheinungen vermieden werden.

Die Schwankungen des Luftdrucks, wie sie in den Isobaren zum Ausdruck kommen, oder die zeitlichen Differenzen desselben äussern offenbar keinerlei directe Wirkungen auf den gesunden Menschen; nur bei abnormen Zuständen (Lungenkrankheiten) können vermuthlich Störungen, z. B. Haemoptoe, durch plötzliches Sinken des Luftdrucks ausgelöst werden. Ein indirecter Einfluss zeigt sich darin, dass die Barometerschwankungen Bewegungen der im Boden enthaltenen Luft veranlassen; beim Sinken des Luftdrucks erhebt die Bodenluft sich über die Oberfläche und dringt eventuell in unsere Woh-

nungen ein. — Ferner spielen die Luftdruckschwankungen eine Rolle beim Entstehen der sogenannten „bösen Wetter“ in Steinkohlengruben. Das in tieferen Erdspalten sich findende Methan, welches mit Luft gemengt explosiv ist, vermag in Folge eines plötzlichen Sinkens des Luftdrucks in grösserer Masse in die Gruben einzutreten und dort Explosionsgefahr zu bedingen.

D. Die Luftbewegung.

Die Bewegungsvorgänge in der Atmosphäre zeigen sich aufs Innigste abhängig von den Verhältnissen des Luftdrucks.

Messung der Luftbewegung. Die Richtung des Windes wird bestimmt durch frei aufgestellte Windfahnen, die aus zwei im Winkel von 20° gegen einander geneigten Flügeln bestehen.

Die Stärke der Luftbewegung kann entweder approximativ bestimmt werden; schwächste Strömungen durch die Ablenkung einer Kerzenflamme, durch Tabaksrauch, Flaumfedern oder dergleichen; stärkerer Wind durch Feststellung seiner Wirkung auf Baumblätter, Baumzweige u. a. w.

Wind- stärke	Geschwin- digkeit des Windes	Winddruck		Wirkungen des Windes
		Meter in der Secunde	Kilogr. auf den Quadratmeter	
0—6				
0	Stille	0—0.5	0—0.15	Der Rauch steigt gerade oder fast gerade empor.
1	Schwach	0.5—4	0.15—1.87	Für das Gefühl merkbar, bewegt einen Wimpel.
2	Mässig	4—7	1.87—5.96	Streckt einen Wimpel, bewegt die Blätter der Bäume.
3	Frisch	7—11	5.96—15.27	Bewegt die Zweige der Bäume.
4	Stark	11—17	15.27—34.35	Bewegt grosse Zweige und schwächere Stämme.
5	Sturm	17—28	34.35—95.4	Die ganzen Bäume werden bewegt.
6	Orkan	über 28	über 95.4	Zerstörende Wirkungen.

Zu genaueren Messungen benutzt man Anemometer: entweder statische, bei denen der Druck des Windes gemessen wird, oder dynamische, bei welchen man die Geschwindigkeit aus der Zahl der Umdrehungen eines Rotationsapparates entnimmt (Flügel-Anemometer: Robinson'sches Schalenkreuz-Anemometer). Die nebenstehende, der 6stufigen, sog. Landskala entsprechende Tabelle giebt einen Vergleich der empirisch beobachteten Windgeschwindigkeit und der durch statische und dynamische Instrumente gemessenen. Vielfach wird eine 12stufige „Seeskala“ benutzt. — Mit grossen Schwierigkeiten ist die Wahl eines für die Aufstellung der Anemometer geeigneten Ortes verbunden. Wenige Meter über der Erdoberfläche sind Hemmnisse nicht zu vermeiden; und in grösserer Höhe sind die gefundenen Werthe mit denen in unserer Umgebung nicht vergleichbar.

Vertheilung der Luftbewegung auf der Erdoberfläche.

Die Winde, welche durch die Gleichgewichtsstörungen im Luftmeer dingt sind, werden im Allgemeinen in senkrechter Richtung zu den Isobaren nach dem Luftdruckminimum hin oder vom Maximum weg zu bewegen; und sie werden um so raschere Strömung zeigen müssen,




Fig. 57. Synoptische Witterungskarte.

je kürzer die Wegstrecke zwischen zwei Isobaren wird, je dichter letztere aufeinander rücken und je steiler also der Abfall des Luftdruckes ist. Die Beziehung zwischen der Druckdifferenz einerseits und der Wegstrecke, auf welcher sich dieselbe vollzieht, andererseits, bezeichnet man gewöhnlich als den barometrischen Gradienten. Derselbe giebt an, wie gross die Druckdifferenz ist auf eine bestimmte, einheitliche, senkrecht zu den Isobaren gemessene Weglänge. Als Einheit der Weglänge dient ein Aequatorgrad = 111 Kilometer. Je höher der Gradient, d. h. je mehr Millimeter Druckdifferenz auf 111 Kilometer Weglänge entfallen, um so rascher muss die Windbewegung sein.

Während die Lufttheilchen in solcher Weise von allen Seiten nach einem Minimum hin oder von einem Maximum weg strömen, erleiden sie noch eine gewisse Ablenkung, theils durch die Erdumdrehung, theils durch die Centrifugalkraft. In Wirklichkeit entstehen daher nicht Bewegungen in der Richtung des Gradienten, sondern es entstehen Spiralen, welche auf der nördlichen Halbkugel von links nach rechts nach dem Minimum hin, resp. vom Maximum fort sich bewegen. Die von einem Minimum beherrschten Strömungen nennt man Cyclonen, die von einem Maximum ausgehenden Winde Anticyclonen. Die letzteren zeigen eine relative Ruhe und Unveränderlichkeit, während die Cyclonen im Allgemeinen veränderliches Wetter bewirken. Minima und Maxima findet man oft in lebhaft fortschreitender Bewegung; auf der nördlichen Halbkugel wandern die Minima vorzugsweise von West nach Ost und der Wind hat hier den niederen Druck links und etwas vor sich, den höheren rechts und etwas hinter sich. Minima können sich unter Umständen mit einer Geschwindigkeit von 800—1000 Kilometer pro 24 Stunden bewegen.

Eine gute Uebersicht über die momentan herrschenden Windverhältnisse geben die synoptischen Witterungskarten (Fig. 57), die von vielen Tagesblättern publicirt werden. Auf denselben sind die Isobaren eingezeichnet; ferner Pfeile, welche die Windrichtung anzeigen (der runde Kopf des Pfeiles geht voran), und durch die Fiederung des Pfeiles die Windstärke (sechs ganze Striche bedeuten stärksten Orkan). Der Kopf der Pfeile giebt ausserdem durch die verschiedene Schattirung Aufschluss über den Grad der Bewölkung; ein Punkt neben dem Kopf bedeutet Regen u. s. w.

In der gemässigten Zone stehen die Luftströmungen unter dem Einflusse der Cyclonen und Anticyclonen; häufig findet ein regelloser Wechsel der Windrichtung und Windstärke statt. In Westeuropa herrschen im Allgemeinen West- und Südwestwinde vor und zwar unter dem Einfluss von Depressionen, welche über dem Atlantischen Ocean entstehen und von da nach Nordosten fortschreiten.

Ausserdem treten an vielen Orten lokale Ursachen für die Windbewegung hinzu. So haben wir am Meeresufer häufig lokale Land- und Seewinde; Vormittags findet in den oberen Schichten eine Strömung von dem stark erwärmten Land zur See statt, in den unteren Schichten umgekehrt, in den Abendstunden erfolgt allmählicher Ausgleich und in der Nacht stellt sich eine entgegengesetzte Strömung her wie am Tage, weil jetzt das Land stärkere Abkühlung erleidet. Ferner beobachtet man in Gebirgsthälern eine Periodicität der Luftströmungen, indem am Tage ein energisches Aufsteigen der erwärmten Thalluft, Nachts dagegen ein Niederströmen der kalten Luft eintritt. Grössten nahe der Meeresküste gelegene Gebirgsmassen pflegen oft sehr starke Temperaturdifferenzen und dadurch heftige lokale Winde zu veranlassen, so den Mistral in der Provence, die Bora in Dalmatien u. s. w.

Ausser der Richtung und Stärke des Windes ist auch seine sonstige Beschaffenheit, namentlich die Temperatur und die Feuchtigkeit der Luft, von Bedeutung. Für meteorologische Zwecke sucht man die mittlere Temperatur, Feuchtigkeit u. s. w. für jede einzelne Windrichtung aus langjährigen Beobachtungen zu ermitteln. Man erhält in dieser Weise Charakteristika der Windrichtungen und zugleich lokale Wahrscheinlichkeitszahlen für das Wetter, welches jede Windrichtung bringt.

Regelmässige zeitliche Schwankungen der Windrichtung und -stärke kommen in unserem Klima nicht vor; wir können höchstens eine reichere Jahreshälfte von Ende September bis Ende März unterscheiden über einer ruhigeren, welche sich über Sommer und Herbst erstreckt.

Ferner beobachten wir auf dem Continent bei relativ ruhigem heiteren Wetter eine Tagesschwankung in der Windstärke derart, dass dieselbe um 10 Uhr abends, kurz nach Mittag das Maximum erreicht und gegen Sonnenuntergang sinkt. Es erklärt sich dieser Gang dadurch, dass in der Nacht die untere Schicht als die kältere dem Vermischen mit der oberen nicht ausgesetzt ist: obere ist aber stets in viel rascherem Strömen begriffen, weil sie nicht wie untere durch Häuser, Bodenerhebungen u. s. w. in der horizontalen Fortbewegung behindert ist. Gegen 10 Uhr Morgens aber ist die untere Luftschicht erwärmt, wird nun nach oben gedrängt und mischt sich mit den lebhafteren Schichten. Gegen Abend tritt in Folge der Bodenausstrahlung allmählich wieder die frühere Schichtung und Stagnation ein. Daher kommt es, dass sich über Nacht die stärkste Ansammlung von Gerüchen geltend macht, namentlich im Hochsommer, wo die engen Strassen und Höfe und die Souterrains Häuser die relativ niedrigsten Temperaturen zeigen.

Angesichts der an den meisten Tagen sich vollziehenden lebhaften Schwankungen der Windstärke ist weder aus den 3 mal täglich gemachten Momentanbestimmungen, noch aus dem am Anemometer abgelesenen Gesamtwert für 24 Stunden ein Schluss auf das wirkliche Verhalten und die eventuellen Wirkungen des Windes statthaft.

Hygienische Bedeutung der Luftbewegung.

Die Windrichtung ist stets nur bedeutungsvoll durch den bedingenden Charakter des Windes, durch die Temperatur, Feuchtigkeit, Regen, Niederschläge, welche eine bestimmte Windrichtung mit sich bringen pflegt.

Die Windstärke ist direkt von bedeutendem Einfluss auf die Wärmeabgabe des Körpers. Im Freien ist in Folge der steten, selbst bei Windstille und schwachem Wind noch mit $\frac{1}{2}$ bis 2 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit sich vollziehenden Luftbewegung die Entlastung durch Leitung ausserordentlich erleichtert gegenüber den im Innern. In tropischen Klimaten oder an heissen Sommertagen werden unter der Beihülfe stark bewegter Luft sehr hohe Temperaturen ertragen. Das „erfrischende“ Gefühl beim Hinaustreten aus den Wohnungen ins Freie ist wesentlich auf die bessere Entwärmung durch den Wind in der bewegten Luft zurückzuführen, durch welche die im Innern des Raumes so leicht in gewissem Grade zu Stande kommende Luftstagnation beseitigt wird. — Andererseits befördern stärkere Winde bei kaltem Wetter in ausserordentlich hohem Grade schädliche Wirkungen durch zu intensiven Wärmeverlust (Erkältungen, Erfrierungen). — CO_2 -Abgabe ist bei Temperaturen unter 20° im Wind grösser als

bei Windstille; bei 20—35° unverändert oder etwas herabgesetzt. — Die Wasserdampfabgabe wird bei 20—35° erheblich geringer als bei Windstille (vgl. S. 111). Diese Wirkungen steigern sich nicht proportional der Windstärke, sondern in viel langsamerer Progression (WOLPERT). — Der Körper vermag daher einer zu stark abkühlenden Wirkung des Windes bei niedriger Temperatur durch gesteigerte Wärmeproduktion, bei höheren Temperaturen durch Einschränkung der Wasserverdunstung zu begegnen. Ausserdem scheint im Winde die Oberflächentemperatur des Körpers zu sinken und dadurch die Entwärmung durch Leitung allmählich geringer zu werden.

Ferner ist die zerstörende Gewalt der heftigsten Stürme und Orkane zu erwähnen, denen alljährlich eine grosse Anzahl von Menschen zum Opfer fällt. Um die Seefahrer zu schützen, sind die Sturmwarnungen von grosser Bedeutung. Sobald auf Grund telegraphischer Witterungsberichte in der deutschen Seewarte in Hamburg eine synoptische Witterungskarte zusammengestellt ist und sich aus dieser ergibt, dass ein von dichtgedrängten Isobaren umgebenes Minimum sich gegen die Küste hin fortbewegt, werden die Häfen mit telegraphischen Warnungen versehen.

Indirect haben die Winde insofern hygienische Bedeutung, als sie ein lebhaftes Durchmischen der Atmosphäre verursachen, üble Gerüche, schädliche Gase und suspendirte Bestandtheile schnell in's Unendliche verdünnen, und eine stets gleiche Beschaffenheit der Luft garantiren. Auch eine Lüftung der Wohnungen wird nicht zum wenigsten durch die Winde ermöglicht. — Eine fernere Wirkung der Winde besteht in ihrem mächtigen Einfluss auf die Wasserverdampfung von allen freien Flächen, speciell von der Bodenoberfläche; heftigere Winde vermögen grosse Massen von Staub aufzuwirbeln und der Luft beizumengen.

E. Die Niederschläge.

Die Niederschläge entstehen durch Condensation von atmosphärischem Wasserdampf, indem kältere Luftströmungen in wärmere einbrechen oder umgekehrt; es bildet sich dann Nebel, Thau, Reif, Regen oder Schnee.

Nebel. Zur Bildung desselben ist ausser der Temperaturerniedrigung noch die Anwesenheit suspendirter Bestandtheile erforderlich (vergl. unter „Luftstaub“). Fehlen diese völlig, so bleibt jede Nebelbildung aus. Für gewöhnlich sind überall in der Atmosphäre genügend feste Körperchen vorhanden. Enthält die Luft viel Rauch, Russ und Staub, so kommen die stärksten Nebel zu Stande.

Thau und Reif entstehen nur bei klarem Himmel, weil nur dann die Ausstrahlung kräftig genug ist und besonders an den Gegenständen, die sich durch Ausstrahlung stark abkühlen, so namentlich an Pflanzen. Jede Wolke, wenn sie keine leuchtende Bedeckung, eine schwache Rauchsicht u. s. w., gewährt, schützt gegen Reifbildung.

Regen und Schnee. Dieselben werden gemessen in Sammelgefässen, bei denen die auffangende Fläche eine bestimmte Grösse, gewöhnlich 500 qcm besitzt.

Angaben erfolgen dann jedoch nicht in Cubikmetern, sondern in Millimetern Regenhöhe, d. h. es wird die Höhe der Wasserschicht angegeben, die durch den 24stündigen Niederschlag auf der Erdoberfläche gebildet werden würde, falls kein Abfliessen, Einsickern oder Verdunsten stattfände.

Die grössten Regenmengen fallen innerhalb der tropischen Zone. Es führt der aufsteigende warme Luftstrom enorme Mengen Wasserdampf in die höheren kälteren Luftschichten und veranlasst massenhafte Condensation. — Ferner sind Gebirge, ausgedehnte Waldungen und andere lokale Momente von bedeutendem Einfluss (s. Tab.).

Regenhöhen.

Cherrapoonjee (Ostindien)	12 520 mm
Maranhao (Brasilien)	7 100 „
Sierra Leone	4 800 „
Stye Pass (Schottland)	4 182 „
St. Maria (Alpen)	2 483 „
Chambery (Savoyen)	1 650 „
Baden (Schwarzwald)	1 444 „
Klausthal (Harz)	1 527 „
Norddeutsche Tiefebene	613 „
Würzburg	401 „
Breslau	400 „

Ausser der Regenmenge wird die Zahl der Regen- und Schneetage und die Vertheilung derselben auf die Jahreszeit registriert. Die Zahl der Regentage nimmt zu mit der Erhebung über das Meeresniveau; ferner in Europa von Süden nach Norden; ausserdem mit der Annäherung an's Meer. — Während es in der Region der Passate nur innerhalb 3—5 Monaten des Jahres zu Regen kommt (z. B. in Ostindien von Juni bis September), dann aber oft regelmässig von Vormittag bis Nachmittag, vertheilen sich in der gemässigten Zone die Regentage über das ganze Jahr; im Ganzen ist in Deutschland der Sommerregen, in Westfrankreich und England der Herbstregen vorherrschend. Im Norden, resp. den Tropen regnet es ausserdem intensiver.

Die hygienische Bedeutung der Niederschläge.

Ein directer Einfluss liegt insofern vor, als durch die Niederschläge eine Durchfeuchtung der Kleidung, insbesondere des Schuhwerks, bewirkt werden kann, die zu Erkältungen Anlass giebt.

Indirect sind die Niederschläge bedeutungsvoll einmal dadurch, dass sie einen Theilfaktor des Klimas bilden, der für die Vegetation und die Bodencultur besonders wichtig ist. Zweitens sind stärkere Niederschläge eines der wirksamsten Reinigungsmittel für Luft und Boden, ein Einfluss, der namentlich in tropischen Ländern scharf hervor-

treten muss; Staub, angesammelte Fäulnisstoffe, Mikroorganismen und eventuell Infektionserreger werden fortgeschwemmt und aus dem Bereich der Menschen entfernt. Drittens können mässige Niederschläge organisches Leben und auch die Vermehrung und Erhaltung von Mikroorganismen befördern. Viertens ist von den Niederschlägen der Feuchtigkeitsgehalt der oberen Bodenschichten und der Stand des Grundwassers abhängig. Allerdings kommt genau genommen nur ein gewisser Theil der Niederschläge für die Durchfeuchtung des Bodens und die Speisung des Grundwassers in Betracht; nämlich diejenige Wassermenge, welche nicht oberflächlich abfließt und auch nicht kurze Zeit nach dem Eindringen in den Boden wieder verdunstet. Wie gross dieser Antheil ausfällt, das hängt einerseits von lokalen Einflüssen, von dem Gefälle der Oberfläche, von der Durchlässigkeit des Bodens, von der Temperatur, dem Sättigungsdeficit und der Bewegung der Luft u. a. w. ab; andererseits ist die Art des Regensfalls massgebend. Erfolgt dieser plötzlich in grossen Mengen, so wird der abfließende Antheil unter den gleichen örtlichen Bedingungen viel grösser, als wenn dieselbe Regenmenge langsam und stetig innerhalb eines längeren Zeitraums niedergeht. Um daher den zum Grundwasser durchdringenden Antheil aus der gemessenen Gesamt-Regenmenge abschätzen zu können, muss man die zeitlichen Beziehungen des Regensfalls genauer berücksichtigen.

F. Sonnenscheindauer; Licht; Elektrizität.

Die Wärme- und Lichtmenge, welche welche wir durch die directen Sonnenstrahlen erhalten, ist vorzugsweise abhängig vom Einfallswinkel der Strahlen, von der Dicke und Qualität der Atmosphäre und von der Dauer der Bestrahlung; für letztere ist die Tageslänge und die Bewölkung maassgebend.

Eine directe Messung der Sonnenscheindauer erfolgt durch den CAMPBELL'schen Autographen; unter einer als Brennnlinse wirkenden Glaskugel liegt ein Papierstreifen, auf dem die Tagesstunden markirt sind; die Sonne erzeugt eine beim Dazwischentreten von Wolken unterbrochene Brandlinie, deren addirte Strecken der Sonnenscheindauer entsprechen. — Die Intensität der Sonnenstrahlung kann annähernd durch das S. 92 beschriebene Vakuumthermometer bestimmt werden. Beide Werthe kombinirt ergeben ein Bild des gesammten Strahlungsaffekts.

Die so gelieferte Wärmemenge hat hygienische Bedeutung zunächst durch die directe Wirkung auf den menschlichen Körper. Durch anhaltende Sonnenstrahlung kann dem Menschen selbst bei sehr hoher Aussenluft ein langer Aufenthalt im Freien ermöglicht werden, besonders wenn die Strahlungsintensität in Folge der dünneren Atmosphäre

schicht erheblich ist, wie im Hochgebirge. Andererseits wird bei hoher Luftwärme durch directe Bestrahlung des Körpers die Gefahr der Wärmestauung bedeutend gesteigert und es treten die Erscheinungen des Erythema solare hinzu (s. S. 100). — Sehr bedeutungsvoll ist die Sonnenstrahlung aber noch dadurch, dass von derselben im Sommer die Wandtemperaturen unserer Häuser und in Folge dessen die Innentemperatur unserer Wohnungen vorzugsweise abhängt (s. Kap. „Wohnung“). Auch die Bodenoberfläche zeigt unter dem Einfluss der Insolation Temperaturen, die von der Lufttemperatur wesentlich differiren und selbst in unseren Breiten zwischen 50 und 60° betragen können.

Ob directe Lichtwirkungen auf den Menschen durch die Sonnenstrahlung nur insofern zu Stande kommen, als letztere die Quelle des diffusen Tageslichtes ist, oder ob der directen Sonnen-Belichtung specielle Wirkungen (abgesehen von Blendungserscheinungen u. dgl.) zukommen, darüber liegen sichere Beobachtungen noch nicht vor. Einstweilen sind daher die Lichtwirkungen der Sonnenstrahlung und des diffusen Tageslichts gemeinsam zu besprechen.

Die hygienische Bedeutung des Lichts betrifft zunächst die normale Funktion des Sehorgans. Störende Einflüsse in dieser Beziehung kommen vorzugsweise innerhalb der Wohnungen zu Stande; hier ist daher eine genauere Messung der Lichtintensität erforderlich (s. Kap. „Wohnung“).

Daneben besteht aber vielleicht auch ein Einfluss des Lichts auf andere Funktionen und auf das Allgemeinbefinden des Menschen. Durch Experimente an Thieren ist festgestellt, dass sie im Licht grössere Mengen Kohlensäure ausscheiden, als im Dunkel; und zwar ist der Grund dafür nicht etwa nur in einer Erregung der Retina zu suchen, sondern auch geblendete Thiere reagiren in derselben Weise. Es wird daher dem Licht eine Reizwirkung auf das Protoplasma zugeschrieben, welche den Zerfall der organischen Stoffe in der Zelle erhöht. Damit ist indess keineswegs ein Beweis dafür erbracht, dass das Licht für den thierischen Organismus ein unentbehrliches Agens ist, dessen Beschränkung zu schweren Schädigungen des Körpers führt. Kleinere und grössere Thiere gedeihen in dunklen Behausungen, und ein Weniger von Licht lässt oft deutliche Nachtheile nicht erkennen.

Beobachtungen an Menschen liegen vor in den Berichten verschiedener Polarexpeditionen. Es wird in diesen mehrfach die grün-gelbliche Gesichtsfarbe betont, welche die Mitglieder der Expedition während des Polarwinters annehmen; ferner sollen nervöse Affectionen, Verdauungsstörungen u. s. w. auftreten. Doch ist es zweifelhaft, wie viel von diesen Symptomen auf den andauernden Lichtmangel, wie viel andererseits auf die Monotonie der Kost, der Beschäftigung u. s. w. zu

schieben ist. — Auch durch sonstige Beobachtungen an Menschen, die dem Licht wenig ausgesetzt sind (Grubenarbeiter, Kellerbewohner, die Bewohner englischer Städte während der nebligen Wintermonate) konnten erheblichere krankhafte Störungen in Folge des Lichtmangels beim Fehlen anderer Schädlichkeiten bisher nicht nachgewiesen werden.

Zweifellos sprechen aber viele Erfahrungen von Aerzten und Laien dafür, dass eine grössere oder geringere Lichtfülle erhebliche nervöse und psychische Einflüsse äussern kann, und dass für unsere Stimmung, unser Behagen und unser subjektives Wohlbefinden die Belichtung von allergrösster Bedeutung ist.

Eine wichtige indirecte hygienische Beziehung äussert das Licht ferner dadurch, dass es eine sehr mächtige Wirkung auf das Leben der Mikroorganismen ausübt. Durch Sonnenlicht gehen Krankheitserreger ausnahmslos binnen 3 Stunden, durch diffuses Tageslicht binnen 3—4 Tagen zu Grunde. — In der Praxis darf man indess nicht allzuviel von dieser Wirkung des Lichts erwarten, weil nur die offen zu Tage liegenden Krankheitserreger davon betroffen werden und genug unbelichtete Infektionsquellen in jedem Krankenzimmer vorhanden sind.

Ueber das Verhalten und die Bedeutung der Luftelektricität sind wir noch ziemlich im Unklaren. Es ist nicht undenkbar, dass auch hier noch hygienische Beziehungen verborgen liegen.

Die elektrischen Entladungen in Form von Gewittern sind vom hygienischen Standpunkt nicht so bedeutungsvoll, als vielfach angenommen wird. Todesfälle und Verletzungen durch Blitz sind in unserem Klima ausserordentlich selten; in Preussen sterben durch Blitzschlag jährlich 96 Menschen (in den letzten Jahren mehr) und diese Fälle machen 1.4 Procent der Verunglückungen, 0.07 Procent aller Todesfälle aus.

II. Allgemeiner Charakter und hygienischer Einfluss von Witterung und Klima.

A. Die Witterung.

Die Witterungsverhältnisse, wie sie sich aus den meteorologischen Beobachtungen ergeben, pflegen seit lange regelmässig mit den für die gleiche Zeitperiode erhaltenen Morbiditäts- und Mortalitätsziffern zum Zweck der Auffindung ätiologischer Beziehungen verglichen zu werden.

Sowohl die Charakteristik der Witterung, wie wir sie bis jetzt aufzustellen pflegen, wie auch die übliche Mortalitätsstatistik ist indessen für diesen Zweck wenig brauchbar.

Die meteorologischen Daten berücksichtigen zu sehr die Mittelwerthe; sie lassen die Intensität der Schwankungen und das gleichzeitige Zusammenwirken verschiedener Faktoren nicht genügend hervor-

ten; sie geben für besonders wichtige Faktoren, z. B. die Windstärke, wenig ungenaue und unbrauchbare Werthe.

Einen vollkommeneren Einblick gewähren graphische Darstellungen der Witterungsverhältnisse, welche namentlich auch die Intensität der Excursionen aller gleichzeitig beteiligten Faktoren zur Anschauung bringen. In Fig. 58 ist die Witterung eines Theils des Monats Februar 1885 in solcher Weise aufgezeichnet; ausser der Temperaturkurve ist die Intensität der Winde durch die Höhe der verticalen Striche (Skala) der untersten Linie angegeben ($2.5 \text{ mm} = 1$ Stufe der 12stufigen Skala); ferner sind die Niederschläge eingezeichnet und zwar so, dass




Fig. 58. Witterung vom 17.—26. Februar 1885.

deren Dauer der horizontalen Ausdehnung der Schraffirung und deren Menge dem Inhalt der schraffirten Rechtecke entspricht ($1 \text{ qmm} = 0.1 \text{ mm}$ Regenmenge). Ebenso ist es je nach Bedarf leicht, noch die Zahlen für die relative Feuchtigkeit und für das Sättigungsdeficit übersichtlich einzuordnen.

Falls die graphische Darstellung nicht anwendbar ist, kann die Methode der Auszählung der Tage nach verschiedenen Stufen der Temperaturschwankung, der Windstärke, des Sättigungsdeficits u. s. w. zur Anwendung kommen. Für die Tagesschwankung der Temperatur unterscheidet man dann z. B. die Stufen: $0-5^\circ$, $5-10^\circ$, mehr als 10° ; für die Veränderlichkeit der Temperatur von Tag zu Tag die Stufen: $0-2^\circ$, $2-4^\circ$, $4-6^\circ$, $6-8^\circ$ und mehr als 8° . Ähnlich

stuft man Windstärke und Sättigungsdeficit ab und zählt alsdann, wie viele Tage von jeder Stufe innerhalb des untersuchten Zeitraums beobachtet wurden.

Eine Uebersicht der hygienisch wichtigen Witterungsverhältnisse eines Monats müsste sich danach ungefähr folgendermaassen gestalten:

Februar 1885.

Mittlere tägliche Temperaturschwankung 7.2°.	Mittlere relative Feucht. 76.9 %.
Tage mit 0—2° Temperaturschw. 0	Tage unter 70 % Feucht. . . 6
Tage mit 2—5° Temperaturschw. 4	Tage mit 70—80 % Feucht. . . 8
Tage mit 5—10° Temperaturschw. 20	Tage mit 80—90 % Feucht. . . 10
Tage mit mehr als 10° Temperaturschwankung 4	Tage mit mehr als 90 % Feucht. 4
	Mittleres Sättigungsdeficit 0.6 mm.
Mittlere Veränderlichkeit der Temperatur von Tag zu Tag 1.9°.	Tage mit Nebel und 0 mm Sätt.-Def. 9
Tage mit 0—2° Veränderlichkeit 15	Tage mit 0—5 mm Sätt.-Def. . 19
Tage mit 2—4° Veränderlichkeit 7	Tage mit 5—10 mm Sätt.-Def. . 0
Tage mit 4—6° Veränderlichkeit 4	Tage mit mehr als 10 mm Sätt.-Def. 0
Tage mit 6—8° Veränderlichkeit 1	Mittlere Windgeschwindigkeit 9.2 mp. Sec.
Tage mit Niederschlägen . . . 12	Tage mit 0—3 m Geschwindigkeit. 0
Tage mit Bodennässe 12	Tage mit 3—6 m Geschwindigkeit. 4
	Tage mit 6—10 m Geschwindigkeit. 16
	Tage mit 10—15 m Geschwindigkeit. 3
	Tage mit mehr als 15 m Geschw. 5

Bei dieser Methode fehlt indess ein Einblick in die gleichzeitige, sich ergänzende Wirkung verschiedener Faktoren. Erst wenn es gelänge, mehrere bei einer hygienischen Wirkung betheiligte Faktoren zusammenzufassen, z. B. Lufttemperatur, Feuchtigkeit und Windstärke in ihrer Wirkung auf die Entwärmung unseres Körpers, wird die Auszählungsmethode der graphischen Registrirung ungefähr gleichwerthig werden können.

Soweit die ungenügende Methode der Registrirung eine Charakteristik der Witterung gestattet, haben wir in Deutschland zu Anfang des Jahres, genauer von Ende Januar oder Anfang Februar ab, eine Periode, welche durch besonders intensive Schwankungen der Temperatur ausgezeichnet ist. Dieselben bewegen sich häufig in kritischen Temperaturlagen, so dass völlige Aenderung unserer Gewohnheiten erforderlich wird. Nicht selten sind sie von heftigen Winden und starken Niederschlägen begleitet. Eine derartige hygienisch bedenkliche Veränderlichkeit der Witterung erstreckt sich über den Februar, März, April; zuweilen auch noch über einen Theil des Mai. In dieser Zeit ist ausserdem die Bodenoberfläche meist kalt und nass, das Sättigungsdeficit gering. Von da ab beginnt dann eine Periode, in welcher zwar starke Tagesschwankungen der Temperatur, zuweilen auch noch erhebliche Variationen von Tag zu Tag, dann aber in wenig gefährlicher Temperaturlage, vorkommen; ausserdem werden heftigere Winde selten und Niederschläge gelangen in der stark trocknenden Luft rasch zur Verdunstung. Hier und da kommt es bereits im Mai und Juni zu Perioden ausserordentlich hoher Temperatur. Aber es erfolgt Nachts gewöhnlich noch starke Abkühlung; und die Wohnungen pflegen noch gemässigte Temperaturen zu zeigen, weil die Häusermassen nicht entsprechend

durchhitzt sind. Ende Juni, namentlich aber im Juli und August, treten fast regelmässig Perioden von sehr hoher Temperatur auf, die bei langer Dauer, geringer Windstärke und hoher Feuchtigkeit bedenklich werden können. Von Ende August ab kommt durch kühlere Nächte und interkurrierende kältere Perioden eine allmähliche Abkühlung der Häuser zu Stande. Vom September ab vollzieht sich dann der Abfall der Temperatur und der Uebergang zum Winter in einer mehr allmählichen Weise und ohne die schroffen Schwankungen des Frühjahrs. Erst im November und Anfang December kommt es wieder zuweilen zu kritischen Variationen der Temperatur, und auch zu begleitenden heftigeren Winden, zu Bodennässe und nebliger Luft, bis dann Ende December oder Anfang Januar eine Periode dauernden Frostes einzutreten pflegt.

Jahreszeitliche Vertheilung der Todesfälle.

Die Vertheilung in Deutschland geht aus dem Diagramm Nr. 59 hervor. An demselben beobachten wir zwei Erhebungen der Curve, die allerdings im Verhältniss zur Gesamtmenge der Todesfälle nur geringfügige Excursionen darstellen (bei durchschnittlich 100 Todesfällen beträgt das Minimum 91, das Maximum 112 Todesfälle pro Monat). Die eine, kürzere und niedrigere Erhebung fällt in den Hochsommer; die zweite, breitere in den Spätwinter resp. Frühling.

Um die ätiologischen Beziehungen dieses Verlaufs der Mortalitätscurve zu erkennen, wird es erforderlich sein, diejenigen Krankheiten herauszufinden, durch welche wesentlich die beiden jahreszeitlichen Erhebungen bewirkt werden. Die Statistik weist nach, dass an der Sommerakme ganz überwiegend das kindliche Lebensalter theilhaft ist, und dass Cholera und Diarrhoea infantum in dieser Jahreszeit die weitaus grösste Zahl von Todesfällen veranlassen. Ausserdem zeigen Ruhr, Cholera nostras und andere infektiöse Darmkrankheiten der Erwachsenen eine ausgesprochene Sommerakme.

Die Winterakme betrifft dagegen mehr die höheren Lebensalter; und zwar sind die Krankheiten, welche im Spätwinter und Frühjahr hier so stark vermehrte Opfer fordern, hauptsächlich sog. Erkältungskrankheiten, Pneumonie, Bronchitis und Angina; ferner ist die Mortalität an Phthise bedeutend gesteigert; daneben ist eine deutliche Zunahme contagiöser Krankheiten im Winter zu constatiren, so der Pocken, des Scharlachfiebers und der Masern.




Fig. 59. Mortalität im Deutschen Reich nach Monaten.

Unter 1000 Todesfällen an:	entfallen auf:			
	Decbr., Januar Februar	März, April, Mai	Juni, Juli, August	Septbr., October, Novbr.
Krankheiten mit Sommerakme:				
Cholera u. Diarrhoea infantum (Berlin)	50	83	701	166
Cholera asiatica (Preussen 1848—58)	62	5	278	655
Ruhr und Darmkatarrh	20	35	750	195
Krankheiten mit Winterakme:				
Tuberkulose (Berlin 1830—39) . . .	265	279	230	224
Bronchitis (Berlin 1830—39) . . .	289	344	179	187
Pleuritis (London 1849—53) . . .	314	267	188	231
Pneumonie (Bayern 1871—75) . . .	311	345	165	179
Pocken (Bayern 1871—75)	299	432	176	93
„ (London 1849—53)	303	272	204	221
Scharlach (Bayern 1871—75) . . .	274	274	237	215
Masern (Bayern 1871—75)	294	275	248	183

Aus einer genaueren Betrachtung dieser Krankheiten muss sich ergeben, ob die jahreszeitliche Steigerung resp. Verminderung auf directe Wirkung der Witterung zurückzuführen ist, oder ob Lebensgewohnheiten, Beschäftigungsart, Sitten und Gebräuche wesentlich betheiligt sind und die Anwendung prophylaktischer Maassregeln ermöglichen.

Eine genauere Analyse der Krankheiten mit Sommerakme zeigt, dass eine stärkere Beeinflussung der Curve der gesammten Mortalität nur ausgeht von der Cholera infantum und anderen Verdauungskrankheiten der Säuglinge. Aus der Aetiologie dieser Affektionen, die im Kapitel „Infektionskrankheiten“ ausführlich besprochen werden, sei hier nur hervorgehoben, dass zwar eine gewisse Höhe der Wohnungstemperatur für ihr Zustandekommen Bedingung ist; dass aber andererseits bestimmte Lebensgewohnheiten, schlechte Wohnungseinrichtungen und mangelhafte Conservirung und Zubereitung der Milch, die endemische Verbreitung ausserordentlich befördern. — Maassregeln, durch welche eine Besserung dieser schlechten Gewohnheiten herbeigeführt wird, müssen eine bedeutende Abflachung der Mortalitätscurve bewirken, trotz völligen Gleichbleibens der Witterung.

Auch die übrigen infektiösen Darmkrankheiten sind offenbar einer Einschränkung durch gewisse Sitten und Gebräuche zugänglich, wie dies z. B. bezüglich der Cholera in eklatanter Weise aus der relativen Immunität hervorgeht, deren sich die in Indien lebenden Engländer erfreuen. Immerhin wird der Sommer auch hier die disponirende

Jahreszeit bleiben, weil die stärkere Wucherung von Bakterien in Nahrung und Wasser, der reichlichere Wassergenuss und andere Umstände dann die verschiedensten Darmaffektionen begünstigen und vermehrte Vorsichtsmaassregeln zu ihrer Verhütung nothwendig machen.

Unter den Krankheiten mit Winterakme haben die contagiösen Krankheiten den kleinsten Antheil an der Erhebung der Mortalitätscurve. Sie werden auch nur ganz indirect von der Witterung beeinflusst. Ihre Steigerung erfolgt vor Allem durch das im Winter häufigere und innigere Zusammenleben der Menschen in den Wohnungen. Je grösser der Bruchtheil der Bevölkerung ist, der im Freien lebt, und je länger derselbe sich im Freien aufhält, um so weniger Gelegenheit zur Ansteckung ist gegeben, und die Chancen für die Ausbreitung wachsen um so mehr, je mehr sich das ganze Leben der Bevölkerung innerhalb des Hauses abspielt. — Ausserdem ist für die Wintersteigerung bedeutungsvoll, dass in der kalten Jahreszeit mehr Kleidungsstücke benutzt werden, dass aber die Reinigung der Wäsche, des Körpers, der Wohnung u. s. w. auf grössere Schwierigkeiten stösst und mehr guten Willen voraussetzt, als im Sommer. Jede Beförderung der Unreinlichkeit muss im Sinne einer vermehrten Ausbreitung der contagiösen Krankheiten wirken. In Gegenden, wo die Jahreszeit die stärksten Contraste zwischen Leben im Freien und Leben im Hause bedingt, wo die Bevölkerung ein mehr indolentes Wesen zeigt, finden sich daher die stärksten Contraste zwischen der Ausbreitung der contagiösen Krankheiten in der warmen und in der kalten Jahreszeit (Constantinopel), während andere Länder nur geringe und unregelmässige Differenzen aufweisen.

Die Zunahme der Todesfälle an Phthise, welche einen sehr bedeutenden Procentsatz der gesammten Mortalität ausmachen, deutet nicht etwa darauf hin, dass die Phthise vorzugsweise im Winter acquirirt und verbreitet wird, sondern nur darauf, dass das tödtliche Ende dieser Krankheit hauptsächlich in der zweiten Hälfte des Winters und im Frühjahr eintritt. Die Ursache hierfür liegt vorzugsweise darin, dass für die Phthisiker in diesen Monaten eine erhöhte Gefahr für die Acquirirung von Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Pneumonie, gegeben ist, die bei dieser Kategorie von Kranken leicht zum Tode führen.

Dass die Erkältungskrankheiten im Winter stark gesteigert sind, ist nach der oben gegebenen Darstellung der Witterung im Allgemeinen wohl verständlich. Die launischen Schwankungen der Temperatur namentlich gegen Ende des Winters und ihr häufiges Zusammenfallen mit heftigen Winden, Bodennässe, Niederschlägen müssen eine Steigerung dieser Krankheiten begünstigen. Ein genauerer Einblick in

die ätiologischen Beziehungen, eine Abschätzung der Bedeutung der einzelnen beteiligten Faktoren und in die Abhängigkeit der verschiedenen Erkrankungsformen von diesen ist, wie bereits oben hervorgehoben wurde, zur Zeit nicht möglich. Schon die Mängel in der Beobachtung und Registrirung der Windstärke machen jeden Versuch, den sicher vorhandenen ätiologischen Zusammenhang genauer aufzuklären, zur Zeit von vornherein aussichtslos. — Die in den letzten Jahren erschienenen Zusammenstellungen **MAGGELSEN's**, **RUHEMANN's** u. A. über die Abhängigkeit der Krankheiten von Witterungsverhältnissen sind entschieden verfrüht und völlig unbrauchbar, weil diese Autoren einseitig nur die Lufttemperatur bezw. die Sonnenscheindauer als Maassstab benutzen und ausschliesslich mit Mittelwerthen rechnen.

B. Das Klima.

Eine hygienisch brauchbare Charakterisirung der einzelnen Klimate stösst auf noch bedeutendere Schwierigkeiten, als die Charakterisirung einer Witterung, weil wir dazu der Mittelwerthe aus mehrjährigen Beobachtungen nicht entzählen können. Jedenfalls muss aber auch hier eine Auszählung der Tage von bestimmter Variation der Temperatur, von bestimmter Windstärke u. s. w. erfolgen, so dass die Intensität der einzelnen Schwankungen einigermassen hervortritt (s. S. 130). Von besonderer Wichtigkeit scheint dies für die interdiurnen Temperaturschwankungen zu sein (s. Tabelle). Schon beim Vergleich mit der Gesamt-Mortalität ergibt sich hier eine Beziehung, insofern (in den preussischen Provinzen) die höchste Veränderlichkeit der Temperatur mit der höchsten Mortalität zusammengeht (**KREMSE**R).

Ein sehr grosser Fehler haftet allen diesen Zahlen dadurch an, dass das Zusammenwirken verschiedener klimatischer Faktoren gar nicht zum Ausdruck kommt. Mehr noch als für die Charakterisirung der Witterung würde daher für Klimaschilderungen die Aufstellung combinirter Wirkungsziffern (z. B. Entwärmungsziffer aus Temperatur, Feuchtigkeit und Windstärke) angezeigt sein. — Einstweilen können den pflanzenphänologischen Beobachtungen manche Hinweise auf hygienisch wichtige klimatische Verhältnisse entnommen werden. Theils wird dabei das Vorkommen verschiedener Pflanzen in diesem und jenem Klima zur Charakterisirung benutzt; namentlich aber werden die mittleren Eintrittszeiten der Vegetationerscheinungen (Belaubung, Blüthe, Frucht reife, Laubverfärbung und Laubfall) bei verschiedenen allverbreiteten Pflanzen, z. B. Rosskastanie, *Syringa vulgaris*, Weinrebe u. s. w. registrirt.

Auch die Morbiditäts- und Mortalitätsstatistik der einzelnen Kli-

Mittlere Häufigkeit von Temperaturveränderungen bestimmter Grösse
(in Tagen):

Um mindestens	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	November	December	Jahr
------------------	--------	---------	------	-------	-----	------	------	--------	----------	---------	----------	----------	------

Berlin.

2°	10.8	11.2	9.2	10.1	10.3	10.6	8.6	6.8	7.6	9.3	9.4	11.0	114.9
4	2.6	2.4	1.9	1.6	2.0	3.0	1.3	0.8	0.7	1.5	1.2	3.9	22.9
6	0.7	0.7	—	0.3	0.2	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	3.7
8	0.2	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.3	0.6
10	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2

München.

2°	15.9	12.9	12.2	12.2	13.5	14.7	15.9	11.4	8.6	10.3	13.1	13.2	123.9
4	8.0	5.4	2.7	3.6	4.3	4.8	3.7	2.5	2.3	1.9	4.3	4.3	47.8
6	3.1	1.5	0.8	0.4	1.2	0.9	0.8	0.8	0.6	0.1	1.4	1.6	12.2
8	1.3	0.6	0.3	—	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	—	0.5	0.7	4.4
10	0.5	0.4	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	0.4	1.8
12	0.2	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6
14	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1

St. Petersburg.

2°	18.1	15.9	14.1	10.5	12.5	10.6	8.2	6.6	7.4	9.6	12.6	16.4	142.7
4	10.1	8.7	6.3	2.9	3.4	2.3	1.4	0.9	1.4	2.3	4.5	8.3	52.6
6	5.7	4.4	2.7	0.7	0.7	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	1.5	3.0	20.1
8	2.9	2.2	0.9	0.1	0.1	0.1	—	—	—	0.1	0.5	1.8	8.8
10	1.3	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8	3.8
12	0.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	1.6
14	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7
16	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
18	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1

mate ist noch durchaus mangelhaft. Nur wenige europäische Staaten bieten in dieser Beziehung ein einigermaassen befriedigendes Material.

Wir müssen uns daher einstweilen auf eine Abgrenzung und Charakterisirung weniger grosser klimatischer Zonen beschränken, und zwar sollen im Folgenden nur eine tropische, eine arktische, eine gemässigte Zone und das Höhenklima unterschieden werden. Die bedeutenden Differenzen, welche die verschiedenen Länder jeder einzelnen Zone immerhin noch darbieten, müssen einstweilen unberücksichtigt bleiben.

1. Die tropische (und subtropische) Zone.

Charakteristik. Tropische Klimate sind ausgezeichnet durch den regelmässigen, periodischen Ablauf der Witterungserscheinungen, während unperiodische Schwankungen und das, was wir „Wechsel der Witterung“ nennen,

fast völlig fehlen. — Meistens sind allerdings Jahreszeiten unterscheidbar, aber nicht sowohl nach der Temperatur, als vielmehr nach Winden und Niederschlägen. In einem Theil des Jahres herrschen die Passate und veranlassen trockenes Wetter. Mit dem Aufhören der Passate beginnt dann die Regenzeit, und zwar stellt dieser Regen eigentlich Sommerregen dar, da er in die Zeit des höchsten Sonnenstandes fällt; meistens bringt aber die Regenzeit in Folge der Bewölkung eine gewisse Abkühlung zu Stande und daher wird diese Periode in manchen Gegenden fälschlich als „Winter“ bezeichnet.

Bemerkenswerth ist der Einfluss, den die tropische Regenzeit oft gegenüber der Anhäufung von Schmutzstoffen zeigt, welche während der trockenen Jahreszeit sehr hochgradig geworden zu sein pflegt. Die Bodenoberfläche wird abgeschwemmt, stagnirende Teiche und Flüsse werden mit reichlichem, reinem Wasser gefüllt, der Bezug guten Trinkwassers und die Reinigung der Kleider, der Wohnung u. s. w. ausserordentlich erleichtert. Es ist ohne Weiteres einleuchtend, dass in dieser Weise durch die massenhaften Niederschläge der Regenzeit an vielen Orten contagiöse und infektiöse Krankheiten in ihrer Verbreitung gehemmt werden müssen.

Entsprechend dem Wechsel der trockenen und der nassen Jahreszeit, ferner je nach der Nähe der Meeresküste variirt die Luftfeuchtigkeit in den tropischen Gebieten, und da bei hoher Temperatur die Luftfeuchtigkeit zu einem äusserst einflussreichen klimatischen Faktor wird, ist die Wirkung des tropischen Klimas, je nach Art und Jahreszeit, ausserordentlich verschieden. — Eine fernere Eigenthümlichkeit des Tropenklimas bildet die intensive Sonnenstrahlung. Das Vakuumthermometer steigt auf der besonnten Bodenoberfläche bis über 80°. Innerhalb weniger Minuten wird die entblösste Haut des Europäers unter der Tropenzone roth und schmerzhaft.

Durch die überaus günstigen Bedingungen für organisches Leben kommt es einerseits zu doppelten Ernten; andererseits zu einer enormen Anhäufung von zersetzungsfähigem Material und zu intensiven Fäulnis- und Gährungsvorgängen. Man begegnet daher einer hochgradigen Verpestung der Luft durch Fäulnissgase, wenn nicht entweder starke Trockenheit die Zersetzungen hindert oder lebhaft Winde die Gase zerstreuen.

Wesentlich abweichende klimatische Verhältnisse bieten Höhenlagen (s. unten) und einzelne insulare Gebiete.

Krankheiten der Tropenzone.

Nach allen Erfahrungen ist die Gesamt-Mortalität in den Tropen — abgesehen von den eben erwähnten Ausnahmefällen — eine sehr hohe. Genauere Zahlen fehlen; angeführt sei nur nachstehend eine Tabelle über die Mortalität der europäischen Truppen in den Tropen:

Unter 1000 Mann europäischer (französischer resp. englischer) Truppen starben jährlich in:

Algier 1847—46	78
Senegal 1819—55	106
Sierra Leone 1819—36 . .	483
Bengalen 1838—56	70
Britisch-Westindien 1816—46	75

Dagegen in:

Capland 1817—49	14
Neu-Seeland 1844—56 . . .	9
Canada 1837—46	13

Die Steigerung der Mortalität ist vorzugsweise bedingt durch folgende Krankheiten:

Sonnenstich und Hitzschlag, die unter den Truppen in British-Indien durchschnittlich 3 p. m. Todesfälle verursachen.

Schwere Formen von Anämie und Leberkrankheiten. Unter europäischen Truppen in Indien starben an Hepatitis jährlich 2 p. m. In der Präsidentschaft Madras macht diese Krankheit Procent aller bei den Truppen vorgekommenen Krankheitsfälle aus. Leichtere Leberaffektionen sind enorm verbreitet.

Die vorgenannten Affektionen erscheinen als schwer vermeidliche Krankheiten. Zweifellos kann durch die Lebensweise, insbesondere Ernährung und Beschäftigung, die Disposition erhöht resp. verringert werden. Aber selbst bei grosser Vorsicht pflegt nach einer gewissen Zeit die eine oder andere dieser Krankheitserscheinungen bei den in tropische Länder Eingewanderten aufzutreten.

Malaria ist ausserordentlich verbreitet und tritt vielfach in perniziöser Form auf, so zwar, dass sie unbedingt den gefährlichsten Feind des tropischen Klimas darstellt. Unter den Truppen an der Sierra Leone erkrankten 32 Procent; in Ostindien 41 Procent; in British-Indien und Cayenne 70—80 Procent an Malaria. In Bombay und Bengalen liefert die Malaria 50—60 Procent aller Erkrankungen.

Ruhr und schwerer Darmkatarrh fordern nächst der Malaria das meiste Opfer. Unter den Truppen in Bengalen kommen 13 Procent, in British-Guiana 50 Procent Erkrankungen vor.

Cholera asiatica tritt in mörderischen Epidemien auf, fordert aber nicht so viel Opfer wie die vorgenannten Krankheiten.

Cholera infantum ist in den meisten tropischen Gebieten stark verbreitet.

Auch von Erkrankungen der Respirationsorgane ist die tropische Zone nicht frei. Phthise ist, mit Ausnahme der Hochplateaus und nördlicher subtropischer Gebiete, fast überall verbreitet und tritt in relativ schwerer Form auf. Pneumonie ist in einzelnen Theilen Indiens, namentlich in Unterägypten und Tunis selten, kommt aber in anderen tropischen Ländern häufig vor. Bronchitis und andere katarrhale Erkrankungen werden in den Tropen in grosser Zahl beobachtet. Nur gewisse subtropische Gegenden, wie einzelne Theile Ägyptens, der Ostküste Afrikas, Californiens zeigen eine relative Immunität; ferner die Antillen und St. Helena, welches letzteres unter der Herrschaft kühler südlicher Winde steht und daher ein im Verhältniss zu der geographischen Breite sehr gemässigttes Klima hat.

2. Die arktische Zone.

Charakteristik. Im polaren Klima tritt uns der Wechsel der Jahreszeiten in ausgesprochenster Weise entgegen.

Während des Winters fehlt die Sonnenstrahlung ganz, die Kälte ist intensiv. Auch März und April sind noch sehr kalt; erst im Mai steigt die Temperatur, und die höchste Wärme tritt im Juli-August ein. Im Herbst erfolgt langsamer Abfall der Temperatur. Selbst im Sommer fallen die Strahlen immer noch in sehr spitzem Winkel auf; trotzdem erhebt sich die Temperatur an den meisten Tagen über 0°, das geschwärzte Thermometer steigt noch in 78 $\frac{1}{2}$ ° Breite bis 21° C. Der Sommer würde noch erheblich wärmer sein, wenn nicht so viel Wärme durch Schmelzen von Eis und Schnee absorbiert würde.

Die absolute Feuchtigkeit ist im Winter minimal; der Himmel fast steter, Niederschläge sind selten. Im Sommer tritt oft Nebel ein, ebenso viel fache Niederschläge.

Der Winter bringt eine furchtbare Monotonie; überall zeigt sich das Bild vollkommener Gleichmässigkeit, Erstarrung und Ruhe. Unter diesen psychischen Eindrücken und unter dem Einfluss des Lichtmangels werden die Menschen Anfangs schläfrig und deprimirt; später reizbar. Gewöhnlich gesellen sich Dyspepsien, und bei mangelnder Abwechslung in der Kost akorbutische Erscheinungen hinzu.

Mit grosser Begeisterung wird von allen Polarreisenden das erste Wiedererscheinen der Sonne geschildert. Schon mehrere Tage ehe sie selbst am Horizont erscheint, wird ihr Nahen durch prachtvolle Dämmerungsfarben angekündigt.

Der Sommer bietet dann durchweg angenehme Witterungsverhältnisse. Auch die stete Tageshelle wird in keiner Weise lästig empfunden.

Krankheiten des polaren Klimas.

Die Gesundheitsverhältnisse sind im Allgemeinen sehr günstig, abgesehen davon, dass in Island, Grönland u. s. w. ein verhältnissmässig grosser Theil der Bevölkerung verunglückt, beim Fischen ertrinkt, oder in Schneestürmen umkommt. Malaria, infektiöse Darmkrankheiten, vor allem Cholera infantum, fehlen so gut wie vollständig. Auch die asiatische Cholera hat in Nordamerika den 50., in Russland den 64. Breitengrad nicht überschritten; Island, Lappland, die Färöerinseln sind bisher freigeblieben; gleichwohl liegen beschränkte Epidemien in noch höheren Breiten gewiss nicht ausser dem Bereich der Möglichkeit, und dass es bisher zu solchen nicht gekommen ist, daran trägt jedenfalls die Erschwerung der Einschleppung die Hauptschuld. Auch Australien und das Capland sind aus diesem Grunde bisher von Cholera verschont geblieben.

Krankheiten der Respirationsorgane sind in Island, Skandinavien, Nord-Russland u. s. w. häufig, jedoch nicht häufiger, als in der gemässigten Zone. Im hohen Norden zeigt die Witterung im Ganzen weniger erhebliche Schwankungen, als in unserem Winter und Früh-

ir; und dabei sind dort die Einrichtungen und Gewohnheiten oft zweckmässiger Weise auf die Bekämpfung der Kälte und den Witterungswechsel zugeschnitten.

Phthise kommt in Island, Spitzbergen, auf den Färoer- und Inseln, den Hebriden und im nördlichen Norwegen so gut wie nicht vor; Pneumonien sind in denselben Gebieten relativ selten. Gegenüber werden in West-Grönland und Canada Phthise und Pneumonien ausserordentlich häufig angetroffen. Wodurch diese eigenthümliche Differenz zwischen der östlichen und westlichen Polarregion bedingt ist, lässt sich zur Zeit noch nicht ermitteln.

3. Die gemässigte Zone.

Charakteristik. Weder erschlaffende Wärme, noch hemmende Kälte herrscht während des ganzen Jahres, sondern es findet ein solcher Wechsel der Jahreszeiten und ein so häufiges aperiodisches Schwanken der Witterung statt, wie einerseits intensive Cultur des Landes ermöglicht ist, andererseits scharfe Contraste und kräftige Reize auf den Körper einwirken. Frühling und Herbst mit ihrem stets wechselnden Wetter kommen erst in dieser Zone zu merklicher Entwicklung.

Innerhalb der gemässigten Zone findet man im Uebrigen ausserordentlich grosse klimatische Differenzen. — Die stärksten Contraste werden durch die mehr maritime oder mehr continentale Lage eines Landes bewirkt. Wie bereits früher ausgeführt wurde (S. 95), beobachteten wir im continentalen Klima die stärksten Tages- und Jahresschwankungen der Temperatur; im Sommer Perioden unerträglicher Hitze, abwechselnd mit plötzlicher hochgradiger Abkühlung; im Frühjahr fortwährend scharfe Witterungswechsel; im Winter Perioden intensiver Kälte, aber auch mit Rückfällen in höhere Wärmegrade untermischt. Die Luftfeuchtigkeit ist im Sommer und Herbst gering, die Luft staubgefüllt; Niederschläge sind mässig, Nebel selten.

An den Küsten begegnet man erheblich gleichmässigeren Temperaturen. Im Sommer fehlt es ganz an den längeren Perioden stärkerer, erschlaffend wirkender Hitze; im Winter wird die Kälte weniger intensiv. Die Uebergänge im Frühjahr und Herbst vollziehen sich spät, aber langsam und allmählich, ohne bedeutendere Rückschläge. Meist herrschen lebhaft Winde; das Sättigungsdeficit ist gering und die Luft rein und staubfrei. Niederschläge sind relativ häufig, der Himmel oft bewölkt; leicht kommt es zu Nebelbildung.

Auch innerhalb ein und desselben Küsten- oder Binnenlandes machen sich noch vielfache klimatische Unterschiede bemerkbar. So kann das lokale Klima wesentlich beeinflusst werden, indem durch Gebirge (Riviera) oder Waldungen ein Schutz gegen die kältesten Winde gewährt wird; indem ferner durch die Lage des Ortes an einem nach S oder SW geneigten Abhang besonders starke Insolation erfolgt; indem die Bodenbeschaffenheit selbst nach stärkeren Niederschlägen ein Trockenbleiben der Bodenoberfläche garantirt u. s. w. — Von mächtigem Einfluss sind ausgedehntere Waldungen. Sie bewirken, ähnlich wie grosse Wassermassen, ein Ausgleichen der Temperatur, dadurch dass sie einer zu starken Insolation durch fortwährende Verdunstung von Wasser ent-

gegenwirken, und einer zu starken Abkühlung durch die reichlichere Feuchtigkeit der Atmosphäre und durch Wolken- und Nebelbildung vorbeugen. Ebenausgleichend wirken sie auf die Vertheilung der Niederschläge. Von dem fallenen Regen halten sie einen relativ grossen Bruchtheil in der oberen locken Bodenschicht zurück, und dieser Antheil fällt nicht einer plötzlichen, sondern einer langsamen, mässigen Verdunstung anheim, da die Luft ein niedriges Sättigungsdeficit zeigt und die Winde nur ganz abgeschwächt zur Wirkung kommen. Die Jahresmenge der Niederschläge ist zwar bedeutend, aber dieselben gehen allmählich und nicht mit plötzlicher Gewalt nieder, weil keine Gelegenheit zu schroffen Abkühlungen und starker Condensation gegeben ist. — Aus dem hält sich die Luft innerhalb der Waldungen aromatisch und staubfrei, bei hoher Luftwärme wird die Entwärmung des Körpers durch Abstrahlung begünstigt (S. 97).

Krankheiten der gemässigten Zone.

Die folgende Tabelle giebt eine Statistik der Sterblichkeit in verschiedenen Lebensalter für einige Länder der gemässigten Zone. Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, wie in den Ländern mit vorwiegend continentalem Charakter des Klimas — Preussen und Oesterreich — vor allem die Säuglingsterblichkeit höher ist, als in den Ländern mit relativ stärkerer Küstenentwicklung. Berücksichtigt man die Todesursachen genauer (vgl. S. 5), so zeigt sich, dass in Binnenlande die Cholera und Diarrhoea infantum über 20 Procent der Todesfälle ausmacht; dazu kommen zahlreiche Todesfälle an Phthisis, Pneumonie und Bronchitis, die zusammen ebenfalls mehr als 20 Procent der Gesamtmortalität betragen.

Altersklasse	Von 10 000 Menschen jeder Altersklasse starben in:			
	Preussen	Oesterreich	Belgien	Norwegen
0—1	2177	2582	1785	1063
1—2	577	610	580	331
2—3	281	319	269	176
3—4	178	215	171	152
4—5	130	127	125	98
5—10	94	98	127	63
10—15	42	41	64	39
15—20	49	63	76	52
20—25	69	93	103	72
25—30	82	97	112	77
30—35	106	106	127	81
35—40		126	135	91
40—45	146	149	160	96
45—50		181	171	112
50—55		242	208	186

Im Küstenklima ist die Mortalität der Kinder viel geringer, weil er die heissen Sommermonate fehlen, die allein zahlreichere Opfer an *colera infantum* fordern. Ferner tritt an den Küsten in ganz auffälliger Weise die Frequenz der Todesfälle an Phthise zurück. Während Deutschland im Mittel von 1000 Lebenden 3·6 an Phthise sterben (Kassel, Breslau u. s. w. 3·7—3·8), werden in Danzig, Stettin, Amsterdam, Haag, England 2·4—2·6 Todesfälle an Tuberkulose auf je 1000 Lebende gezählt. — Die klimatischen Verhältnisse, denen dieser günstige Einfluss auf die Phthise zugeschrieben werden muss, liegen vornehmlich hauptsächlich in den selteneren und geringeren Schwankungen der Witterung, welche zu einer Verminderung der Erkältungen und dadurch zu günstigerem Verlauf der Phthise führen; ferner in den gemässigten Hochsommertemperaturen, welche es gestatten, dass selbst während dieser Jahreszeit an Stelle der körperlichen Erschlaffung, die der continentale Sommer mit sich zu bringen pflegt, reichliche Nahrungsaufnahme stattfindet und die Körperkräfte erhalten bleiben; vielleicht noch in der steten Bewegung der Luft und dem dadurch gegebenen Antrieb zu tiefen Respirationen. Auch im Seeklima hat man ausserdem eine Zunahme der rothen Blutkörperchen, ähnlich wie im Höhenklima, beobachtet. — Völlig unrichtig ist die Vorstellung, dass ob das Freisein der atmosphärischen Luft von Tuberkelbacillen von wesentlicher Bedeutung sei. Die Infektionen erfolgen in ganz überwiegendem Maasse innerhalb der Wohnungen und der Keimgehalt der Wohnungsluft wird von den klimatischen Differenzen kaum berührt.

Im Uebrigen spielen bei der Mortalität einzelner Landstriche und Städte die Erwerbsverhältnisse, Ernährung und Beschäftigung eine grosse Rolle. So ist in manchen Küstenländern die geringere Entwicklung industrieller Anlagen und die vorzugsweise Beschäftigung der ärmeren Bevölkerung mit Schifffahrt und Fischfang gewiss ebenfalls bei der niederen Mortalitätsziffer der Phthise betheiligt; und wiederum die hohe Sterblichkeit zwischen dem 10. und 30. Lebensjahre in Belgien durch die dortigen ausgedehnten Arbeiterdistrikte bedingt. Auch die Bauart der Häuser, die Heizeinrichtungen, die Tracht der ländlichen Bevölkerung, eine Menge von Sitten und Gebräuchen findet man nicht selten in benachbarten Theilen eines Landes sehr verschieden; und in allen diesen Momenten ist oft eher der Grund für eine lokale Steigerung oder Verminderung der Mortalität an einzelnen Krankheiten zu suchen, als in klimatischen Differenzen.

4. Das Höhenklima.

Charakteristik. In der gemässigten Zone beginnen die Eigenthümlichkeiten des Höhenklimas etwa in 400—500 m Höhe; in niederen Breitengraden jedoch erst in bedeutend grösserer Höhe. An dem Aufhören der Vegetation und dem Beginn des ewigen Schnees lässt sich diese Abhängigkeit des Höhenklimas von der geographischen Breite am deutlichsten verfolgen; in den Anden Südamerikas erhebt sich bekanntlich die Baumregion noch bis in eine Höhe von 4000 Meter.

Die klimatischen Eigenthümlichkeiten des Höhenklimas sind folgende:

Die Temperatur erfährt eine Verminderung und ausserdem eine Aenderung, welche im Allgemeinen der vom Meere bewirkten ausgleichenden Beeinflussung ähnlich ist. Für je 100 m Erhebung nimmt die Temperatur im Mittel um 0.57° ab; diese Abnahme erfolgt aber im Sommer schneller, nämlich 1° auf 160 m Erhebung; im Winter langsamer, 1° auf 280 m. Ferner nimmt die jährliche und die tägliche Temperaturschwankung mit der Höhe ab.

Die für das Höhenklima charakteristischen Verhältnisse gelten allerdings nur für die Gipfel, Rücken, Abhänge und breiten Hochthäler, nicht dagegen für grössere Plateaus und für enge Hochthäler. Erstere können sehr starke Contraste zwischen Tag und Nacht, Sommer und Winter bieten, namentlich wenn ihnen die Bewaldung fehlt; und die engeren Thäler zeigen Nachts und im Winter sehr niedrige Temperaturen, weil die kalte Luft dann in ihnen herabsinkt und dort lagern bleibt.

Die absolute Feuchtigkeit ist, entsprechend den niederen Wärmegraden, sehr gering; die relative Feuchtigkeit meist hoch und das Sättigungsdeficit niedrig. Da aber im Freien stets lebhafter Wind herrscht und auch der geringe Luftdruck die Verdunstung erleichtert, kommt es trotzdem zu einer merklichen, stark trocknenden Wirkung der Luft. Diese wird sofort ausserordentlich gross, wenn etwa durch Sonnenwirkung hohe Temperatur hergestellt wird, und ebenso in beheizten Wohnräumen. Halten sich die Menschen vorzugsweise in der Sonne und im geheizten Zimmer auf, so werden sie das dem sich herstellende starke Sättigungsdeficit an der Trockenheit der Kleider und der unbedeckten Haut deutlich empfinden. Nur selten kommt es daher zu Schweissbildung und zu fühlbarer Durchfeuchtung der Kleider.

Die Regenmenge steigt mit der Erhebung; erst in grösseren Höhen nimmt sie wieder ab. Der Regen hinterlässt aber bei der meist vorhandenen Neigung des Terrains und bei dem starken Austrocknungsvermögen der Luft selten anhaltendere Bodennässe.

Die Luftbewegung ist lebhafter als in der Ebene; aber meist kann leicht völliger Windschutz aufgesucht werden. Bei der steten Trockenheit der Haut und Kleidung pflegt selbst kalter mässiger Wind nur kräftig anregend zu wirken.

Die niedere Temperatur und der lebhafte Wind vereinigen sich, um schon in relativ geringer Höhe die Perioden der schwülen Sommermonate zu beseitigen, die so schwer auf den meisten Menschen lastet und Kranke vollends herunterbringt. Die Wärmeabgabe erfolgt vielmehr stets, auch bei reichlichster Nahrungszufuhr, ausserordentlich leicht. Appetit und Stoffwechsel pflegen daher das ganze Jahr hindurch ausserordentlich rege zu sein. — Ausserdem führt

ie Herabsetzung des Luftdruckes und die Verminderung der Sauerstoffmenge der Luft zu den S. 119 geschilderten Wirkungen.

Besondere Effekte sind noch der überaus kräftigen Insolation zuzuschreiben. Die niedere Schicht der Atmosphäre, ihre grosse Armuth an Wasserdampf, ihre Klarheit und Staubfreiheit lässt im Gebirge einen viel grösseren Bruchtheil der Sonnenstrahlen zur Erde gelangen als im Thale. Alle Gegenstände, welche Wärme zu absorbiren vermögen, z. B. schneefreier Boden, die Häuser, die Kleider der Menschen u. s. w. müssen sich daher sehr intensiver den Sonnenstrahlen erwärmen. In der That finden wir noch in grosser Höhe eine ebenso grosse Bodentemperatur wie im Thal, während die Lufttemperatur der Polargegenden gleichkommt. In Folge der intensiven Insolation können selbst Kranke im Winter des Hochgebirges sich dauernd im Freien aufhalten; an besonnten Plätzen fühlen sie sich warm und behaglich, während sie eine norm. kalte Luft einathmen. Dieser Contrast scheint bei Leiden der Respirationsorgane von nicht ungünstiger Wirkung zu sein.

In Davos (Seehöhe 1560 m) zeigte z. B. das Vacuumthermometer am 7. December:

8 Uhr 20 Min.	Morgens (vor Sonnenaufgang)	= - 18.3°
8	" 45 "	" = + 22°
9	" — "	" = + 30°
12	" — "	" = + 42.4°
1	" 45 "	" = + 43°

am 25. December:

12 Uhr in der Sonne = + 40°; im Schatten = - 9.1°.

Unter Umständen wird die Erwärmung noch gesteigert durch die reflektirte Wärmestrahlung, die bei Gletschern, Schnee und Wasserflächen einen sehr beträchtlichen Theil der gesamten Insolationswärme ausmacht. Mit der Erwärmung durch die Sonnenstrahlen geht ferner eine ausserordentlich intensive Belichtung parallel, da die Atmosphäre für die Lichtstrahlen, auch für die chemisch wirksamen, viel durchgängiger ist.

Endlich ist zu erwähnen die Reinheit und Staubfreiheit der Luft namentlich in waldbedeckten Gebirgen, welche anregend auf die Respiration wirkt. Das oft betonte Freisein der Gebirgsluft von Mikroorganismen kann nicht als bedeutsam anerkannt werden, ebensowenig wie die gleiche Eigenschaft der Seeluft, da sich dieses Freisein nicht auf die Luft der Wohnräume und auf die gewöhnliche unmittelbare Umgebung des Menschen erstreckt.

Krankheiten des Höhenklimas.

Die Mortalitätsverhältnisse scheinen im Ganzen günstig zu sein, so weit sich dies aus den schwer unter einander vergleichbaren statistischen Daten entnehmen lässt. — Von besonderem Interesse ist es, dass dem Höhenklima gegen eine Reihe von verbreiteten Infektionskrankheiten relative oder vollständige Immunität nachgerühmt wird; nämlich gegen Cholera infantum, Cholera asiatica und andere infektiöse Darmkrankheiten; sodann gegen Malaria und gegen Phthise.

Die Verminderung resp. das Fehlen der Cholera infantum ist durch die niederen Sommertemperaturen verursacht. Wo trotz der

Höhenlage die Sommerwärme hochgradig wird, z. B. auf kahlen Plateaus und in grossen Städten, findet sich oft eine höhere Kindersterblichkeit als in der Ebene. Von 10 000 Kindern im ersten Lebensjahre starben z. B. in München (528 m) 3290, in Dresden 2270.

Cholera asiatica ist zwar an vielen hochgelegenen Orten noch nicht aufgetreten, doch beweist das nichts für eine Immunität des Höhenklimas, da auch in der Ebene manche Orte bis jetzt verschont geblieben sind und da die Erschwerung des Verkehrs im Gebirge die Chancen für die Einschleppung der verschiedensten Infektionskrankheiten sehr herabsetzen. Andererseits ist es erwiesen, dass selbst grosse Höhenlage vor Cholera nicht schützt, sobald nur reichliche Verkehrsgelegenheit gegeben ist; so hat die Stadt Mexico (2200 Meter) mehrfache heftige Epidemien erlebt.

Malaria kommt in den Alpen bis zu einer Höhe von etwa 500 m vor, in Italien bis 1000 m, in den Anden bis 2500 m. Die immune Zone beginnt daher erst dann, wenn deutliche Herabsetzung der Temperatur eintritt. Gleichwohl ist die Kälte keinesfalls das einzige Moment, das im Gebirge wirksam ist; denn in der Ebene veranlassen erst erheblich niedrigere Temperaturen, ein geradezu polares Klima, die Abnahme resp. das Aufhören der Malaria. Wahrscheinlich ist im Gebirge der Umstand mit von Einfluss, dass hier Ebenen oder muldenförmige Thäler mit starker und anhaltender Bodendurchfeuchtung, wie sie für eine Entwicklung der Stechmücken günstig sind, höchst selten vorkommen.

Die Todesfälle an Phthise nehmen mit der Höhenlage entschieden ab. In Persien, Indien, am Harz, im Riesengebirge, in der Schweiz, den Anden und Cordilleren Amerikas konnte diese Beobachtung bestätigt werden. Auf bewaldeten Gebirgsrücken wurde schon in der Höhe von 5—600 m bereits Abnahme der Phthise constatirt. Aber es tritt nicht etwa volle Immunität ein, vielmehr nur ein allmähliches Geringerwerden der Mortalität. Auch in der Schweiz finden sich in den höchst gelegenen Ortschaften noch Fälle von Phthise. Stark verwischt wird der Einfluss der Höhenlage indess in stark bevölkerten industriereichen Städten, wie die Beispiele von München und Bern zeigen.

Unbekümmert um die Beschäftigung der Bevölkerung und sonstige Lebensverhältnisse, tritt der Einfluss des Höhenklimas auf die Phthise anscheinend erst in Höhen über 2000 m zu Tage. In den 2000—2500 m hoch gelegenen Städten (Mexico mit 350 000 Einw., Puebla mit 80 000 Einw., Quito mit 60 000 Einwohnern u. s. w.) kommt nach übereinstimmenden Berichten Phthise nur in ganz verschwindender Menge vor.

Die Erklärung für die ausgesprochene günstige Beeinflussung der Phthise werden wir theils darin finden müssen, dass die gleichmässigere Witterung und die niedrigere Temperatur des Hochsommers den Ernährungszustand des Körpers in ähnlicher Weise begünstigt und vor Erkältungen schützt wie das Seeklima. Theils kommt möglicherweise noch die Vermehrung der rothen Blutkörperchen und als besonders schützendes Moment die Vermehrung der Pulsfrequenz und die ausgiebigere Respiration in Betracht, welche unter der Einwirkung des verminderten Luftdrucks und Luftsaauerstoffs beobachtet werden.

Acclimatisation.

Vielfach besteht die Ansicht, dass es möglich sein müsse, den schädlichen Einflüssen eines Klimas durch allmähliche Gewöhnung des Körpers — sei es dass sich diese nur auf das einzelne Individuum, oder aber auf eine Reihe von Generationen erstreckt — zu begegnen, und dass der Mensch im Grunde befähigt sei, in jedem Klima zu leben und zu gedeihen.

Die Erfahrung hat jedoch diese Ansicht, namentlich bezüglich des arischen Völkerstammes, nicht bestätigt. Unter den extremen Klimaten kommt das arktische wenig in Frage; es ist naturgemäss selten das Ziel grösserer Colonisationsversuche. Jedenfalls scheint es relativ geringe Gefahren für die Gesundheit zu bieten; gesunde und mit guten Verdauungsorganen ausgerüstete Menschen pflegen sich dort wohl zu befinden. Auch bei einer Fortpflanzung durch mehrere Generationen tritt keine abnorme Entwicklung des Körpers zu Tage. Eine Grenze wird der Existenzfähigkeit des Menschen hier nur gesetzt durch die Schwierigkeit einer ausreichenden Ernährung, durch das Fehlen einer Flora und Fauna, und durch den steten Kampf mit elementaren Gewalten.

In der gemässigten Zone und auch in den subtropischen Gebieten stösst die Colonisation ebenfalls auf keine Schwierigkeiten. So haben wir blühende europäische Niederlassungen im südlichen Australien, in Südafrika, in Chile, Argentinien, dem südlichsten Theil von Brasilien u. a. m.

Ungleich schwieriger ist für die arischen Völker, speciell für die Bewohner des mittleren Europas, eine Besiedelung tropischer Gebiete. Zwischen dem Aequator und 15° nördlicher und südlicher Breite und in einer Höhe von weniger als 800 m vermag der Europäer keine dauernden Wohnsitze zu begründen. Schon das eingewanderte Individuum selbst pflegt kaum einen ununterbrochenen Aufenthalt von

mehreren Jahrzehnten ohne manifeste Gesundheitsstörung ertragen zu können. Die in den Tropen geborenen Kinder von Einwanderern (Kreolen) sind besonders leicht vulnerabel und müssen meist für Jahrzehnte nach der Heimath oder in ausnahmsweise günstig gelegene Gegenden, in Sanatorien im tropischen Hochgebirge u. s. w. gesandt werden, falls sie zu gesunden Menschen heranwachsen sollen. In der zweiten und dritten Kreolen-Generation tritt bereits eine geringere Vermehrung hervor, und schliesslich bleiben die Ehen unfruchtbar. Ausnahmsweise und in relativ günstig gelegenen, namentlich gebirgigen tropischen Regionen ist es wohl zu einer längeren Nachkommenreihe und zu einer Vermehrung arischer Einwanderer gekommen; aber im Allgemeinen sind die Ansiedelungsversuche der weissen Rasse in den Tropen als fehlgeschlagen zu bezeichnen.

Die gefährlichsten Gesundheitsstörungen, durch welche diese Misserfolge bedingt werden, sind, wie oben hervorgehoben wurde (S. 128), vorzugsweise die Tropenanämie und die dieselben begleitenden Leberaffektionen, Malaria und Dysenterie; in manchen Gegenden gesellen sich noch Gelbfieber, Beri-Beri und andere endemische Krankheiten hinzu.

Diese Klimawirkungen kommen aber nicht gegenüber allen Menschen zu Stande. Die eingeborene Bevölkerung zeigt zwar meist eine stärkere Gesamt-Mortalität, als wir in der gemässigten Zone finden; aber trotzdem reichliche Vermehrung, kräftige Körperbeschaffenheit und ziemliche Leistungsfähigkeit. Ferner giebt es auch einige südeuropäische Völker, welche unter dem Tropenklima viel weniger zu leiden haben, und sich dort dauernd vermehren; so namentlich Spanier und Portugiesen. — Es muss von grosser Bedeutung sein, festzustellen, worin diese Unterschiede in der klimatischen Wirkung begründet sind und ob nicht Aussicht vorhanden ist, dass durch Acclimatisation auch die anderen europäischen Völker eine gleiche Unempfindlichkeit sich aneignen können.

Für die hervorgehobenen Differenzen in dem Einfluss des Tropenklimas ist nun 1) angeborene Rassen-Disposition maassgebend. Dieselbe macht sich geltend durch eine angeborene Immunität gegen die am meisten gefahrdrohenden Krankheiten. So sind die Neger immun gegen Gelbfieber. Ferner muss in ihrer Körperbeschaffenheit ein gewisser Schutz gegen die Tropenanämie und deren Folgen gegeben sein; alle Organe, insbesondere die blutbildenden, verhalten sich vermuthlich so, dass die denkbar günstigsten Bedingungen für den im tropischen Klima lebenden Körper verwirklicht sind. Diese Körperbeschaffenheit vererbt sich von Generation zu Generation, und garantirt

die Nachkommen die gleiche Existenzfähigkeit, falls dieselbe nicht noch fortgesetzte Kreuzung mit weniger geeigneten Rassen beeinträchtigt wird.

Für europäische Völker ist es bezüglich ihrer Ansiedlungsfähigkeit in den Tropen von grosser Wichtigkeit, ob ihre Vorfahren sich vor mit Einwanderern aus der tropischen oder subtropischen Zone gesetzt und so eine Rassenimmunität erworben haben. Es ist das eifellos der Fall bei den Maltesern, Spaniern und Portugiesen, die schon mit phönizischem und maurischem Blut gemischt haben. Diese leben fern daher noch jetzt die in der warmen Zone resistentesten Colonisten. Nordfranzosen und Deutsche, die ihre Rasse reiner erhalten haben, sind am vulnerabelsten. Besonders widerstandsfähig sollen sich die Juden erweisen.

Jedoch sind die betreffenden statistischen Belege, die in Algier, Westafrika u. s. w. für die Resistenz der verschiedenen Rassen gesammelt sind, wenigweisend, da dieselben gewöhnlich die verschiedene Beschäftigung und Lebensweise der verglichenen Rassen nicht berücksichtigen. In Algier z. B. sind die eingewanderten Franzosen und besonders Elsässer die eigentlichen Ackerbauer gewesen, die ins Innere des Landes vorgedrungen sind und allen Gefahren ausgesetzt waren; die Semiten dagegen haben sich wesentlich in den Städten aufgehalten und Handel getrieben. Dabei sind sie den Gefahren des Klimas ausserordentlich viel geringerem Grade ausgesetzt als jene Colonisten; und ein Vergleich der Sterblichkeit beider Rassen gestattet noch keinen endgültigen Schluss auf ihre Resistenz gegen die Wirkungen des Klimas.

2) Ferner kommt eine angeborene individuelle Disposition für die Lebensfähigkeit in den Tropen in Betracht. Selbst unter den Individuen eines nordeuropäischen Volkes pflegt es Einige zu geben, welche eine angeborene Immunität gegen die bedeutsamsten Infektionskrankheiten besitzen, ausserdem über eine im Uebrigen möglichst für das Leben in den Tropen geeignete Körperbeschaffenheit verfügen, und befähigt sind, sich von Tropenanämie frei zu erhalten. Magere, aber kräftige Menschen von normaler Blutfülle und Blutbeschaffenheit, mit wenig schwitzender Haut, scheinen in dieser Beziehung anämischen, hydrämischen, fetten oder leicht schwitzenden Menschen überlegen zu sein. — Derartige angeborene Eigenschaften, deren genauere Erkenntnis ganz besonders wichtig sein würde, werden durch Ehen mit weniger günstig Constituirten sich leicht verlieren; sie können aber günstigen Falls vererbt werden, und dann zu jenen hier und da beobachteten Generationen ausnahmsweise existenzfähiger Europäer führen.

3) Bis zu einem gewissen Grade ist eine Aenderung des Individuums im Sinne einer Anpassung an das Klima denkbar. Dieselbe

keit berücksichtigt werden, und die Colonisten müssen von Anfang an auf eine möglichst sorgsame Durchführung der erprobten hygienischen Massregeln achten. Von grösster Bedeutung ist die Tilgung der Mücken, insbesondere der Malaria in den Colonialgebieten nach den im Kap. „Parasitäre Krankheiten“ dargelegten Grundsätzen. Durch die auf der neueren Erforschung dieser Krankheiten beruhenden Massnahmen können in Zukunft Gebiete besiedlungsfähig werden, die bisher für das Bewohnen von Europäern als völlig ungeeignet gelten mussten. Unter solchen Cautelen wird, selbst wenn auch von einer „Acclimation“ wenig zu erwarten ist, mindestens doch die Leitung tropischer Colonieen durch Europäer ausführbar sein.

Literatur: a) Methoden: JELINEK, Anleitung zur Anstellung meteorologischer Beobachtungen, Wien 1876. — FLÜGGE, Lehrbuch der hygienischen Untersuchungsmethoden, Leipzig 1881. — LEHMANN, Die Methoden der praktischen Hygiene, Wiesbaden 1890.

b) Meteorologie und Klimatologie: HANN, Handbuch der Klimatologie, 1883. — SUPAN, Grundzüge der physischen Erdkunde, 2. Aufl. 1895. — WINKOFF, Die Klimate der Erdkunde. Nach dem Russischen. 2 Bände. 1887. RATH, Anthropogeographie, 1882. — VAN BEEBE, Hygienische Meteorologie, 1895. — ASSMANN, Das Klima, im „Handb. der Hygiene“, 1894.

c) Hygienischer Einfluss von Witterung und Klima: RENK, Die Luft, im Handbuch der Hygiene von v. PETTENKOFER u. v. ZIEMSEN. — HIRSCH, Handbuch der historisch-geographischen Pathologie, 2. Aufl. 3 Bde. 1881—87. — WEBER, Klimatherapie in v. ZIEMSEN's Handb. der Allgem. Therapie, 1880. — RÜNER, Lehrbuch der Hygiene. 6. Aufl. 1900. — RÜNER u. WOLPERT im Arch. f. Hygiene.

d) Akklimatisation: VIECHOW, Ueber Akklimatisation, Vortrag a. d. Naturf.-Vers. in Strassburg, 1885. — MÄHLY u. TREILLE, Referate auf d. hyg. Congress in Wien, 1887. — SCHELLONG, Akklimatisation und Tropenhygiene, im „Handb. d. Hygiene“, 1894.

Drittes Kapitel.

Die gas- und staubförmigen Bestandteile der Luft.

I. Chemisches Verhalten.

Die chemische Beschaffenheit der Luft ist für den menschlichen Körper von grosser Bedeutung, weil zwischen beiden ein inniger Wechselverkehr besteht. Der Mensch athmet täglich etwa 10 cbm Luft ein und führt deren Gase theilweise ins Blut über; die

gleiche Menge wird, beladen mit allerlei Excreten, durch Lungen und Haut ausgeathmet. In ähnlicher Weise wird die Beschaffenheit der Aussenluft durch die Athmung der Thiere und Pflanzen, durch Fäulnis- und Gährungsprocesse, durch Verbrennungen u. s. w. verändert. Es fragt sich, welchen Grad diese Veränderungen allmählich innerhalb der freien Atmosphäre und im Wohnraum erreichen und welche Schädlichkeiten dem Körper eventuell daraus erwachsen können.

Untersucht man die atmosphärische Luft, so findet man im Mittel etwa 20·7 Procent Sauerstoff; 78·3 Procent Stickstoff ($O:N = 20·9:79·1$); eine kleine Menge Argon; wechselnde Quantitäten, im Mittel etwa 1 Procent Wasserdampf; ferner kleine Mengen Kohlensäure; Spuren von Ozon, Wasserstoffsuperoxyd, Ammoniak Salpetersäure, salpetrige Säure; zuweilen auch schweflige Säure, Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoffe u. s. w.

Die quantitativen Schwankungen und die hygienische Bedeutung dieser verschiedenen Bestandtheile sind im Folgenden gesondert zu erörtern. Bezüglich des Wasserdampfs, der vorzugsweise als klimatisches Element eine Rolle spielt, muss auf das vorhergehende Kapitel verwiesen werden.

1. Der Sauerstoff.

Derselbe wird überall in der Atmosphäre in der gleichen procentischen Menge gefunden; die Schwankungen des Gehalts betragen in maximo 0·5 Procent; die niedrigsten Zahlen treten bei südlichen Winden und nach anhaltendem Regen auf. Für gewöhnlich zeigt die Luft selbst in Fabrikstädten kaum messbare Unterschiede gegenüber der Land- und Waldluft.

Der Grund dieser Constanz liegt darin, dass der Vorrath der Atmosphäre an Sauerstoff ein ganz enormer ist. Wenn auch in dem Maasse, wie es jetzt geschieht, fortgesetzt Sauerstoff durch Verbrennung und Athmung verbraucht und zur Bildung von CO_2 , H_2O u. s. w. verwandt wird, und wenn aus allen diesen Verbindungen der O nicht nachträglich wieder frei wird, so müssen doch etwa 18000 Jahre verfließen, bis der O-Gehalt um 1 Procent abnimmt. Ein wesentlicher Theil des zu Oxydationen verwandten Sauerstoffs wird aber bekanntlich durch die Chlorophyll führenden Pflanzen wieder in Freiheit gesetzt, so dass thatsächlich die Abnahme noch erheblich langsamer erfolgt. — Ausserdem sorgen für eine stets gleichmässige Vertheilung des Sauerstoffs und der anderen Gase die Winde, die fortgesetzt ein kräftiges Umrühren und inniges Mischen der Luft bewirken.

Auch in Folge des Sauerstoffconsums innerhalb bewohnter Räume werden nur geringe Abweichungen von der Norm beobachtet; die vorkommenden Schwankungen sind als hygienisch bedeutungslos anzusehen. Die absolute Menge des eingeathmeten Sauerstoffs kann

dagegen in erheblichem Grade vermindert werden bei abnehmendem Luftdruck (S. 109); und eine geringere Wirkung tritt ein mit der höheren Temperatur und der damit parallel gehenden Ausdehnung der Luft, ohne dass jedoch die Grösse dieses Ausfalls an Sauerstoffzufuhr Symptome veranlassen könnte.

Eine Bestimmung des Sauerstoffgehalts der Luft ist daher äusserst selten im hygienischen Interesse wünschenswerth. Die Ausführung hat eventuell nach den Vorschriften und unter den üblichen Cautelen der Gasanalyse zu erfolgen.

Der Stickstoff der atmosphärischen Luft hat keinerlei Funktion im thierischen oder pflanzlichen Körper; er stellt nur ein indifferentes, den Sauerstoff gleichsam verdünnendes Agens dar, das hygienisch bedeutungslos ist. Die gleiche Indifferenz kommt dem Argon zu.

2. Ozon und Wasserstoffsuperoxyd.

Beiden Körpern ist ein sehr energisches Oxydationsvermögen eigen, und sie machen daher zusammen die sogenannte „oxydirende Kraft“ der Luft aus.

Das Ozonmolekül wird aufgefasst als ein Sauerstoffmolekül, welchem noch ein drittes Sauerstoffatom angelagert ist (O_3). Es ist ein farbloses Gas von eigenthümlichem Geruch, das in reinem Zustande noch nicht erhalten wurde, sondern höchstens mit relativ viel gewöhnlichem Sauerstoff gemengt. In Wasser ist es nur in Spuren löslich. Bei höherer Temperatur, bei Berührung mit den verschiedenen oxydablen Stoffen wird es zersetzt.

Das Ozon der Atmosphäre entsteht durch elektrische Entladungen (Gewitter); bei allen in grösserem Umfange ablaufenden Oxydationsprocessen; ferner bei Verdunstung von Wasser. In beiden letzten Fällen entsteht gleichzeitig Wasserstoffsuperoxyd, bei der Verdunstung sogar in stark vorwiegender Menge, wenn nicht ausschliesslich. — Künstlich lässt sich Ozon am reinsten darstellen, wenn man im RÜCHENBERG'schen Apparat elektrische Schläge durch Luft oder Sauerstoff leitet; ferner durch langsame Oxydation von Phosphorstücken, die zur Hälfte in Wasser eintauchen; oder indem man einen erhitzten Platindraht in Aetherdampf bringt (Princip der DÖBEREINER-JÄGER'schen Ozonlampe); oder dadurch, dass man gepulvertes Kaliumpermanganat allmählich mit Schwefelsäure versetzt.

Unter den Eigenschaften des Ozons ist sein kräftiges Oxydationsvermögen am bemerkenswerthesten. Farbstoffe werden durch Ozon zerstört, Metalle oxydirt, Schwefelmetalle in Sulfate, gelbes Blutlaugensalz in rothes übergeführt. Organische Körper aller Art, Staub, Verunreinigungen der Luft werden gleichfalls oxydirt und bewirken damit Zerlegung des Ozons.

Zur Bestimmung des atmosphärischen Ozons benutzt man gewöhnlich Jodkaliumstärkepapiere, welche 24 Stunden an einem gegen Sonnenlicht geschützten Orte der Luft exponirt, dann befeuchtet und mit einer 16stufigen Farbenskala verglichen werden.

Diese Art der Messung ist durchaus ungenau; vor allem besteht der Fehler derselben darin, dass das Reagenspapier die summirte Wirkung aller Ozontheilchen anzeigt, die in 24 Stunden darüber gestrichen sind, dass also der Reaktionsgrad wesentlich abhängig ist von der Intensität der Luftbewegung,

während der Gehalt der Luft an Ozon, der Concentrationsgrad, geprüft werden soll — Es kann dieser Fehler dadurch eliminirt werden, dass man das Papier in einer sog. Ozontüche einem Luftstrom von constanter Geschwindigkeit aussetzt. Aber auch dann sind immer noch zahlreiche Ungenauigkeiten vorhanden. — Auch mit dem neuerdings empfohlenen Tetramethylparaphenyldiamin-Papier, kurz Tetra-Papier (Wusterke), gelingt eine einigermaßen sichere Bestimmung des atmosphärischen Ozons nicht.

Der Eifer, mit welchem trotz der Unvollkommenheiten der Methoden Ozonmessungen betrieben sind, muss zu der Vermuthung führen, dass dem Ozon eine erhebliche hygienische Bedeutung zukommt. Eine solche ist indessen nicht nachgewiesen. Halten sich Menschen in einer künstlich stark ozonhaltig gemachten Zimmerluft auf, so treten Schläfrigkeit und Symptome einer Reizung der Respirationsschleimhaut ein. Bei noch stärkerem Ozongehalt kommt es zu Glottiskrampf und sehr heftiger Reizung der Schleimhäute. Von kleineren, aber im Vergleich zum Gehalt der Atmosphäre immerhin bedeutenden Ozonmengen haben Unbefangene keinerlei Empfindung. Auf der Haut machen selbst stärkste Concentrationen keinerlei Eindruck.

Wenn sonach eine directe Wirkung des in der Luft enthaltenen Ozons auf den Menschen entschieden bestritten werden muss, so hat man doch einen indirecten hygienischen Einfluss vermuthet darin, dass das Ozon vielleicht Mikroorganismen und speciell Infektionserreger zu tödten vermag. Auch das hat sich indess nicht bestätigt. Relativ starke Concentrationen des Ozons sind ohne Wirkung auf Leben und Entwicklung der Mikroorganismen: erst bei einem Gehalt von 2 mg Ozon im Liter beginnt nach 48 Stunden eine Schädigung von wenig resistenten Bakterien; gegenüber resistenten erst bei einem Gehalt von 14 mg Ozon im Liter. In der atmosphärischen Luft werden dagegen im Mittel nur 2 mg in 100 Cubikmeter, in maximo 2 mg in 1 ccm Luft gefunden.

Auch aus den Resultaten der zahlreichen bis jetzt ausgeführten Beobachtungen lässt sich nicht entnehmen, was für eine hygienische Bedeutung der atmosphärischen Ozon spräche. Am wenigsten beobachtet man im Herbst, bei westlichen Nord- und Nordostwinden, bei Wolkendecke („N. vor Gewitter“) die größten Mengen im Frühjahr, bei windiger bewegter Luft nach Gewittern, bei Schneefall. — Ostliche Abwinde finden sich in Wäldern, am Meer, auf Bergen u. s. w. In den meisten gemessenen Städten (Paris, London, Boston, Prag u. s. w.) war in der Sommerzeit 1897 in bewölkten Räumen kein Ozon nachweisbar. Alles dies lässt allerdings sprechen dafür, dass keine irgend erhebliche Bedeutung an die Gesundheit durch den Ozongehalt der Luft zu setzen kommt.

statische Vergleiche zwischen den Resultaten der Ozonmessung
1 Auftreten von Infektionskrankheiten sind mehrfach angestellt;
1 ohne positives Ergebniss.

1 insofern ist ein Ozongehalt der Luft von Bedeutung, als der-
zeigt, dass die Luft frei von allem organischen Staub, übel-
en Substanzen u. s. w. ist, da diese alle das Ozon rasch zersetzen
en Ozon nicht vorkommen können. Diese Reinheit der Luft
st den Respirationstypus und von da aus verschiedene körper-
nktionen; aber das Wesentliche ist dabei nicht der Ozongehalt,
1r Umständen auch = 0 sein kann, sondern das Fehlen jener
n Beimengungen bezw. das Vorhandensein aromatischer, die
g anregender Substanzen (Wald-, Wiesenluft).

1 in der Atmosphäre enthaltene Wasserstoffsuperoxyd, H_2O_2 , ent-
reih dieselben Prozesse wie das Ozon, meist aber in viel grösseren
als dieses. — Die oxydirende Kraft des H_2O_2 ist nicht so gross wie die
s; Jodkalium wird langsamer zerlegt, Indigo wird nur allmählich ent-
ie Oxydationen erfolgen indess momentan, wenn einige Tropfen Eisen-
ang zugefügt werden. Ferner vermag H_2O_2 auch reducierend zu
 $H_2O_2 + O = H_2O + O_2$, z. B. auf Kaliumpermanganat, Ferricyankalium.

1 atmosphärische H_2O_2 ist leichter nachweisbar als das Ozon, weil es
en Niederschlägen löst und dort gleichsam gesammelt wird; man unter-
o diese oder bewirkt künstliche Thaubildung. — Im Mittel findet man
er Niederschlag 0.2 Milligramm; in Schnee und Hagel sehr wenig,
en im Juni und Juli und bei westlichen Winden.

gienische Bedeutung scheint dem atmosphärischen Wasserstoff-
d nicht zuzukommen. Die betreffenden Concentrationen sind sowohl
Menschen wie auf Mikroorganismen ohne Wirkung.

3. Kohlensäure.

Quellen der atmosphärischen CO_2 kommen in Betracht:
Athmung der Menschen und Thiere; ein Mensch liefert stünd-
Liter CO_2 ; die gesammte jährlich von den die Erde bewohnen-
ischen producirt CO_2 berechnet sich auf circa 130 Milliarden
ster. b) Die Fäulnis- und Verwesungsprocesse, die namentlich
üngen Boden in grossem Umfang verlaufen. c) Die Ver-
g von Brennmaterial, besonders in Industriebezirken; jährlich
0 Milliarden Cubikmeter. d) Unterirdische CO_2 -Ansammlungen,
eventuell nach Bergwerken öffnen (matte Wetter) oder durch
en und Vulkane ausströmen.

1 fortlaufenden Production steht eine ausgiebige Fortschaffung
aus der Luft gegenüber, und zwar erfolgt diese: a) Durch die
Pflanzen, die im Tageslicht CO_2 zerlegen. b) Durch die Nieder-

schläge, welche im Mittel 2 ccm CO_2 in 1 Liter enthalten. c) Durch die kohlensauen Salze des Meerwassers.

Ausserdem sorgen die Winde für eine gleichmässige Vertheilung der vorhandenen CO_2 , so dass wir im Freien nur geringe Schwankungen, zwischen 0.2 und 0.55 pro mille, im Mittel 0.3 pro mille, beobachten. Den höchsten Gehalt beobachtet man im Innern grösserer Städte zur Winterszeit. Eine geringfügige Steigerung ist in Wäldern, bei windstillem Wetter in Industriebezirken, ferner bei Moorrauch wahrzunehmen. Die zeitlichen Schwankungen fallen ähnlich aus.

Weit höher, bis 1, 2, ja 10 pro mille, kann der CO_2 -Gehalt innerhalb der Wohnungen steigen, wo die Menschen und Leuchtmaterialien reichlich CO_2 liefern, ohne dass eine kräftige Luftbewegung ausgleichend eingreifen kann.

Bestimmung der Kohlensäure. Zur genaueren quantitativen Bestimmung füllt man die zu untersuchende Luft in eine Flasche von bestimmtem Volum und lässt in dieselbe eine gemessene Menge Barytwasser oder besser Strontianwasser einfliessen. Das Strontianwasser absorbiert die CO_2 , trübt sich durch Strontiumcarbonat und enthält dann weniger alkalisch reagirendes Strontiumhydrat als vorher. Der Ausfall an Strontiumhydrat lässt sich durch Titrieren mittelst einer Säure von bekanntem Gehalt leicht quantitativ ermitteln und giebt einen Maassstab für die Menge CO_2 , welche in dem abgemessenen Luftquantum enthalten war und auf das Strontiumwasser eingewirkt hatte.

Approximativ lässt sich die CO_2 der Luft in der Weise bestimmen, dass durch eine kleine Flasche mit Sodalösung, welche mit einigen Tropfen Phenolphthaleinlösung versetzt und dadurch roth gefärbt ist, die zu untersuchende Luft hindurchgeleitet wird, bis Entfärbung auftritt. Je mehr Luft dazu erforderlich ist, um so geringer ist ihr CO_2 -Gehalt. (Vgl. den Anhang.)

Hygienische Bedeutung der Kohlensäure der Luft. Ein direct schädlicher Einfluss der in der Luft enthaltenen CO_2 -Mengen kann nicht angenommen werden. Die CO_2 wirkt erst in grossen Dosen giftig; ein Gehalt der Luft von 1 Procent kann für längere Zeit, ein solcher von 5 Procent vorübergehend ohne Schaden ertragen werden. Auch wenn gleichzeitig Verminderung des Sauerstoffgehalts zu Stande kommt, also wenn z. B. die CO_2 durch Verbrennung oder Athmung in einem geschlossenen Raum gebildet ist, muss der CO_2 -Gehalt um mehrere Procent steigen, der O-Gehalt um mehrere Procent sinken, ehe deutliche krankhafte Symptome auftreten.

Trotzdem ist durch vielfache Erfahrung festgestellt, dass freie Luft von mehr als 0.5 pro mille CO_2 , wie sie stellenweise in Städten, Industriebezirken oder bei Moorrauch vorkommt, die Athmung beeinträchtigt und dass namentlich in Wohnungsluft von mehr als 1 p. m. CO_2 häufig Belastungen oder Gesundheitsstörungen auftreten.

Diese Wirkungen können nach dem oben Gesagten nicht durch die CO_2 direct veranlasst sein, sondern müssen auf andere Eigenschaften der betreffenden Luft zurückgeführt werden, die im Folgenden genauer zu erörtern sind, und mit denen der Kohlensäuregehalt vielleicht so weit parallel geht, dass er uns einen Maassstab für die Beurtheilung der Luft liefern kann.

4. Sonstige gasförmige Bestandtheile der Luft.

a) Kohlenoxydgas und Kohlenwasserstoffe.

Kohlenoxydgas gelangt in die freie Atmosphäre z. B. mit den Gichtgasen der Hochöfen, mit dem Schornsteinrauch u. s. w., jedoch ohne dass nachweisbare Mengen sich in der Luft halten. — Im Wohnraum kann es in solchen Mengen, dass Vergiftungen entstehen, der Luft beigemischt werden durch ausströmendes Leuchtgas und durch Eindringen von Heizgasen (vgl. „Heizung“); in sehr kleiner, nicht nachweislich schädlicher Menge durch Leuchtflammen, Cigarrenrauch u. s. w.

Nachweis: 5–10 Liter der zu untersuchenden Luft werden in einer Flasche mit 10 ccm verdünnten Bluts (1 : 300) geschwenkt; das Blut wird spektroskopisch untersucht. — Oder man schwenkt die Luft mit 20 ccm einer 20procentigen Blutlösung und versetzt letztere 1. mit Ferrocyankaliumlösung und Essigsäure; in CO -Blut tritt vorübergehend ein rothbrauner, in gewöhnlichem Blut ein grauer Niederschlag auf; 2. mit der dreifachen Menge einer 1procentigen Tanninlösung: es bildet sich ein Niederschlag, der allmählich bräunlich-rothe Farbe annimmt und dauernd behält.

Kohlenwasserstoffe entstehen in grösserer Menge in Sümpfen und Morästen; ferner sind sie als Produkte unvollkommener Verbrennung im Schornsteinrauch enthalten. In Wohnräume gelangen sie event. mit letzterem, mit Tabaksrauch u. s. w. Feinere Nachweismethoden fehlen. Directe Gesundheitsstörungen scheinen von dem unter gewöhnlichen Verhältnissen auftretenden Gehalt der Luft nicht auszugehen.

b) Chlor, Salzsäure, schweflige Säure, salpetrige Säure.

Chlor findet sich spurenweise in der Luft im Freien in nächster Nähe von Chlorkalkfabriken, Chlorbleichen u. s. w. Salzsäure in der Nähe von Steingutöpfereien, Sodafabriken u. s. w. Schweflige Säure (und Schwefelsäure) entstammt vor allem dem S-Gehalt der Kohlen (im Mittel 1.7 Procent) und findet sich daher reichlich in der Luft von Industriestädten; in Manchester in 1 cbm 2.5 mgr. Ferner liefern die Röstöfen der Hütten grosse Mengen SO_2 , ebenso Alaunfabriken, Ultramarinfabriken, Hopfendarren u. s. w. — Salpetrige Säure (bezw. Salpetersäure) findet sich in kleinster Menge fast stets in der freien Luft und

amer Dosis vorhanden sind, ist nach den bisher darüber angestellten Versuchen gleichfalls unwahrscheinlich. Wenn trotzdem unter gewissen Verhältnissen flüchtige Toxine von intensiver Giftigkeit häufiger am Menschen abgeschieden werden, so muss jedenfalls die individuelle Empfänglichkeit gegen diese Gifte sehr verschieden und die Gewöhnung an dieselben sehr leicht sein. Denn wir sehen, dass Canalarbeiter, Abdecker, überhaupt die meisten Menschen aus den unteren Volksschichten völlig gleichgültig sind gegen übelriechende Gase und durch Ausscheidungen von Menschen verunreinigte Luft, und dass sie ohne Schaden für ihre Gesundheit geradezu mit einem gewissen Behagen sich innerhalb ihrer Kleidung und Wohnung einatmen mit solchen Gasen imprägnirte Luft conserviren.

Eine Bestimmung der theils bekannten, theils noch unbekannten organischen flüchtigen Stoffe ist mit sehr verdünnter Chamäleonlösung versucht worden, die durch organische Stoffe entfärbt wird (s. „Trinkwasseruntersuchung“). Die Methode erscheint aber aus verschiedenen Gründen nicht zu einer Beurtheilung der Luft verwendbar; namentlich geben Gase, welche nicht von der Ausatmung des Menschen oder von Fäulnissherden stammen und nicht übelriechend sind (Schornsteinrauch, Tabakrauch u. s. w.), gerade die stärksten Färbungen.

Wir sehen somit, dass weder in der freien Atmosphäre, noch auch unter gewöhnlichen Verhältnissen in der Wohnungsluft¹ gasförmige Substanzen in solcher Menge auftreten, dass von ihnen häufiger eine Giftwirkung und directe Gesundheitsschädigung ausgehen könnte.

Dennoch sprechen viele Erfahrungen dafür, dass durch eine verunreinigte „schlechte“ Luft alltäglich Beeinträchtigungen der Gesundheit zu Stande kommen.

Erstens beobachtet man, dass in Räumen, wo viele Menschen zusammengedrängt sind, einzelne Menschen akut von Schwindel, Uebelkeit, Ohnmacht befallen werden; der Zustand bessert sich, sobald die Befallenen an die frische Luft gebracht werden. Werden zwangsweise für längere Zeit Menschen in geschlossenen Räumen zusammengedrängt, so werden sogar Todesfälle beobachtet; z. B. im Zwischendeck von besetzten Schiffen, wenn während eines Sturmes alle Luken dicht geschlossen werden mussten; ferner in den berühmten Fällen, wo zahlreiche Kriegsgefangene in engen geschlossenen Räumen zusammengesperrt wurden.

¹ Fabrikräume sowie die Fälle, wo Leuchtgas oder Heizgase in der Zimmerluft sich ansammeln, kommen hier nicht in Betracht.

Bei diesen akuten Wirkungen ist indess zweifellos in erster Linie die Wärmestauung beteiligt. Durch die eng gedrängten Menschen wird so viel Wärme und Wasserdampf geliefert und die Abstrahlung so erschwert, dass die Wärmeabgabe schliesslich unmöglich wird (vgl. unter „Hitzschlag“ S. 99). Von dieser Seite droht Gefahr, längst ehe eine Haufung der CO_2 oder irgend eines anderen Gases oder eine Verminderung des Sauerstoffs in einem die Gesundheit beeinträchtigenden Grade erfolgen kann. — Die Wärmestauung ist offenbar das hervorstechendste Symptom, das durch „schlechte Luft“ hervorgebracht wird. Unter „frischer“ oder „erfrischender“ Luft verstehen wir vorzugsweise Verhältnisse, die eine bessere Entwärmung des Körpers herbeiführen, während die chemische Beschaffenheit der Luft bei weitem nicht so in Betracht kommt.

Zweitens ruft eine durch übelriechende Gase verunreinigte Luft Widerwillen und Ekel, bei längerem Aufenthalt Appetitlosigkeit und Lebelkeit hervor, der Respirationstypus ändert sich, die Athemzüge werden so oberflächlich als möglich; man hat den Eindruck, als befände sich der Körper in Gefahr, und sucht instinktmässig der übelriechenden Luft zu entgehen. Diese Erscheinungen treten am stärksten hervor, wenn man eben bereits mit Menschen dicht gefüllten und schon abgewandte Luft erhaltenden Raum betritt.

Der dem Füllgefühl und der ungenügenden Athmung, welche in solcher Luft zu Stande kommen, liegt eine Beeinträchtigung unserer Wahrnehmung und unserer Leistungsfähigkeit; vielleicht resultiren aus der Anordnung der Respirationstypus im Laufe der Zeit sogar Störungen der Verdauung und der Ernährung. Während eine reine oder mit angenehmen aromatischen Stoffen geschwängerte Luft unwillkürlich zu tiefer Auspiration und zu reichlicher Aufnahme von Luft anregt, behindern dagegen übelriechende Beimengungen die Aufnahme der Luft in derselben Weise, wie ekelerregende — wenn auch nicht schädliche — Zusätze die Aufnahme von festen und flüssigen Speisen hindern. Nun ist zwar diese Missempfindung und vielleich ansserordentlich verschieden; aber vielleicht haben auch die m. demeter Sinner, ausgerüsteten Menschen, finden die oft besonders unangenehmen, kritischen Asthmatiker, Emphysematiker u. s. w. Ausgrund darauf, dass ihnen eines der wichtigsten Nahrungsmittel, die Luft, in einem reinen, nicht Widerwillig erregenden und die Nahrung in normaler Weise unterhaltenden Zustande zur Verfügung gestellt wird; und allein dieser Gesichtspunkt genügt vollkommen, um die Forderung einer reinen Luft und einer sorgfältigen Beseitigung der verunreinigungen

us derselben zu begründen. — Chronische Ernährungsstörungen nämlich u. s. w. bei der ärmeren Bevölkerung werden oft ohne genügende Begründung auf derartige übelriechende Beschaffenheit der Luft zurückgeführt. Schlechte Ernährungsverhältnisse sind bei diesen Affectionen meist erheblich stärker betheiligt; bei gleichzeitiger guter Ernährung (Landleute) treten dieselben trotz erheblich verunreinigter Wohnungsluft nicht hervor.

Drittens hat man angeblich beobachtet, dass manche infektiöse Krankheiten (Malaria, Typhus) auf die Einathmung schlechter Luft und riechender Gase, sogenannter Miasmen, zurückzuführen seien. Diese Anschauung muss jedoch jetzt als entschieden irrthümlich zurückgewiesen werden. Ein Gift kann nur Intoxication, aber keine Infektion bewirken; diese hervorzurufen sind ausschliesslich lebende Organismen befähigt (vgl. Kap. X). Auch für die Malaria, welche früher als exquisiteste miasmatische Krankheit angesehen wurde, ist nachgewiesen, dass sie nur durch vermehrungsfähige Organismen verbreitet wird.

In Folge der falschen Vorstellung von der Wirkung der Miasmen sehen viele Aerzte noch heute in üblen Gerüchen die Ursache von Infektionen. Aber der Zusammenhang zwischen Infektionserregern und stinkenden Gasen ist nur ein ganz entfernter und lockerer. Die Infektionserreger selbst produciren bei ihrem Wachsthum keine oder wenig intensive Gerüche; stärker riechende Gase deuten stets auf die Anwesenheit von lebhaft wuchernden Saprophyten, welche der gleichzeitigen Ansiedlung pathogener Organismen meist feindlich sind und diese schwer aufkommen lassen. Riechende Gase werden ferner am stärksten von flüssigen und feuchten, eine rege Lebensthätigkeit der Bakterien gestattenden Substraten geliefert; von diesen aus verbreiten sich aber mit Luftströmungen keine Organismen; sondern erst dann, wenn die Substrate austrocknen und das Bakterienleben und die Produktion übelriechender Gase abnimmt bzw. aufhört, ist die Gefahr vorhanden, dass in die Luft Mikroorganismen übergehen. Es ist also entschieden unzulässig, üble Gerüche als directe Ursache einer Infektion aufzufassen, und den Ausbruch einer Infektionskrankheit mit dem Hinweis auf irgendwelche Fäulnissgase u. dgl. zu erklären.

Man hat auch wohl die Ansicht geäußert, dass durch die Aufnahme unreiner Luft eine individuelle Disposition zu Infektionskrankheiten geschaffen werde. Weder experimentell noch statistisch sind aber in dieser Richtung Thatsachen ermittelt, welche einwandfrei auf eine solche vorbereitende Rolle der genannten Gase gedeutet werden könnten. Dagegen machen wir bei zahlreichen Individuen die Erfahrung,

dass selbst langdauernde Einathmung verunreinigter Luft keine gesteigerte Empfänglichkeit für Infektionskrankheiten hinterlässt.

Zweifellos sind aber die Fäulnissgase häufig Symptome einer ungenügenden Reinlichkeit in Bezug auf Haut, Kleidung, Wohnung, Boden u. s. w.; und da wir wissen, dass durch peinliche Reinlichkeit auch eine Entfernung vieler Infektionserreger gelingt, dass dagegen da, wo Schmutz- und Abfallstoffe sich häufen, auch keine genügende Beseitigung eventuell vorhandener Infektionserreger erfolgt ist, so deutet insofern übelriechende Luft indirect auf eine gewisse Begünstigung der Infektionsgefahr. Dieser Indicator zeigt aber bei weitem nicht immer richtig und ist daher nur mit grösster Reserve zu verwerthen.

Die Beurtheilung einer Luft in geschlossenen Räumen vom hygienischen Standpunkt aus hat somit in erster Linie die Verhältnisse der Entwärmung für die in dem Raume sich aufhaltenden Menschen zu beachten; in zweiter Linie die Produktion übelriechender, Ekel erregender Gase.

Eine directe Untersuchung nach beiden Richtungen stösst auf grosse Schwierigkeiten. Freilich haben wir relativ feine Sinnesempfindung für jene offensiven Gase und für die Erschwerung der Wärmeabgabe; aber dieselbe ist individuell sehr verschieden, und wenn wir lediglich auf die Haut- und Geruchsempfindung oder auf den allgemeinen Eindruck auf den Körper angewiesen wären, würde sehr häufig der Eine dieselbe Luft für gut erklären, die der Andere für schlecht hält. Wir müssen einen ziffermässigen, nicht von dem individuellen Ermessen abhängigen Maassstab für die Luftbeschaffenheit wünschen; und insbesondere die Wohnungs- und Schulhygiene kann eines solchen sehr entbehren.

In der CO_2 -Bestimmung besitzen wir wenigstens einen theilweise brauchbaren Maassstab. Die Produktion der CO_2 hält in den Wohnräumen unter Umständen gleichen Schritt mit der Produktion von Wärme und Wasserdampf einerseits, mit der Ausscheidung belästigender und übelriechender Gase andererseits. Der Parallelismus ist allerdings nicht unter allen Verhältnissen vorhanden; es macht einen erheblichen Unterschied, ob die Erwärmung noch aus anderen Quellen (Heizung, bestrahlte Hauswände) oder wesentlich durch die Menschen erfolgt; und ebenso variiert die Luftqualität bei gleichem CO_2 -Gehalt bedeutend, je nachdem reinliche oder unreinliche Menschen sich im Raume befinden. Diese Verhältnisse sind daher, sobald aus der Menge der CO_2 auf die Verschlechterung der Luft geschlossen werden soll, sehr wohl in Rücksicht zu ziehen.

irrschnittlich wird man annehmen dürfen, dass eine Steigerung des CO_2 -Gehalts der Luft in Wohnräumen über 1.0 p. m. mit lästigen Empfindungen verbunden sein wird, und dass daher eine solche Luft anstandes werden muss (vgl. unter „Ventilation“).

Für die Beurtheilung der Luft im Freien giebt die CO_2 -Bestimmung nicht ausreichende Ausschläge und ist als Indicator nicht brauchbar. Hier sind wir einstweilen auf die sinnliche Wahrnehmung riechender und belästigender Beimengungen angewiesen.

Literatur: OZON: SONNTAG, Zeitschr. f. Hyg., Bd. 8. — OHLMÜLLER, Arb. d. Kais. Ges.-Amt., Bd. 8. — CHRISTMAS, Annal. Pasteur 1893, Nr. 10. — HENSEN: BITTER, Zeitschr. f. Hyg., Bd. 9. — WOLFERT, Theorie u. Praxis der Ventilation und Heizung, Bd. 1 u. 2, 1896, 1901. — Toxische Wirkung der Inspirationsluft: BROWN-SÉQUARD, Compt. rend. 1888. — HERMANS, Arch. f. Hyg., Bd. 1. — LEHMANN u. JESSEN, Arch. f. Hyg., Bd. 10. — RAUER, Zeitschr. f. Hyg., Bd. 15. — LÜBBERT-SCHNEIDER, Pharmaceutische Centralhalle 1894.

II. Der Luftstaub.

Unter den in der Luft suspendirten Elementen unterscheiden wir feine Staubartikel, Russ, Sonnenstäubchen und Mikroorganismen.

Zur quantitativen Bestimmung des gesammten Luftstaubes wird die Luft durch ein Glasrohr mit Wattepfropf aspirirt und die Gewichtszunahme des Rohrs bestimmt. Zur mikroskopischen Untersuchung des Luftstaubes nimmt man z. B. eine Glasplatte, die mit einem klebrigen Ueberzug (Chlorcalciumlösung, Glycerin, Lävulose) versehen ist, dem Luftstrom aus; nach Beendigung des Versuchs wird die Platte mit einem Mikroskop durchmustert. Um einigermaßen vergleichbare Resultate zu erhalten, muss man die Geschwindigkeit des Luftstroms, die Grösse der Einströmungsöffnung und den Abstand der Glasplatte von letzterer in genau gleicher Weise reguliren (MIQUEL). — Zur Zählung der Staubtheilchen hat AIRKEN eine interessante Methode benutzt. Bekanntlich werden die kleinsten Staubtheilchen sichtbar, wenn sie mit überhitztem Wasserdampf in Berührung kommen, da dann jedes Theilchen zu einem Condensationskern wird, der zu einem leicht sichtbaren Tröpfchen anwächst. AIRKEN construirte nun einen Apparat, der es gestattet, die Untersuchungsluft mit staubfreier Luft beliebig zu mischen und dann mittelst Luftpumpe zu verdünnen. Die Mischung wird stets so weit getrieben, bis alle Staubtheilchen des Gemisches zu Condensationskernen werden, so dass weitere Druckerniedrigung keine weitere Tropfenbildung veranlasst. Die Tröpfchen werden mittelst eines mit feiner Theilung versehenen Spiegels gezählt. Unter Berücksichtigung des Mischungsverhältnisses mit staubfreier Luft ergibt sich daraus die Zahl der Stäubchen in der Volumeinheit der Untersuchungsluft.

Zur Zählung und Untersuchung der lebenden Mikroorganismen der Luft lässt sich keine dieser Methoden verwenden; bei der mikroskopischen Prüfung des gesammten Staubes verdecken die gröberen Objecte die etwa vorhandenen Bakterien, Sporen werden vollends leicht übersehen und bei den lebenden Mikroorganismen bleibt ihre Lebensfähigkeit in Frage.

Eine Kenntniss der lebenden Luftmikroben können wir vielmehr nur durch Culturmethode erhalten. Soll das Verfahren quantitative Aufschlüsse geben, so müssen dabei alle in der Luft enthaltenen Bakterien aufgefangen werden, zugleich aber jedes Individuum oder jeder Complex von Individuen isolirt zur Entwicklung kommen; wenn möglich müssen auch die Nährsubstrate und sonstigen Lebensbedingungen variiert werden. Diese Forderungen werden am vollständigsten erfüllt:

1) Durch das Hesse'sche Verfahren. Ein Glasrohr von 70 cm Länge und 3.5 cm Weite wird mit Nährgelatine beschickt, dann sterilisirt und horizontal gelagert, so dass die Gelatine nach dem Erstarren in dünner Schicht die ganze Wandung auskleidet. Dann wird langsam Luft hindurch aspirirt, etwa 1 Liter in 2—4 Minuten, bis 10—20 Liter durchgeströmt sind. Die Stäubchen und Bakterienverbände fallen nieder und entwickeln sich auf der Gelatine zu isolirten Colonieen, die gezählt und qualitativ weiter untersucht werden können.

2) Das Petri'sche Verfahren. In ein kurzes ca. 2 cm weites Glasrohr wird ein Stück Drahtnetz eingeklemmt, darauf kommt eine etwa 3 cm dicke Schicht grober Sand von 0.4 mm Korngrösse, dann wieder ein Drahtnetz. Das so hergestellte Filter wird sterilisirt, mit einem kräftigen Aspirator verbunden

und die Luft in raschem Strome durchgesogen. Das Filter hält nachweislich alle Keime sicher zurück. Nach Beendigung des Versuchs wird der Sand und das Drahtnetz des Filters in Schälchen mit Gelatine oder Agar gebracht, und die gewachsenen Colonieen werden gezählt und untersucht. — Die Colonieen werden besser sichtbar und zählbar, wenn man statt des Sandes gestossenes und gesiebtes Glas benutzt. Ausserdem ist es zweckmässig, dem Glasrohr mit dem Filter eine bauchige Erweiterung zu geben und das Rohr, das die Luft zuführt, in das Glaspulver dieser Erweiterung hineinzuführen, um völlig sichere Absorption zu erzielen (Ficker).




Fig. 60. FICKER'sches Filter zur Bestimmung der Luftkeime. 1:2.

3) Falls es nicht auf vollständiges Auf- fangen aller Keime abgesehen ist: Aspiration der Luft durch ein Glasrohr, das mehrfach auf- und abwärts gekrümmt und mit Lävulose- lösung ausgekleidet ist; das Rohr wird nach Auf-

nahme der Luftkeime mit Wasser wiederholt ausgespült, das Waschwasser gesammelt und auf Platten vertheilt. — Oder der Luftstrom streicht durch eine Reihe unter einander mittelst Glasrohren verbundener Reagensgläser, deren jedes eine kleine Wasserschicht enthält; beim langsamen Durchgang durch letztere bleiben die Keime zurück, das gesammelte Wasser wird auf Platten gebracht (Borwin). — Bei sehr starken Luftströmen erhält man durch alle Apparate, die mit schwächeren Aspirationsströmen arbeiten, keine Ausbeute. Hier muss man trichterförmige Gefässe, innen mit Lävulose ausgekleidet, dem Wind entgegenrichten, um wenigstens einen Theil der schwebenden Keime abzufangen.

Ueber den Ursprung und die Verbreitung der einzelnen Elemente des Luftstaubs haben neuere Untersuchungen Folgendes ergeben:

1) Grob sichtbarer Staub.

Derselbe ist in der Strassenluft europäischer Städte zu 0.2—25 mg 1 cbm Luft gefunden; die Zahl der Staubteilchen betrug nach ~~TKEN~~ auf dem Lande 500 bis 5000, in grossen Städten 100000 bis 0000 in 1 ccm; die grössten Mengen treten bei trockener Bodenoberfläche und austrocknenden heftigen Winden, die geringsten nach Regen und bei feuchtem Boden auf. Im Durchschnitt zeigt der Sommer die höchsten, das Frühjahr die niedrigsten Werthe.

Die wesentlichste Quelle des Staubes ist die Bodenoberfläche. In den obersten Schichten des Bodens aus einem Gesteinsmaterial bestehend, das rasch verwittert und dabei relativ viel feinste Partikelchen abgibt; ferner in einem Klima oder in einer Witterungsperiode, wo ein grosses Sättigungsdeficit und lebhafte Winde herrschen, werden die grössten Staubmengen gefunden. Besonders in der tropischen und subtropischen Zone, speciell im Pendschab, in Aegypten, der Sahara u. s. w. kommt es in einem Theil des Jahres zu heftigen Staubstürmen, die mit enormen Massen von Staub die Luft im Freien und selbst im Innern der Wohnräume erfüllen und zu einer höchst lästigen Lage werden.

Genauere Untersuchungen über die Qualität des Staubes ergeben, dass er zu $\frac{2}{3}$ bis $\frac{3}{4}$ aus anorganischer Substanz, aus Gesteinsplättchen, Sand- und Lehmtheilchen besteht. Der Rest besteht grösstentheils aus organischem Detritus, in städtischen Strassen namentlich aus Pferdeäpfeln, Haaren, Pflanzentheilchen, Fasern von Kleidungsstoffen, Stärkemehl u. s. w. Ferner finden sich viel tote und lebensfähige Keime von höheren Pflanzen, Pollenkörner und Sporen von Kryptogamen. Der Blütenstaub von Nadelhölzern wird oft Meilen weit fortgetragen (Schwefelregen). — Endlich haften vielfach noch Mikroorganismen, theils im toten, theils im lebenden Zustand, an den gröberen Staubtheilchen.

2) Rauch und Russ

entstehen aus dichten Kohlewasserstoffen und Kohletheilchen, die den Feuerungsgasen in Folge der stets unvollständigen Verbrennung der Kohle beigemengt sind. In Industriestädten, beim Moorbrennen finden sich dieselben oft in enormer Menge in der Luft, und zwar immer nach den S. 155 aufgeführten gasigen Verunreinigungen. — Die ein-

geathmeten Kohletheilchen können sich massenhaft in die Bronchialdrüsen einlagern und auch nach Leber, Milz und anderen Organen verschleppt werden.

3) Die Sonnenstäubchen.

Sehr kleine Partikelchen von organischem Detritus, feinste Theile von Woll- und Baumwollfasern, abgestorbene, selten lebensfähige Mikroorganismen u. s. w. Sonnenstäubchen sind für gewöhnlich nicht in der Luft sichtbar; lässt man aber in ein sonst dunkles Zimmer einen Lichtstrahl einfallen, so können sie mit blossem Auge deutlich wahrgenommen werden; durch die stete Anwesenheit dieser Stäubchen wird erst der Lichtstrahl auf seinem Wege durch die Luft sichtbar (TYNDALL).

Die Sonnenstäubchen sind so leicht, dass sie selbst in ruhiger Luft sich nicht vollständig absetzen und bis zu den grössten Höhen in der Atmosphäre verbreitet sind.

4) Die Mikroorganismen.

Die Quelle der Luftkeime sind die verschiedensten Oberflächen, auf welchen Bakterienansiedlungen etablirt waren, in erster Linie die Bodenoberfläche, aber auch Kleider, Haut und oberflächliche Schleimhäute der Menschen u. s. w. Von feuchten Flächen oder von Flüssigkeiten gehen mit der einfachen Wasserverdunstung und bei schwachen Luftströmen keine Bakterien in die Luft über. Lässt man einen solchen Luftstrom über eine Flüssigkeit oder über feuchte Substanzen, die eine bestimmte leicht erkennbare Bakterienart enthalten, hinwegstreichen und dann ein mehrfach gekrümmtes Aufgangrohr passiren, so finden sich in letzterem keine Keime der betreffenden Art. Wenn aber ein Luftstrom von mehr als 4 m Geschwindigkeit so auf die Oberfläche der Flüssigkeit auftrifft, dass Wellenbildung und beim Anprall der Wellen gegen feste Flächen Zerstäubung eintritt, oder wenn Verspritzen der Flüssigkeit durch brechende Wellen, heftiges Schlagen oder Platzen oberflächlicher Blasen erfolgt, können Wassertröpfchen und mit diesen Mikroorganismen in die Luft übergeführt werden. Im Freien kommt es beim Anbränden des Meeres, durch Mühlräder, ferner sehr häufig dann, wenn stärkere Winde die vom Regen befeuchteten Baumblätter bewegen, zur Ablösung von Tröpfchen. In Wohnräumen können dieselben bei jedem Ausgiessen von Flüssigkeiten, beim Waschen u. s. w. entstehen; vor allem aber dadurch, dass die Menschen beim Niesen, Husten und lauten Sprechen nachweislich fast stets Tröpfchen von Speichel

und Sputum verschleudern, die mit blossen Auge nicht wahrgenommen werden können, die aber lebende Mikroorganismen enthalten. Zum Weitertransport dieser einmal losgelösten Tröpfchen genügen zum Theil Luftströme von sehr geringer Stärke; selbst solche von 0.1—0.2 mm Geschwindigkeit pro Sekunde können die feinsten Tröpfchen noch Meter hoch in die Höhe tragen.

Nach dem Eintrocknen einer Bakterienansiedlung geht der Uebertritt der Keime in die Luft zunächst schwierig von statten. Sie kleben den Flächen relativ fest an, fixirt durch die zu einer Kruste eintrocknenden schleimigen oder eiweissartigen Stoffe ihrer Hüll- und Intercellularsubstanz. Selbst kräftige Luftströme führen von solchen trockenen Ueberzügen nichts fort. Es müssen vielmehr erst durch stärkere Temperaturdifferenzen oder durch mechanische Gewalt Continuitätstrennungen und theilweise Ablösungen erfolgen; die Kruste zersplittert, und erst dann sind Luftströme von 4—5 m Geschwindigkeit im Stande, kleine Theilchen aufzunehmen und zu transportiren. Bildet feiner Sand oder Lehm die Unterlage der Bakterienansiedlung, oder haften sie z. B. an porösen leicht fasernden Kleidungsstoffen (Sputum, Dejektionen u. s. w. an Wäsche), so geschieht die hauptsächlichste Verbreitung nicht sowohl in Folge einer Ablösung der Bakterien, sondern dadurch, dass Theile des Substrats selbst in die Luft übergehen. An den mineralischen Staubpartikelchen sowie an den gröberen und feineren Fasern, welche sich von Kleider- und Möbelstoffen lösen, haften daher die hauptsächlichsten Mengen der in der Luft befindlichen Mikroorganismen.

Dieser Entstehungsart entsprechend gehören die in Staubform in der Luft enthaltenen Mikroorganismen nicht durchweg zu den feinsten und leichtesten Staubelementen; vielmehr ist der grösste Theil derselben unter dem grob sichtbaren Staub zu suchen, und sie sind durchschnittlich gröber und schwerer transportabel als die bakterienführenden Tröpfchen.

Nur für Schimmelpilzsporen liegen die Verhältnisse anders. Auch wenn diese auf feuchtem Substrat wuchern, ragen die trockenen Sporen in die Luft, werden einzeln durch leichte Erschütterungen abgelöst, und in solchem isolirten Zustande durch die schwächsten Luftströme fortgeführt. Die Schimmelpilzsporen sind daher die kleinsten und leichtesten Elemente des Luftstaubs.

Die verhältnissmässige Grösse und Schwere der Bakterienstäubchen ist durch verschiedene Beobachtungen und Experimente bestätigt. So zeigen die Versuche mit der Hesse'schen Röhre, dass in den ersten Theilen derselben, gleich nach dem Eintritt der Luft,

vorzugsweise die schweren bakterienführenden Staubelemente abgesetzt werden, während im letzten, von der Eintrittsstelle der Luft entfernten Theil weniger Bakterien und hauptsächlich Schimmelpilze zur Entwicklung kommen. — Dieselben Resultate erhält man, wenn in ruhiger Luft (Zimmerluft) Staub aufgewirbelt wird. Anfangs finden sich dann grosse Mengen von Bakterien in der Luft; aber schon nach ca. 30 Minuten sind die Bakterien grösstentheils, nach einer Stunde fast sämmtlich, durch Absetzen des Staubes aus der Luft entfernt und es bleiben im Wesentlichen nur Schimmelpilzsporen übrig. Selbst Luftströmungen bis 0.2 m Geschwindigkeit sind nicht im Stande, die gröberen Bakterienstäubchen schwebend zu erhalten oder dieselben fortzutransportiren; während allerdings die leichteren Bakterienstäubchen, von denen sich fast immer einige in der Luft finden, schon durch Luftströme von 0.2—2.0 mm Geschwindigkeit horizontal weitergeführt resp. schwebend erhalten werden. — Solche leichteste Stäubchen entstehen vorzugsweise von der Kleidung, von Taschentüchern, Möbelüberzügen u. dergl., während der Fussbodenstaub durchschnittlich schwerer ist.

Für die Qualität der Luftkeime ist es dann noch von grosser Bedeutung, dass viele Bakterienarten ein so vollständiges Austrocknen, wie es für den Uebergang in die Luft in Form von feinstem, leicht flugfähigem Staub erforderlich ist, nicht vertragen. Fängt man feinen, mit bestimmten Bakterien beladenen Staub auf, nachdem ein Luftstrom von 4 mm Geschwindigkeit (der Luftbewegung in stark ventilierten Wohnräumen entsprechend) denselben 80 cm hoch aufwärts getrieben hat, so sind Cholerabakterien, Pestbacillen, Pneumokokken, Influenzabacillen, Diphtheriebacillen ausnahmslos abgestorben. Diese alle können daher nur in Form von feinsten Tröpfchen auf weitere Strecken durch die Luft fortgeführt werden. Dagegen bleiben unter den angegebenen Verhältnissen auch im feinsten trockenen Staube lebendig: Tuberkelbacillen, Milzbrandsporen, Staphylokokken. Eine Mittelstellung nehmen Typhusbacillen und Streptokokken ein, die wenigstens in Form von etwas gröberen Stäubchen und bei Anwendung von stärkeren Luftströmen noch lebend transportirt werden können. — Schimmelpilzsporen vertragen das Austrocknen sämmtlich gut und können lange in Form von feinstem Staub existiren, ohne ihre Keimfähigkeit einzubüssen. Sie werden daher in älterem und feinerem Staub leicht prävaliren, auch wenn in dem stäubenden Material ursprünglich mehr Bakterien vorhanden waren.

Zahl und Arten der Luftkeime. Im Freien werden sehr verschiedene Mengen von Luftkeimen gefunden; im Mittel in 1 cbm Luft 0—1000 Keime, darunter 100—200 Bakterien, der Rest Schimmelpilze; manchmal erheblich mehr und auch relativ mehr Bakterien.

Die geringste Keimzahl wird in Einöden, auf unbewohnten Bergen und im Winter zu finden sein, weil es hier an starker Ausbildung der Bakterienansiedlungen fehlt. Ferner beobachtet man wenig Keime bei feuchtem Wetter und feuchter Bodenoberfläche (nach Regen, im Frühjahr) und bei mässigen Winden. Nur Schimmelpilzsporen sind auch bei feuchtem Wetter reichlicher in der Luft enthalten, weil die Pilzrasen dann am besten gedeihen und weil deren Sporen aus dem feuchten Substrat aus leicht in die Luft gelangen. — Auf dem Meere ist die Luft in 500—1000 km Entfernung vom Lande keimfrei gefunden, jedoch nur bei Anwendung schwacher Aspirationsöme; es ist nicht zu bezweifeln, dass auch die Luft auf offenem Meere bei bewegtem Wasser je nach dem Keimgehalt desselben Tröpfchen mit lebenden Keimen führt.

Die grössten Mengen von Keimen werden in die Luft dann aufgenommen, wenn hohe Temperatur, starkes Sättigungsdeficit und heftige Winde zusammenwirken. Bei vorübergehender Bodentrockenheit können sich in den breiten städtischen Strassen zwar auch schon grössere Staubmassen bilden; aber erst eine Periode anhaltender Dürre und östlicher Winde führt aus allen Winkeln und Höfen und von den Dächern, wo die Abfallstoffe abgelagert zu werden pflegen, mannigfaltige und zahlreiche Bakterien in die Luft über.

In geschlossenen Räumen finden sich bei ruhiger Luft sehr wenig oder gar keine Luftkeime; dagegen kommt es bei jedem Verreiben von bakterienhaltiger Flüssigkeit (Hustenstösse) und in noch grösserer Menge beim Aufwirbeln trockenen Staubes (Bürsten, Fegen etc.) zu einem theils vorübergehenden, theils anhaltenden, oft ausserordentlich hohen Keimgehalt der Luft.

Wichtiger als die Zahl der Luftkeime ist die Feststellung ihrer Arten und speciell das Verhalten der pathogenen Keime. In dieser Beziehung muss jedoch scharf unterschieden werden zwischen der Luft im Freien und der Luft in geschlossenen Wohnräumen.

Im Freien scheint sich immer, in Folge der steten Bewegung der Luft, die selbst bei sogenannter Windstille noch $\frac{1}{2}$ —1 m pro Sekunde beträgt, eine starke Verdünnung der Keime zu vollziehen. Wenigere Arten, die ausnahmsweise und in relativ kleiner Zahl in die Luft gelangen, müssen daher so gut wie ganz verschwinden; und die saprophytischen Bakterienansiedlungen in unendlich viel grösserer

Ausdehnung vorkommen, als Herde von pathogenen Bakterien, so kann nur ein besonderer seltener Zufall dahin führen, dass einmal eine pathogene Bakterienart bei der Luftuntersuchung gefunden wird. In der That haben die verschiedensten Beobachter bei ihren zahlreichen Luftanalysen gewöhnlich nur Saprophyten und niemals spezifische pathogene Keime (mit Ausnahme der weitverbreiteten Eitererreger) erhalten; nur bei directen Uebertragungen von grösseren Mengen Strassenstaub und Strassenschmutz auf Versuchsthiere hat man z. B. Tetanus- und Oedembacillen, und angeblich in vereinzelt Fällen auch Tuberkelbacillen nachweisen können.

Die Luft im Freien bietet daher fast niemals Infektionschancen. In früherer Zeit hat man diese Gefahr erheblich überschätzt, weil man über die im Vergleich zum Bakteriengehalt des Wassers, vieler Nahrungsmittel u. s. w. sehr geringe Zahl der Luftkeime, über das rasche Absterben vieler pathogener Bakterien beim Austrocknen und über das enorme Ueberwiegen saprophytischer Keime im Luftstaub nicht hinreichend orientirt war. Unsere in dieser Beziehung jetzt geklärten Vorstellungen decken sich aber im Grunde auch viel besser als die früheren Annahmen mit den Erfahrungen über die Verbreitungsweise contagiöser Krankheiten. In unmittelbarer Nähe von Pockenhospitalern sollen zwar Infektionen beobachtet sein; aber schon in einer Entfernung von wenigen Metern, in benachbarten Strassen mit freier Luftbewegung kommt nach allen Erfahrungen eine Infektion nicht mehr vor, sondern nur solche Personen, welche mit Kranken verkehrt oder das Haus eines Pockenkranken betreten haben, setzen sich dieser Gefahr aus. Ebenso werden die Erreger von Scharlach, Masern, Flecktyphus, denen wir die Fähigkeit durch die Luft verbreitet zu werden, zweifellos zuerkennen müssen, so gut wie niemals aus der freien Luft aufgenommen, sondern nur im directen oder indirecten Verkehr mit dem Kranken. — Ebenso wissen wir von den verschiedensten Thierseuchen, dass sie durch Berührungen und Objecte, nicht aber durch die freie Luft verbreitet werden, und dass deshalb Sperrmassregeln und Grenzcordons, obwohl sie sich um die Luft nicht kümmern, ausreichenden Schutz gewähren.

Auch Tuberkelbacillen konnten im Luftstaub städtischer Strassen nicht nachgewiesen werden, weil offenbar die Verdünnung selbst dieser so relativ reichlich produzierten und in der Luft sich lange lebensfähig haltenden Bacillen zu bedeutend ist. In interessanter Weise wird die Uegefährlichkeit des Strassenstaubes bestätigt durch eine Statistik der Berliner Strassenleuten, die nach der Infektion mit Strassenstaub fortgesetzt im höchsten Grade exponirt sind, von denen aber nur ein

relativ sehr kleiner Bruchtheil (2 Procent) an Lungen- und Bronchialkatarrh (mit eventuellem Ausgang in Phthise) erkrankt. Dabei haben 0 Procent dieser Strassenkehrer eine Dienstzeit von über 5 Jahren, 5 Procent eine solche von über 10 Jahren (CORNET). — Die Erreger von Typhus, Diphtherie, Influenza u. s. w. werden erst recht kaum jemals aus der Luft im Freien auf den Menschen übergehen, da sie immer noch erheblich geringerer Menge in der äusseren Umgebung des Menschen vorhanden resp. weniger resistent sind, wie die Tuberkelbacillen.

Nur wenn etwa eine pathogene Mikrobenart in ähnlicher Ausdehnung auf totem Substrat gedeihen könnte, wie die Gährungs- und Fäulnisserreger, würde eine Luftinfektion Chancen gewinnen. Nach den zahlreichen bis jetzt vorliegenden Untersuchungen des Bodens, des Wassers, der Nahrungsmittel ist aber für die Mehrzahl der bekannten Infektionserreger eine so ausgedehnte saprophytische Wucherung völlig unwahrscheinlich. Am ehesten könnte vielleicht noch eine gelegentliche Infektion vorkommen bei den weitverbreiteten Eiterkokken, die aber auch jedenfalls in der freien Luft ungleich seltener vorkommen, als auf der Haut, im Wohnungsstaub und an Gebrauchsgegenständen, und die in der Regel von diesen aus in die Wunden eindringen; ferner begegnet man im Strassenstaub den Bacillen des malignen Oedems und des Tetanus, die eigentlich an saprophytische Lebensbedingungen angepasst sind, aber in praxi gleichfalls nur durch Berührungen in die zu ihrer parasitären Existenz nothwendigen tiefen Verletzungen gelangen.

In geschlossenen Räumen (zu denen auch Treppenhäuser, Corridore, ringsum geschlossene Höfe, Strassen- und Eisenbahnwagen u. s. w. zu rechnen sind) wird dagegen eine Infektion von der Luft aus weit leichter und häufiger zu Stande kommen, sobald Kranke da sind, deren Excrete sich der Luft beimengen. — In einem Raum von 60 cbm Inhalt athmet der bewohnende Mensch täglich $\frac{1}{6}$ des ganzen Luftvolums ein; hier können ausserdem die pathogenen Bakterien einen erheblichen Bruchtheil der gesamten Luftkeime ausmachen. Bei Influenza werden die Bacillen durch das reichliche Niesen und Husten in grosser Menge in Tröpfchenform in die Luft übergeführt; stark hustende Phthisiker, Masernkranke im Initial- oder Prodromalstadium, Pockenranke, Lepröse, Kranke mit Pestpneumonie, Kinder mit Keuchhusten, gelegentlich auch Diphtherie, werden mit dem Contagium beladene Tröpfchen in die Luft liefern und diese bald in geringerem, bald in hohem Grade infektiös machen. Je länger gesunde Menschen sich in solcher Luft aufhalten und je mehr sie sich

dem Kranken nähern, um so grösser wird für sie die Gefahr der Infektion (vgl. Kap. X). — Bei manchen Krankheiten, namentlich bei Phthise und den Wundinfektionskrankheiten, gesellt sich die Möglichkeit einer Infektion durch trockenen, leicht in der Luft schwebenden Wohnungsstaub hinzu, der noch lebensfähige Erreger enthält. Am gefährlichsten wird in dieser Beziehung die Wohnungsluft, wenn sie grob sichtbaren Staub enthält, der durch Bewegung des Kranken oder Hantirungen mit inficirten Betten, Kleidern oder Möbeln aufgewirbelt ist.

Zu abweichenden Anschauungen bezüglich der Infektiosität der atmosphärischen Luft ist man früher durch statistische Zusammenstellungen gelangt, aus welchen hervorgehen sollte, dass die Frequenz aller möglichen infektiösen Krankheiten mit der Zahl der in 1 cbm Luft gefundenen (saprophytischen!) Bakterien parallel geht. Diesen Zusammenstellungen liegt von vornherein ein unrichtiger Gedanke zu Grunde, insofern die atmosphärische Luft für keinen der Infektionserreger den einzigen oder auch nur den hauptsächlichsten Transportweg darstellt; vielmehr kommen Berührungen, Wasser, Nahrung u. s. w. immer als mehr oder weniger mitbetheiligte Infektionsquellen in Betracht; eine Verbreiterung oder Verengerung jenes einen Weges muss daher durchaus nicht in der Zahl der gesammten Krankheitsfälle ihren Ausdruck finden. Wenn trotzdem ein Parallelismus zwischen den Ergebnissen der Luftanalysen und den Mortalitäts- und Morbilitätsziffern herausgerechnet ist, so zeigt das nur, wie leicht durch statistische Zusammenstellungen Coincidenzen erhalten werden können, die in keiner Weise auf einen ätiologischen Zusammenhang hindeuten.

Literatur: RENK, Die Luft, Abth. aus v. ZIRMSEN's und v. PETTENKOFER's Handbuch. d. Hygiene, 1885. — MIQUEL, Les Organismes vivants de l'atmosphère, Paris 1881. — AITKEN, Nature, Bd. 41 u. 45. — CORNET, Die Verbreitung der Tuberkelbacillen ausserhalb des Körpers, Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 5, Heft 2. — FLÜGGE, Ueber Luftinfektion, ibid. Bd. 25.

Methoden: FLÜGGE, Lehrbuch d. hyg. Untersuchungsmethoden, 1881. — HUEPPE, Die Methoden der Bakterienforschung, 4. Aufl., 1889. — LEHMANN, Die Methoden der praktischen Hygiene, 1890. — PETRI, Zeitschr. f. Hyg., Bd. 3 (dort die ältere Lit.). — FICKER, ibid. Bd. 23.

Viertes Kapitel.

Der Boden.

Es ist eine von Alters her verbreitete Ansicht, dass der Mensch in der Beschaffenheit seines Wohnbodens in gewisser Weise abhängig

Je nach seiner Oberflächenbeschaffenheit ist der Boden ein wesentlicher Theilfactor des Klimas; ferner ist bei der Fundamentirung des Wohnhauses, bei der Trinkwasserversorgung, bei der Entfernung der Abfallstoffe, bei der Anlage der Begräbnissplätze in erster Linie auf das Verhalten des Bodens Rücksicht zu nehmen.

Eine weitergehende hygienische Bedeutung hat in den letzten Jahrzehnten der Boden dadurch erlangt, dass einige Forscher denselben als ausschlaggebend für die Entstehung und Verbreitung mancher epidemischer Krankheiten angesprochen haben. Seitdem sind erst die Eigenschaften des Bodens genauer und mit spezifischer Berücksichtigung ihrer hygienischen Gesichtspunkte studirt.

Die Darstellung der durch diese Forschungen gewonnenen Resultate hat zunächst die Oberflächengestaltung und das geognostische Verhalten des Bodens flüchtig zu streifen, um dann die mechanische Struktur und die von dieser abhängigen Bodeneigenschaften, ferner die Temperaturverhältnisse und die chemische Beschaffenheit des Bodens eingehender zu erörtern. Specielle Berücksichtigung erfordert schliesslich auch das Verhalten der Luft, des Wassers und der Mikroorganismen im Boden.

1. Oberflächengestaltung und geognostisches Verhalten.

Die Gestalt der Bodenoberfläche bietet vielerlei Variationen und nicht selten hygienisch interessante Beziehungen. So führt eine zu geringe Neigung des Terrains oder eine muldenförmige Einsenkung leicht zu oberflächlichen Wasseransammlungen, zu feuchtem Boden und zu Malariaefahr. Bei scharf entscheidenden engen Thälern kann es zu stagnirender Luft, starker Bodenfeuchtigkeit und eventuell nächtlicher Einlagerung kalter Luftschichten kommen. Bergrücken oder Höhen und Sättel sind oft den Winden ausserordentlich stark exponirt. Vegetationslose Hochplateaus bieten extreme Temperaturcontraste. Nach

Norden gerichtete Abhänge zeigen relativ niedrige, Südabhänge entsprechend höhere Temperaturen in Folge der verschiedenen Insolation. — Von erheblichem Einfluss auf das Verfahren der Luftfeuchtigkeit und der Niederschläge und somit des ganzen Klimas ist ferner die Bewaldung der Bodenoberfläche (s. S. 139).

Neben der äusseren Gestaltung kommt der geognostische und petrographische Charakter der oberflächlichen Bodenschichten in Betracht.

Man unterscheidet vier geologische Formationen: 1) Die azoische, in deren Gesteinen keinerlei Spuren eines organischen Lebens gefunden werden. Repräsentanten dieser Formation sind Granit, Gneiss, Glimmerschiefer u. s. w. 2) Die paläozoische Formation, gekennzeichnet durch Reste von Algen, Gefässkryptogamen, Protozoen, Arthrozoen u. s. w. als Anfänge der organischen Welt. Diese Formation ist vertreten z. B. durch Grauwacke, Thonschiefer, Steinkohle. 3) Die mesozoische Formation, welche in der Kreide, dem Jura, und in dem Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein des sogenannten Trias zahlreiche Amphibien und Reptilien, sowie die Anfänge von Vögeln und Säugethieren erkennen lässt. 4) Die känozoische Formation, deren älteste Periode man als Tertiär bezeichnet. Das Tertiär weist Spuren von Palmen und Angiospermen, von Säugthieren und den ersten Menschen auf. Zu demselben gehören Kalkstein, Sand-, Thon-, Braunkohlenlager u. s. w., ferner manche in Folge vulkanischer Thätigkeit entstandene Trachyte, Basalte. Auf das Tertiär folgt zeitlich das Diluvium, auf dieses das Alluvium; beide bestehen aus Trümmern verwitterter Gesteine und diese Trümmer haben sich theils durch Ablagerung an Flüssen, theils unter der Einwirkung der früher bis nach Mitteleuropa und weit in Nordamerika hereinreichenden nordischen Gletscher zu ausgedehnten Kies-, Sand- und Lehmschichten aufgehäuft.

Unser Wohnboden besteht in seinen oberflächlichsten Lagen fast stets aus Diluvium oder Alluvium. Da Ortschaften sich gewöhnlich in Fluss- oder Bachthälern zu etabliren pflegen, bedeckt dort alluviales Schwemmland die Gesteinslager früherer Formationen; in den meisten Fällen folgen unter dem Alluvium diluviale Schichten, oft in ungeheurer Mächtigkeit. Nur ganz ausnahmsweise kommt es vor, dass Ortschaften unmittelbar auf älterem Gestein liegen.

Früher hat man dem geologischen und petrographischen Charakter der tieferen Schichten erhebliche hygienische Bedeutung beigemessen. Allerdings sind von der Formation und der Gesteinsart in gewissem Grade die Gestaltungen der Bodenoberfläche und damit das klimatische Verhalten, die Bodenfeuchtigkeit, ferner die Art der Wasseraufnahme im Boden, die Neigung zur Staubbildung, die Beschaffenheit des Trinkwassers u. s. w. abhängig. Aber alle diese Einflüsse bilden nicht regelmässige Charaktere der Gesteinsarten; letztere variiren vielmehr ganz erheblich in Bezug auf ihre äussere Gestaltung, auf ihre physikalische Beschaffenheit und auf ihre chemische Zusammensetzung.

sserdem werden auf der bewohnten Erdoberfläche durch die Auf-
erung alluvialen und diluvialen Schwemmlandes jene Einflüsse
estentheils verwischt.

Es ist daher höchst selten zulässig, von einem bestimmten klima-
hen und hygienischen Charakter dieser oder jener Gesteinsformationen
sprechen. Hygienisch bedeutungsvoll sind wesentlich nur die obersten
lenschichten und auch bei diesen ist es nicht sowohl von Interesse,
sie dem Diluvium oder dem Alluvium angehören, sondern höch-
s, ob sie innerhalb der letzten Jahre oder Jahrzehnte etwa durch
ischenhand (Aufschuttboden) oder bereits vor Jahrhunderten oder
rtausenden durch natürliche Einflüsse entstanden sind.

Die mechanische Struktur der oberen Bodenschichten.

Das Verhalten flüssiger, gasiger und suspendirter Stoffe im Boden
in erster Linie von seiner mechanischen Struktur abhängig, und
se ist daher für die hygienischen Beziehungen des Bodens von be-
nderer Wichtigkeit. Die mechanische Struktur umfasst die Korn-
össe, das Porenvolum und die Porengrösse; aus den Strukturverhält-
ssen resultiren dann unmittelbar jene eigenthümlichen Eigenschaften
s Bodens, welche unter der Bezeichnung „Flächenwirkungen“ zu-
mmengefasst werden.

a) Korngrösse, Porenvolum, Porengrösse.

Die mechanische Struktur zeigt — abgesehen von dem Gegensatz
ischen dem compacten Boden und dem Geröllboden — die auf-
llendsten Unterschiede je nach der Grösse der componirenden Ge-
einstrümmen; man scheidet in dieser Weise Kies (die einzelnen Körner
essen mehr als 2 mm), Sand (zwischen 0.3 und 2.0 mm Korngrösse),
einsand (unter 0.3 mm Korngrösse), Lehm, Thon, Humus (ab-
blämbare Theile). Thon besteht aus den allerfeinsten Partikelchen;
thält er gewisse Verunreinigungen, so bezeichnet man ihn als Letten,
inz; bei einem Gehalt von feinem Sand und geringen Eisenbei-
engungen als Lehm. Humus ist Sand oder Lehm mit reichlicher Bei-
schung organischer, namentlich pflanzlicher Reste.

Der Untergrund der Städte erhält durch die verschiedene Korn-
esse des Bodens ein sehr charakteristisches Gepräge. Bald liegt ein
kerer, grober Kies vor (München); bald ein gleichmässiger mittel-
er Sand (Berlin); bald vorwiegend Lehm Boden (Leipzig). Grober

Kies kann mit feinerem Kies und Sand oder mit dichtem Lehm gemengt vorkommen. Oft ist auch der Sand aus verschiedenen Korngrössen und eventuell noch mit lehmigen Theilen gemischt. Nicht selten findet sich beim Aufgraben städtischer Strassen bis in mehreren Meter Tiefe ein dunkel gefärbter humusartiger Boden, der durch Reste von Mauer- und Pflastersteinen, Mörtel, Holz u. s. w. als Aufschuttboden zu erkennen ist.

Um zu bestimmen, welche Korngrössen ein Boden enthält und in welchem Verhältniss die einzelnen Korngrössen gemischt sind, wird eine Probe des Bodens zunächst getrocknet, dann zerrieben, gewogen und nun auf einem Siebsatz gebracht, welcher fünf oder sechs Siebe von verschiedener Maschenweite enthält. Die auf jedem Sieb zurückbleibende Masse wird wieder gewogen und auf Procente des Gesamtgewichts der Probe berechnet. Die feinsten Theile (unter 0.3 mm) können noch durch Schlämmapparate in weitere Stufen zerlegt werden; doch ist eine solche Trennung häufiger im landwirtschaftlichen, als im hygienischen Interesse indicirt. — Das Resultat der Analyse wird beispielsweise in folgender Form gegeben: Charakter des Bodens; Grober Sand; enthält: 18 Procent Feinkies, 79 Procent Grobsand, 9 Procent Feinsand und abschlämmbare Theile.

Ausser der Korngrösse kommt die Porosität und das Porenvolum des Bodens in Betracht. Die Eigenschaft der Porosität fehlt dem städtischen Untergrund nur in den seltenen Ausnahmefällen, wo kompakter Felsboden die Wohnstätten trägt. Auch dann ist nicht selten nur scheinbar dichte Struktur vorhanden; Kalk- und Sandsteinböden zeigen oft eine poröse Beschaffenheit und können grosse Mengen Wassers schnell aufsaugen. — Der aus Gesteinstrümmern aufgeschichtete alluviale oder diluviale Boden enthält selbstverständlich stets eine Menge von toten Poren zwischen seinen festen Elementen. Diese Zwischenräume sind von besonderer Wichtigkeit; denn was immer sich im Boden findet, Luft, Wasser, Verunreinigungen, Mikroorganismen, muss in denselben sich aufhalten und fortbewegen.

Zunächst ist die Frage aufzuwerfen, wie gross das Porenvolum ist, d. h. wie viel Procent des ganzen Bodenvolums von den Poren eingenommen wird. — Es hängt dies wesentlich davon ab, ob die Elemente des Bodens unter einander annähernd gleich gross, oder aber aus verschiedenen Grössen gemischt sind. Sind dieselben gleich gross, so beträgt das Porenvolum circa 38 Procent, und zwar ebensowohl wenn es sich um Kies, als wenn es sich um Sand oder Lehm handelt. So haben z. B. alle abgeseihten, und daher aus unter einander gleich grossen Elementen zusammengesetzten Bodenproben 38 Procent Poren; die kleineren Korngrössen haben um so viel feinere Zwischenräume, aber entsprechend mehr an Zahl, so dass die Volumprocente gleich bleiben

Wesentlich kleiner wird das Porenvolum, wenn verschiedene Korngrößen gemischt sind, so zwar, dass die feineren Theile die Poren zwischen den grösseren Elementen ausfüllen. Dann kann eine grosse Dichtigkeit und ein sehr geringes Porenvolum resultiren. Sind z. B. die Poren des Kiesel mit grobem Sand, und dann die Poren des Sandes mit Lehm ausgefüllt, so geht das Porenvolum auf 5—10 Procent herunter und der Boden bekommt eine ausserordentliche specifische Schwere (Leipziger Kiesboden).

Das Porenvolum lässt sich leicht mathematisch berechnen, wenn man die Körner des Bodens als Kugeln ansieht. — Eine directe Bestimmung ist dadurch möglich, dass man in ein bekanntes Volum trockenen Bodens von unten her langsam Wasser aufsteigen lässt, bis alle Poren gefüllt sind und die Oberfläche feucht geworden ist; die Menge des zur Füllung der Poren verbrauchten Wassers ist durch Messung oder Wägung zu bestimmen. — Wenn es auf genaue Resultate ankommt, so ist es besser, die in den Poren enthaltene Luft durch Kohlensäure auszutreiben und im Eudiometer zu messen. Eine solche Bestimmung erfordert indess einen complicirteren Apparat und ist im hygienischen Interesse in den seltensten Fällen nothwendig.

In einfacher Weise lässt sich das Porenvolum auch aus dem Gewicht eines bekannten Bodenvolums berechnen. Das specifische Gewicht der einzelnen vorzugsweise in Betracht kommenden Bodenelemente beträgt nämlich, einerlei ob es sich um Kies, Sand oder Lehm handelt, etwa 2.6. Dividirt man dann das wahre Gewicht eines Bodenvolums durch dieses specifische Gewicht, so erhält man das Volum der festen Gesteinsmasse; und durch Abzug dieses Volums von dem Gesamtvolum die Summe der Zwischenräume. Hat man z. B. 600 ccm Boden und diese wiegen 1000 g, so sind $\frac{1000}{2.6} = 379$ ccm feste Masse und also 121 ccm Poren; das Porenvolum folglich 24 Procent.

Die Porengrösse schwankt in derselben Weise wie die Korngrösse und ist bei Thon, Lehm, sowie bei den aus diesen feinsten Elementen und grösseren Körnern gemischten Bodenarten am geringsten. Häufig sind grössere und kleinere Poren in demselben Boden neben einander. An den grösseren Poren sind ausserdem ungleichwerthige Antheile zu unterscheiden: die Ausläufer entsprechen feinsten Poren und wirken eventuell diesen ähnlich durch die relativ grosse Ausdehnung der den Hohlraum umgebenden Flächen; der Rest der Poren zeigt dagegen eine im Verhältniss zum Hohlraum geringe Ausdehnung der begrenzenden Flächen und ist daher zu sogen. Flächenwirkungen ungeeignet.

Je feiner die Poren sind, um so mehr Widerstände bieten sie der Bewegung von Luft und Wasser. Die Durchlässigkeit (Permeabilität) des Bodens für Luft und Wasser ist daher in erster Linie von der Porengrösse, daneben noch vom Porenvolum abhängig, und zwar haben manere Bestimmungen ergeben, dass sie den vierten Potenzen der

Porendurchmesser proportional ist, also mit dem Kleinwerden der Poren ausserordentlich rasch abnimmt.

Die Durchgängigkeit für Luft lässt sich in der Weise bestimmen, dass man bei gleichem Druck Luft durch eine bestimmte Schicht des Bodens hindurchtreten lässt und dann die Mengen, die in der Zeiteinheit passirt sind, mit Hilfe einer Gasuhr misst. — Die Durchlässigkeit für Wasser ist im Laboratorium nicht zu ermitteln, weil die in den Poren eingelagerten und nicht völlig zu bewegenden Luftblasen sehr ungleiche Widerstände bedingen.

Befeuchtet man absichtlich den Boden, so hört bei feinerem Boden schon alle Luftbewegung auf, sobald etwa die Hälfte der Poren mit Wasser gefüllt ist. — Noch bedeutender ist die Abnahme der Permeabilität im gefrorenen Boden.

b) Flächenwirkungen des Bodens.

Der poröse Boden bietet in den Begrenzungen seiner Zwischenräume eine ganz enorme Oberfläche dar, welche im Stande sein muss, energische Attraktionswirkungen auszuüben. Dieselben werden um so stärker ausfallen, je feinkörniger der Boden ist. Bei grobem Kies zählt man in 1 cbm Boden etwa 180000 Körner und diese repräsentiren eine Oberfläche von 56 qm; feiner Sand enthält dagegen in 1 cbm ca. 50000 Millionen Körner mit einer Oberfläche von über 10000 qm.

Die Attraktion erstreckt sich:

1) auf **Wasser**. Lässt man durch einen vorher trockenen Boden grössere Wassermengen hindurchlaufen, so gewinnt man nach dem Aufhören des Zutlusses nicht alles Wasser wieder, sondern ein Theil wird in dem Boden durch Flächenattraktion zurückgehalten. Dieser Rest giebt ein Maass für die wasserhaltende Kraft oder die sogenannte „kleinste Wassercapacität“ des Bodens. Je grösser das gesammte Porenvolum und je grösser der Procentsatz der feinen Poren ist, um so mehr Wasser vermag im Boden zurückzubleiben. Bei reinem Kiesboden werden nur 12—13 Procent der Poren dauernd mit Wasser gefüllt, 1 cbm Kiesboden vermag daher höchstens 50 Liter Wasser zurückzuhalten (1 cbm nimmt bei 38 Procent Porenvolum 380 Liter in den gesammten Poren auf, in 13 Procent derselben also 49 Liter). Dagegen findet man beim Feinsand etwa 84 Procent feine Poren, 1 cbm solchen Bodens hält dementsprechend 320 Liter Wasser zurück. Ist der Boden aus verschiedenen Korngrössen gemengt, so vermindert sich natürlich die Wassercapacität, weil das Gesamtvolum des Bodens erheblich kleiner wird.

Die Bestimmung der Wassercapacität erfolgt dadurch, dass ein mit trockenem Boden gefülltes, z. B. durch ein Platinetz verschlossenes Blech oder eine andere Vorrichtung, die einen genau zu bestimmenden grösseren Gefäss mit Wasser

gesenkt wird; ist das Wasser bis zur Oberfläche durchgedrungen, so hebt in das Rohr heraus, lässt abtropfen und wägt wieder.

Eine fernere Wirkung des Bodens gegenüber dem Wasser (oder deren Flüssigkeiten) besteht in dem capillaren Aufsaugungsvermögen. Nur die engsten Porentheile oder Poren vermögen solche pillarattraktion zu äussern und durch dieselben das Wasser seiner Schwere entgegen fortzubewegen. Oft wirken hier nur die feineren Ästläufer der Poren; die Füllung durch die gehobene Wassersäule erreicht sich aber schliesslich auf die ganzen Porenräume und ist daher deutender als die Wassermenge, welche der kleinsten Wassercapacität entspricht.

Man prüft die Capillarität durch aufrecht stehende Glasröhren, welche in verschiedenem Boden gefüllt sind und mit ihrem unteren Ende in Wasser tauchen; man beobachtet dabei theils die Höhe, bis zu welcher das Wasser capillare gehoben wird, theils die Geschwindigkeit des Aufsteigens. Letztere ist in Kies und grobem Sand, der geringen Widerstände wegen, bedeutender; im Feinsand und namentlich im Lehm steigt die Säule erheblich langsamer, erreicht aber dafür innerhalb 30—35 Tagen eine Höhe von 120 cm und mehr, während ein grobporiger Boden nur 5—10 cm hoch durchfeuchtet wird.

2) Wasserdampf und andere Dämpfe und Gase werden durch Flächenwirkung im Boden absorbirt (unabhängig von einer Condensation durch Temperaturerniedrigung). Energische Wirkung zeigt nur der saugporige, trockene Boden. Bekannt ist dessen momentane Absorption riechender Gase; die aus Fäkalien, Faulflüssigkeiten u. s. w. sich entwickelnden Gerüche, die riechenden Bestandtheile des Leuchtgases u. s. w. können durch eine Schicht feiner, trockener Erde vollständig zurückgehalten werden.

3) Absorption gelöster Substanzen. Verschiedene chemische Körper unterliegen einer Art absorbirender Wirkung durch chemische Umsetzung mit Hülfe gewisser Doppelsilikate des Bodens; in dieser Weise erfolgt die für den Ackerbau so wichtige Fixirung der Phosphorsäure, des Kalis und Ammoniaks.

Für uns ist eine Reihe von Absorptionerscheinungen von besonderer Bedeutung, die durch reine Flächenattraktion zu Stande kommen und sich namentlich gegenüber organischen Substanzen von hohem Molekulargewicht: Eiweissstoffen, Fermenten, Alkaloiden, Bakterientoxinen, Farbstoffen u. s. w. geltend machen. Kohle, Platinschwamm, Thonfilter, und jeder poröse Körper mit grosser Porenoberfläche zeigt ähnliche Wirkung. Von Bodenarten ist nur Humus, Lehm und feinstes Sand stärkeren Effekten befähigt; bei Kies und Grobsand kommt keine merkliche Absorption zu Stande.

Am leichtesten zu demonstrieren ist die schnelle und gründliche Zurückhaltung der Farbstoffe; ferner die Retention der Gifte. Giesst man z. B. auf eine Röhre mit 400 ccm Feinsand sehr allmählich 1procentige Strychninlösung (täglich etwa 10 ccm) oder eine entsprechende Lösung von Nikotin, Coniyn u. s. w., so ist in den nach einigen Tagen unten ablaufenden Portionen nichts von diesen Giften mehr nachzuweisen. — Am vollständigsten ist die Wirkung, wenn der Boden nicht mit Wasser gesättigt wird, sondern wenn die Poren zum Theil lufthaltig bleiben, oder wenn ein Wechsel von Befeuchtung und Trockenheit stattfindet. — Wählt man zu concentrirte Lösungen oder bringt man zu schnell neue Portionen auf, so wird der Boden übersättigt und die Absorption bleibt unvollständig.

Für gewöhnlich bleibt es nicht nur bei der Fixirung der bezeichneten Stoffe, sondern es erfolgt auch Zerstörung und Oxydirung der organischen Moleküle; aller C und N wird vollständig mineralisirt, d. h. in Kohlensäure und Salpetersäure übergeführt, und nur diese Mineralisierungsproducte findet man im Filtrat des Bodens. Allerdings ist die Zerstörung nicht etwa ausschliesslich auf die Flächenattraktion und eine durch diese gesteigerte Oxydation zurückzuführen, sondern es sind hierbei saprophytische Mikroorganismen wesentlich betheiligt. Sterilisirt man den Boden, so tritt nur oberflächliche Zerlegung der organischen Stoffe ein; z. B. in den Versuchen mit Strychninlösung erscheint viel Ammoniak und sehr wenig Salpetersäure im Filtrat. Unter natürlichen Verhältnissen sind aber stets Mikroorganismen, welchen die Fähigkeit der Nitrifikation zukommt, im Boden vorhanden; und daher leistet jeder feinporige Boden eine Mineralisirung der organischen Stoffe, sobald diese in nicht zu starker Concentration und nicht zu häufig auf den Boden gebracht werden und sobald ferner eine wechselweise Füllung der Poren mit Wasser und Luft stattfindet. — WINOGRADSKY ist die Isolirung einiger die Nitrifikation bewirkenden Bakterien durch Verwendung eines an Nährstoffen besonders armen Nährbodens gelungen. Er fand zwei Arten, welche Ammoniak in Nitrit, und eine andere Art, welche Nitrit in Nitrat zu verwandeln vermögen. Diese Arten sind anscheinend überall im Boden verbreitet. Ihren Bedarf an Kohlenstoff vermögen sie den kohlensauen Salzen oder der CO_2 der Luft zu entnehmen; derselbe ist im Ganzen sehr gering gegenüber den N-Mengen, die sie oxydiren. — Bei concentrirter Nährlösung und mangelndem Luftzutritt treten die Wirkungen der oxydirenden Bakterien in den Hintergrund und es werden dann andere Bakterienarten begünstigt, bei deren Lebensthätigkeit Reduktionsvorgänge ablaufen.

III. Temperatur des Bodens.

Das Verhalten der Bodentemperatur lässt sich entweder nach den die Erwärmung des Bodens einflussreichen Momenten abschätzen oder durch directe Messungen bestimmen.

Für die Erwärmung des Bodens kommt theils die Intensität und der Einswinkel der Sonnenstrahlung (Neigung des Terrains) in Betracht; theils eine Reihe von Bodeneigenschaften: das Absorptionsvermögen für Wärmestrahlen, bei dunklem Boden weit stärker ist als bei hellfarbigem; die Wärmeleitung und die Wärmecapazität, die namentlich in feuchtem, feinkörnigem Boden zu höheren Werthen führen; endlich die Verdunstung resp. Condensation von Wasserdampf, durch welche einer extremen Erwärmung und Abkühlung entgegen gewirkt wird, und welche ebenfalls im feinkörnigen Boden am stärksten in Wirkung gelangen.

Dementsprechend weist ein grobkörniger, dunkler, trockener Boden die höchsten Wärme- und niedrigsten Kältegrade auf; während feinkörniger, feuchter Boden sich nachhaltiger, aber nicht so hochgradig zu erhitzen vermag. — Stellen des Bodens, welche stark mit organischen Stoffen unreinigt sind, können ausserdem durch die Fäulnis- und Oxydationsvorgänge eine Erwärmung bis zu einigen Graden über die Temperatur des umgebenden Bodens erfahren.

Die Messung lokaler Bodentemperaturen erfolgt dadurch, dass Eisenrohre (Asrohr) bis zu verschiedener Tiefe in den Boden eingesenkt und in diese, unter möglichstem Abschluss gegen die Aussenluft, unempfindlich gemachte Thermometer (deren Gefäss mit Kautschuk und Paraffin umhüllt ist) herabgelassen werden. — Zu fortgesetzten exakten Messungen dienen in die Erde eingetragene Gestelle von Holz oder Hartgummi, die nur da, wo die Thermometergefässe angebracht sind, von gut leitendem Material unterbrochen sind.

Aus den Beobachtungen geht hervor, dass je mehr man sich von der Oberfläche nach der Tiefe hin entfernt, 1) die Excursionen der Temperatur mehr und mehr verringert werden, 2) die Temperaturen zeitlich entsprechend verschieben, 3) die Schwankungen von kürzerer Dauer allmählich zum Schwinden kommen. — Schon in 0.5 m Tiefe kommt die Tagesschwankung fast gar nicht mehr zum Ausdruck; auch die Differenzen zwischen verschiedenen Tagen sind verwischt; die Excursionen der Monatsmittel sind um mehrere Grade geringer; die Jahreschwankung beträgt nur noch ca. 10°. In 4 m Tiefe sinkt die tägliche bereits auf 4°, in 8 m Tiefe auf 1°. Zwischen 8 und 30 m Tiefe — verschieden je nach dem Jahresmittel der Oberfläche — stellt sich das ganze Jahr hindurch die gleiche mittlere Temperatur ein, und jede Schwankung fällt fort. Von da ab findet beim weiteren Eindringen in die Tiefe eine Zunahme der Temperatur statt in Folge

Annäherung an den heissen Erdkern. Auf je 35 m steigt die Temperatur um etwa 1° (im Gotthardtunnel bis +31°). — Die nach-

stehende Tabelle giebt einen genauen Ueberblick über die Temperatur in den uns interessirenden Tiefen.

	Äussere Luft	Boden in			
		0.5 m Tiefe	1.0 m Tiefe	3.0 m Tiefe	6. 7
Januar	-3.1°	+1.8°	+3.7°	+7.8°	+
Februar	-0.3	2.0	4.2	7.2	
März	+4.4	3.5	4.5	7.4	
April	7.1	6.0	6.3	7.9	
Mai	10.1	10.1	10.5	8.5	
Juni	16.5	14.1	13.5	10.0	
Juli	19.5	16.1	14.9	12.1	
August	18.5	16.8	15.7	13.6	
September	13.1	17.8	16.5	14.2	
October	10.7	13.7	14.4	13.2	
November	5.1	8.2	10.2	11.7	
December	1.4	7.0	8.7	10.2	

An der Bodenoberfläche können bei kräftiger Insolation in unseren Breiten sehr hohe Temperaturen zu Stande kommen; beträgt das Maximum, welches mit dem geschwärzten Vacuumthermometer beobachtet wurde, in Magdeburg im Mai +44°, im Juni - im Juli +54°.

Die Bodentemperatur erhält ihre hygienische Bedeutung durch ihren Einfluss auf die localen klimatischen Verhältnisse; durch ihre Wirkung auf das Leben der Mikroorganismen. Es ist grosser Tragweite, dass schon in etwa 1 m Tiefe die höchste, die Zeit herrschende Temperatur unter derjenigen bleibt, welche für ausgiebige Vermehrung pathogener Bakterien Bedingung ist. Das Verhalten der Temperatur allein ist ausreichend, um eine Wucherung z. B. von Cholera-, Typhusbacillen u. s. w. im tieferen Boden zu ausschliessen. — In heissen Klimaten, resp. im Sommer, werden üblicherweise an der äussersten Oberfläche die Temperaturen sogar so hoch, dass dieselben eine Schwächung und Tödtung von Mikroorganismen zu Stande lassen.

IV. Chemisches Verhalten des Bodens.

Die verschiedenen Gesteine, aus welchen der Boden aufgebaut ist, enthalten hauptsächlich Kieselsäure, Kohlensäure, Thonerde, Kali, Natrium, Kalk, Magnesia; alle diese aber in Verbindungen, die in Wasser

löslich resp. in Spuren löslich und daher für die biologischen Vorgänge im Boden indifferent sind. Ausser diesen eigentlichen mineralischen Bestandtheilen enthält aber der städtische Boden in den Poren zwischen seinen Elementen noch vielfache Beimengungen, organische und anorganische Stoffe, aus den Abfallstoffen des menschlichen Haushaltes, aus pflanzlichem und thierischem Detritus und aus den Niederschlägen stammend. Gerade diese beigemengten Stoffe des Bodens resp. ihre Zersetzungsprodukte sind für uns von Interesse.

Die Untersuchung richtet sich vorzugsweise auf die Menge der vorhandenen verbrennlichen Stoffe, auf die Menge des Stickstoffs, sowie auf Ammoniak, salpetrige Säure, Salpetersäure u. s. w.; letztere werden im wässrigen Extract aus einer gewogenen Bodenprobe bestimmt. In vielen Fällen ist eine chemische Untersuchung des Bodens dadurch überflüssig, dass im Brunnenwasser der betreffenden Lokalität eine natürliche Lösung der uns interessirenden Bestandtheile gegeben ist und dass die Wasseruntersuchung Rückschlüsse auf die Bodenbeschaffenheit gestattet (s. folg. Kap.).

Eine besondere Schwierigkeit bietet die Bestimmung des Wassergehalts des Bodens dadurch, dass es von Bedeutung ist zu erfahren, auf welchen Raum im Boden eine bestimmte Wassermenge sich vertheilt. Da das specifische Gewicht des aus verschiedenen Korngrössen gemengten Bodens stark variiert und das Volum also nicht einfach aus dem Gewicht entnommen werden kann, muss die zur Wasseruntersuchung bestimmte Bodenprobe entweder gleich mit einem Cylinder von bekanntem Volum ausgestochen oder es muss der ausgegrabene Boden nachträglich so dicht als möglich in ein Gefäss von bekanntem Volum eingestampft werden. Die Probe wird dann gewogen, an der Luft getrocknet, bis keine Gewichtsabnahme mehr eintritt, und eventuell noch einer Temperatur von 100° ausgesetzt, um auch das hygroskopische Wasser zu entfernen. Die Berechnung erfolgt schliesslich auf Liter Wasser pro 1 cbm Boden.

Die hygienische Bedeutung der chemischen Beschaffenheit des Bodens ist in früherer Zeit sehr hoch angeschlagen. Namentlich war man der Meinung, dass ein Boden um so disponirter zur Verbreitung von Infektionskrankheiten sei, je höheren Gehalt an organischen Stoffen er zeigt. Die verunreinigenden Abfallstoffe im Boden sollten das Nährmaterial für die Entwicklung von Infektionserregern darstellen; und wo der Boden frei von grösseren Mengen organischer Stoffe blieb, sollte keine Möglichkeit bestehen zur Ausbreitung von Infektionskrankheiten.

Diese Ansicht stiess jedoch bereits früher auf manchen Widerspruch, indem z. B. Städte und Stadttheile mit hervorragend stark verunreinigtem Untergrund von Typhus, Cholera u. s. w. relativ verschont blieben, während hartnäckige Infektionsherde auf geringer verunreinigten Bodenparthieen lagen.

Seit die Culturbedingungen der pathogenen Bakterien genauer studirt sind, kann nicht mehr angenommen werden, dass ein Mehr oder Weniger der in Rede stehenden Abfallstoffe einen so entscheiden-

den Einfluss auf die Lebens- und Vermehrungsfähigkeit der Infektionserreger ausübt, dass sich ein Parallelismus zwischen Bodenvereinerung und Ausbreitung der Infektionskrankheiten herstellt. Die in den Boden gelangenden Abfallstoffe enthalten stets Massen von Saprophyten; deren Wucherung schreitet im Boden rasch weiter vor, und in der Concurrenz mit diesen und bei den ungünstigen Temperaturverhältnissen des Bodens kann ein Unterschied in der Menge der Abfallstoffe, wie er zwischen gedüngtem Ackerland und städtischem Boden oder zwischen dem Untergrund der einen oder anderen Stadt innerhalb der Culturländer vorkommt, den Infektionserregern nicht zu wesentlich besserem Wachsthum verhelfen.

Die Beziehung zwischen dem Grade der Imprägnirung des Bodens mit Abfallstoffen und der Frequenz der Infektionskrankheiten liegt vielmehr vorzugsweise darin, dass dort, wo die Abfallstoffe in geringem Grade in den Boden gelangen, Einrichtungen zu bestehen pflegen, durch welche die Hauptmasse der Abfallstoffe, damit zugleich aber auch Massen von Infektionserregern aus dem Bereich der Menschen entfernt werden; dass dagegen in den Städten, wo alle Abfallstoffe ohne Vorsichtsmaassregeln dem Boden überantwortet werden, auch zahlreiche Infektionserreger in der nächsten Umgebung der Menschen verbleiben.

Der Gehalt des Bodens an organischen Substanzen führt nur dann zur Benachtheiligung der Bewohner, wenn auf und in dem Boden so intensive Fäulnissprocesse verlaufen, dass riechende Produkte sich in merkbarer Menge der atmosphärischen oder der Wohnungsluft beimischen (s. unten).

V. Die Bodenluft.

Die Poren des Bodens sind bald nur zum Theil, bald ganz, mit Luft erfüllt. Diese Luft stellt gleichsam eine Fortsetzung der Atmosphäre dar und steht mit letzterer in stetem Verkehr. Die Bodenluft kann sich unter bestimmten Bedingungen über die Bodenoberfläche erheben und der atmosphärischen Luft beimengen; umgekehrt wird sie aus dieser ergänzt.

Ein **Auströmen** der Bodenluft ist namentlich in folgenden Fällen denkbar: 1) wenn das Barometer sinkt und die Bodenluft dementsprechend sich ausdehnt; 2) wenn heftige Winde auf die Erdoberfläche drücken, während auf die von Häusern bedeckten Stellen dieser Druck nicht einwirkt; hierdurch muss ein Eindringen von Bodenluft in die Häuser stattfinden können; 3) in ähnlicher Weise wirken stärkere Niederschläge, welche auf der freien Erdoberfläche einen Theil

der Poren mit Wasser füllen und dabei eine Spannung der Bodenluft veranlassen, die sich eventuell durch Abströmen in die Wohnhäuser ausgleicht; 4) als Folge von Temperaturdifferenzen. Besonders kann während der Heizperiode ein Ueberdruck seitens der kälteren Bodenluft und entsprechendes Einströmen derselben in das erwärmte Haus beobachtet werden.

Directe Messungen (mit empfindlichen Manometern oder besser mit RECKNAGEL's Differentialmanometer angestellt) ergeben indess, dass thatsächlich nur selten ein merkliches Einströmen von Bodenluft in die Wohnhäuser stattfindet. Sobald die Sohle des Hauses aus einigermaassen dichtem Material (Pflaster) besteht, sind die Widerstände für eine ausgiebigere Luftbewegung dort zu gross und der Ausgleich von Druckdifferenzen erfolgt ausschliesslich durch die grösseren Communicationen, welche zwischen Aussenluft und Hausluft stets vorhanden zu sein pflegen. — Fehlt die Pflasterung der Kellersohle, so lässt sich bei durchlässigem Boden im Mittel ein Ueberdruck von 0.05 mm Wasser constatiren, entsprechend einer Geschwindigkeit der Luftbewegung von 0.03 m pro Sekunde. Bei heftigem Sturm ist ein Ansteigen des Ueberdruckes auf 0.75 mm (= 0.1 m Geschwindigkeit) beobachtet.

Die chemische Analyse weist in der Bodenluft eine stete Sättigung mit Wasserdampf nach; eine grosse Menge von CO_2 (0.2—14 Procent, im Durchschnitt 2—3 Procent); eine entsprechend geringere Menge O, der zur Bildung der CO_2 verbraucht war.

Ausserdem enthält die Bodenluft noch Spuren von NH_3 und geringe Mengen anderer Zersetzungs gases. In tiefen Brunnenschächten kommt es eventuell zu toxischer Wirkung seitens der Bodenluft durch excessive Anhäufung von CO_2 und O-Mangel, äusserst selten durch beigemengten H_2S und Kohlenwasserstoffe. (Ueber Leuchtgasvergiftung aus Strassenrohren s. unter Kapitel „Beleuchtung“).

Die CO_2 wird am besten mit gewogenen KOH-Apparaten bestimmt. — Früher hat man geglaubt in der CO_2 der Bodenluft einen Maassstab für die Verunreinigung des Bodens mit organischen Substanzen zu besitzen. Allerdings findet man hohe CO_2 -Zahlen nur in einem Boden, der mit organischen Stoffen imprägnirt war; in der lybischen Wüste dagegen nicht mehr, wie in der Atmosphäre. Aber als ein richtiger Ausdruck für den Grad der Verunreinigung ist der CO_2 -Gehalt doch nicht zu gebrauchen. Die Production von CO_2 schwankt nicht allein nach der Menge des vorhandenen zersetzlichen Materials, sondern auch nach der Temperatur, dem Grad der Durchfeuchtung u. s. w.; und vor Allem ist die Concentration der CO_2 ausser von der Production noch abhängig von der Luftbewegung im Boden; bei grosser Permeabilität des Bodens und unter dem Einfluss kräftig ventilirender Winde bleibt der CO_2 -Gehalt der Bodenluft niedrig, während die nämliche Production bei einem dichten Boden und bei fehlenden Winden hohen CO_2 -Gehalt bewirkt.

Mikroorganismen werden in der Bodenluft ausnahmslos vermisst. Nur von der äussersten Oberfläche werden im Freien mit den Bodenpartikelchen Mikroorganismen losgerissen und als Staub in die Luft übergeführt; die aus dem Boden unterhalb der Oberfläche stammende Luft ist dagegen wegen ihrer überaus schwachen Bewegung und ihrer steten Sättigung mit Wasserdampf nicht im Stande Mikroorganismen fortzuführen; und wenn dies etwa geschähe, so müssten die Bakterien beim Durchstreichen der Luft durch die darüber liegende Bodenschicht völlig zurückgehalten werden, da ja schon dünne Erdschichten nachweislich ein völlig dichtes Filter für Luftbakterien darstellen.

Auch in die Wohnhäuser werden mit der Bodenluft niemals Bakterien eingeführt. Dort kann nicht einmal eine Ablösung von der äussersten Oberfläche erfolgen, weil an der Kellersohle des Hauses der erforderliche Grad von Austrocknung und die zum Losreissen und Fortführen des Staubes nothwendige Windstärke fehlt.

Da somit eine infektiöse Wirkung der Bodenluft durch ihre Keimfreiheit auszuschliessen ist, kommen für eine **hygienische Bedeutung** der Bodenluft nur toxische oder übelriechende gasförmige Bestandtheile in Betracht, die mit der Bodenluft in die Atmosphäre oder in die Wohnungsluft gelangen. Wenn namentlich die Kellerpflasterung fehlt, so kann unter der Einwirkung der oben aufgezählten treibenden Kräfte übelriechende CO_2 -reiche Luft in grosser Menge in die Wohnhäuser eindringen. Ein toxischer Effekt kommt hierdurch (ausser bei Leuchtgasausströmungen) zwar nicht zu Stande; wohl aber kann eine hygienische Beeinträchtigung, wie sie S. 158 beschrieben ist, aus der dauernden Luftverunreinigung resultiren. — Uebrigens ist durch Dichtung der Kellersohle des Hauses resp. durch dichte Pflasterung der Strassen das Einströmen der Bodenluft leicht ganz zu verhindern.

VI. Verhalten des Wassers im Boden.

Im porösen Boden begegnen wir gewöhnlich in einer Tiefe von einigen Metern einer mächtigen Wasseransammlung, die als „Grundwasser“ bezeichnet wird; die darüber gelegenen Schichten zeigen einen geringeren und wechselnden Wassergehalt. Beide Zonen erfordern eine gesonderte Betrachtung.

A. Das Grundwasser.

Bodenwasser oder Grundwasser nennt man jede ausgedehntere terrestrische Wasseransammlung, welche die Poren des Bodens völlig und dauernd ausfüllt. In einem durchlässigen Boden kann eine solche Ansammlung nur dadurch zu Stande kommen, dass undurchlässige Schichten, Felsen, Thon- oder Lehmlager das Wasser tragen und am Abfließen hindern. Oft finden sich mehrere Etagen von undurchlässigen Schichten und darauf gelagertem Grundwasser über einander, die dann an einzelnen Stellen communiciren; manchmal haben die Thon- und Lehmlager nur geringe Ausdehnung, bilden kleine Inseln, auf welchen sich eine geringe und nicht constante Wasseransammlung bildet (sogenanntes „Schicht-“ oder „Sickerwasser“).

Das Grundwasser passt sich im Ganzen der Oberfläche der tragenden undurchlässigen Schicht an, ohne dass jedoch kleinere Erhebungen und Senkungen die Gestalt des Grundwasserniveaus beeinflussen. Die Bodenoberfläche dagegen zeigt oft starke Abweichungen vom Verlauf sowohl der undurchlässigen Schicht wie des Grundwasserspiegels (vergl. s. Profil S. 188).

Die Quellen des Grundwassers sind 1) die Niederschläge, oder richtiger derjenige Bruchtheil der Niederschläge, welcher bis zum Grundwasser gelangt, also nicht oberflächlich abfließt und auch nicht nach dem Eindringen in den Boden wieder verdunstet. Es ist bereits oben (S. 124) betont, dass der das Grundwasser speisende Antheil der Niederschläge verschieden gross ist nach der Neigung des Terrains, der Durchlässigkeit und Temperatur des Bodens und der austrocknenden Kraft der Luft; dass ferner auch die Art des Regenfalles von Belang ist. Bei abschüssigem, felsigem Boden, ebenso bei sehr warmem Boden und sehr trockener Luft gelangt nur wenig von den Niederschlägen in die Tiefe; dagegen lässt ein poröser, kalter, ebener Boden relativ grosse Mengen zum Grundwasser durchtreten. 2) Condensation von atmosphärischem Wasserdampf, die jedoch nur dann etwas leistet, wenn die Aussenluft erheblich wärmer ist als der Boden und relativ viel Feuchtigkeit enthält, also in den Monaten April bis September; auch in dieser Jahreszeit aber nur an einzelnen Tagen und in unbedeutender Menge. 3) Zuströmung von Grundwasser von anderen Orten. Wenn die undurchlässige Schicht und dementsprechend das Niveau des Grundwassers stärkere Neigung zeigt und wenn gleichzeitig der Boden leicht durchlässig ist, kommt eine deutliche horizontale Fortbewegung des Grundwassers zu Stande, die den Grundwasserstand an verschiedenen Punkten wesentlich beeinflussen kann. Bei dichteren Bodenarten und geringen Niveaudifferenzen fehlt eine solche Bewegung, und

die Grundwassermasse kann als stagnirend angesehen werden. 4) Flüsse. Meist liegt das Grundwasser tiefer als das Flussbett, und man wird dann leicht zu der Annahme geführt, dass Wasser aus dem Fluss oder Bach in das Grundwasser übertreten müsse. Dennoch ist dies vielfach nicht der Fall. Die Betten der Flussläufe sind oft durch allmähliche Ablagerung lehmiger oder thoniger Massen vollkommen wasserdicht geworden, so dass selbst bei starken Niveaudifferenzen kein Durchtritt von Wasser stattfindet. Werden unmittelbar neben einem solchen Flussbett Brunnenschächte in das Grundwasser gegraben, so lässt sich durch die Resultate der chemischen Untersuchung, z. B. durch das Gleichbleiben des Härtegrades, noch leichter und genauer

durch vergleichende Temperaturbeobachtungen feststellen, dass kein Wasser von dem höher liegenden Flusse in das Grundwasser dringt. Fehlen aber verschlammende Bestandtheile im Flusse und besteht das Bett aus lockerem Sand, dann erfolgt eine Speisung des Grundwassers vom Flusse aus, in besonders hohem Grade, wenn der Fluss abnorm hohes Wasser führt oder künstlich gestaut ist.

Unter und neben dem Flusslauf zieht der breite Grundwasserstrom der Niederung zu; hier und da tritt das Grundwasser in Form von Seen oder Sümpfen zu Tage; allmählich, bei grösserer Annäherung an's Meer, durchdringt es die oberen Bodenschichten und kommt in den Marschen an die Oberfläche. Langsam, aber in ungeheurer Masse vollzieht sich diese unterirdische Wasserbewegung. Zuweilen wird sie in ihrem natürlichen Abfluss gehemmt durch das Anschwellen der Flüsse, welche das ganze Thal ausfüllen; dann kommt es zu

einem Aufstauen des Grundwassers, und eine solche Stauwelle addirt sich eventuell zu der durch den Zutritt von Flusswasser bewirkten Anschwellung des Grundwassers.

Von besonderem Interesse sind die zeitlichen Schwankungen des




Fig. 61. Grundwassermessung. Schematischer Durchschnit durch einen Grundwasserbrunnen. Bei a Messung mit PETTENKOPFER's Schälchenapparat; bei b Schwimmer mit oben abzulesendem Zeiger.

wasserniveaus, die man dadurch misst, dass man den Abstand Grundwasser- und Wasseroberfläche von der Bodenfläche ermittelt.

Die Messung wird gewöhnlich an Schachtbrunnen ausgeführt, die bis in's Wasser reichen; die Bohlendeckung des Schachtes wird abgehoben und vermaass, an dessen Ende sich ein Schwimmer oder ein sogen. Schaalen- (ev. auch eine mit Kreide bestrichene Holzleiste) befindet, herabgelassen. Die Höhe dieser Instrumente ist der Abstand zwischen oberer Kante der Brunnen- und der Wasseroberfläche genau zu messen. Bei dichtem Boden darf man Stunden vor der Messung nicht an dem Brunnen gepumpt werden; werden stets besondere eiserne Standrohre benutzt. Jener obere Rand- markung, oder irgend eine andere leicht kenntliche, festliegende Marke, bis zu welcher der Abstand jedesmal gemessen wird, ist der locale Fixpunkt.

Auf solcher Weise beobachtet man an ein und derselben Station die zeitliche Schwankungen. Man ermittelt einmal den höchsten und niedrigsten Stand, der im Laufe der Jahre erreicht wird; das Maximum ist uns wichtig für die Fundamentirung unserer Häuser, möglichst nicht unter dieses Maximum herabreichen soll; und das Minimum ist da von Bedeutung, wo man den Wasserbedarf aus Brunnen zieht. Zweitens beobachtet man die Schwankungen innerhalb des Jahres und der Jahreszeiten; und dieser Messung kommt ein Interesse bei, weil sie uns Aufschluss giebt über gewisse gleich zu besprechende Verhältnisse der obersten Bodenschichten.

Auf der norddeutschen Ebene verhalten sich die Schwankungen Grund- und oberflächennahen Wassers im Ganzen so, dass auf den April das Maximum, auf den September oder October das Minimum fällt. Das liegt nicht etwa nur von der Regenvertheilung, sondern wie aus der untenstehenden

	Berlin			München		
	Nieder- schläge in mm	Sättigungs- deficit in mm	Grund- wasser in m üb. d. Meere	Nieder- schläge in mm	Sättigungs- deficit in mm	Grund- wasser in m üb. d. Meere
...	40.3	0.71	32.72	53.3	0.15	515.55
...	34.8	0.91	32.79	29.6	0.41	515.55
...	46.6	1.55	32.88	48.5	0.81	515.60
...	32.1	2.73	32.96	55.6	1.78	515.64
...	39.8	3.95	32.88	95.1	2.34	515.67
...	62.2	5.13	32.69	111.9	3.00	515.72
...	66.2	5.64	32.56	108.8	3.43	515.73
...	60.2	4.83	32.45	104.4	3.13	515.72
ber .	40.8	3.77	32.40	68.1	1.98	515.63
...	57.5	1.72	32.38	53.1	0.93	515.54
ber .	44.5	1.01	32.47	50.0	0.39	515.49
ber .	46.2	0.59	32.50	42.9	0.20	515.51

Tabelle ersichtlich ist, an dem Sättigungsdeficit der Luft und der hohen Bodentemperatur, welche im Sommer allen Regen zum Verdunsten bringen und nur den Winter- und Frühjahrsniederschlag in den Boden eindringen lassen. — Anders ist es in München; dort fällt vorherrschend Sommerregen in verhältnissmässig sehr grossen Massen und ebendort ist zur selben Zeit das Sättigungsdeficit erheblich geringer. Offenbar dringt denn auch in München der Sommerregen bis zum Grundwasser durch und bewirkt dort einen wesentlich anderen Typus




Fig. 62. Bodenprofil.

der Grundwasserbewegung, nämlich Hochstand im Juni bis August, tiefsten Stand im November bis December. Allerdings wirkt hierbei noch ein wesentlicher Faktor — die Durchlässigkeit des Bodens — mit, dessen Einfluss unten zu erörtern ist.

Beim Studium der Untergrundverhältnisse einer Stadt muss man ferner versuchen, eine Vorstellung von der Gestalt der Grundwasseroberfläche zu bekommen. Da die verschiedenen lokalen Fixpunkte in Folge der Unebenheiten der Bodenoberfläche sehr verschiedene Abstände auch von dem gleichen, ebenen Grundwasserniveau zeigen, sind die an verschiedenen Orten für den Grundwasserabstand gewonnenen Zahlen nicht direct vergleichbar und man muss die lokalen Fixpunkte auf einen gemeinsamen oberen oder unteren Fixpunkt einnivelliren. Dabei geht man gewöhnlich aus von der Oberkante der Schienen

des Bahnhofs, deren Höhenlage über dem allgemeinen Nullpunkt, dem Spiegel der Nordsee (Marke bei Wilhelmshafen) oder der Ostsee resp. des adriatischen Meeres, bekannt ist. In dieser Weise werden die Höhen der Lokalfixpunkte über dem gemeinsamen Nullpunkt und nach Abzug des Abstandes der Grundwasseroberfläche vom lokalen Fixpunkt, die Höhenlage jedes Punktes der Grundwasseroberfläche über dem allgemeinen Nullpunkt erfahren und aufgemessen.

Die Darstellung der Resultate erfolgt am besten durch Profile ähnlich der vorstehenden schematischen Zeichnung (Fig. 62). Die Stadt wird in eine Anzahl von Bohrlinien zerlegt und von jeder Bohrlinie gewinnt man ein Profil, indem in gewissem Abstand Bohrlöcher in den Boden getrieben werden, deren horizontaler Abstand unter einander und deren Höhenlage über dem allgemeinen Nullpunkt auf der Zeichnung markirt wird. Der beim Bohren ausgehobene Boden wird beobachtet und gesammelt; sobald Proben neuer Schichten (von anderer Korngrösse, Farbe u. s. w.) herausgefördert werden, wird die Tiefe des Bohrloches gemessen und auf dem Profil ist dementsprechend die Höhenlage des Beginnes der neuen Schicht über dem allgemeinen Nullpunkt einzzeichnen. Verbindet man dann auf dem Profil die Punkte der verschiedenen Bohrlöcher, an welchen die Beschaffenheit des Bodens wechselt, so erhält man ein Bild der Neigung der einzelnen Bodenschichten und insbesondere auch der undurchlässigen Schicht. — Um ferner das Grundwasserniveau zu erhalten, wird der Abstand des Grundwassers von der Bodenoberfläche in den verschiedenen Bohrlöchern gemessen und die augenblickliche Höhe über dem allgemeinen Nullpunkt, bei länger fortgesetzten Messungen auch das Maximum und das Minimum, auf dem Profil eingetragen; die Verbindungslinie dieser Punkte ergibt dann die Gestalt der Grundwasseroberfläche.

Bei der Zeichnung der Profile werden übrigens gewöhnlich die Längen in viel (50fach und mehr) stärkerem Maasse reducirt als die Höhen; bei gleichmässiger Reduktion würden die Höhendifferenzen kaum sichtbar werden. — Auch Karten, auf denen Isohypsen (d. h. Horizontale, welche die Punkte gleicher Erhebung über dem Nullpunkt mit einander verbinden) der Bodenoberfläche, des Grundwasserniveaus und der Oberfläche der undurchlässigen Schicht eingetragen sind, geben anschauliche Bilder von den Verhältnissen des Untergrundes.

An einzelnen Orten ist auch die horizontale Fortbewegung des Grundwassers gemessen und zwar dadurch, dass man an einer Reihe von umliegenden Brunnen die Zeit des Eintritts von Niveauänderungen beobachtete, während an einem Brunnen durch ausgiebiges Pumpen eine starke Depression des Niveaus hergestellt wurde; oder dadurch, dass man feststellte, wie lange Zeit die durch Hochwasser eines Flusses erzeugte Fluthwelle gebraucht, um sich zu verschiedenen Stationen der Grundwasserbeobachtung fortzupflanzen. Ferner ist an den Deichen nach Hochwasser die Durchtrittszeit des eindringenden Wassers ermittelt. — Es hat sich bei diesen Messungen herausgestellt, dass die Fortbewegung sehr verschieden ist je nach der Bodendurchlässigkeit und der Neigung der undurchlässigen Schicht, unter allen Umständen aber ausserordentlich langsam. Die bisher gefundenen Werthe betragen 3—8—35 m pro 24 Stunden, also im Mittel nur etwa 25 cm pro Stunde.

B. Das Wasser der oberen Bodenschichten.

In den über dem Grundwasser gelegenen Bodenschichten unterscheiden wir 3 Zonen (HOFMANN):

1) Die Verdunstungszone, die von der Oberfläche soweit herabreicht, wie sich noch eine austrocknende Wirkung der atmosphärischen Luft bemerkbar macht, und wo also der Wassergehalt eventuell unter die kleinste Wassercapazität des Bodens sinken kann. Hat in dieser Zone einmal stärkere Austrocknung bis zu gewisser Tiefe stattgefunden, so ist dieselbe im Stande sehr grosse Wassermengen zurückzuhalten. Dichter Boden fasst pro 1 qm bis zu 25 cm Tiefe 40—50 Liter Wasser

(vgl. S. 176), da aber ein Regenfall von 10 mm Höhe nur 10 Liter Wasser auf 1 qm liefert, so können mehrfache starke Niederschläge vollauf in den Poren dieser Zone Platz finden. Je nachdem der Boden mehr oder weniger feine Poren enthält, wird natürlich die zurückgehaltene Regenmenge verschieden gross sein; in einigermaassen feinporigem Boden ist aber im Sommer unseres Klimas die Austrocknung immer so bedeutend, dass dann gar nichts, weder von Regen noch von verunreinigenden Flüssigkeiten in die Tiefe eindringt, sondern dass alles




Fig. 63. Wassergehalt der oberen Bodenschichten.

in der oberflächlichen, wie ein trockener Schwamm wirkenden Zone zurückbleibt.

2) Unterhalb der Verdunstungszone folgt eine Schicht, die von der austrocknenden Wirkung der Luft nicht mehr erreicht wird, in der aber andererseits keine vollständige Füllung der Poren mit Wasser bestehen kann, weil die den Ablauf hemmende, undurchlässige Schicht noch zu weit entfernt ist. In dieser „Durchgangszone“ muss also stets so viel Wasser in den Poren vorhanden sein, wie der kleinsten Wassercapazität des Bodens entspricht. Bei feinporigem Boden repräsentiert dies immerhin eine sehr bedeutende Wassermenge, im Mittel verschiedener directer Bestimmungen 150—350 Liter in 1 cbm Boden. Es ist leicht zu berechnen, dass in einer 1—2 m hohen Schicht solchen Bodens die Niederschläge eines ganzen Jahres haften bleiben. Bei

iger Ausdehnung der Durchgangszone stellt dieselbe also ein enorm grosses Wasserreservoir dar.

3) Zwischen Durchgangszone und dem Grundwasser befindet sich Zone des durch Capillarität gehobenen Wassers. Je nach Porengrösse der über dem Grundwasser liegenden Schicht wird dieselbe wenige Centimeter bis eventuell 1 m und mehr gehoben und es tritt dann fast sämtliche Poren des Bodens.

Der Durchtritt von irgend welchen Flüssigkeiten, Niederschlägen, verunreinigenden Abwässern u. s. w. zum Grundwasser erfolgt durch die genannten 3 Zonen in wesentlich verschiedener Weise, je nachdem grob- oder feinporiger Boden vorliegt.

In grobporigem Kiesboden sind breite, zugängliche Wege vorhanden; in diesen findet ein rasches Fortbewegen aller Flüssigkeiten jeder Jahreszeit statt. Auch im Sommer gelangen die Niederschläge leicht zum Grundwasser. Verunreinigungen werden durch stärkere Niederschläge schnell in die Tiefe gespült. Nur in den feineren Porenteilen (Seitenstrassen) können Verunreinigungen längere Zeit haften bleiben.

In feinporigem Boden fehlt es an den breiteren Strassen; es kommt in den vorhandenen engen Wegen nur zu einem langsamen Fortrücken Schicht um Schicht, so dass die unten ans Grundwasser reichende Wasserzone von der oberen in Bezug auf ihr chemisches und bakteriologisches Verhalten total verschieden sein kann. Ist die Durchgangszone stark entwickelt, so muss es enorm lange, 1—3 Jahre und mehr dauern, bis die auf die Oberfläche des Bodens gelangenden Niederschläge das Grundwasser erreichen. Ebenso werden alle Verunreinigungen nur ganz langsam tiefer gespült und dringen meist erst nach Jahren bis zum Grundwasser vor.

Unter den Häusern und unter gepflastertem Boden, wo keine neuen Flüssigkeiten in den Boden gelangen, stagniert die ganze im Boden enthaltene Wassermasse und ein Weiterrücken der Niederschläge oder der Verunreinigungen findet überhaupt nicht mehr statt.

Ueber den jeweiligen Feuchtigkeits- und Reinlichkeitszustand der oberen Bodenschichten bekommen wir nun wichtige Auskunft durch die zeitlichen Schwankungen des Grundwasserspiegels. Sinkt derselbe, so wird dadurch angezeigt, dass tiefer spülende Zuflüsse von oben spärlicher geworden sind oder aufgehört haben; dies kann — abgesehen von lokaler Aenderung der Bodenfläche, Pflasterung u. s. w. — vorzugsweise dadurch bewirkt sein, dass sich oben eine grössere trockene Zone gebildet hat, in welcher von da ab alle Niederschläge und ebenso

alle Verunreinigungen, Abfallstoffe u. s. w. verbleiben. Steigen des Grundwassers erfolgt dagegen erst dann, wenn die trockene Zone wieder entsprechend der kleinsten Wassercapacität mit Wasser gesättigt ist und nunmehr ein Vorrücken der ganzen Wassermasse und Tieferspülen der Verunreinigungen stattfinden kann.

Der verschiedene Gang der Grundwasserbewegung in dem feinporigen Berliner Boden einerseits, in dem grobporigen Münchener Boden andererseits wird hierdurch verständlich. (Vgl. Tab. S. 187). In Berlin finden die Niederschläge des Winters keine ausgetrocknete Bodenschicht vor; dieselbe ist vielmehr mit Wasser gesättigt, der Boden kalt. Kommt es einmal zum Aufhören der Niederschläge, so stellt sich doch höchstens eine ganz geringfügige trockene Zone her. Ehe nur der Grundwasserspiegel durch die fortlaufende Wasserentnahme und den fehlenden Zufluss sinken kann, kommen neue Niederschläge, die sofort die Continuität der Wassermassen wieder herstellen. Dann aber treten die hohen Temperaturen und das starke Sättigungsdeficit des Mai und Juni in Action. Setzen jetzt die Niederschläge eine Zeit lang aus, so ist sofort eine beträchtliche Austrocknungszone da, die nicht mehr — oder nur in Ausnahmefällen — wieder von den nächsten Niederschlägen ausgefüllt werden kann. Dann sinkt das Grundwasser und damit ist der Verbleib aller Flüssigkeit in der obersten Zone angezeigt. Erst nach dem Eintritt niederer Temperatur und höherer Feuchtigkeit sind anhaltende Niederschläge im Stande, die starke Schicht trockenen Bodens ausreichend zu füllen.

In München vermag der grobporige Boden viel weniger Wasser zu fassen und eine trockene Zone hat daher einen viel geringeren Effekt. Zu einem längeren Aufhören aller Zuflüsse zum Grundwasser kommt es kaum. Namentlich aber dringt im Sommer von den massenhaft niedergehenden Niederschlägen ein grosser Theil zum Grundwasser durch; eine trockene Zone stellt sich in dieser Zeit immer nur vorübergehend her; alle Verunreinigungen werden kräftig in die Tiefe gespült. Erst im Spätsommer und Herbst, wenn die Niederschläge nachlassen, kommt es zu länger dauernder Trockenheit des oberflächlichen Bodens, zum Verbleib der Verunreinigungen in der obersten Schicht und zum Sinken des Grundwassers. Diese Periode dauert aber viel kürzer und das Absinken des Grundwassers ist erheblich geringer, als im feinporigen Boden; bereits im December beginnt wieder eine Durchfeuchtung des Bodens und ein Ansteigen des Grundwassers, das bis zum August anhält.

Uebrigens haben die geschilderten Verhältnisse nur Geltung für eine gewisse durchschnittliche Beschaffenheit des natürlichen Bodens. Wird feinporiger, lehmhaltiger Boden bearbeitet (z. B. auf Aeckern, Rieselfeldern), so finden sich immer gröbere Spalten und Risse, durch welche ein Theil der Flüssigkeiten rasch in grössere Tiefen gelangt. Auch durch Ratten, Maulwürfe, Regenwürmer können abnorme Wege für die Beförderung von Flüssigkeiten im Boden geschaffen werden.

Hygienische Bedeutung des Grundwassers. Während ein grosser Abstand des Grundwassers von der Bodenoberfläche nur die Beschaffung von Trink- und Nutzwasser erschwert, hat ein zu geringer Abstand erheblich grössere Nachtheile im Gefolge. Hält sich das Grundwasser während eines grösseren Theils des Jahres nahe der Boden-

oberfläche, so entsteht sumpfiges, eventuell zu Malaria disponirendes Terrain; rückt dasselbe nur vorübergehend nahe an die Bodenoberfläche heran, so sind die Fundamente der Häuser gefährdet, das Grundwasser dringt in die Keller, macht diese unbenutzbar und hinterlässt noch lange nach dem Absinken eine abnorme Feuchtigkeit der Wandungen. — Theils durch Drainirung und Canalisirung, theils durch Aufschüttung kann diesem Einfluss begegnet werden (s. Kap. „Wohnung“).

Die zeitlichen Schwankungen des Grundwasserniveaus haben dadurch Bedeutung, dass sie uns in der oben erörterten Weise für den Feuchtigkeitszustand und die Verunreinigung der obersten Bodenschichten einen Maassstab liefern. Dieser ist um so werthvoller, als eine directe Bestimmung des Wassergehalts des Bodens auf Schwierigkeiten stösst (s. S. 181). In dieser Beziehung ist aber die Grundwasserschwankung nur ein Maassstab, eine Art Uhr; wollten wir etwa durch künstliche Mittel (Drainage) die Grundwasserschwankungen verringern oder beseitigen, so werden wir damit nicht immer den Feuchtigkeitszustand der oberen Bodenschichten ändern; sicher aber werden wir bewirken, dass die Uhr, die uns bisher in richtiger Weise über diesen Zustand belehrt hat, fortan nicht mehr richtig zeigt und als Maassstab nicht zu verwenden ist.

VII. Die Mikroorganismen des Bodens.

Die Untersuchung des Bodens auf Mikroorganismen erfolgt in der Weise, dass man mit einem kleinen Platintöfel, der etwa $\frac{1}{100}$ ccm fasst, eine Probe auszieht, in Gelatine bringt, mit dem Platindraht möglichst zerkleinert, und dann das Röhrchen ausrollt. Sehr wichtig ist es, die Untersuchung unmittelbar nach der Probenahme vorzunehmen, da bei der höheren Temperatur des Laboratoriums und nach Luftzutritt sehr rasche, meist kolossale nachträgliche Vermehrung der Bakterien eintritt. — Aus tieferen Schichten entnimmt man Proben mittelst eines besonderen Bohrers, der sich erst in der gewünschten Tiefe öffnet und dann wieder schliesst.

Zahl und Vertheilung der Bodenbakterien. Die angestellten Untersuchungen haben gezeigt, dass der Boden das wesentlichste Reservoir der Mikroorganismen darstellt. Es finden sich im Durchschnitt selbst im sogenannten jungfräulichen, unbebauten Boden ca. 100000 Keime in 1 ccm Boden, oft noch erheblich mehr. Ferner ist ermittelt, dass weitaus die grösste Zahl dieser Mikroorganismen an der Oberfläche und in den oberflächlichsten Schichten enthalten ist. Nach der Tiefe zu nimmt die Zahl der Bakterien allmählich ab, und in 1 bis 3 m beginnt meist eine geradezu bakterienfreie Zone. Auch die

Parteien, in welchen bereits Grundwasser steht, werden für gewöhnlich frei von Bakterien gefunden. — Der Grund für die Keimfreiheit der tieferen Schichten liegt darin, dass poröser Boden nicht nur für Luft, sondern auch für Flüssigkeiten ein bakteriendichtes Filter bildet.

Laboratoriumsversuche scheinen das allerdings zunächst nicht zu bestätigen. Giesst man auf eine Schicht Grob- oder Feinsand eine bakterienhaltige Flüssigkeit, so gehen die Bakterien ungehindert durch die Poren des Bodens hindurch. Der Versuch fällt aber völlig anders aus, wenn man die Filtration zunächst so langsam vor sich gehen lässt, dass die feinsten Theile des Bodens und die suspendirten Theile der Flüssigkeit Gelegenheit haben, die nächstgelegenen Poren zu füllen, und dass ferner die Bakterien Zeit gewinnen, mit einer schleimigen Schicht die Wege auszukleiden. Sobald dies geschehen, ist die Filtration eine sehr vollständige. (Vgl. im folg. Kapitel). — Unter natürlichen Verhältnissen und bei der enorm langsamen Fortbewegung des Wassers werden sich solche filtrirende Auskleidungen der Poren regelmässig herstellen und zwar in der ersten Schicht der „Durchgangszone“, wo die für die Filtration erforderliche Dichtung ungestört bestehen bleiben kann.

Ausnahmsweise kann es indess auch zu einem Bakteriengehalt tieferer Bodenschichten kommen, namentlich in abnorm durchlässigem oder künstlich aufgelockertem Boden, ferner, wenn gröbere Spalten (in zerklüftetem Felsboden, zusammengetrocknetem Lehm Boden), oder Ratten- und Maulwurfsgänge Flüssigkeiten unfiltrirt nach abwärts gelangen lassen.

Was die **Qualität** der im Boden gefundenen Bakterien betrifft, so herrschen einige Arten entschieden vor, kommen stets zur Beobachtung und können sich offenbar im Boden ausgiebig vermehren. Dahin gehören namentlich die Bakterienarten, welche lebhaftes Oxydation hervorrufen und bei der Nitrifikation und Kohlensäurebildung im Boden betheiligt sind (s. oben). In den oberflächlichsten Schichten sind viel Sporen, darunter zuweilen enorm resistente Dauersporen enthalten, die selbst nach 4—5stündigem Erhitzen in strömendem Dampf noch keimfähig bleiben; in tieferen Schichten scheint es an Sporen ganz zu fehlen.

Pathogene Bakterien sind durch Cultur nur in den seltensten Fällen aus dem Boden isolirt. Dagegen konnte man durch directe Verimpfung grösserer Dosen von Erdproben auf Versuchsthiere die häufige Anwesenheit der Bacillen des malignen Oedems und des Wundtetanus in gedüngter Erde nachweisen; auch einige andere septisch wirkende Arten wurden in solcher Weise durch den Thierkörper herausgezüchtet.

Die **Quelle** der aufgezählten, in der ganz überwiegenden Mehrzahl saprophytischen Bakterien sind vorzugsweise die Verunreinigungen der

den oberfläche, die Abfallstoffe des Haushalts, die Düngstoffe der Gärten und Aecker u. s. w., deren Bakterien von den Niederschlägen allmählich unter die Oberfläche, bis in Tiefen von $\frac{1}{2}$ —2 m gespült werden. Ferner Gruben und Canäle, welche zur Aufnahme der Abfallstoffe bestimmt sind, aber oft undicht werden und dann die bakteriensicheren Flüssigkeiten gleich in einer Tiefe von 1—2—3 m unter der Oberfläche in den Boden übertreten lassen.

Einige dieser Bakterienarten können im Boden, wie dies aus Culturversuchen und directen Bodenuntersuchungen hervorgeht, lebhaft proliferiren, pathogene Arten jedoch nur an der Oberfläche des Bodens in den Abfallflüssigkeiten selbst, wenn noch wenig saprophytische Concurrenten vorhanden sind, und während hohe Temperatur mitwirkt, während im tieferen Boden die Wucherungsbedingungen für solche Bakterienarten ausnahmslos zu ungünstig liegen.

Dagegen scheint der Boden sehr wohl im Stande zu sein, auch pathogene Bakterien lange zu conserviren. Der Reichthum der oberflächlichen Bodenschichten an Sporen deutet darauf hin, dass die Bedingungen für die Sporenbildung hier günstig sind; und Versuche mit Milzbrandbacillen haben ergeben, dass die Fruktifikation derselben in einem Gemisch der Cultur mit porösem Boden verhältnissmässig rasch erfolgt.

Ein Austritt der in tiefere Bodenschichten gelangten Bakterien an die Oberfläche und eine Verbreitung derselben durch Luft, Wasser u. dgl. findet für gewöhnlich nicht statt. Wie oben begründet wurde, ist namentlich die Bodenluft niemals im Stande, Keime in die Aussenluft mitzuführen. Auch das Grundwasser ist erwiesenermaassen fast immer bakterienfrei und kann nur ausnahmsweise durch gröbere Communicationen einen Verkehr zwischen tieferen Bodenschichten und dem Menschen herstellen. In gleicher Weise ist zuweilen wohl ein Transportweg gegeben durch Thiere, welche aus tieferen Schichten Bodenpartikel an die Oberfläche tragen (Maulwürfe, Ratten, Regenwürmer); oder dadurch, dass der Boden aufgedrückt und tiefere Schichten zu Tage gefördert werden.

Wesentlich bessere Chancen für die Weiterverbreitung der Bakterien bietet die oberflächlichste Schicht des Bodens. Von hier aus kann die Verbreitung erfolgen: 1) durch staubaufwirbelnde Winde. 2) Durch Nahrungsmittel, die in der Erde wachsen (Kartoffeln, Gartengemüse u. s. w.) und welche theils roh genossen werden und direct Infectionen veranlassen können, theils indirect, indem sie die anhaftenden Erdpartikel und Mikroben in Wohnung und Küche transportiren. 3) Durch Schuhzeug und Geräthschaften der Menschen, welche den

verunreinigten Boden betreten oder denselben bearbeiten, sowie durch Haustiere.

Gelegentlich wird es so zur Verbreitung von Infektionserregern kommen; weniger durch die atmosphärische Luft, welche bald unendlich verdünnend wirkt (vgl. S. 168), als vielmehr durch Verschleppung (Nahrungsmittel, Schuhzeug u. s. w.) von den einzelnen Infektionsherden aus, welche auf der Bodenoberfläche durch zufällig dorthin gelangte Absonderungen von Kranken, z. B. Dejektionen, Sputa u. a. m., gebildet werden.

Eine bestimmte Phase im Zustand der oberflächlichen Bodenschichten wird besonders geeignet sein zu dieser Verbreitung von Keimen; nämlich die, wo eine trockene Zone an der Oberfläche besteht und intercurrende Niederschläge höchstens einige Millimeter tief eindringen, so dass alle Bodenverunreinigungen in der oberflächlichsten Schicht verbleiben. In dieser Zeit bestehen für Verschleppungen aller Art entschieden grössere Chancen, als wenn der Boden durchfeuchtet ist und auftreffende Niederschläge die Verunreinigungen rasch abschwemmen oder in eine Tiefe spülen, welche sie dem Verkehr entzieht. — Ferner liefern die Jahreszeiten, in welchen die Ernte der Gemüse resp. das Aufbringen des Gruben- und Tonneninhalts auf das benachbarte Land stattfindet, vermehrte Gelegenheit zur Verschleppung mancher infektiöser Bakterien.

Somit wird eine zeitliche Steigerung der Infektionsgefahr zur Zeit des tiefsten Grundwasserstandes resp. in den Herbstmonaten eintreten können; insbesondere bei solchen Krankheiten, deren Erreger in den Dejektionen ausgeschieden werden und mit diesen auf den Boden gelangen.

Hygienische Bedeutung der Mikroorganismen des Bodens. Nach den vorstehenden Darlegungen erscheint es zweifellos, dass der oberflächlichste Boden — aber auch nur dieser — zur Verbreitung von Infektionskrankheiten zuweilen Anlass giebt. Indessen bildet der Boden ausserhalb der Wohnstätte dabei immer nur ein selten in Betracht kommendes Zwischenglied. Das infektiöse Material ist stets viel reichlicher in der Nähe des Kranken und innerhalb der Wohnstätte vorhanden. Dort ist für gewöhnlich die beste Gelegenheit zur Infektion gegeben. Nur zuweilen wird es vorkommen, dass die Infektion hier vermieden, das gefährliche Material entfernt und vermeintlich unschädlich gemacht wird, indem man es an irgend welcher Stelle den oberflächlichen Schichten des Bodens überantwortet, und dass von diesem aus das Material auf den oben bezeichneten Wegen wieder in den Bereich der Menschen gelangt. Es ist nicht wahrscheinlich, dass dieser

ite Umweg häufig eingeschlagen wird und dass ein grösserer Procentz der Infektionen durch Vermittelung des Bodens zu Stande kommt. e oben hervorgehobene zeitliche Steigerung der Infektionschancen im Sinken des Grundwassers resp. im Herbst wird sich daher i gewissen infektiösen Krankheiten auch nur bei einem einen Bruchtheil der Erkrankungen, nicht etwa bei der ossen Masse derselben, bemerkbar machen (vgl. Kap. X).

Eine Verhütung der Infektion vom Boden aus ist am vollständ-
sten dadurch erreichbar, dass Strassen, Höfe und Sohlen der Häuser
pflastert, asphaltirt oder cementirt werden. Ferner ist es erforderlich,
Oberfläche einer häufigen Reinigung, die durch passendes Gefäll
d gute unterirdische Ableitung unterstützt wird, auszusetzen und so
erflächliche Ansammlungen von Abfallstoffen zu verhüten. Acker-
d Gartenland in der näheren Umgebung einer Ortschaft ist von
njenigen Abgängen des menschlichen Haushaltes, welche leicht in-
rtiöse Organismen enthalten, nach Möglichkeit frei zu halten. Beim
nuss von Nahrungsmitteln aus solchem Boden ist Vorsicht anzu-
then.

Litteratur: SOYKA, Der Boden, Abtheilung aus v. PETTENKOFER's und
ZIMMERMAN's Handb. d. Hygiene, Leipzig 1887. — v. FODOR, Der Boden, in
Handb. d. Hygiene“ von Weyl, 1894. — FRÄNKEL, Untersuchungen über das
Vorkommen von Mikroorganismen in verschiedenen Bodenschichten, Zeitschr. f.
Hyg., Bd. 2. — ibid. Bd. 6. — Vgl. ferner die von verschiedenen städtischen
Verwaltungen (München, Berlin, Frankfurt u. s. w.) herausgegebenen Berichte
über die Vorarbeiten zur Canalisation und Wasserversorgung.

Fünftes Kapitel.

Das Wasser.

Im Folgenden ist zunächst die allgemeine Beschaffenheit der natür-
lichen, zur Deckung des Wasserbedarfs in Betracht kommenden Wässer
u besprechen. Zweitens sind die hygienischen Anforderungen an ein
Wasser zu präcisiren; drittens ist zu erörtern, in welcher Weise sich
in Urtheil darüber gewinnen lässt, ob ein Wasser diesen Anforderungen
entspricht; und schliesslich ist die Ausführung der Wasserversorgung
schildern.

A. Allgemeine Beschaffenheit der natürlichen Wässer.

Die Deckung des Wasserbedarfs des Menschen muss aus den natürlichen Wasservorräthen erfolgen, welche in Form von Meteorwasser, von Grundwasser, von Quellwasser, von Flussa- und Seewasser sich vorfinden.

Meteorwasser, das in Cisternen aufgesammelt wird, enthält die Bestandtheile der atmosphärischen Luft, also Salpetersäure, salpetrig Säure, Ammoniak, ferner zahlreiche Mikroorganismen und aus den Sammelbehältern gewöhnlich organische Stoffe. Es entwickelt sich leicht Fäulniss darin, ausserdem ist es fade von Geschmack; es ist daher nur im Nothbehelf für den Wassergenuss zu verwenden, indess zu manchen häuslichen Gebrauch geeignet.

Grundwasser rekrutirt sich ebenfalls vorzugsweise aus den Niederschlägen. Diese nehmen zunächst von der Bodenoberfläche noch grosse Mengen gelöste und suspendirte Stoffe auf und die Qualität des Wassers wird schlechter. Dann aber findet beim Durchgange durch den Boden gleichsam eine Veredelung des Wassers statt; suspendirte und gelöste Stoffe werden theils zurückgehalten, theils oxydirt und mineralisirt; ausserdem bewirkt die Kohlensäure des Wassers eine partielle Lösung von Bodenbestandtheilen, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Kieselsäure u. a. m., gehen in das Wasser über; endlich wird die Temperatur des Wassers auf eine gleichmässige, eventuell für den Genuss angenehme Höhe gebracht.

Besonders starken Verunreinigungen ist das Grundwasser in städtischen Boden ausgesetzt. Das Material dieser Verunreinigungen bilden Harn und Fäces von Menschen und Thieren, pflanzliche und thierische Abfälle aus Küche und Haus. Von chemischen Körpern sind in den Abfallstoffen vorzugsweise enthalten: Harnstoff, Hippursäure, Kochsalz, Natriumphosphat, Kaliumsulfat, Kalk- und Magnesiaverbindungen; ferner die verschiedensten Produkte der Fäulniss von Eiweisskörpern (Amide, Fettsäuren, Indol, Skatol, Ptomaine), und der Zersetzung von Fetten (Fettsäuren) und Kohlenhydraten (Huminsubstanzen). Daneben enthalten die Abfallstoffe unzählige saprophytische und gelegentlich auch pathogene Mikroorganismen.

Diese Stoffe gelangen auf zwei sehr wohl auseinander zu haltende Wegen in das Wasser (s. Fig. 64). Erstens sickern sie langsam von der Bodenoberfläche oder von dem die Gruben und Canäle umgebenden Erreich durch Schichten gewachsenen Bodens in das Grundwasser, und sind dann dem veredelnden Einfluss des Bodens in vollem Masse

ausgesetzt. Dabei werden vor allem die suspendirten Bestandtheile und die Mikroorganismen vollständig abfiltrirt. Sodann werden Harnstoff, Hippursäure, sowie die stickstoffhaltigen Fäulnisprodukte für gewöhnlich ganz in Nitrate übergeführt. Die Phosphorsäure bleibt gänzlich im Boden zurück, die Chloride dagegen erscheinen vollständig im Wasser, die Sulfate zum grossen Theil. — In einem stark verunreinigten Boden enthält das Grundwasser grosse Mengen Nitrate, viel Chloride u. s. w.; aber die Filtration der Mikroorganismen kommt auch in solchem Boden vollkommen zu Stande. — Unter mancherlei




Fig. 64. Die verschiedenen Wege für die Verunreinigung des Grundwassers, schematisch.

Verhältnissen, z. B. wenn nicht genügend Sauerstoff vorhanden ist, finden sich wenig Nitrate, kleine Mengen von Nitriten, von Ammoniak und grössere Mengen von noch nicht mineralisirten organischen Stoffen im Wasser. — Ist endlich der Boden übersättigt, so erscheinen die organischen Stoffe, daneben Nitrate, Chloride u. s. w., stark vermehrt; aber auch dann kann die Zurückhaltung der Mikroorganismen gerade so gut erfolgen, wie im reinen Boden.

Zweitens können Verunreinigungen ins Grundwasser gelangen, welche dem Bodeneinfluss nicht ausgesetzt waren. Sie kommen von der Bodenoberfläche durch Undichtigkeiten der Brunnendeckung direct ins Wasser, oder von Gruben und Canälen aus durch zufällig

vorhandene größere Kommunikationen mit dem Brunnenschacht werden die Mikroorganismen nicht abfiltrirt und eine Minerale der organischen Stoffe findet nicht statt. Diese Verunreinigungen führen daher dem Wasser die verschiedensten Mikroorganismen, daneben organische Stoffe und auch wohl Ammoniak, oft in einem Verhältniss zu den anorganischen Bestandtheilen sehr grosse zu. Vom hygienischen Standpunkt aus erscheinen derartig weit bedenklicher, als die durch den Boden passirten Verunreinigungen.

Die chemische Zusammensetzung des Grundwassers ist nahezu eine sehr wechselnde. Man beobachtet folgende Mengen gelöster

	Milligramme in 1 Liter		
	Minimum	Maximum in reinem Wasser	Maximum in Grundwasser
Summe der gelösten Bestandtheile . .	100	500	
Organische Stoffe	0	40	
Dieselben verbrauchen Sauerstoff .	0	2	
Ammoniak	0	Spuren	
Salpetrige Säure (haupts. Kaliumnitrit)	0	Spuren	
Salpetersäure (Calcium-, Kaliumnitrat u. s. w.)	1	15	
Chlor (hauptsächlich Kochsalz) . . .	4	30	
Kalk	25	120	
Magnesia	0	50	
Schwefelsäure (haupts. Calciumsulfat)	2	100	
Ferner Kalium, Natrium, Kieselsäure, Kohlensäure, Eisen als Ferrosalz.			

Daneben vielerlei suspendirte Bestandtheile, z. B. Thonhydrat; ferner niedere Thiere, Algen, Bakterien.

Quellwasser nennt man ein Grundwasser, welches frei an die Oberfläche tritt. Das geschieht z. B. dann, wenn die geneigte, undurchlässige Schicht an die Oberfläche tritt. Handelt es sich dabei um ein Grundwasser, welches sich auf der obersten Schicht gesammelt und keine Bodenschichten durchflossen hat, so kann es ganz gleiche Zusammensetzung zeigen, wie künstlich gehobenes Grundwasser. Meistens stammen die Quellen aus tiefer gelegenen Schichten, welche relativ rein von organischen Stoffen oder deren Zersetzungsprodukten sind. Directe der Bodenwirkung nicht unterworfenen Zuflüsse können leicht bei der Fassung der Quellen leichter fern gehalten werden als bei Grundwasserbrunnen. Im Uebrigen richtet sich die Zusammensetzung ganz nach der Bodenformation.

Zuweilen finden sich in grösserer Tiefe Wassermassen zwischen zwei undurchlässige Schichten eingeschlossen, welche sich mit starkem Gefälle senken. Werden solche Schichten in ihrem unteren Theile angebohrt, so strömt das Wasser unter hohem Drucke aus (Artesische Brunnen). Auch deren Wasser ist sehr verschieden zusammengesetzt, oft nicht so rein, als man gewöhnlich annimmt.

Bäche und Flüsse erhalten durch die Meteorwässer zahlreichste Verunreinigungen von der Bodenoberfläche zugeführt: häufig nehmen sie die Canal- oder Spüljauche von ganzen Ortschaften auf, ferner den Ablauf von gedüngten Aeckern, die Abwässer der Schiffe, sowie übelriechende oder giftige Abgänge der Industrie. So enthalten z. B. die Abwässer der Textilindustrie Leim, Blut, Seife, Farbstoffe; Zuckerfabriken, Gerbereien liefern grosse Mengen faulender und fäulnissfähiger Substanzen; Schlachthäuser gleichfalls Massen leicht zersetzlichen Materials; Gasfabriken Ammoniakverbindungen und theerige Produkte.

Viele Bestandtheile dieser Abwässer sind nicht gelöst, sondern suspendirt und unter diesen finden sich zahlreichste Mikroorganismen. Allmählich tritt allerdings im Verlauf des Flusses, wenn keine neuen Verunreinigungen hinzukommen, eine gewisse Selbstreinigung ein. Die suspendirten Bestandtheile setzen sich ab und reissen auch viel Mikroorganismen zu Boden; die Kohlensäure der Bicarbonate des Calciums und Magnesiums entweicht und es entstehen unlösliche Erdverbindungen, welche gleichfalls niederschlagend wirken. Ausserdem tritt ein allmähliches Verzehren der organischen Stoffe durch Mikroorganismen, Algen und Bakterien, ein; endlich werden durch die Belichtung viele Bakterien abgetödtet. Im grossen Ganzen ist das Flusswasser jedoch so bedeutenden Verunreinigungen und so grossen Schwankungen der Beschaffenheit unterworfen, dass es ohne besondere Vorbereitung nicht zu häuslichen Zwecken verwendbar ist. Manche Krankheits-erreger scheinen hauptsächlich an Anhängseln der Flussufer wuchern zu können; sie werden dann von jener Selbstreinigung nicht mit betroffen, sondern höchstens theilweise durch den Einfluss des Lichts und concurrirende Saprophyten geschädigt.

Landseen bieten ein günstigeres Material für Wasserversorgung als Flüsse. Die suspendirten Bestandtheile und die Mikroorganismen sind meist ausserordentlich vollständig abgesetzt und das Wasser ist chemisch und bakteriologisch verhältnissmässig rein. Doch kommen auch hier grosse Schwankungen vor und es ist eine Beurtheilung von Fall zu Fall erforderlich. In neuerer Zeit kommt von oberflächlichen Wasseransammlungen noch das Wasser der Thalsperren in Betracht,

die das Niederschlagswasser aus grösseren Gebieten in kolossalen Reservoirs auf sammeln. Sie führen, wenn das Niederschlagsgebiet aus unbewohntem waldigem Terrain besteht, ein relativ reines Wasser.

B. Die hygienischen Anforderungen an Trink- und Brauchwasser.

Das Wasser, das den Menschen zum Genuss und Wirthschaftsbetrieb geboten wird, soll 1) wohlschmeckend und von appetitlicher Beschaffenheit sein, so dass es gern genossen wird; 2) soll es nicht zu hart sein; 3) soll es nicht zur Krankheitsursache werden können; 4) soll die Menge zureichend sein.

Zuweilen macht man in Bezug auf die zu stellenden Anforderungen scharf Unterschiede zwischen Trink- und Brauchwasser. Vom hygienischen Standpunkt aus ist eine solche Untersuchung meist nicht gerechtfertigt. Das Wasser, mit welchem die roh genossenen Nahrungsmittel gewaschen, die Wäsche gereinigt, die Ess- und Trinkgeschirre gespült werden, muss ebensowohl frei von Krankheitskeimen sein, wie das zum Trinken bestimmte.

Nur hinsichtlich des Wohlgeschmacks und der appetitlichen Beschaffenheit und besonders hinsichtlich der Temperatur sind nicht so strenge Anforderungen an ein Brauchwasser zu stellen. Wenn daher ein reichlich und leicht zu beschaffendes Wasser z. B. nur oder vorzugsweise wegen seiner hohen Temperatur zum Genuss ungeeignet erscheint (Flusswasserleitung mit guter Filtration, zu warmes Quellwasser), so kann sehr wohl die Frage aufgeworfen werden, ob nicht dies Wasser zu Gebrauchszwecken beizubehalten und durch eine andere, lediglich für Trinkwasser bestimmte Anlage zu ergänzen sei.

1) Für den Wohlgeschmack und die Appetitlichkeit eines Wassers ist erforderlich:

Geruchlosigkeit, insbesondere das Fehlen jedes Fäulnisgeruches. Fluss- oder Seewässer, die durch Aufnahme von Fabrikabwässern auch nur zeitweise Geruch nach Petroleum, Carbol und dergl. zeigen können, sind von der Benutzung auszuschliessen. Grundwässer aus Bodenschichten, die reichlich Huminsubstanzen, Braunkohle und dergl. enthalten, weisen neben einem Gehalt an gelösten Eisenverbindungen häufig Geruch nach flüchtigen Schwefelverbindungen auf. Lässt sich dieser Geruch nicht vollständig beseitigen, so sind auch solche Wässer nicht benutzbar. Ferner ist die Abwesenheit jeden Beigeschmacks erforderlich; z. B. nach fauligen, modrigen Substanzen, oder auch nach gelöstem Eisen. Dagegen soll ein erfrischender Geschmack vorhanden sein, der in erster Linie von der Temperatur des Wassers beeinflusst wird, ausserdem vom CO_2 - und O-Gehalt; auch ein gewisser

halt an Kalksalzen wirkt günstig, zu kalkarme Wässer schmecken nicht fade. Die Temperatur soll sich wo möglich das ganze Jahr zwischen 7° und 11° bewegen; höher temperirtes Wasser bietet keine Erfrischung, kälteres wird vom Magen schlecht vertragen. Die gleichmässige und bekömmliche Temperatur ist bei Wasser aus Grundwasserquellen nur vorhanden, wenn sie mindestens 3 m unter der Bodenoberfläche liegen. Flusswasser zeigt — abgesehen von hoher Gebirgslage im Winter 0° , im Hochsommer $+25^{\circ}$. Dadurch fehlt dem Wasser gerade im Sommer, wo am meisten Wasser konsumirt wird, die erforderliche Frische, und dieses Verhalten allein ist ausreichend, um Flusswasser ungeeignet für die Benutzung als Trinkwasser erscheinen zu lassen.

Farblosigkeit und Klarheit. Färbung oder Trübung, stamme woher sie wolle, macht ein Wasser unappetitlich und ungeeignet zum Genuss. Gelbe Farbe tritt bei Grundwasser aus moorigem Boden und häufig bei Flusswasser auf. Trübung kann bei Flusswasser bewirkt werden durch Lehm- und Thontheile. Am häufigsten kommt eine Trübung durch Ferrihydrat in Betracht. Das Eisen pflegt in Form von Eisenoxydulverbindungen (hauptsächlich Ferrobicarbonat) in's Wasser überzutreten, die aus Eisenoxydverbindungen des Bodens unter dem Einfluss reducirender organischer Substanzen (Braunkohle, vermoderndes Holz, Moor, Humus u. s. w.) entstanden sind. Die Ferrosalze trüben zunächst das Wasser nicht. Steht dasselbe aber einige Zeit an der Luft, oder wird es erhitzt, so entweicht die CO_2 des Bicarbonats und es erfolgt Oxydation, so dass sich braune Flocken von Eisenoxydhydrat abscheiden, die dem Wasser ein unappetitliches Aussehen verleihen und dasselbe für Wäsche, für die Bereitung von Thee, Kaffee u. s. w. völlig unbrauchbar machen. In eisenhaltigem Wasser kommt es ausserdem besonders leicht zur Entwicklung von *Crenothrix* (s. S. 80), deren weissliche oder durch Einlagerung von Eisen braun gefärbte Pilzrasen die Trübung und Unappetitlichkeit des Wassers noch vermehren.

Fehlen grob sichtbarer Verunreinigungen. Eine Wassereutnahmestelle in verschmutzter Umgebung und mit offenkundiger Berührung mit Abfallstoffen des menschlichen Haushalts, ebenso eine Vernachlässigung der Brunnenanlage selbst macht das Wasser unappetitlich und für empfindlichere Menschen zum Genuss ungeeignet. Daher ist Flusswasser zu verwerfen, das die Entleerungen von Schiffen und Dampferpassagieren, die Abflüsse von Aborten, Düngstätten u. s. w. aufnimmt; ferner Wasser aus Brunnen, in deren Umgebung die Bodenoberfläche stark verunreinigt ist und in deren Nähe Abortgruben, Düngerhaufen, Rinnsteine sich befinden. Auch Defekte am Brunnen,

undichte Deckungen, Vermodern der Holztheile können Unappetitlichkeit des Wassers bedingen und sind zu beanstanden.

2) Die Härte eines Wassers ist bedingt durch Kalk- und Magnesiumsalze, die entweder aus Bodenbestandtheilen gelöst sind (z. B. Gipslagern als CaSO_4 , aus CaCO_3 -lagern unter Mitwirkung von CO_2 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$) oder dem Harn und Fäces entstammen. Calcium- und Magnesiumbicarbonat machen die vorübergehende Härte aus, d. h. Härte, welche nach dem Kochen oder längerem Stehen des Wassers verschwindet, weil die lösende CO_2 abdunstet und unlösliche Metalle als Niederschlag an Wandungen und Boden des Gefässes (Kesselstein) zurückbleiben. Calcium- und Magnesiumsulfat, -nitrat u. s. w. dagegen bedingen die bleibende Härte, die auch nach dem Kochen des Wassers unverändert fortbesteht. — Man bemisst die Härte eines Wassers nach (deutschen) Härtegraden, von denen ein Grad viel Kalk- und Magnesiaverbindungen anzeigt, dass sie in Bezug auf die Zerlegung einer Seifenlösung sich verhalten wie eine Lösung von 1 mg CaO in 100 cc Wasser.

Zu weiches Wasser ist nur insofern nicht angenehm, als es etwas faden Geschmack haben kann. Zu hartes Wasser hat mancherlei Unannehmlichkeiten: es ist zum Kochen mancher Speisen (Hülsenfrüchte, Thee, Kaffee) ungeeignet, weil sich unlösliche Verbindungen zwischen den Kalksalzen und Bestandtheilen dieser Nahrungsmittel herstellen. — Technisch kommt ausserdem in Frage, dass zum Waschen mit hartem Wasser eine abnorm grosse Menge von Seifen consumirt werden muss, weil ein grosser Theil der Seife durch die Kalksalze zerlegt wird; ferner dass hartes Wasser, namentlich solches mit vielen Bicarbonaten wegen massenhafter Kesselsteinbildung zur Speisung der Dampfkessel ungeeignet ist.

Ein sehr hoher, 20° überschreitender Gehalt an Kalksalzen (namentlich Calciumsulfat und Magnesiumsalzen) scheint bei manchen Menschen gastrische Störungen zu bewirken oder setzt wenigstens eine allmähliche Gewöhnung voraus.

3) Wasser als Krankheitsursache. Mehrfach sind durch Wassergenuss Vergiftungen hervorgerufen, und zwar durch einen Gehalt an Arsen- oder Bleiverbindungen. Arsen gelangte früher namentlich durch Abwässer der Anilinfabriken in großen Mengen ins Grundwasser. Ferner ist in den Abfallstoffen der Gerbereien, welche Arsenverbindungen zur Enthaarung benutzen, reichlich Arsen enthalten und die kann bei geeigneten Bodenverhältnissen von den Lagerstätten nachhaltig und weit in das Grundwasser vordringen. — Ein bedeu-

Der Bleigehalt des Wassers kommt häufiger nur vor durch Aufnahme aus den Bleirohren der Wasserleitungen (s. unter „Wasservergiftung“).

Viel bedeutungsvoller ist die Rolle, welche das Wasser beim Zustandekommen parasitärer Erkrankungen spielt.

Gelegentlich kommt es durch Wasser zur Infektion mit thierischen Parasiten. Eier von *Taenia solium*, *Ascaris lumbricoidea*, *Hystris vermicularis*, *Distoma haematobium* und *hepaticum*, Embryonen von *Botriocephalus latus* können mit Wasser aufgenommen werden, allerdings nur bei primitivem Wasserbezug aus unfiltrirtem Oberflächenwasser. — Bei bestimmten Kategorien von Arbeitern werden häufiger die Eier von *Anchylostomum duodenale* mit Wasser eingeführt. Dieser 6—8 mm lange Wurm bewohnt beim Menschen den oberen Theil des Dünndarms, dringt dort in die Schleimhaut ein und saugt sich mit Blut voll; seine massenhafte Ansiedlung ruft perniciose Anämie hervor. Mit den Fäces der Kranken werden die Eier entleert; gelangen diese in feuchte Erde von 25—30° Temperatur, so schlüpft nach 4—5 Tagen der Embryo (die Larve) aus; darauf folgt die Einnistung, nach welcher die Larve in Wasser lange lebensfähig bleibt. Der Genuss solchen Wassers führt zur Infektion. — Die Gefahr der Infektion liegt nur vor bei primitivem Wasserbezug und ausreichender Wärme (25°). Bei Tunnelarbeitern, bei Lehmarbeitern im Sommer, namentlich aber bei Bergleuten, die in tiefen, warmen Gruben arbeiten, sind diese Bedingungen häufig vorhanden. — Durch das Nilwasser scheint auch die ägyptische Dysenterie verbreitet zu werden, die auf bestimmte Amöben zurückzuführen ist (s. S. 82).

Infektionen durch pathogene Bakterien, die mit Wasser eingeführt sind, kommen häufig zur Beobachtung. Die meisten explosionsartigen Massenausbrüche von Cholera asiatica sind durch Wasser und die in diesem enthaltenen Cholerabacillen verursacht. Die Vertheilung der Erkrankungen bei der Choleraepidemie in Hamburg 1892 und verschiedene ähnliche Beobachtungen beseitigen jeden Zweifel daran, dass das Wasser oft das gemeinsame Transportmittel für die infektiösen Erreger ist. — Ebenso sind zahlreiche kleinere Gruppenepidemien und Massenausbreitungen von Typhus abdominalis, die durch das gleichzeitige plötzliche Auftreten der Erkrankungen ausgezeichnet waren, auf Trinkwasserinfektion zurückzuführen, weil das Gebiet des gleichen Wasserbezugs und das der Typhusausbreitung sich genau deckte und mehrere gemeinsame Vehikel ausgeschlossen werden konnten. In mehreren derartigen Fällen ist es auch gelungen, Typhusbacillen in dem verdächtigen Wasser aufzufinden. — Manche andere gastrische

Erkrankungen sind ebenfalls mit höchster Wahrscheinlichkeit auf Wassergenuss und damit eingeführte Krankheitserreger zu beziehen; z. B. nach Flussbädern beobachtete Fälle von sog. Weil'scher Krankheit, die durch den *Bac. proteus fluorescens* hervorgerufen wird. Auch Beziehungen zwischen der Cholera infantum und dem Bakteriengehalt des Trinkwassers sind in Hamburg und Dresden hervorgetreten.

III. In ausreichender Menge ist ein Wasser dann vorhanden, wenn pro Tag und Kopf etwa 150 Liter zur Verfügung stehen. Das Minimum des Bedarfs für den Genuss und die Speisenzubereitung ist auf Schiffen zu etwa 4 Liter pro Kopf und Tag ermittelt. Bei freigestelltem Consum beziffert sich der Bedarf incl. des zur Reinigung des Körpers, des Hauses u. s. w., ferner des von den industriellen Anlagen verbrauchten Wassers auf 100—200 Liter, verschieden je nach den Lebensgewohnheiten der Bevölkerung und der Ausdehnung der Industrie. Von der gesammten Verbrauchsmenge entfallen etwa $\frac{2}{3}$ auf die Tagesstunden von 8 Uhr früh bis 6 Uhr Abends; der stärkste Consum trifft die Stunden von 11—12 Uhr Vormittags und 3—4 Uhr Nachmittags.

Dass das Wasser in reichlichsten Mengen zur Disposition gestellt wird, ist eine vom hygienischen Standpunkt aus sehr wichtige Forderung. Nur dann kann die Wasserversorgung zu grösserer Reinlichkeit der Bevölkerung und damit zur Beseitigung grosser Mengen von Infektionserregern Anlass geben.

C. Die Untersuchung und Beurtheilung des Trinkwassers.

Keine der natürlichen Bezugsquellen des Wassers entspricht unter allen Umständen den hygienischen Anforderungen; in jedem Einzelfall hat vielmehr hierüber eine besondere Untersuchung zu entscheiden. Diese umfasst: 1. die sog. „Vorprüfung“; 2. die chemische Untersuchung; 3. die mikroskopische und bakteriologische Untersuchung; 4. die Lokalinspektion.

1. Die Vorprüfung soll vorzugsweise über Wohlgeschmack und Appetitlichkeit des Wassers entscheiden. Ausser einfacher sinnlicher Prüfung auf Geruch, Geschmack und Temperatur kann letztere durch Thermometer ermittelt werden, und zwar da, wo das Wasser geschöpft werden muss, mit unempfindlich gemachten Thermometern (s. S. 179) oder mit sog. Schöpfthermometern, bei welchen die Kugel in einem kleinen mit Wasser sich füllenden Behälter steckt.

Farbe und Klarheit sind nach dem Augenschein an Proben in grösserer Schichthöhe zu beurtheilen. — Am wichtigsten ist die Bestimmung von gelöstem Eisen, das anfänglich das Wasser völlig klar erscheinen lässt und erst nachträglich Trübung bewirkt. Man muss daher die Probe beobachten, nachdem man sie längere Zeit in Schüttelrührung mit Luft hat stehen lassen oder nachdem man dieselbe gekocht hat.

2. Die chemische Untersuchung.

Dieselbe hat zunächst die Vorprüfung des Wassers auf Klarheit zu ergänzen, indem man einen Gehalt an gelöstem Eisen nachzuweisen sucht. Falls nicht zu kleine Mengen Ferrosalz vorliegen, erhält man sofort beim Einwerfen eines kleinen Krystalls Ferricyankalium grüne Färbung. Kleinere Quantitäten sind zu ermitteln, indem eine Probe des Wassers $\frac{1}{4}$ Stunde gekocht, der Niederschlag mit HCl gelöst und dann mit Ferrocyankalium geprüft wird. — Quantitative Bestimmung des Ferrosalzes gelingt unmittelbar nach der Entnahme durch Titriren mit Chamäleonlösung in der Kälte.

Ferner giebt die chemische Untersuchung über die Härte eines Wassers Auskunft. Die Bestimmung erfolgt entweder gewichtsanalytisch; oder durch Titriren mit Seifenlösung: Die Seife setzt sich mit den Kalk- und Magnesiasalzen um (es entsteht unlöslicher fettsaurer Kalk und die Säure der Kalksalze verbindet sich mit dem Alkali der Seife), solange noch Kalk und Magnesia vorhanden sind; erst nachher bleibt bei weiterem Zusatz Seife als solche bestehen und dies wird kenntlich durch die starke Schaumbildung beim Schütteln (Näheres s. im Anhang).

Von Krankheitsursachen vermag die chemische Analyse die Gegenwart von Blei und Arsen zu ermitteln. Zum Nachweis von Blei versetzt man die Probe mit etwas Essigsäure und Schwefelwasserstoff; ein Bleigehalt verräth sich durch braune bis braunschwarze Färbung. — Arsen ist durch H_2S abzuscheiden, dann in Oxydverbindung überzuführen und im MARSH'schen Apparat zu prüfen.

Ausserdem hat man aus der chemischen Untersuchung Schlüsse zu ziehen versucht auf die Infektionsgefahr und die Appetitlichkeit eines Wassers. In dieser Absicht hat man namentlich: a) die organischen Stoffe bestimmt. Da die Ermittlung der gesamten organischen Stoffe auf Schwierigkeiten stösst, begnügt man sich, nur einen Bruchtheil der organischen Stoffe zu bestimmen, welcher leicht oxydabel ist, und zwar denjenigen, welcher bei einer bestimmten Behandlung mit Kaliumpermanganat-Lösung den Sauerstoff der letzteren absorbiert und dieselbe dadurch entfärbt. b) Ammoniak, das fast

stets nur in Spuren vorhanden ist, qualitativ durch das **NESSELE'sche** Reagens. c) Nitrite, ebenfalls stets in sehr geringer Menge vertreten, durch Zinkjodidstücke oder Diamidobenzol und Schwefelsäure. d) Nitrate, qualitativ durch Brucinlösung oder durch Diphenylamin; quantitativ durch Titrieren mit Indigolösung oder Ueberführen der Salpetersäure in Stickoxyd und Messen des letzteren im Eudiometer. e) Chloride durch Titrieren mit Silbernitratlösung von bekanntem Gehalt. — Genaueres über alle diese Untersuchungsmethoden s. im „Anhang“.

Die Resultate der chemischen Untersuchung sind indess nicht geeignet, um Folgerungen für die Gesundheitsgefährlichkeit eines Wassers abzuleiten. — Zunächst sei betont, dass alle untersuchten Substanzen Nitrate, Nitrite, Chloride u. s. w. selbst in der Menge, die in sehr stark verunreinigten Wässern vorkommt, nicht direct die Gesundheit zu beeinflussen vermögen. Auch den organischen Stoffen kann eine toxische Wirkung nicht zukommen.

Allerdings werden bei der Fäulniss auch giftige Substanzen producirt, aber immer in ausserordentlich geringer Menge gegenüber den anderen Fäulnissprodukten. Es ist von vornherein völlig unwahrscheinlich, dass in den geringen Quantitäten organischer Stoffe, welche ein Trink- oder Brauchwasser enthält, jemals Gifte in ausreichender Menge vorhanden sind, um toxische Symptome zu veranlassen. Ausserdem ist aber experimentell auf das Bestimmteste erwiesen, dass selbst die unreinsten Wässer, wenn sie bei niederer Temperatur stark concentrirt und Thieren injicirt werden, erst dann giftige Wirkung äussern, wenn auch der eingescherte Rückstand in der gleichen Dosis wirkt. Irgend welche organische Gifte sind daher gänzlich auszuschliessen.

Indirect könnte aber eine Gefährdung der Gesundheit von jenen Stoffen insofern angezeigt werden, als sie auf die Anwesenheit von Infektionserregern im Wasser oder in der Umgebung des Wassers hindeuten. Speciell für die Verhältnisse des Grundwassers hat man sich in dieser Beziehung früher unrichtige Vorstellungen gemacht.

Man glaubte, dass Zersetzungs- und Fäulnissprocesse identisch seien mit Infektionsgefahr, und man hielt jedes Wasser für infektionsverdächtig, welches Spuren von Abfallstoffen und Fäulnissprocessen aufwies. In diesem Sinne sah man grössere Mengen organischer Stoffe im Wasser als bedenklich an und glaubte, namentlich in den durch Chamäleon rasch oxydablen Stoffen leicht zersetzliche und besonders gefährliche Verbindungen erblicken zu müssen. Ammoniak und Nitrite sollten als Zeichen dafür angesehen werden, dass nicht die normale Nitrifikation der organischen Stoffe im Boden stattfindet, sondern abnorme Fäulniss- und Reduktionsprocesse. Ferner sollte die Menge der

trate der Menge der in den umgebenden Boden eingetretenen Abfallstoffe entsprechen; ebenso sollten die Chloride, die hauptsächlich dem Kochsalz des Harns entstammen und unverändert den Boden passiren, sich gut als Indikator der Verunreinigung mit Abfallstoffen eignen.

In den letzten Jahrzehnten sind wir indess zu der Erkenntniss gelangt, dass Fäulnis- und Zersetzungsprozesse mit Infektionsgefahr keineswegs identisch sind; für letztere sind nur spezifische Mikroorganismen, nicht saprophytische Bakterien von Belang. Ausserdem steht aber kein Parallelismus zwischen jenen durch die chemische Analyse im Wasser ermittelten Stoffen und seinem Gehalt an irgendwelchen saprophytischen und infektiösen Mikroorganismen. Denn die Wege, auf denen jene Stoffe und andererseits die Organismen ins Wasser gelangen, sind, wie wir oben gesehen haben, ganz verschieden und völlig unabhängig von einander. Organische Stoffe, Nitrate, Ammoniak, Nitrite, Chloride gehen langsam durch den gewachsenen Boden ins Grundwasser; für die Organismen dagegen ist dieser Weg erschlossen, sie gerathen nur durch Undichtigkeiten der Entnahmestelle ins Wasser. Ist ein Boden noch so reichlich mit organischen Stoffen, Nitraten u. s. w. durchsetzt, und treibt man durch solchen Boden ins Grundwasser ein eisernes Rohr, das man von den von der Oberfläche verschleppten Bakterien durch Desinfektion befreit, so gewinnt man aus diesem Rohr anhaltend ein keimfreies, aber chemisch sehr stark verunreinigtes Wasser. — Gelegentlich können wohl die Effekte der Entnahmestelle und grobe Zutrittswege für Organismen mit Bodenverunreinigung zusammentreffen; aber meist fehlt jeder Parallelismus.

Noch eine andere Beziehung ist zwischen den chemisch nachweisbaren Verunreinigungen eines Trinkwassers und infektiösen Organismen denkbar: jene könnten dem Wasser erst die erforderlichen Nährstoffe zuführen, ohne welche eine Wucherung der Infektionserreger nicht zu Stande kommt. Aber auch diese Annahme lässt sich, wie unten erörtert wird, nicht aufrecht erhalten. In stärker gebrauchtem Trinkwasser kommt es anscheinend überhaupt zu keiner Wucherung hineingelangter Krankheitserreger, sondern nur zu einer Conservirung, die für zahlreichste Infektionen ausreicht.

Somit ist das Resultat der chemischen Untersuchung belanglos für die Feststellung der Infektionsgefahr eines Wassers.

Dagegen lässt sich aus der chemischen Analyse häufig ein Anhalt gewinnen für die Beurtheilung der Appetitlichkeit der Anlage. Sind reichlich organische Stoffe, viel Chloride und Nitrate vorhanden, so entstammt das Wasser einem mit Abfallstoffen übersättigten Boden,

und das Wasser kann bei weiterer Verschmutzung der Umgebung in grobsinnlicher Weise unappetitlich werden.

Freilich ist auch hier Vorsicht im Urtheil angezeigt: bei gleicher Bodenverunreinigung zeigt das Grundwasser sehr verschieden starke Verunreinigung je nach der Durchlässigkeit des Bodens, nach der Benutzung des Brunnens, nach dem Zutritt von Flusswasser u. s. w. Nur wenn gleichzeitig an mehreren Stellen die chemische Beschaffenheit des Grundwassers festgestellt wird, für das fragliche Wasser aber erheblich höhere Zahlen gefunden werden, ist der Schluss auf eine abnorme Verschmutzung der Anlage berechtigt. — Selbstverständlich sind auch Wässer verschiedener Herkunft, Fluss-, Quell- und Grundwässer, in dieser Beziehung nicht mit einander vergleichbar. — Sind nur einzelne Substanzen in grösserer Menge vorhanden, z. B. organische Stoffe und Ammoniak, so können diese auch alten Huminlagern entstammen und mit Abfallstoffen nichts zu thun haben.

3. Die mikroskopische und bakteriologische Untersuchung. Im mikroskopischen Präparat, das man aus dem Absatz des 12—14 Stunden gestandenen Wassers anfertigt, findet man neben mineralischen Bestandtheilen zunächst mancherlei pflanzlichen oder




Fig. 65. Helmintheneier. a Ei von *Taenia solium*. 500:1. b Ei von *Anchylostomum duodenale*. 500:1. c Dasselbe, späteres Stadium. 100:1. d Dasselbe. 500:1. e Unreifes, f reifes Ei von *Botriocephalus latus*. 500:1. g Ei von *Ascaris lumbricoides*. 500:1. h Ei von *Oxyuris vermicularis*. 500:1. i Ei von *Trichocephalus dispar*. 500:1.

thierischen Detritus. Reste von mehr oder weniger verdauten Fleischfasern sind bedenklich, weil sie auf Verunreinigung des Wassers mit Fäkalien deuten. Erheblich bedeutungsvoller ist der Nachweis thierischer Parasiten in Form von Eiern von *Anchylostomum duodenale*, *Distoma*, *Taenia solium*, *Ascaris lumbricoides*, *Oxyuris vermicularis* u. s. w. (Fig. 65).

In grosser Menge und Mannigfaltigkeit finden sich saprophytische Rhizopoden, Sporozoen und Infusorien im Wasser. Einige der am häufigsten vorkommenden sind in Figg. 66 u. 67 zusammengestellt. Zur Untersuchung lässt man das Wasser in sterilen Gefässen 6 Tage stehen und fertigt dann von der Oberfläche 5 Präparate an. Es ist wahrscheinlich, dass gelegentlich auch krankheitserregende Protozoen durch Wasser verbreitet werden, z. B. die Amöben der egyptischen Dysenterie (s. S. 82). Indess ist die Kenntniss dieser niedersten Thiere nicht so weit vorgeschritten, dass man durch das Mikroskop die wenigen infektiösen Arten unter den sehr viel zahlreicheren unschädlichen herausfinden könnte.

Ferner kommen häufig Algen, Diatomeen und die S. 80 beschriebenen

asserpilze im Wasser verschiedenster Herkunft vor. Sie sind an und für sich schädlich, können aber durch massenhafte Entwicklung das Wasser trübend zum Genuss ungeeignet machen. — Ueber die in Industrieabwässern wuchernden Organismen s. im IX. Kap.

Ob manchen jener kleinsten Thiere und Pflanzen eine symptomatische Bedeutung für die Beurtheilung eines Wassers zukommt, ist noch zweifelhaft.




Fig. 66. Infusorien. a *Euglena viridis*. 100:1. b *Paramecium aurelia*. 500:1. c *Stylonichia*. 230:1. d *Vorticella*. 230:1. e *Euplotes Charon*. 230:1. f *Amoeba diffusa*. 200:1.

Die früheren Beobachtungen sind meist ohne die nöthigen Cautelen gegen nachträgliches Eindringen von Keimen (nicht sterilisirte Gefässe u. s. w.) gemacht; ebenso sind Herkunft, Wucherungsbedingungen u. s. w. nicht genügend berücksichtigt. Untersuchungen, bei welchen auf alle diese Momente Rück-




Fig. 67. a *Actinophrys*. b *Trichomonas*. c *Cercomonas*. d *Lacrimaria olor*. e *Colpodium colpoda*.

nicht genommen ist, haben bisher keinerlei symptomatische Bedeutung der Protozoen des Wassers erkennen lassen.

Zur bakteriologischen Untersuchung des Wassers ist stets das Culturverfahren anzuwenden.

Man bedient sich für gewöhnlich der oben S. 41 beschriebenen Gelatine-lattencultur. — Besondere Vorsicht ist bei der Probenahme des Wassers zu

beachten, damit fremde Bakterien vollkommen ausgeschlossen bleiben. Das Wasser ist entweder in sterilisirte und mit Wattepfropf verschlossene Reagentgläser einzufüllen, die sofort nach der Füllung wieder mit dem Wattepfropf zu schliessen sind. Wenn längerer Transport erforderlich ist, benutzt man sterilisirte Glasstopfenflaschen oder Flaschen mit Patent-Gummiverschluss. — Die Probe muss stets sofort, innerhalb 3 Stunden untersucht werden, da viele Bakterien sich in dem Wasser nachträglich massenhaft vermehren. Eine nach 24 Stunden oder später angestellte Untersuchung giebt völlig unbrauchbare Resultate.

Es werden 4 Platten in Petri'schen Schälchen angelegt und zwar eine mit $\frac{1}{100}$, die zweite mit $\frac{1}{10}$, die dritte mit 1, die vierte mit 10 Tropfen des Wassers (20 Tropfen = 1 ccm); zum Abmessen von $\frac{1}{100}$ und $\frac{1}{10}$ Tropfen verdünnt man 1 ccm des Wassers mit 100 bzw. 10 ccm sterilisirten Wasser, mischt und entnimmt der Mischung 1 Tropfen. Nach dem Auswachsen der Colonieen werden dieselben mittelst eines Zählapparates gezählt; die einzelnen Colonieen werden mit dem Mikroskop durchmustert und verdächtige in Gelatineröhrchen behufs weiterer Untersuchung übertragen. — Die Untersuchung auf Typhus- und Cholera bacillen hat durch besondere Methoden zu erfolgen; siehe im Anhang.

Die bakteriologische Untersuchung ist vor allem dadurch bedeutungsvoll, dass es mittelst derselben unter Umständen gelingt, Infektionserreger, wie Typhus- und Cholera bacillen, direkt nachzuweisen. Cholera bacillen sind im Wasser eines indischen Tanks, in Hafenwasser, in Leitungs- und Brunnenwasser wiederholt aufgefunden; ebenso ist in vereinzelten Fällen der Nachweis von Typhus bacillen im Leitungswasser geglückt. In weitaus der Mehrzahl solcher Untersuchungen ist freilich das Resultat negativ auch dann, wenn das Wasser zweifellos bei der Ausbreitung der Krankheit ursächlich theiligt ist; theils deshalb, weil die Untersuchung des Wassers so spät vorgenommen wird, dass die hineingelangten Bakterien mechanisch entfernt oder abgestorben zu sein pflegen; theils weil die Erkennung der immer in starker Minderzahl vorhandenen pathogenen Bakterien unter den saprophytischen auf grosse Schwierigkeiten stösst.

Unter diesen Umständen hat man versucht, die bakteriologische Untersuchung noch in anderer Weise zum Nachweis der Infektionsgefahr auszunutzen, indem man die Zahl der gesammten im Wasser enthaltenen Keime und die unter diesen vorhandenen Arten als Symptome der Infektionsgefahr aufgefasst hat. Dies wird weit eher zulässig sein, als die Annahme symptomatischer Beziehungen zwischen den gelösten chemisch nachweisbaren Stoffen und Infektionsgefahr, weil auch die nicht pathogenen Bakterien doch wenigstens auf denselben Wegen in's Wasser gelangen, wie die pathogenen, während für die chemisch nachweisbaren Verunreinigungen eine ganz andere Art des Zutritts in Betracht kommt.

Diese symptomatische Verwerthung setzt indessen eine genauere Kenntniss darüber voraus, von welchen Einflüssen die Zahl und das Auftreten verschiedener Arten der in einem Wasser vertretenen Bakterien abhängt; vielleicht wird durch solche Einflüsse eine symptomatische Beziehung zwischen saprophytischen und pathogenen Keimen unmöglich gemacht.

Vor allem kommen die Herkunft und die Zutrittswege der Bakterien in Betracht. Es bestehen hier vorzugsweise zwei Wege: a) Einwanderung vom Boden aus, in erster Linie von der Bodenoberfläche. Von dieser aus werden die Bakterien durch Niederschläge, Schneeschmelze u. s. w. den Bächen, Flüssen und offenen Leitungen zugeführt. Sehr oft gelangen sie aber auch in Grundwasserbrunnen, indem sich unter der Deckung des Brunnens, durch Spalten zwischen der undichten Wandung und dem angrenzenden Erdreich, durch Spalten, die vom Schlammfang durch die Mauerung des Brunnens hindurchführen, gröbere Wege und mittelst dieser Zuflüsse zum Brunnenschacht herstellen (s. Fig. 68). — In tieferen Bodenschichten finden sich solche Communicationen viel seltener; sie können gelegentlich durch tiefreichende Klüfte in felsigem Boden, oder durch Spalten in trockenem Lehmboden, oder auch durch Ratten- und Maulwurfsgänge hergestellt werden. b) Zweitens kommen solche Keime in Betracht, die von der Herrichtung der Wasserentnahmestelle herrühren. Beim Bau eines Brunnens, und wenn dieser auch nur im Eintreiben eines eisernen Rohres besteht, bei der Fassung einer Quelle, bei der Anlage und bei Reparaturen einer Leitung u. s. w. werden durch Verschleppung oberflächlicher Bodentheilchen, durch das verwendete Material und durch die Arbeiter zahlreiche Keime eingebracht.

Das weitere Schicksal der so in das Wasser gelangten Keime ist dann sehr verschieden; sie können sich dort entweder vermehren; oder conservirt werden; oder absterben bzw. mechanisch wieder entfernt werden.

Bezüglich der Vermehrungsfähigkeit im Wasser verhalten sich die einzelnen Bakterienarten so, dass einige im Wasser häufig vorkommende Arten sich ungemein reichlich vermehren, wenn auch das Wasser noch so rein und frei von organischen Beimengungen ist. Dahin gehören sowohl mehrere die Gelatine festlassende, wie auch einige verflüssigende Arten, die gemeinsam als sog. „Wasserbakterien“ bezeichnet werden. — Andere Arten und speciell die meisten pathogenen Bakterien vermehren sich im Wasser nicht oder doch nur für kurze Zeit und in unerheblichem Grade. Der Gehalt eines Wassers an organischen Substanzen zeigt zu der Zahl der entwickelten Bakterien

weniger Beziehung als ein gewisser Salzgehalt. Erst bei relativ grossen Mengen von organischen Stoffen scheinen vorzugsweise saprophytische Arten günstig beeinflusst zu werden. Anhaltende Vermehrung von pathogenen Arten erfolgt hauptsächlich an schwimmenden festen Partikeln aus pflanzlichem und thierischem Detritus.

Conservirung der Bakterien wird von allen Wässern, die den üblichen Salzgehalt aufweisen, geleistet; für pathogene Arten mindestens für Wochen, für viele Saprophyten erheblich länger.

Wiederentfernung der Bakterien erfolgt theils durch Absterben; theils durch Absetzen, namentlich in ruhendem Wasser; bei benutzten Leitungen und Brunnen hauptsächlich durch die häufige Wasserentnahme. Pathogene, nicht fortgesetzt wuchernde Keime werden auf diese Weise gewöhnlich nach einigen Wochen wieder entfernt sein, falls nicht kontinuierliche Zufuhr zum Wasser stattfindet. Ein Theil der Bakterien pflegt aber jeder Art von Entfernung, auch der mechanischen, sehr energisch zu widerstehen. Leitungsrohre, Brunnenrohre und -Kessel zeigen meist eine schleimige Auskleidung der Wandungen, die hauptsächlich aus Bakterien besteht und die selbst durch stark fliessendes Wasser nicht vollständig beseitigt wird.

Selbstverständlich kommen in ein und demselben Wasser zeitliche Schwankungen des Bakteriengehaltes vor. Manche Flusswässer und Wasser aus Flachbrunnen zeigen im Sommer mehr Bakterien als im Winter; plötzliche starke Regengüsse bewirken in offenen oder undichten Wasserreservoirien erhebliche Steigerungen des Bakteriengehaltes. Ferner pflegt durch längeres Pumpen die Anzahl der Mikroorganismen in den Brunnenwässern zu sinken; doch bleibt bei manchen Brunnen dieser Effekt aus, wenn das Grundwasser selbst bakterienhaltig ist oder wenn starke verunreinigende Zuflüsse fortwährend in den Brunnen gelangen. Zuweilen bewirkt das Pumpen sogar eine Steigerung der Bakterienzahl durch Aufrühren des abgelagerten bakterienreichen Schlammes.

Aus Vorstehendem ergibt sich, dass aus der Zahl der Bakterien Folgerungen für die Infektionsgefahr nur mit grosser Einschränkung gezogen werden dürfen.

Nur wenn keine oder sehr wenige (unter 20 in 1 ccm) Keime in einem Wasser gefunden werden, ist ein sicherer Schluss zu ziehen, nämlich der, dass keine Infektionsgefahr vorliegt. Ein solches Resultat ist unbedingt erforderlich z. B. bei der Untersuchung eines für centrale Wasserversorgung bestimmten Quell- oder Grundwassers.

Werden mässige Mengen von Bakterien (20—200 in 1 ccm) in einem Wasser nachgewiesen, so ist Infektionsgefahr nicht sicher ausgeschlossen, weil z. B. die groben Wege, auf denen die Bakterien

zutreten, durch vorübergehende Trockenheit versiegt und die vorher eingeführten Bakterien durch lebhafte Wasserentnahme wieder entfernt sein können.

Sind zahlreiche Bakterien (200—5000 und mehr) vorhanden, so können diese alle von der Brunnenanlage herrühren, zum grossen Theil aus vermehrungsfähigen Wasserbakterien bestehen und daher unverdächtig sein; oder sie können z. B. aus Dachtraufen in den Brunnen gelangt sein, dessen Lage im Übrigen jeden Infektionsverdacht ausschliesst; oder aber sie können von dem Bestehen grosser Zufuhrwege und vom Hineingelangen suspekter Zuflüsse herrühren. — Eine Entscheidung über die Bedeutung der gefundenen Zahl von Bakterien ist daher in den meisten Fällen bei einmaliger Untersuchung nicht zu liefern.

Dagegen ist die Bakterienzählung von grosser Bedeutung bei fortlaufender, täglicher Controle. Alsdann ergibt sich eine Durchschnittsziffer, deren Ueberschreitung ein vortreffliches Warnungszeichen liefert. Eine derartige Controle ist namentlich für die Filterbetriebe bei Flusswasserversorgungen von grösster Bedeutung (s. unten).

Die Arten von Bakterien, die im Wasser angetroffen werden, sind ausser den erwähnten stark vermehrungsfähigen Wasserbakterien sehr mannigfaltig. Nicht selten begegnet man chromogenen Arten; ferner Cladothricheen; auch Schimmelpilzen. Sehr verbreitet sind Coli-Arten, die keineswegs stets auf Zutritt von Fäkalien zum Wasser hindeuten, sondern die von der Anlage herrühren können, oder durch Luftstaub oder durch ganz unverdächtige Zuflüsse in das Wasser gelangt sind. Bestimmte Arten, aus welchen eine Infektionsgefahr gefolgert werden dürfte, sind bisher nicht bekannt. Nur insofern ist die Feststellung der saprophytischen Arten bei der bakteriologischen Untersuchung von Bedeutung, als eine grössere Mannigfaltigkeit der Arten Verdacht auf das Bestehen gröberer verunreinigender Zuflüsse erwecken muss, während die Wasserbakterien und die von der Anlage herrührenden Keime meist keine solche Verschiedenartigkeit der Colonieen verursachen.

4. Die Lokalinspektion. Da bezüglich der Beurtheilung der Infektionsgefahr eines Wassers die chemische Untersuchung ganz, die bakteriologische Untersuchung sehr häufig im Stich lässt, ist eine weitere Ergänzung der Methoden dringend erwünscht. Diese wird durch die Lokalinspektion der Wasser-Entnahmestelle geliefert, die darauf ausgeht, festzustellen, ob gröbere Wege für Verunreinigung des Wassers vorhanden sind und ob gelegentlich von diesen aus eine Infektion des Wassers erfolgen kann. Die Lokalinspektion will also nicht

nur eine momentan etwa vorhandene bedenkliche Verunreinigung des Wassers feststellen, sondern sie geht weiter, indem sie ermittelt, ob in absehbarer Zeit überhaupt die Möglichkeit einer Infektion des Wassers vorliegt.

Die Lokalinspektion hat bei Bach- und Flusswässern darauf zu achten, ob irgendwo Abwässer des menschlichen Haushalts, Dejekte von Menschen und Thieren u. s. w. Zugang zum Wasser finden; ob Reinigung von Wäsche stattfindet (Waschbänke); ob Schiffe auf dem Flusse verkehren und in welchem Umfang. — Bei Quellwässern ist festzustellen, ob ihr unterirdischer Lauf nicht etwa kurz ist und ob sie nicht weiter oberhalb aus oberflächlichen Rinnsalen entstehen; ob im Bereich der letzteren gedüngte Wiesen liegen; ob gelegentlich eine grössere Anzahl von Wald-, Wegearbeitern u. s. w. sich dort aufhält, ob Communicationen mit Bächen und Flüssen bestehen.

Bei Grundwasserbrunnen ist zunächst die oberflächliche Umgebung zu mustern; es ist zu ermitteln, ob das Terrain so geneigt ist,




Fig. 68. Schlechter Schachtbrunnen.

dass oberflächlich sich sammelndes Wasser nach dem Brunnen zu abläuft. Sodann ist zu beachten, ob der Brunnenkranz das Niveau überragt, ob Defekte in der Mauerung, in der Deckung, am Schlammfang oder an dem das überschüssig ausgepumpte Wasser abführenden Rinnsal vorhanden sind, durch welche Spülwasser von Wäsche, Geschirren u. s. w. in den Schacht gelangen kann. Sodann ist der Brunnen womöglich aufzudecken und der Schacht im Inneren abzu- leuchten; finden Einläufe von Abwässern, Spülflüssigkeiten oder Niederschlagswasser statt, so pflegen sich dunkle oder weissliche Streifen an der Wandfläche zu zeigen. Auch in grösserer Tiefe zutretende Einläufe können oft in dieser Weise erkannt werden. — Sind trotz dringenden Verdachts gröbere Wege zwischen Oberfläche und Brunnen oder z. B. zwischen Quellen und Flüssen nicht ohne weiteres zu ermitteln, so kann

roh Eingiessen von Fluorescein- (Uraninkali) oder Saprollösungen oder auch von Aufschwemmungen von Hefe, *B. prodigiosus* bezw. Wasserbakterien auf bestehende Communicationen geprüft werden.

Die in dieser Weise vorgenommene Lokalinspektion ist geeignet, reithvolle Aufschlüsse über die Infektionsgefahr eines Wassers geben, meistens besser als die bakteriologische und stets besser als die chemische Untersuchung. Der letzteren ist sie ausserdem noch überlegen in dem Nachweis der Appetitlichkeit des Wassers. Diese ergibt sich aus der Besichtigung der Umgebung einfacher und zuverlässiger als aus dem vieldeutigen Resultat der chemischen Prüfung.

Entschieden verwerflich ist die Methode, welche man jetzt vielfach noch wendet, um festzustellen, ob durch Wasser die Ausbreitung einer Epidemie verursacht ist. Dieselbe besteht darin, dass das verdächtige Wasser einem Chemiker oder Apotheker zur Untersuchung zugesandt wird. Dieser giebt sein Urtheil dahin ab, dass das Wasser wegen hohen Gehaltes an organischen Stoffen, Chloriden, Nitraten u. s. w. schlecht, gesundheitsgefährlich und infektiös sei. Damit ist dann gewöhnlich die Beweisaufnahme geschlossen und die Aetiologie wird als genügend aufgeklärt angesehen: Das „schlechte“ Wasser hat den Typhus veranlasst. — Wir wissen nun aber aus zahlreichen vergleichenden Untersuchungen, dass oft gerade die typhusreichsten Städte ein chemisch reines, typhusfreie Städte ein enorm verunreinigtes Wasser haben; dasselbe Verhältniss ist für einzelne Stadttheile und Strassen zu konstatiren. Würde man sich in denjenigen Fällen, wo ein Brunnen in solcher Weise verdächtig ist, die Mühe geben, auch die benachbarten Brunnen aus typhusfreien Häusern zur Untersuchung heranzuziehen, so würde man sicher dort oft noch wesentlich höhere Zahlen finden. Nach den oben gegebenen Darlegungen über die Verschiedenheit der Wege für die Infektionserreger einerseits, für die geübten, chemisch nachweisbaren Verunreinigungen des Wassers andererseits kann ein solches Verhalten auch durchaus nicht überraschen. Angesichts der ungeheuren Verbreitung unreiner Brunnen innerhalb der Städte ist es daher völlig unzulässig, in der chemisch schlechten Beschaffenheit eines einzelnen Brunnens einen Beweis für die Infektiosität des Wassers zu sehen. Erst wenn eine Untersuchung nach den oben angeführten Kriterien eine Infektionsgefahr für das Wasser festgestellt hat, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Infektionen durch das Wasser erfolgt sind; aber auch dann sind in jedem Erkrankungsfall die übrigen Verbreitungswege der Krankheitserreger sehr wohl in Rechnung zu ziehen.

D. Die Wasserversorgung.

1. Lokale Wasserversorgung.

Für einzelne Haushaltungen kommt die Entnahme von Bachwasser, Quellwasser oder Grundwasser in Betracht. Bach- (und Teich-) Wasser ist stets suspekt und es bedarf genauer Lokalinspektion, ehe

ausnahmsweise die Benutzung solchen Wassers als Trink- oder Brauchwasser gestattet werden kann. Quellen sind in einer Weise zu fassen, dass sie gegen jede Verunreinigung von aussen geschützt sind; auch die Leitung muss vollkommen geschlossen sein.

Für die Hebung des Grundwassers sind Kesselbrunnen oder Röhrenbrunnen in Gebrauch. Die Kesselbrunnen (Schachtbrunnen) müssen völlig dicht gemauert sein, so dass das Eindringen des Wassers nur von unten her erfolgt; ferner müssen sie oben völlig dicht abgedeckt sein und dem Terrain muss eine solche Neigung gegeben




Fig. 69. Guter Schachtbrunnen.

werden, dass das Brunnenrohr auf dem höchsten Punkte steht. Sehr zweckmässig ist es, den Brunnenschacht $1\text{--}1\frac{1}{2}$ m unter der Bodenoberfläche zu decken und dann eine Schicht von Feinsand aufzulagern, so dass etwaige Zuflüsse diese Sandschicht passieren müssen. Ferner ist es empfehlenswerth, das Saugrohr aus dem Kessel unterirdisch eine Strecke weit horizontal zu führen, so dass die Pumpe an ganz anderer Stelle sich befindet, wie der nach oben dicht abgeschlossene und von einer starken Erdschicht überlagerte Kessel. Für das ablaufende Wasser ist ein wasserdichter Trog mit gut gedichteter Ablaufrinne herzustellen (Fig. 69).

Fast immer sind indess die Kesselbrunnen einer Infektion relativ leicht ausgesetzt; ausserdem ist eine Reinigung und Desinfektion relativ schwierig.

Viel besser sind die sogenannten abessinischen **Röhrenbrunnen** für die Wasserversorgung geeignet, bei welchen ein unten durchloches Rohr in die Grundwasser führende Schicht des Bodens ein-
 rammt wird (Fig. 70). Das umgebende Erdreich legt sich diesem
 hr als fester Mantel an, so dass ein Einfließen von Verunreinigungen
 nz unmöglich ist. Nur durch die Oeffnung der oben auf das Rohr
 fgesetzten Saugpumpe können mit Staub oder Regen minimale Mengen
 schädlicher Bakterien in das Pumpenrohr gelangen, die sich all-
 hlich zu einer schleimigen Auskleidung
 Rohres entwickeln.

Diese Brunnen sind sehr leicht zu
 sinficieren. Schon einfaches Auspumpen
 l mechanische Säuberung des Rohrs mittelst
 igneter Bürsten liefert fast keimfreies Was-
 ; durch Eingiessen einer 5 procentigen
 schung von roher Carbolsäure und Schwefel-
 re oder auch durch Einleiten von Dampf
 a 100° für einige Stunden kann das
 asser für mehrere Tage völlig keimfrei ge-
 acht werden.

Wir haben also in diesen Röhrenbrunnen
 l vorzügliches Mittel, völlig ungefährliches
 asser zu beschaffen. Gegenüber den Kessel-
 unnen haben die Röhrenbrunnen nur dann
 nen erheblichen Nachtheil, wenn innerhalb
 urzer Zeit ausgiebige Wasserentnahme er-
 orderlich ist; in diesem Fall ist das bei den
 Kesselbrunnen vorhandene grössere Reservoir
 unentbehrlich.

Ist das Grundwasser eisenhaltig, so
 lässt sich das Wasser in manchen Fällen
 eisenfrei zu Tage fördern, wenn der Brunnenschacht einen Mantel be-
 kommt, der mit Stücken Aetzkalk (Weisskalk) gefüllt ist, und wenn
 auch der Boden des Schachts mit einer Kalklage bedeckt wird. Eine
 solche Vorkehrung ist im Stande für viele Jahre alles gelöste Eisen
 des zuströmenden Wassers abzuscheiden und zurückzuhalten. — Bei
 vielen eisenhaltigen Wässern versagt indess dies Verfahren. Hier muss
 dann, entsprechend der unten erläuterten, im Grossbetrieb angewendeten
 Methode, eine Filtration des Wassers durch ein Grobsandfilter einge-
 richtet werden, der bei reichlichem Eisengehalt noch eine Lüftung des
 Wassers durch Niederfall aus einer Brause vorausgehen muss.



Fig. 70. Röhrenbrunnen.

In einfachster Form stellt Fig. 71 den dazu erforderlichen Apparat dar, der aus einem Filterfass und einem Fass für das durchfiltrirte reine Wasser besteht. Ersteres erhält eine 30 cm hohe Schicht Sand von 1—1½ mm Korngröße: die Sandschicht wird mit einem 1 mm dicken, vielfach durchlochten Zinkblech bedeckt. Der Einlauf des Hahns wird durch Messingdrahtnetz gegen Eindringen von Sandtheilchen geschützt. Das Filter muss über Nacht bei geöffnetem Hahn leer stehen: alle 2 bis 4 Monate muss das Filter durch Aufrühren und Waschen des Sandes gereinigt werden. — In Fig. 72 ist der Apparat mit Anwendung einer Flügelpumpe und Brause abgebildet; hier ist ein Spülrohr angeschlossen, durch das die Reinigung bequemer erfolgen kann.



Fig. 71.



Fig. 72.

Enteisung des Wassers bei Brunnenanlagen.

2. Centrale Wasserversorgung.

Centrale Versorgungen sollten so viel als möglich in grösseren und kleineren Städten eingeführt werden. Auf diese Weise kann der stets verunreinigte städtische Untergrund umgangen und also ein viel appetitlicheres Wasser beschafft werden; die Gefahr, dass gelegentlich pathogene Pilze in das Wasser gelangen, kann bei guter Auswahl der Entnahmestelle und guter Deckung der ganzen Anlage auf ein Minimum reducirt werden. Dabei wird durch die ausserordentlich bequeme Lieferung reichlichster Wassermassen die Bevölkerung geradezu zur Keuschheit erzogen und damit eine ausserordentlich wirksame Be-

der Infektionsgefahr erzielt; ferner wird ein Quantum von Kraft und Zeit erspart, das in nationalökonomischer Beziehung unterschätzen ist, und es wird eine wesentlich grössere Garantie Löschten entstandener Brände gegeben.

Entnahme geschieht dabei entweder aus Quellen. Die müssen nach aufmerksamer Lokalinspektion und wiederholter chemischer Prüfung (namentlich nach reichlichen Niederschlägen) werden, um den Bestand derselben zu sichern, gleichmässigen zu erzielen und Verunreinigungen fernzuhalten. Reichliche in der Nähe der Stadt liefern die beste und billigste Bezugswasser bei sehr langen Leitungen (wie z. B. Wien 97 km, Frankfurt 82 km) sind die Kosten bedeutend. Die Qualität des Wassers ist meist gut,

die des Grundwassers nicht übertreffend. Die Quantität ist abzuschätzen und schwankt in wenig erwünschter Weise; es kann plötzliche Verminderung der Wassermenge schon grosse Calamitäten entstanden. Daher ist eine unbedingte Empfehlung der Quellwasserleitungen nur in Gebirgsgegenden zulässig, wo überreichlich Quellen zu Gebote stehen.

Oder die Entnahme erfolgt aus dem Grundwasser. Dann werden Sammelbrunnen angelegt an einer Stelle der betr. Gegend, in welcher reines, aber reichliches Grundwasser vorhanden ist. Letzteres findet man namentlich in der Nähe der Flüsse, die den tiefsten Punkt der Thalsohle bezeichnen. Bezüglich der Reinheit ist es wichtig, dass keine Ortschaften im Gebiet des betreffenden Grundwassers liegen, ferner kein stark gedüngtes Land, namentlich nicht Garten-




Fig. 73. Enteisungsanlage nach PIEPKER.

land, sondern besser Wiese und Wald, und dass die filtrierende Bodenschicht feinkörnig und von genügender Höhe ist. Das Wasser ist auf seine Keimfreiheit durch Eintreiben eines Röhrenbrunnens, Desinfektion desselben und Probenahme nach anhaltendem Abpumpen zu prüfen. Ausserdem ist es einer genauen chemischen Analyse zu unterwerfen; namentlich ist auch darauf zu achten, ob Eisen im Wasser auftritt. Findet sich letzteres in solcher Menge, dass das Wasser trübe und unappetitlich wird, ist aber im übrigen nichts gegen das betreffende Wasser einzuwenden, so braucht darum noch nicht auf die Benutzung desselben zur Wasserversorgung verzichtet zu werden. Das Eisen lässt sich vielmehr relativ leicht aus dem Wasser entfernen, wenn man letzteres zunächst regenartig herabfallen und über eine Schicht von Cokesstücken rieseln oder auch nur durch ein relativ grobes Kiesfilter fließen lässt; auf diese Weise wird es so stark durchlüftet, dass die ganze Menge des Eisenbicarbonats die Kohlensäure verliert und durch den Sauerstoff der Luft rasch und vollständig in Eisenoxydhydrat verwandelt wird; die Flocken von Eisenoxydhydrat bleiben im Filter zurück; 1 qm eines solchen Filters filtrirt pro Tag 20 cbm eisenfreies Wasser (s. Fig. 73).

In das ausgewählte Wasserterrain werden dann ein oder mehrere grosse Sammelbrunnen (jetzt gewöhnlich eiserne Röhrenbrunnen) eingebaut, welche eventuell noch mit horizontalen Sammelstollen unter einander verbunden sind; oder es werden aus Sickergräben und Drainrohren Sammelgalerien gebildet.

Gewöhnlich ist Grundwasser relativ billig zu haben; allerdings werden die Kosten der Anlage dadurch erhöht, dass es im Gegensatz zu dem Quellwasser künstlich gehoben werden muss. Aber dafür ist die Entfernung und die Länge der Leitung unbedeutend. Die Qualität steht gewöhnlich dem Quellwasser kaum nach; die Quantität bietet meist keine Schwierigkeiten, das Quantum ist bei sorgsamer Auswahl des Terrains je nach der Vergrösserung der Stadt beliebig zu erweitern.

Drittens wird auch Flusswasser benutzt; jedoch sollte dies nie ohne vorhergehende Reinigung geschehen (s. S. 201). Eine solche erfolgt in unvollkommener und vorbereitender Weise wohl durch Klärbassins, in genügender Weise aber erst mittelst Filtration durch porösen Boden, der in grosse Bassins eingefüllt ist.

Die Bassins sind gewöhnlich 2—4000 qm gross, aus Mauerwerk und Cement wasserdicht hergestellt, in manchen Städten zur Vermeidung von Eisbildung überwölbt. Am Boden befindet sich eine Reihe von Sammelcanälen. Das Filter selbst ist folgendermaassen zusammengesetzt; von unten bis 305 mm Höhe grosse Feldsteine, dann kleine Feldsteine in Schichthöhe von 102 mm, darauf grober Kies 76 mm, mittlerer Kies 127 mm, feiner Kies 152 mm, grober Sand

fer Sand 559 mm; gesammte Höhe 1872 mm. Nur die Sandschicht in Höhe wird als eigentliche Filtrirschicht angesehen.

Das Filter wird zunächst gefüllt, bis das Wasser circa 1 m hoch über die Oberfläche steht. Dann lässt man es 24 Stunden oder länger stehen, damit sich von Sinkstoffen eine Schicht bildet. Diese bildet nämlich den oberen Theil des Filters, für das der Sand nur die Stütze darstellt; die oberflächliche Haut, theils durch den schleimigen Ueberzug, Bakterienarten in den Poren des ganzen Filters etabliren, findet eine ständige Zurückhaltung der im Wasser enthaltenen Bakterien statt. Das Filter, ehe die Decke sich gebildet hat, in Betrieb, so gehen Bakterien durch. Im Anfang ist die Filtration immerhin noch nicht genügend; dafür genügt aber ein Druck von wenigen Centimetern, um die Förderung des Filters zu erzielen. Allmählich bei zunehmender




Fig. 74. Filter mit Regulirung nach GILL.

Sandschicht. c Feinkies. d Grobkies. e Grosse Feldsteine. In der dem Filter zugehörigen Kammer wird durch die Differenz der beiden Schwimmerstände die Filtrationsmenge constant erhalten. In der zweiten Kammer wird durch Regulirung der Schleierstellung die Filtrationsmenge constant erhalten.

Bei der Reinigung des Filters, muss man aber mit dem Druck immer höher steigen, um die Wassermenge durchzutreiben; dabei wird die qualitative Leistung des Filters. Zuletzt kommt man an eine Grenze: Beträgt die Druckdifferenz, die mindestens erforderliche Wassermenge gewährt wird, mehr als diese, so besteht die Gefahr, dass die Decke des Filters zerrissen wird. Bei geringerem Druck wird die Wassermenge zu gering, und es bleibt dann bei der Reinigung des Filters, d. h. es wird zunächst durch eine Bewässerungsanlage alles Wasser abgelassen, und dann wird die oben angesammelte Schlamm- und Schmutzschicht, die gewöhnlich nur einige Millimeter beträgt, höchstens bis 2 cm in den Sand hinein. Es macht für die Filtration nichts aus, wenn auch die Sandschicht bis auf $\frac{1}{3}$ ihrer Stärke

aufgebraucht wird. Der schmutzige Sand wird gewaschen und demnächst wieder verwandt.

Filtrationsdruck und Fördermenge müssen fortgesetzt beobachtet werden. Die Sammelcanäle der Filter stehen mit dem gemeinsamen Reinwasserreservoir der Art in Verbindung, dass der Spiegel des letzteren etwa 50 cm tiefer liegt, als der Wasserspiegel der Filter. Am Ausfluss des Reinwasserchanals ist eine Schiebervorrichtung, mittelst welcher die Menge des abfliessenden Wassers regulirt werden kann. Aus der Stellung dieses Schiebers wird auf den Filtrationsdruck geschlossen. Die quantitative Leistung des einzelnen Filters dagegen wird aus der Stellung des Schiebers in der Zufussleitung bestimmt.

Die Geschwindigkeit der Wasserbewegung beträgt bis jetzt gewöhnlich 100 mm pro Stunde; die Fördermenge stellt sich dann auf 0.1 cbm pro Stunde und 1 qm Filterfläche. Rechnet man pro Kopf und die Stunde des maximalen Consums 10 Liter Wasserverbrauch, so ist bei der angegebenen Geschwindigkeit für je 10 Menschen 1 qm Filterfläche erforderlich; für 300 000 also 30 000 qm. Dazu würde dann noch eine beträchtliche Reservefläche kommen, welche der zeitweisen Ausschaltung eines Filters behufs Reinigung resp. Auffüllung Rechnung trägt.

Die Leistung der Filter bezüglich der Qualität des Wassers besteht darin, dass zunächst die organischen Stoffe und das NH_3 ziemlich erheblich verringert werden; HNO_3 wird wenig, Cl gar nicht beeinflusst. — Die Bakterien werden im Ganzen gut abfiltrirt. Im Durchschnitt findet man 50—200 in 1 cem. Diese stammen zum Theil von den Bakterien her, welche dem Material der tieferen Filterschichten von vornherein anhaften; zum Theil entstammen sie aber dem unreinen Wasser. Es hat sich gezeigt, dass die Filter niemals völlig keimdicht arbeiten, sondern dass ein kleiner Bruchtheil der aufgebrauchten Bakterien regelmässig in das Filtrat geräth; je zahlreicher die Bakterien im unfiltrirten Wasser sind, um so höher steigt auch der Bakteriengehalt des Filtrats. Am günstigsten ist die Wirkung der Filter bei langsamer Filtration, ferner bei Vermeidung stärkerer Druckschwankungen und überhaupt aller Unregelmässigkeiten im Filterbetrieb. Unter solchen Umständen wird die Zahl der Bakterien etwa auf $\frac{1}{1000}$ reducirt, und damit kommen die Infektionschancen so gut wie ganz in Wegfall.

Eine sehr gefährliche Periode bleibt aber immerhin die Zeit, wo ein gereinigtes Filter neu in Benutzung genommen wird. Alsdann soll das Wasser mindestens 24 Stunden ruhig sedimentiren; und die danach während weiterer 12—24 Stunden durchfiltrirten Wassermengen sollen unbenutzt bleiben. — Ferner kommen bei jedem Filtrirbetrieb gelegentlich noch aussergewöhnliche Störungen des Betriebes vor; entweder kann die Reinigung nicht zur Zeit erfolgen und die Filterdecke reisst; oder es müssen grössere Reparaturen vorgenommen werden; oder das Flusswasser ist durch Hochwasser stark mit lehmigen Partikeln getrübt, und es stellt sich auf den Filtern rasch eine undurchlässige Schicht

r, die fortwährend mechanisch beseitigt oder durch abnorm hohen Druck überwunden werden muss. In allen diesen Fällen treten grosse Mengen von Bakterien im Filtrat auf, und das ist natürlich um so denklicher, als das Flusswasser einer Verunreinigung mit pathogenen Keimen ganz besonders exponirt ist.

Die Flusswasserleitungen sind daher hygienisch nur zulässig bei renger Ueberwachung des Betriebes. Vor Allem muss durch tägliche bakteriologische Untersuchung der einzelnen Filterabläufe kontrollirt werden, dass in keinem Ablauf mehr als 100 Bakterien in 1 ccm auftreten. Dies Resultat ist erfahrungsgemäss nur zu erreichen, wenn in keinem Filter zu irgend einer Zeit die Filtrationsgeschwindigkeit 100 mm pro Stunde überschreitet, wenn nach der Reinigung eines jeden Filters eine ausreichende Schonzeit gewährt wird, und wenn auch sonst irgend welche den Durchtritt von verdächtigen Keimen gestattende Betriebsstörungen nicht vorliegen.

Bei einigen Wasserwerken verwendet man statt der Sandfilter sogenannte Filtersteine (System FISCHER-PETERS). Es sind dies 1 qm grosse, aus geschliffenem Flusssand von bestimmter Korngrösse mit Natron-Kalksilikat als Bindemittel hergestellte, im Inneren hohle Steine. Die Filtration geschieht von aussen nach innen; die Schmutzschicht fällt von den senkrechten Wänden kontinuierlich ab. Die Reinigung der Filterelemente erfolgt durch Umkehren der Strömungsrichtung des Wassers. Die Filter beanspruchen namentlich viel weniger Raum als die Sandfilter und sollen den Betrieb erleichtern.

Zu der Infektionsgefahr der Flusswasserleitungen gesellt sich als erheblicher Nachtheil die hohe Temperatur des Wassers während des Sommers; es wird demselben dadurch die erforderliche Frische und Speisefähigkeit gerade zu einer Zeit benommen, wo am meisten Wasser konsumirt wird.

Alle neueren Wasserversorgungen sind mit hoch gelegenen Reservoiren für das Reinwasser versehen. Bei Quellwasserversorgung könnte man allerdings das Wasser durch den natürlichen Druck direct bis in die Häuser leiten. Aber es wird dann oft vorkommen, dass bei starkem Verbrauch die Lieferung nicht ausreicht, während bei fehlendem Consum die solche Anhäufung von Wasser stattfindet, dass ein Theil durch Sicherheitsventile unbenutzt abfliessen muss. — Besser ist es daher, in solchen Fällen Reservoirs einzuschalten, in welchen das Verbrauchsquantum für mehrere Stunden Platz findet, von dem aus allen Ansprüchen genügt werden kann, und das namentlich auch für Feuerlöschzwecke jederzeit die grössten Wasserquantitäten zur Verfügung stellt.

Zu den Hochreservoirs gelangt das Quellwasser mit natürlichem Gefälle (Gravitationsleitung), Grundwasser und filtrirtes Flusswasser

werden künstlich gehoben. Die Hochreservoirs werden auf einer nah gelegenen Anhöhe angelegt und dann dicht gemauert, oben gewöhnlich mit Erdschicht bedeckt, die im Sommer mit Wasser berieselt wird; oder eigens für diesen Zweck erbaute Thürme tragen die Reservoirs. Von da aus verzweigen sich dann die Canäle in die Stadt. Das Reservoir liegt so hoch, dass das Wasser mit natürlichem Gefälle bis in die obersten Etagen der Häuser steigt.

Die Leitungen bestehen bis zur Sammelstelle hin in gemauerten oder aus Cement- oder Thonröhren hergestellten Canälen. Für das unter Druck stehende Wasser dienen Röhren aus Gusseisen, die auf hohen Druck geprüft sind und die zum Schutz gegen Rostbildung in eine Mischung von Theer und Leinöl eingetaucht sind. — In den Häusern sind Gusseisenrohre nicht zu verwenden, weil hier zu viele Biegungen vorkommen. Schmiedeeiserne Röhren verrosten zu stark. Daher wird meist Bleirohr verwendet.

Allerdings bilden die Bleirohre die Gefahr der Bleivergiftungen. Dieselbe liegt namentlich bei einem sehr reinen und salzarmen Wasser vor; ferner wenn die bleiernen Leitungsrohre zeitweise mit Luft gefüllt sind. Es bildet sich alsdann Bleihydrat, das nicht sowohl im gelösten, sondern in fein suspendirtem Zustand im Wasser vorhanden ist. Grössere Mengen gehen nur in Wasser über, welches längere Zeit (über Nacht) im Rohre gestanden hat. Wasser, das reich an organischen Verbindungen, namentlich Kalksalzen, ist, ferner ein solches, welches organische Stoffe oder kleine Mengen von Eisen enthält, pflegt kein Blei oder doch nur unschädliche Spuren davon aufzunehmen.

Versuche, das Bleirohr mit innerem Zinnmantel herzustellen oder dasselbe mit unlöslichen Ueberzügen zu versehen, sind noch nicht mit völlig befriedigendem Resultat zu Ende geführt. — Sehr zweckmässig ist es, in Städten, welche bleierne Hausleitungen haben, von Zeit zu Zeit öffentliche Belehrungen darüber zu erlassen, dass das erste über Nacht in den Rohren gestandene Wasser unbenützt abfließen müsse. — Im Nothfall sind auch Hausfilter zur Retention des Bleis zu verwenden.

Die Wasserversorgungen werden gewöhnlich von der Gemeinde ausgeführt. Entweder wird das Wasser dann frei geliefert und die Kosten werden nach Zahl der bewohnbaren Räume, unter Berücksichtigung des Miethzinses, mit 1.8—3.5 Mark pro Jahr und Raum; oder nach Grundstücken; oder nach Procenten des Miethzinses der Wohnungen (2—6 Procent jährlich) berechnet. Oder es sind Wassermesser eingeführt und es werden pro 1 cbm verbrauchtes Wasser 0.1—0.2 Mark bezahlt.

Eine **Reinigung und Besserung** verdächtigen Wassers kann am besten erfolgen durch Kochen des Wassers. Hält man das Wasser nur im Sieden, so bietet dasselbe keine Infektionsgefahr mehr. Für einen stärkeren Consum empfehlen sich besondere Wasser-Kochapparate (von Siemens & Co., Berlin). Allerdings ist der Geschmack des kochten und wieder abgekühlten Wassers fade und ist daher ein Zusatz zuzusetzen in Form von Kaffee, Thee, Fruchtsaft, Citronen- u. s. w. — Zur chemischen Desinfektion des Wassers ist von SCHUMMER der Zusatz von Brom und nachherige Neutralisirung durch Natriumsulfit und Natr. bicarb. siccum empfohlen. Gegenüber grösseren Mengen trübten Wassers wird die sichere Reinigung bestritten.

Ferner kann eine Filtration in Betracht in Frage kommen. Für diesen Zweck sind zahlreichste Filter construiert, doch indess bis jetzt meist nicht sehr wirksam. Filter aus plastischer Substanz oder mit Füllung von Sand, Tonpulver, Filz, Wolle oder dgl. können wohl gröbere Trübungen (Eisenschlacken), aber nicht Bakterien zurückhalten. Bei längerer Benutzung bilden sich in diesen Filtern ausgedehnte Wucherungen von Bakterien, die geradezu Verunreinigung des durchfiltrirten Wassers führen. — Ein sicher bakterienfreies Filtrat liefern wenigstens die PASTEUR-CHAMBERLAND'-Thonfilter und die BERCKEFELDT'-Kieselguhrfilter.




Fig. 75. Thon- oder Kieselguhrfilter.

Erstere bestehen aus einer Kerze von Thon (e), die innen einen Hohlraum (d) enthält und an einem Ende in eine Manschette aus glasiertem Porzellan übergeht. Die filtrierende Flüssigkeit dringt von aussen (aus dem Raum e) in den Hohlraum der Kerze und fliesst aus dem Ausflussrohr (i) der Manschette aus. Um das Filter mit der Wasserleitung in Verbindung zu setzen, wird die Kerze in eine weitere Metallhülse (b) eingesetzt, deren unterer Abschnitt ein Gewinde trägt. Zwischen dem unteren Rand der Hülse und der Thonmanschette wird ein Kautschukring (h) eingeschaltet und nun eine

Metallkapsel (g) auf das Gewinde aufgeschraubt, so dass die Manschette fest gegen den Kautschukring resp. die Hülse angepresst und der Zwischenraum (e) zwischen Hülse und Kerze nach unten dicht abgeschlossen wird. Am oberen Ende der Hülse ist ein Verbindungsrohr zum Hahn der Wasserleitung eingeschraubt, durch welches das Wasser von a her einfließt.

Bei einem Druck von circa drei Atmosphären liefert eine Kerze Anfangs 1 Liter Wasser innerhalb 20—30 Minuten; schon nach 1—2 Stunden nimmt die Ergiebigkeit erheblich ab. Um die quantitative Leistung zu erhöhen, sind Combinationen von vier und mehr Kerzen construiert. — In den ersten Tagen ist das Filtrat zuverlässig keimfrei. Aber schon nach 3—8 Tagen, wechselnd insbesondere je nach der Temperatur, wachsen einige Bakterienarten durch das Filter hindurch, gelangen auf dessen innere Fläche und theilen sich von da ab in steigender Menge dem Wasser mit. Ausserdem wird der quantitative Ertrag um so geringer, je dicker die Schicht der abfiltrirten suspendirten Stoffe auf der Aussenfläche der Kerze wird; nach einigen Tagen filtriren stündlich nur noch wenige Cubikcentimeter. Man muss daher die Filter häufig, wenigstens alle acht Tage, aus der Metallhülse herausnehmen, an ihrer äusseren Fläche mit Bürsten reinigen, und dieselben dann längere Zeit kochen, um die Bakterien im Innern des Filters abzutöden.

Ein in der äusseren Form dem Chamberlandfilter ähnliches Filter ist von BERCKEFELDT & NORDMEYER aus Kieselguhr hergestellt. Dasselbe liefert weit grössere Mengen eines zuverlässig bakterienfreien Filtrats (1 Liter in 5—10 Minuten); ausserdem wird durch eine im Innern der Metallhülse angebrachte automatisch funktionirende Wischvorrichtung die äussere Filterfläche immer wieder gereinigt und dadurch die quantitative Leistung constant auf nahezu der gleichen Höhe gehalten. Auch diese Filterkerzen sind übrigens alle acht Tage von neuem durch einstündiges Kochen der Kerze in Wasser zu sterilisiren. Die Kerzen sind sehr zerbrechlich; um sicher zu sein, dass nicht feine Risse entstanden sind, ist eine häufige bakteriologische Prüfung des Filtrats unerlässlich.

Drittens kann eine Desinfektion der Anlage vorgenommen werden. Am leichtesten sind Röhrenbrunnen zu desinficiren (a. oben). — Schachtbrunnen sind am sichersten zu desinficiren, wenn man heissen Wasserdampf mittelst einer Lokomobile in das Wasser des Schachts einleitet, bis dasselbe 80—90° warm geworden ist. Von chemischen Mitteln ist Kupferchlorür, Aetzkalk, Schwefelsäure (1:1000) empfohlen. — Reservoirs und Leitungsrohre grösserer Wasserleitungen sind mehrfach mit Erfolg durch Schwefelsäure (1:1000, 2stündige Einwirkung) desinficirt, ohne dass das Eisen oder Blei der Rohre angegriffen wäre.

Eis. Künstliches Selterwasser.

Früher hat man wohl geglaubt, dass lebende Organismen im Eis nicht vorhanden sein könnten. In der That haben directe Versuche ergeben, dass viele Bakterien bei 0° zu Grunde gehen, namentlich von einer grossen Zahl von Individuen der gleichen Art vermuthlich alle älteren, nicht mehr so widerstandsfähigen Exemplare. Weiter aber ist ein sehr verschiedenes Verhalten der

inzelnen Arten beobachtet; manche scheinen sehr wenig widerstandsfähig zu sein, andere besser, einige leisten sogar bei 0° noch eine gewisse Vermehrung. — Da das Eis gewöhnlich aus sehr unreinem Wasser, Flüssen, Teichen u. s. w. entnommen wird, findet man entsprechend dieser relativ grossen Widerstandsfähigkeit der Bakterien in 1 ccm Schmelzwasser im Durchschnitt 2000, als Minimum 50, als Maximum etwa 25000 lebende Keime. — Es sind diese Befunde offenbar durchaus nicht ohne Bedenken. Im Sommer wird viel Eis roh genossen; ferner wird es nicht selten auf Wunden applicirt. Ersteres sollte nie, letzteres nur über undurchlässigen Unterlagen geschehen. — Ohne Bedenken ist dagegen innerlich und äusserlich das Kunsteis zu verwenden, das durch Verdunstung von comprimirtem Ammoniak aus destillirtem Wasser bereitet wird. Dies Eis enthält im Mittel 0—10 Keime pro 1 ccm. Das destillierte Wasser führt zwar auch oft Massen von sog. Wasserbakterien, aber diese scheinen eben zu den leicht durch Gefrieren zu schädigenden Arten zu gehören.

Die künstlichen kohlensauen Wässer sind im Durchschnitt sehr reich an Bakterien; selbst 7 Monate langes Lagern ändert daran nichts. Auch bei solchem Selterwasser, das aus destillirtem Wasser bereitet wurde, ist der Bakteriengehalt ein sehr hoher. Dagegen ist die Mannichfaltigkeit der Arten in mit Brunnenwasser bereitetem Selterwasser weit grösser; und hier ist ebenfalls die Gefahr einer Infektion ungleich bedeutender. Im destillirten Wasser ist nur auf indifferente saprophytische Bakterien zu rechnen, während in Brunnenwasser ebensowohl in Form des Selterwassers, wie im natürlichen Zustand zu Infektionen Anlass geben kann.

Absichtlicher Zusatz pathogener Keime zu künstlichem Selterwasser hat ergeben, dass zwar einige Arten (Cholera-, Milzbrandbacillen) rasch absterben, dass aber z. B. Typhusbacillen, *Microc. tetragenus* u. s. w. einige Tage bis Wochen lebensfähig bleiben. Mit Rücksicht auf diese Resultate ist unbedingt nur das aus destillirtem Wasser oder aus völlig unverdächtigem Brunnenleitungswasser bereitete Selterwasser zu empfehlen.

Literatur: LOEFFLER, OSTEN und SENDTNER, Die Wasserversorgung in VYLY's Handb. d. Hygiene, 1896. — TIEMANN und GÄRTNER, Die chem. u. mikrosk. bakteriol. Untersuchung des Wassers, 1896. — PLAGGE u. PROSKAUER, Zeitschr. f. Hyg., Bd. 2. — FRÄNKEL, ibid. Bd. 6. — KOCH, Wasserfiltration u. Cholera, Zeitschr. f. Hyg., Bd. 14. — OHLMÜLLER, Die Untersuchung des Wassers, Berlin 1894. — BRIX, „Wasserversorgung“ in BEHRING's „Bekämpfung der Infektionskrankheiten“, hygienischer Theil, 1894. — KRUZE, Kritische u. experimentelle Beiträge zur hygienischen Beurtheilung des Wassers. Zeitschr. f. Hyg. u. Inf., Bd. 17. — PIEPKKE, Ueber die Betriebsführung von Sandfiltern, ibid. Bd. 16. — FLÜGGE, Verh. d. Ver. f. öffentl. Ges. in Stuttgart, 1895. — Zeitschr. Hyg., Bd. 22.

Sechstes Kapitel.

Ernährung und Nahrungsmittel.

Die Aufgaben des folgenden Abschnitts umfassen erstens die Erörterung des Nährstoffbedarfs des Menschen und dessen Deckung durch Nahrungsmittel; und zwar ist dabei zunächst die Bedeutung der einzelnen Nährstoffe, dann der quantitative Bedarf, und schliesslich die Auswahl und Zusammensetzung einer rationellen Kost zu erörtern. Zweitens sind die Eigenschaften der einzelnen Nahrungsmittel und die hygienischen Nachtheile, welche aus einer abnormen Beschaffenheit, aus Verunreinigungen und Verfälschungen derselben hervorgehen können, zu besprechen.

A. Die Deckung des Nährstoffbedarfs des Menschen.

I. Die Bedeutung der einzelnen Nährstoffe.

Der Zweck der Ernährung ist eine solche Erhaltung (unter Umständen, z. B. beim wachsenden Körper, eine solche Zunahme) des substantiellen Bestandes der gesammten Organe, dass deren Funktionen stets in normaler Weise vor sich gehen. Dieser Zweck ist ohne Zufuhr von Nahrung offenbar nicht zu erreichen, da der Körper einerseits stetig Stoffe zerstört, die seinem Zellbestande angehörten, andererseits für seine Kraft- und Wärmeentwicklung fortwährend Stoffe verbraucht. Der Verbrauch zum Zwecke des Kraftwechsels übertrifft den zum Stoffersatz nöthigen Verbrauch bei weitem. Da es für den Kraftwechsel nicht specifischer Stoffe, sondern nur der in den Stoffen aufgespeicherten chemischen Spannkraft bedarf, so ist es selbstverständlich, dass die einzelnen Nährstoffe in ihrer Fähigkeit das Leben zu unterhalten, sich wesentlich nur nach dem Maasse ihrer chemischen Spannkraft resp. ihrer Verbrennungswärme im Körper vertreten. Diese Verbrennungswärme beträgt unter den im Organismus vorliegenden Verhältnissen (die für das Eiweiss nur eine unvollständige Verbrennung ermöglichen) im Durchschnitt

für 1 g Eiweiss . . .	4.1	Calorien
„ 1 g Fett . . .	9.3	„
„ 1 g Kohlehydrat . .	4.1	„

10 g Fett sind also ungefähr gleichwerthig 227 g trockenem Eiweiss oder Kohlehydrat, bzw. gleich 1000 g frischer Muskelsubstanz (BURNER).

Daneben ist auch der kleine Theil von Nahrungsstoffen, welcher im Stoffwechsel, dem Ersatz resp. Ansatz von Körperstoffen dient, von grosser Bedeutung. In dieser Beziehung können die einzelnen Nährstoffe sich nicht beliebig vertreten, sondern jeder Stoff hat seine spezifische Bedeutung, die ihn zum nothwendigen Bestandtheil der Ernährung macht.

In jeder zureichenden Kost finden wir Eiweissstoffe, Fette, Kohlehydrate, Wasser und Salze, und ausserdem noch eine Gruppe von Substanzen, welche als „Genussmittel“ zusammengefasst werden. Aber die Bedeutung dieser einzelnen Stoffe für die Ernährung ist folgendes hervorzuheben:

1. Die Eiweissstoffe.

Die Grösse des Eiweisszerfalls im Körper ist abhängig:

1) von der Masse der Organe und Säfte; je grösser dieselbe ist, um so mehr wird cet. par. zerlegt. Für die Einheit Körpergewicht rechnen zeigen dagegen die kleineren Individuen, bei welchen das Verhältniss der Körperoberfläche zum Körpervolum grösser ist, den bedeutenderen Umsatz.

2) von der Energie der Zellen. Wie schon die Zellen der verschiedenen Organe nicht gleichwerthig sind, so liegen vermuthlich auch individuelle Differenzen vor. Ferner können bei demselben Individuum Ernährungszustand, Nervenreize der verschiedensten Art, psychische Reize die Zellthätigkeit verschieben.

3) von der Menge des in der Nahrung zugeführten Eiweissmaterials. Je grösser diese wird, um so mehr Eiweiss wird zerstört. Die Menge des in der Nahrung gegebenen und in die Säfte aufgenommenen Eiweisses ist also auf den Eiweissumsatz im Körper von bestimmtem Einfluss. — Am ausgesprochensten tritt dies an Versuchstieren hervor, welche ausschliesslich mit Eiweiss genährt werden. Befindet sich ein solches Versuchsthier z. B. mit täglich 500 g Fleisch im Stickstoffgleichgewicht, d. h. scheidet es im Harn 17 g N (100 g Fleisch = 3.4 g N) aus, und man füttert nunmehr täglich 1500 oder 2500 g Fleisch, so ist nach kurzer Zeit wieder N-Gleichgewicht eingetreten und das Thier scheidet 51 resp. 85 g N im Harn aus. Es ergibt sich hieraus die wichtige Folgerung, dass es nicht, oder doch nur bei reichlicher Eiweisszufuhr gelingt, in einem an Eiweiss verarmten

Körper Eiweiss durch ausschliessliche Ernährung mit Eiweiss zur Ablagerung zu bringen.

4) von den sonstigen in den Körpersäften vorhandenen Nährstoffen. Passiren Fett oder Kohlehydrate neben Eiweiss die Zellen, so werden sofort die Zerfallsbedingungen in der Weise verschoben, dass viel weniger Eiweiss zerstört wird. Giebt man in dem vorerwähnten Experiment dem Versuchsthier statt 1500 g Fleisch 1000 g Fleisch und 300 g Fett, so wird nun bei weitem nicht der ganze dem Nahrungseiweiss entsprechende N im Harn ausgeschieden, sondern es bleibt ein Theil des Eiweisses unzerstört im Körper zurück, wird abgelagert. Um den Eiweissvorrath des Körpers zu conserviren oder Eiweissansatz zu erzielen, ist es daher am zweckmässigsten, Fett oder Kohlehydrate zu geben und dadurch die Eiweisszerlegung zu beschränken (Vorr).

Das unter dem Einfluss der aufgezählten Faktoren in stärkerem oder geringerem Grade zerstörte Eiweiss muss in voller Menge durch Nahrungseiweiss ersetzt werden: in erster Linie zur Erhaltung des Eiweissbestandes und zur Regeneration der Muskeln, des Hämoglobins u. s. w.; ausserdem weil die Zerfallsprodukte des Eiweisstoffwechsels bestimmte Reize für unser Centralnervensystem liefern, und weil bei Eiweissmangel sehr bald die Verdauungsfermente spärlicher gebildet werden.

Ist einmal der Ersatz für das zerstörte Eiweiss ungenügend, so bietet die oben betonte Abhängigkeit des Eiweissumsatzes von der Menge der zirkulirenden Eiweissstoffe wesentliche Vortheile. Nur am 1. Tage einer Hungerperiode wird noch eine N-Menge ausgeschieden, welche derjenigen der vorausgegangenen Nahrungstage ungefähr gleichkommt. Von da ab aber geht mit der Verringerung des Eiweissvorraths auch eine stete Verringerung des Umsatzes einher, so dass die Eiweissverarmung nur langsam erfolgt. Erst dann, wenn durch andere die Zerlegung beeinflussende Momente — z. B. psychische Erregung, Fieber u. s. w. — der Umsatz hinsichtlich hochgehalten wird, kommt es zu rascherem und stärkerem Eiweissverlust.

Unmöglich gelingt es aber auch nicht leicht, einem an Eiweiss verarmten Körper wieder einen besseren Eiweissbestand zu verschaffen. Mit einer vermehrten Eiweisszufuhr hält die Zerlegung immer wieder gleicher Schritt, und erst eine richtige Combination von Eiweiss, Fett und Kohlehydrate vermag eine Besserung des Körperzustandes herbeizuführen (s. S. 245).

Das im Körper vorhandene Eiweiss kann nur auf einem Wege ersetzt werden, und zwar durch Zufuhr von Eiweiss in der Nahrung. Eine Bildung von Eiweiss aus anderen Nährmaterial, wie sie die Pflanzen in gewissen Umfange bewirken, vermag der Körper nicht zu leisten.

Ausser den echten Eiweisskörpern kommen in der Nahrung noch andere N-haltige Stoffe vor, welche nicht vollwerthige Eiweisskörper darstellen, und auch für die Ernährung nicht die gleiche Bedeutung haben wie diese. Es sind dies die leimgebenden Substanzen, Glutin und Chondrin, ferner Albumosen, Pepton, Nuclein, Lecithin, Kreatin, Asparagin und andere Amidverbindungen.

Nur die Albumosen scheinen das Eiweiss voll ersetzen zu können. — Was den Leim betrifft, so ist derselbe chemisch insofern von den Eiweisskörpern verschieden, als in ihm die aromatische Gruppe fehlt, die bei gewisser Zerlegung von Eiweiss zum Auftreten von Tyrosin führt. Früher wurde er gleichwohl für besonders nahrhaft und dem Eiweiss sogar an Nährstoffwerth überlegen betrachtet. Durch Vorr's Versuche ist indess ermittelt, dass allerdings ein grosser Theil der im Körper zerstörten Eiweissmenge durch Leim ersetzt werden kann; der in der Nahrung genossene Leim übt eine Eiweiss sparende Wirkung aus, der Art, dass 100 g Leim circa 36 g Eiweiss vor dem Zerfall schützen. Aber wenn auch die Leimzufuhr beliebig gesteigert wird, so ist es doch nicht möglich, ganz ohne Eiweisszufuhr auszukommen. Fortwährend wird vielmehr ein kleines Plus von N ausgeschieden, das muthmaasslich dem organisirten Eiweiss entstammt, und diesen Theil des Eiweissumsatzes vermag man daher mit Leim nicht zu decken. — Auch die Peptone haben nach Vorr's Versuchen eine ähnliche Bedeutung wie der Leim. In der vollen, zusammengesetzten Nahrung können wir freilich Leim und Pepton als dem Eiweiss gleichwerthig betrachten, weil dann immer so viel Eiweiss, als neben Leim und Pepton eingeführt werden muss, in der Nahrung enthalten zu sein pflegt.

Die Nucleine, die z. B. in den Zellkernen enthalten sind, können nicht als Nährstoffe angesehen werden, da sie nicht unverändert resorbirt werden. Die Lecithine, im Eidotter, Gehirn in grösserer Menge enthalten und sehr verbreitet, werden vom Pankreassaft in Neurin, Glycerinphosphorsäure und Stearinsäure zerlegt, und haben ebenfalls keine den Eiweissstoffen, sondern höchstens eine den Fetten ähnliche nährnde Wirkung. Die Amidverbindungen äussern beim Menschen durchaus keine sparende Wirkung auf den Eiweissumsatz; nur für Pflanzenfresser wird eine dem Leim analoge Rolle des Asparagins behauptet.

2. Die Fette.

Das Fett wird im Gegensatz zu den Eiweissstoffen im Körper sehr schwer zerlegt, für gewöhnlich nur in einer Menge von 50—100 g. Wird mehr Fett aufgenommen, so wird der Rest in den Depots abgelagert; es hat also die Vermehrung des Fettes keinen den Umsatz steigernden Einfluss. Dagegen werden bei Muskelarbeit ausserordentlich viel grössere Fettmengen zerstört als bei Ruhe. Die Steigerung der Fettzerlegung kann das 3—4 fache betragen, und je grösser die Arbeitsleistung, um so mehr Fett wird zerstört. Die Leistungen des Fettes bei seiner Zerlegung bestehen: 1) darin, dass es bedeutende Mengen von Wärme erzeugt; 2) wird der Eiweisszerfall wesentlich verringert, wenn Fett neben Eiweiss im Säftestrom circulirt. Wird allerdings bei wenig Eiweiss reichlich Fett in der Nahrung gegeben, so tritt die ersparende Wirkung nicht deutlich hervor. — Von grosser Bedeutung

ist die sparende Wirkung des Fettes in den Fällen, wo die Nahrungszufuhr wegen Krankheit u. s. w. stark absinkt oder aufhört. Es werden dann stets die Fettdepots des Körpers in beträchtlichem Grade angegriffen, und die Zerstörung der Eiweissstoffe wird bedeutend herabgesetzt. Die Verbrennungswärme des in einem Gesunden abgelagerten Fettes beträgt 3 mal so viel, als die Verbrennungswärme des gesammten Zelleiweisses und des leimgebenden Gewebes zusammengenommen (RUBNER).

Das im Körper zerstörte Fett ist durch Fett der Nahrung zu ersetzen. Es eignen sich dazu die Fette sowohl der thierischen, wie auch der pflanzlichen Nahrungsmittel. Dabei ist nur zu beachten, dass lediglich solche Fette einer Resorption und einer Zerlegung im Körper fähig sind, welche unter 40° flüssig sind; Stearin z. B. ist vollkommen unverdaulich.

Es besteht indess auch die Möglichkeit, das Fett aus Kohlehydraten im Körper zu bilden, wenn letztere in überreichlicher Menge gegeben werden. Indess stösst die dauernde Resorption solcher Kohlehydratmengen auf erhebliche Schwierigkeiten.

Sehr gut geeignet zur Vertretung des Fettes sind die Fettsäuren, die einen so grossen Procentsatz im Fettmolekül ausmachen, dass sie ungefähr die gleiche ersparende Wirkung ausüben, wie die Fette selbst. Das Glycerin dagegen hat keinerlei Einfluss, weder auf den Eiweiss-, noch auf den Fettmangel.

3. Die Kohlehydrate.

Mit Eiweiss und Fett sollte der Mensch eigentlich seinen Nahrungsbedarf vollständig decken können; indessen gelingt dies schwer, weil die Grenzen für Resorption der Fette beim Menschen relativ eng gezogen sind. Wir sehen daher, dass in der Nahrung noch ein anderer stickstofffreier Bestandtheil in ausserordentlich grossen Mengen genossen wird, nämlich die Kohlehydrate (Glykosen von der Formel $C_6H_{12}O_6$, resp. Anhydride derselben). Merkwürdigerweise finden wir aber im Körper stetig nur Spuren von Kohlehydraten, kleine Mengen von Glykogen, die gegenüber den 4—500 g genossener Kohlehydrate völlig verschwinden. Es erklärt sich dies dadurch, dass die Kohlehydrate unter allen Umständen bei Ruhe und Arbeit rasch und vollständig im Körper zerfallen und zu den Endprodukten Kohlensäure und Wasser verbrannt werden. Sie werden also nie zu bleibender Körpersubstanz umgewandelt, ausgenommen wenn bei sehr grossen Gaben ein Theil zur Fettbildung verwandt wird.

Bei ihrer völligen und schnellen Verbrennung liefern dann die Kohlehydrate 1) erhebliche Mengen Wärme; 2) äussern sie eine den

msatz herabsetzende Wirkung, und zwar unter allen Umständen, ob viel oder wenig Eiweiss in den Säften circulirt, also voll-
er als die Fette; 3) bewirken die Kohlehydrate eine geringere
ng des Fettes, und führen häufig eine Ablagerung von Fett
er herbei; 4) können die Kohlehydrate selbst eine Umwandlung
erfett erfahren.

Deckung des Kohlehydratbedarfs geschieht durch die Kohle-
der Nahrung, durch Rohr- und Milchzucker, hauptsächlich
roh Stärke, die allmählich und langsam im Darm in resor-
Zucker übergeht und also gleichsam ein nachhaltiges Reservoir
, aus welchem der Körper für lange Zeit fortgesetzt kleinere
von Kohlehydraten in den Säftestrom überführt.

4. Das Wasser.

Wasser bildet einen wesentlichen Bestandtheil der Organe
te; es ist als Lösungsmittel und zum Transport der löslichen
en von grosser Bedeutung; es theiligt sich an der Wärme-
ig des Körpers.

er ist fast stets voller Ersatz der ausgeschiedenen Wasser-
rforderlich, und dieser erfolgt vorzugsweise durch Zufuhr von
kann aber auch durch Zufuhr verbrennbaren Wasserstoffs
drate u. s. w.) geschehen. Manche Thiere (Pflanzenfresser) kommen
der letzteren Art von Zufuhr und ohne Wassergenuss längere
. Für den Menschen ist indess präformirtes Wasser in einer
von 1—2 Liter und mehr erforderlich.

e abnorme Verminderung der Wasserzufuhr kommt bei frei-
r Nahrungsaufnahme kaum vor; dagegen kann sehr leicht ein
ass von Wasser eingeführt werden.

übergehende Erhöhung der Wasserzufuhr bewirkt dann zu-
ine vermehrte Stickstoffausscheidung, die indess wesentlich auf
ng angesammelter Exkrete beruht. Anhaltende abnorm starke
zufuhr hat insofern gewisse Nachtheile im Gefolge, als leicht
ke Verdünnung der Verdauungssäfte und nach Angabe einiger
ter eine Ueberbürdung des Pfortaderkreislaufs entsteht, welche
allgemeinen Verhältnisse des Blutdrucks zurückwirkt. Ferner
bei den circulatorischen Apparaten übermässige Arbeit zuge-
und die Zellfunktionen scheinen weniger energisch vor sich zu
Allerdings verfügt der Körper über gute regulatorische Vor-
en, und der völlig gesunde Körper kann daher auch den Genuss
Flüssigkeitsmengen lange Zeit ohne Schaden ertragen. Aber

wenn geringe Abnormitäten, Herzschwäche, Verdauungsstörungen, Anämie u. s. w. bereits vorliegen, sollte unnöthige Wasserzufuhr vermieden werden.

5. Die Salze.

Werden die ausgeschiedenen Salze des Körpers nicht ausreichend ersetzt, so giebt derselbe zunächst eine Zeit lang aus seinem Bestande her; bei andauernd salzärmer Nahrung treten eigenthümliche nervöse Erscheinungen und schliesslich der Tod ein. Derartige Folgen beobachtet man aber nur bei Ernährung mit künstlich salzfrei gemachter Nahrung; in der üblichen gemischten Kost sind die nöthigen Salzmenngen gewöhnlich vollauf enthalten, während eine einseitige Ernährung z. B. mit animalischer Kost und Mehlpräparaten Defekte in der Blutbildung zur Folge zu haben scheint. Vermuthlich sind die grünen Gemüse als Lieferanten der dem Körper nöthigen Salze von besonderer Bedeutung.

Beim Hund kommt es durch ausschliessliche Fleischnahrung zu einem Kalkdeficit und damit zu rachitischen Erscheinungen. — Bei ausschliesslicher Pflanzennahrung entsteht ferner ein Kochsalzdeficit, indem die Kalisalze der Vegetabilien sich mit dem Kochsalz des Körpers umsetzen; es werden Natriumphosphat und Kaliumchlorid gebildet, und es kommt so eine fortgesetzte Verarmung an ClNa zu Stande. — Ein Mangel an Kalisalzen in Folge ausschliesslich animalischer Kost soll Skorbut hervorrufen; doch ist dies unwahrscheinlich, da auch bei vorwiegender Pflanzenkost (Gefangene) oft Skorbut beobachtet wird; in beiden Fällen fehlt es wohl eher an grünen Gemüsen.

Sehr empfindlich scheint endlich der Körper gegen eine zu geringe Zufuhr von Eisen zu sein. Man nimmt an, dass das Eisen aus der Nahrung in organischen, den Nucleinen ähnlichen Verbindungen resorbirt wird, von denen im Ganzen nur sehr kleine Mengen für den Körper erforderlich sind. Auch das Eisen ist vorzugsweise in den grünen Gemüsen (Spinat, Bohnen u. s. w.) enthalten.

6. Die Genuss- und Reizmittel.

Eine aus reinem Eiweiss, Fett, Kohlehydraten, Wasser und Salzen zusammengesetzte Nahrung würde immer in einem wesentlichen Punkte noch einer Ergänzung bedürfen: sie würde nur mit Widerstreben genossen werden, so lange nicht eine Gruppe von Stoffen vertreten ist, die wir regelmässig in der Nahrung aller Völker beobachten, nämlich die sogenannten „Genussmittel“. Theils versteht man unter dieser Bezeichnung die in der Nahrung enthaltenen oder ihr zugesetzten schmeckenden Stoffe (die schmeckenden Stoffe des gebratenen Fleisches; das Aroma der Früchte; organische Säuren, wie Weinsäure, Citronensäure; auch den Zucker; ferner die sog. Würzmittel, wie Salz, Pfeffer, Senf u. s. w.); theils Substanzen, welche weniger wegen ihres Geschmacks,

vielmehr wegen ihrer anregenden Wirkung auf das Nervensystem nossen werden, also mehr als Reizmittel fungiren (Thee, Kaffee, Alkohol, Tabak).

Früher hat man manchen dieser Substanzen einen nährenden oder Zersetzung von Nährstoffen ersparenden Effekt zugeschrieben. Diese Ansicht ist jedoch als unrichtig erwiesen; kleinere Dosen haben (abgesehen von Zucker) keinerlei stoffliche Wirkung; grössere Gaben von Thee, Kaffee u. s. w. führen eher zu einer Steigerung des Eiweissumsatzes, während allerdings für den Alkohol eine Eiweiss sparende Wirkung abgewiesen ist.

Sodann hat man sich wohl vorgestellt, dass wenigstens die Ausnutzung der Nahrung im Darm wesentlich durch den Zusatz der Genuss- und Reizmittel beeinflusst werde. Auch das hat sich nicht bestätigt. In Thieren und Menschen wird eine geschmacklose oder gar widerliche, mit Ekel genossene Nahrung trotzdem gut ausgenutzt.

Die Bedeutung der Genussmittel liegt vielmehr darin, dass sie zunächst zur Aufnahme von Nahrung anregen. Selbst Versuchsthiere weisen eine künstlich geschmacklos gemachte Kost hartnäckig zurück, auch wenn ihnen keine andere Nahrung geboten wird. Der Mensch ist insofern weit empfindlicher, als gewisse Aeusserlichkeiten, ein fremdes Aussehen, ein ungewohnter Geruch, ein unappetitliches Arrangement bereits die Aufnahme der Nahrung hindern; ferner stumpft er sich gegen die gleichen Geschmacksreize ausserordentlich leicht ab und verlangt eine häufige Abwechslung derselben. In den Gefängnissen ist nichts mehr gefürchtet als das ewige Einerlei der breiigen Consistenz der Kost und des Hülsenfruchtaromas; und sehr häufig beobachtet man dort den Zustand der „Abgegessenheit“, in welchem die gleiche Nahrung hartnäckig verweigert wird, die vor Wochen oder Monaten gern genossen wurde. Dieser zwingende Einfluss der Geschmacksreize auf die Nahrungsaufnahme ist in früherer Zeit viel zu wenig gewürdigt worden.

Zweitens äussern viele unter den Genuss- und Reizmitteln eine günstige Wirkung auf die Verdauungsorgane, regen (wie z. B. kleine Dosen Alkohol, Nicotin u. a. m.) Magen- und Darmbewegung an oder fördern (wie Zusatz von Kochsalz, Pfeffer, Senf) die Sekretion der Verdauungssäfte. Dazu äussern noch manche dieser Substanzen eine stimmende und regulirende Wirkung auf das Bakterienleben im Darm; besonders die ätherischen Oele, Senföl, in geringerem Grade auch Alkohol, Kaffee u. s. w. sind geradezu Desinficientien und können daher sehr wohl die Zersetzungen im Speisebrei und den Resorptionsverhältnisse beeinflussen. — Ist also auch die schliessliche Ausnutzung einer Kost mit und ohne Reizmittel ziemlich die gleiche, so treten doch im

letzten Falle leicht allerlei Störungen der Verdauung auf, welche in der Folge die Nahrungsaufnahme herabsetzen; und es ist eben Aufgabe der genannten, je nach Bedarf abzustufenden Reizmittel, die Verdauung so zu leiten, dass sie ohne alle Belästigung abläuft und die weitere Nahrungszufuhr nicht beeinträchtigt.

Drittens sind dann die eigentlichen Reizmittel noch dadurch wichtig, dass sie die Empfindung ungenügender Ernährung und Leistungsfähigkeit verdecken. Ihre die Nerven anregende, den Blutdruck und die Energie steigernde Wirkung steht mit psychischen Eindrücken, begeisternden Ideen u. s. w. auf einer Stufe. In unserer Zeit regen Schaffens und Strebens sind derartige Reizmittel, welche ohne Schlaf oder störende Nahrungsaufnahme die Leistungsfähigkeit des ermüdeten Körpers wieder herstellen, von grosser Bedeutung. Zweckmässig werden dabei nur solche Mittel verwendet, welche von störenden Neben- und Nachwirkungen möglichst frei sind, und eine feine, dem jeweiligen Bedarf angepasste Abstufung gestatten.

Haben somit die Genuss- und Reizmittel unleugbar eine grosse und vielseitige Bedeutung für die Ernährung, so ist doch andererseits ein Maasshalten in ihrem Gebrauch auf's dringendste indicirt. Vor allem ist beim Gebrauch der Reizmittel darauf zu achten, dass nicht etwa Gewöhnung an kleine Dosen eintritt, welche zur Anwendung stetig grösserer verleitet; ferner dass, wenn der Körper durch Reizmittel über das Nahrungsbedürfniss weggetäuscht wurde, die Nahrungszufuhr in vollem Maasse nachgeholt wird. Andernfalls ist eine schnelle und schwer reparable Verschlechterung des Ernährungszustandes unausbleiblich.

Zu schweren Folgen führt insbesondere der Alkoholmissbrauch. Derselbe ruft Erkrankungen des Herzens, der Leber, der Nieren und des Centralnervensystems hervor, so dass Alkoholiker eine erheblich grössere Mortalität zeigen als solche Menschen, die nur wenig Alkohol geniessen oder sich des Alkoholgenusses völlig enthalten (Temperenzler, Abstinenzler). Ausserdem hebt der Alkoholgenuss bei vielen Menschen die sittliche Selbstbeschränkung auf; leichtsinnige Handlungen, Rohheiten, Vergehen und Verbrechen sind sehr oft auf Alkoholrausch zurückzuführen.

Eine Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs muss erfolgen theils durch repressives Eingreifen (Controle der Schankstätten, Beschränkungen für die Gewohnheitstrinker, Trinkerasylo u. s. w.), theils durch präventive Maassregeln. Bei der Auswahl der letzteren darf man nicht vergessen, dass in den unteren Volksschichten in Folge fortgesetzter Unterernährung ein mächtiger Trieb nach Reizmitteln vorhanden ist, und dass der Be-

g andere weniger schädliche Reizmittel, Kaffee, Thee u. s. w., sogar unter Beigabe kleiner Alkoholmengen, in bequemer und für billigsten Preis dargeboten werden müssen, wenn der gegen Alkoholmissbrauch erfolgreich sein soll. Zahlreichste und öffentliche oder privaten Mitteln unterstützte Kaffee- und Thee sind am besten im Stande, dem Schankstättenunwesen Abbruch zu thun. In Verfolgung ferner liegender Ziele ist die Besserung der Ernährung und der Wohnung der arbeitenden Bevölkerung, sowie die gesamte sociale Hebung anzustreben, aus der sich ohne weiteres die Beschränkung des Alkoholmissbrauchs ergeben wird.

II. Quantitative Verhältnisse des Nährstoffbedarfs.

Ermittlung der erforderlichen Nährstoffmengen dienen folgende

Untersuchungen im Respirationsapparat und Stickstoffbestimmungen im Harn bei einzelnen gesunden Menschen. Da aber richtige Ergebnisse nur dann erhalten werden, wenn grosse Beobachtungsreihen zu Grunde liegen, so geben die folgenden Methoden bessere Aufschlüsse.

Ausgehend von der Erwägung, dass das Menschengeschlecht durch In- und Exhalation die uralte Tradition im grossen Ganzen eine richtige Zusammensetzung der Nahrung gefunden hat, können wir aus der Kost frei lebender gesunder Menschen die nothwendige Menge und das richtige Mischungsverhältniss der Nahrung entnehmen. Man erhält um so brauchbarere Zahlen, je zahlreichere Untersuchungen ausgeführt werden. Das Verfahren besteht darin, dass stets genossenen gleichen Portion der Nahrung in's Laboratorium geschafft wird, einer genauen Analyse unterworfen wird. Womöglich ist die Stickstoffmenge im 24stündigen Harn zuzufügen, damit man sich von dem Ernährungszustand des Körpers der untersuchten Individuen überzeugt. Ist die Menge der erfahrungsgemäss nicht resorbirten Nährstoffe zu ermitteln. — Bei zahlreichen Arbeitern, Aerzten u. s. w. sind in dieser Hinsicht Untersuchungen angestellt.

Mit Hilfe sorgfältig geführter Haushaltungsbücher, wie sie sich in Familien, in öffentlichen Anstalten, beim Militär u. s. w. vorfinden, lassen sich die gewünschten Bedarfszahlen durch einfache Berechnung finden. Statistisch festgestellte, in einem ganzen Lande verzehrte Menge bestimmter Nahrungsmittel gestattet derartige Berechnungen. Aus den Haushaltungsbüchern ist die pro Monat (Jahr) eingekaufte und verwendete Menge der einzelnen rohen Nahrungsmittel festzustellen. Von diesen sind in Abzug zu bringen die Abfälle, und zwar ist zu rechnen bei:

h 16 % Abfall	Fische 25 % Abfall
fisch 11 % „	Kartoffeln 40 % „
h 13,5 % „	Weiss- und Rothkohl . 23 % „
fisch 10,5 % „	Kohlrüben 33 % „
1 Mittel . . . 13 % „	Mohrrüben 30 % „
den Lieferungsverträgen kom-	Kohlrabi 28 % „
merke Schwankungen vor; daher	
lich besonders zu controliren.)	

Die übrig bleibenden Nahrungsmittel gelten als verzehrt. Für diese ist nach der Tab. S. 251 die Menge der physiologisch verwertbaren Calorien; oder nach S. 252 die consumirte Menge von Eiweiss, Fett und Kohlehydraten zu berechnen, dabei aber der nicht resorbirbare Antheil von Eiweiss und Kohlehydraten nach der Tab. S. 247 in Abzug zu bringen.

Man erhält so die Summe der verzehrten verdaulichen Mengen an Calorien, Eiweiss, Fett und Kohlehydraten, und mittelst Division durch die Kopfsahl die pro Kopf und Monat (resp. nach Division durch die Zahl der Tage die pro Kopf und Tag) entfallende Ration an Nährstoffen.

Aus den nach vorstehenden Methoden angestellten Untersuchungen haben sich bestimmte Mittelzahlen für den Bedarf des Körpers ergeben, der verschieden ausfällt, wenn nur der Bestand erhalten, oder wenn Ansatz von Eiweiss oder Fett, oder aber Verlust von Fett erzielt werden soll.

1. Erhaltung des Körperbestandes (Erhaltungskostmaass)

Die Mittelzahl für den 24stündigen Nährstoffbedarf erwachsener Männer ist, sofern nur der Gesamt-Kraftwechsel in Frage kommt, = 3000 Calorien; und unter Berücksichtigung der Vertheilung auf die verschiedenen Nährstoffe:

105 g verdauliches Eiweiss, 56 g Fett, 500 g Kohlehydrate (Vorr).

Diese Zahlen unterliegen durch den Einfluss verschiedener Momente erheblichen Schwankungen:

1) durch die Körpergrösse, oder genauer den Umfang der thätigen Muskel- und Drüsenzellen. Dieselbe ist von grosser Bedeutung; oft treten bei der Vergleichung ganzer Völker oder Bevölkerungsklassen ausgeprägte Differenzen hervor, z. B. sind durchschnittlich bei den kleineren und schwächlichen sächsischen, italienischen, japanischen Arbeitern wesentlich niedrigere Zahlen beobachtet als bei dem grösseren und kräftigeren oberbaierischen Arbeiter. Im Mittel sind 40—50 Calorien pro Kilo Körpergewicht zu rechnen. — Zu beachten ist andererseits, dass die Wärmebildung bei verschieden grossen Individuen von der Oberflächenentwicklung abhängt, so zwar, dass je kleiner ein Thier ist, um so grösser die auf 1 Kilo Körpergewicht treffende Oberfläche und um so grösser auch die pro Kilo Körpergewicht gebildete Wärme ist.

2) durch die individuelle Energie und Reizbarkeit. Lebhaft, leicht erregte, immer geistig thätige Menschen bedürfen grösserer Nahrungsmengen zur Erhaltung ihres Körperbestandes als trägere Temperamente. Auch derartige Gegensätze finden sich oft bei ganzen Völkerrassen ausgeprägt (Yankees und Kreolen).

3) durch die Arbeitsleistung. Bei der Arbeitsleistung wird erheblich mehr Wärme gebildet unter Steigerung der Zerlegung von

tt und Kohlehydraten. Es sind also dem Arbeitenden mehr Fett und Kohlehydrate in der Nahrung zuzuführen. Einseitige Steigerung der Kohlehydrate belästigt leicht die Verdauungsorgane; daher ist jedenfalls ein Theil des Kohlenstoffs in Form von Nahrungsfett zuzuführen. — Bei andauernder angestrenzter Arbeit ist aber nicht minder eine Erhöhung der Eiweisszufuhr nothwendig, weil dann die arbeitenden Zellen verhältnissmässig grossen Umfang haben und sich stark abnutzen, und weil auch ein starker Eiweissgehalt der Säfte für die Unterhaltung der energischen Leistung förderlich zu sein scheint.

4) durch das Lebensalter. Mit dem Alter pflegt der Stoffumsatz zu nehmen; jedoch tritt dieser Zeitpunkt oft sehr spät ein, und bei Abnahme der geistigen Regsamkeit vermindert sich auch der Nahrungsbedarf nur wenig. — Ueber den Bedarf des kindlichen und wachsenden Körpers s. unten.

5) Das Geschlecht. Frauen haben im Allgemeinen, entsprechend ihrem kleineren Körper und der geringeren Arbeitsleistung geringeren Nährstoffbedarf. Bei alten sich ruhig verhaltenden Frauen (Spittelwohnerinnen) finden wir das niedrigste Kostmaass, das überhaupt zur Beobachtung gelangt.

6) Eine Ausnahme machen die Frauen zur Zeit der Gravidität und namentlich zur Zeit der Laktation. Während der Laktation ist in erster Linie reichliche Eiweisszufuhr nothwendig, weil bei einer Verkleinerung derselben die Sekretion der Milch rasch beeinträchtigt wird und Schrumpfen der Milchdrüse eintritt. Erhöhte Fett- und Kohlehydratzufuhr wirkt bei zu wenig Eiweiss in keiner Weise steigend auf die Milchsekretion.

7) Witterung und Klima. Je nach der Aussentemperatur variiert der Eiweisszerfall relativ wenig; dagegen wird die Wärmedeckung durch Kälte gesteigert (s. S. 98). Bei gleichbleibender Kost verlieren wir daher eigentlich im Sommer an Gewicht zu-, im Winter nehmen. Thatsächlich tritt indess in praxi häufig das Gegentheil ein, weil im Sommer der Appetit geringer ist, leichter Verdauungsstörungen auftreten, und weil reichlichere Bewegung im Freien zu starker Schweisssekretion und lebhafterer Fettzerlegung Anlass giebt.

Im Sommer und im heissen Klima ist der Kraftwechsel des arbeitenden der gleiche wie im kalten Klima. Für den Ruhenden steht bei mässiger Ernährung keine wesentliche Aenderung im körperlichen Verhalten, dagegen wird der Kraftwechsel in belästigender Weise steigert durch Uebernahrung, besonders durch Eiweissüberschuss.

Im kalten Klima ist energische Wärmeproduktion, ferner die Ablagerung einer gewissen Fettschicht im Körper, welche die Wärmeabgabe einschränkt, von Vortheil; sodann sind gewöhnlich ausgiebige willkürliche und unwillkürliche Bewegungen zu bestreiten. Für alle diese Zwecke ist reichlichste Nahrungszufuhr indicirt.

Für die wichtigsten Schwankungen im Erhaltungskostmaass ergibt sich sonach folgende Uebersicht:

	Calorien	Verd. Eiweiss	Fett	Kohle- hydrate
Kräftiger Mann, vorzugsweise ruhend	2400	105 g	50 g	4—500 g
Schwächlicher Mann, ruhend .	1800	75 „	40 „	3—400 „
Schwächlicher Mann, arbeitend	2400	75 „	60 „	4—500 „
Alte Frau, ruhend	1600	60 „	30 „	250 „
Kräftiger Mann, arbeitend . .	3000	122 „	75—100 g	4—500 „
Kräftiger Mann, stark arbeitend	4890	133 „	100—150 „	5—600 „
Frau zur Zeit der Laktation .	3300	130 „	100 g	450 „

Für Kranke und Reconvalescenten in Bettruhe sind pro Kilo Körpergewicht 20 Cal. zu rechnen.

2. Eiweiss-(Fleisch-)Ansatz beim Erwachsenen.

Ein Fleischansatz ist z. B. erforderlich bei Reconvalescenten, insbesondere nach fieberhaften Krankheiten, wo wir einen erheblich erhöhten Umsatz im Körper, eine gesteigerte Ausscheidung von Stickstoff, Kohlensäure, Salzen (namentlich Kalisalzen) und in Folge dessen rasche Abnahme des Körpergewichts beobachten. — Was zunächst die Ernährung während der Krankheit betrifft, so hegte man früher wohl die Befürchtung, dass durch Darreichung von Nahrung die Temperatur erhöht werde. Aus Stoffwechselversuchen weiss man aber, welch' enorme Mengen von Nahrungsstoffen zerlegt werden können, ohne dass die Körpertemperatur sich irgendwie ändert. Die Zufuhr von Nahrung ist daher für die Körpertemperatur relativ belanglos und erst wenn die regulatorischen Apparate nicht richtig funktionieren, kann, unbekümmert um die Nahrungszufuhr, Temperaturerhöhung eintreten. Insofern ist daher eine Aufnahme von Nahrung während des Fiebers nicht contraindicirt; wohl aber kommt es häufig vor, dass es im Magensaft an Salzsäure fehlt, dass der Darmtractus der Kranken sehr empfindlich ist und durch die Nahrungszufuhr gereizt wird. Mit Rücksicht hierauf wird man gewöhnlich nur ein geringes Quantum leicht verdaulicher Nahrung reichen können; so viel irgend statthaft ist, sollte

man aber zuführen, damit nicht eine zu rasche Verarmung des Körpers an Eiweiss und Fett eintritt.

In erster Linie sind in solchen Fällen Kohlehydrate indicirt, da durch diese der Eiweisszerfall in wirksamster Weise beschränkt und die Fettdepots des Körpers geschont werden. Fette sind als zu schwer verdaulich auszuschliessen; Eiweiss oder Pepton ist erst dann in geringer Menge zu geben, wenn bereits eine Zufuhr von Kohlehydraten besteht.

In der Reconvalescentz ist, so lange noch kein grösseres Nahrungsvolum aufgenommen werden kann, aus denselben Gründen das Hauptgewicht auf Kohlehydrate zu legen. In einer späteren Periode, wo bereits so viel genossen werden kann, dass der Gesamtbedarf des Körpers durch die Nahrung voll gedeckt ist, muss das Eiweiss über den Bedarf des Kraftwechsels hinaus gesteigert werden, um reichlichen Ansatz zu erzielen. Nahrungsfett ist in geringer Menge zu geben, da es leicht Widerwillen erregt. Die Vegetabilien, mit welchen der grösste Theil des Kohlehydratbedarfs gedeckt werden muss, liefern zugleich einen Ersatz der im Fieber vermehrt ausgeschiedenen Kalisalze.

Ein besonderer Fall einer auf Fleischansatz berechneten Ernährung liegt dann vor, wenn durch eine länger währende irrationelle Kost Eiweissverarmung des Körpers eingetreten und vorzugsweise Fett an Stelle der verlorenen Eiweissstoffe zur Ablagerung gekommen ist. Solche „aufgeschwemmte“ Individuen müssen vor Allem reichlich Eiweiss, daneben die gewöhnliche auch in der Ruhe zerstörte Fettmenge und relativ wenig Kohlehydrate (130—150 g Eiweiss, 50 g Fett, 300 g Kohlehydrate) erhalten. Um das Volum der Nahrung zu ergänzen und Sättigung zu erzielen, sind cellulosereiche Gemüse und Früchte zuzufügen. Ferner sind systematische Muskelbewegungen erforderlich, um das überschüssige Körperfett zu zerstören. Der Wassergenuss ist möglichst einzuschränken resp. wenigstens während der Mahlzeiten zu vermeiden. Die Insufficienz der Verdauungssäfte eiweissarmer Individuen macht es ausserdem oft nothwendig, dass nur leicht verdauliche Kost, eventuell unter Zufügung von Salzsäure und Pepsin, gereicht wird.

3. Fettansatz.

Eine stärkere Fettablagerung wird beim Menschen nicht angestrebt, da sie die Leistungsfähigkeit des Körpers hemmt und oft geradezu pathologisch wird. Wohl aber kommt es unabsichtlich nicht selten zu hochgradiger Obesität durch eine irrationelle Ernährung, und es ist wichtig zu wissen, welche Lebensweise den Fettansatz am meisten

befördert, damit eine solche vermieden werden kann. Im Allgemeinen gelingt die intensivste „Mästung“ durch genügende Eiweiss- und reichliche Fett- und Kohlehydratzufuhr neben möglicher Körperruhe. Ob Fett oder Kohlehydrate besser wirken, das hängt namentlich ab von der Leistungsfähigkeit der Verdauungsorgane. Bei Pflanzenfressern gelingt die Mästung lediglich mit Eiweiss und Kohlehydraten, wobei allerdings die Eiweissmenge gleichfalls etwas zu steigern ist. Beim Menschen zeigt die Combination von Fett und reichlich Kohlehydraten gewöhnlich den schnellsten Effekt (etwa 120 g Eiweiss, 100 g Fett, 500 g Kohlehydrate). Körperruhe ist eine der wesentlichsten Bedingungen zum Gelingen der Mästung. Ausserdem gehört aber auch eine gewisse individuelle Disposition, ein phlegmatisches Temperament, dazu, das sich bei Manchen erst im Alter einstellt.

4. Fettverlust.

Abgesehen von der Darreichung von Medicamenten, namentlich Laxantien, kann eine Entfettung des Körpers erzielt werden:

a) Durch forcirte Körperbewegung ohne gleichzeitige Steigerung der Nahrung; das Körperfett muss dann der Zerstörung anheimfallen. Der Fettsatz beginnt aber wieder, sobald die Bewegung vermindert oder die Nahrungszufuhr erhöht wird; letzteres geschieht um so leichter, als die forcirte Bewegung den Appetit lebhaft anzuregen pflegt.

b) Durch fast völliges Fortlassen des Fettes und der Kohlehydrate und fast ausschliessliche Ernährung mit Eiweiss (Bantingkur). Die Kost ist alsdann zur Deckung der Gesamtausgaben des Körpers unzureichend, daher wird das Fett des Körpers in den Zerfall einbezogen; durch reichliche Bewegung ist dieser Zerfall zu beschleunigen. Häufig wird bei einem derartigen Regime das Hungergefühl zu lästig; ferner entstehen leicht Verdauungsstörungen, und bei langer Fortsetzung der Kur, nachdem das Körperfett grösstentheils zerstört ist, kann eine nicht unbedenkliche Eiweissverarmung des Körpers sich ausbilden.

c) EBSTEIN's Methode, bei welcher eine sehr geringe Menge von Kohlehydraten, aber reichlich Fett und mässig Eiweiss gegeben wird. Die Gesamtmenge der Nahrung ist unzureichend; das Hungergefühl soll aber durch die reichlichen Fettmengen unterdrückt und die Kur somit für längere Zeit durchführbar werden. Bei Vielen erzeugen indess die grossen Fettgaben Widerwillen oder Verdauungsstörungen; und dann kommt es zu rascher Eiweissverarmung, die gerade bei fetten Individuen gefährlich ist. Für solche, die viel Fett consumiren und vertragen können, ist die Kur erfolgreich und ohne Beschwerden.

d) Am meisten empfiehlt sich eine Ernährungsweise, die im Princip von VOIT, ORTEL und SCHWENNINGER empfohlen wird und — mit gewissen Modificationen — in Folgendem besteht: Reichliche Eiweiss-, normale Fett-, zu niedrige Kohlehydratzufuhr; daneben starke Körperbewegung; die Wasseraufnahme soll beschränkt und zwischen die Mahlzeiten verlegt werden; um das Hungergefühl zu beschwichtigen, ist die Nahrung auf zahlreiche kleine Mahlzeiten zu vertheilen. Sehr empfehlenswerth ist es, Früchte, zarte Gemüse u. s. w., welche weiche Cellulose liefern und nicht nähren, aber sättigen, nach Bedarf zuzufügen. Allmählich ist die Kohlehydratmenge zu steigern, damit keinesfalls Eiweissverarmung des Körpers eintritt.

Sorgfältiges Individualisiren ist bei der Auswahl und Durchführung der Entfettungskuren durchaus erforderlich; bei fanatischem Festhalten an einem Schema kommen oft schwerere Ernährungsstörungen zu Stande.

Ueber den Bedarf des wachsenden Körpers s. unten im Kapitel „Die Ernährung des Kindes mit Milch und Milchsurrogaten“.

III. Die Auswahl der Nahrungsmittel zur Deckung des Nährstoffbedarfs.

An die tägliche Kost sind vom hygienischen Standpunkte aus zunächst die im Vorstehenden näher begründeten Anforderungen zu stellen, dass dieselbe die nöthigen Nährstoffe enthält, und dass sie genügende Geschmacksreize in entsprechender Abwechslung bietet.

Ausserdem ist aber des weiteren noch zu fordern:

- 1) dass die Nahrung gut ausnutzbar und leicht verdaulich sei;
- 2) dass sie wo möglich durch entsprechende Zubereitung verdaulicher und schmackhafter gemacht werde, dass sie aber beim Aufbewahren und Zubereiten keine schädlichen Bestandtheile, Parasiten, Fäulnissgifte, metallische Gifte u. s. w. aufnimmt;
- 3) dass sie ein zur Sättigung ausreichendes Volum, jedoch kein zu grosses Volum ausmacht;
- 4) dass sie richtig temperirt genossen wird.

1. Die Ausnutzbarkeit und Verdaulichkeit der Nahrungsmittel.

Früher glaubte man für die Abschätzung des Nährwerthes der einzelnen Nahrungsmittel nur der Resultate der chemischen Analyse zu bedürfen. Aber es hat sich gezeigt, dass in unserem Verdauungstraktus durchaus nicht dieselben Mengen Eiweiss, Stärke u. s. w. zur Resorption gelangen, die bei der chemischen Analyse aus einem Nahrungsmittel

erhalten werden. Namentlich ist das Eiweiss oft in Cellulosehüllen eingeschlossen, welche im Darm nicht gelöst werden können. Ausserdem bestimmt man den Eiweissgehalt der Nahrung gewöhnlich dadurch, dass man die Stickstoffmenge ermittelt und aus dieser durch Multiplikation mit 6.25 die Eiweissmenge berechnet. Nun enthalten aber viele Vegetabilien reichliche Mengen von Amiden und Amidosäuren (in der Kartoffel z. B. 50 Procent der N-haltigen Stoffe, ebenso viel oder noch mehr in manchen Gemüsen). Andere Nahrungsmittel enthalten Nucleine, Leim u. s. w., kurz eine Menge von Stoffen, welche alle viel Stickstoff bei der Analyse liefern, aber entweder gar keine oder doch nicht dem Eiweiss gleichwerthige Nährstoffe darstellen. Es muss daher für jedes Nahrungsmittel erst gesondert festgestellt werden, wie viel resorptionsfähigen Nährstoff es enthält.

Die Versuche werden entweder in der Weise angestellt, dass der Eiweiss-, Fett- und Kohlehydratgehalt einer genossenen Nahrung genau bestimmt und dann in den zu dieser Nahrung gehörigen Fäces die Menge der unresorbierten Nährstoffe ermittelt wird. Um zu erkennen, welche Fäces als unverdaulicher Theil einer bestimmten Nahrung anzusehen sind, führt man vor und nach dem Genuss der Versuchsnahrung sogenannte markirende Stoffe ein, die sich leicht wieder erkennen lassen, z. B. Preiselbeeren, Kohle, grosse Portionen Milch, welche letztere einen wenig gefärbten, festen Koth liefern u. s. w. — Oder man stellt künstliche Verdauungsversuche im Brütöfen an, und vermag dabei namentlich die peptonisirbaren Eiweissstoffe von den übrigen stickstoffhaltigen, aber dem Eiweiss nicht gleichwerthigen Stoffen zu scheiden.

Es hat sich bei diesen Versuchen ergeben, dass die Ausnutzung zuweilen individuell nicht unerheblich verschieden ist; bei demselben Individuum treten dann aber noch Schwankungen auf, je nach der Beschaffenheit der Nahrung, und zwar ist zunächst das Volumen der Nahrung von Einfluss. Ein zu grosses Volumen setzt die Resorption herab, bewirkt ausserdem noch leicht Magenerweiterung, und in Folge davon stetes Hungergefühl, sobald nicht die Nahrung in abnormer Menge zugeführt wird. Ferner setzt die Beimengung von Cellulose die Resorption sämmtlicher Nährstoffe herab und zwar um so stärker, in je grösserer Menge und in je gröberer Form sie vorhanden ist. Auch sehr grosse Fettmengen haben bei vielen Individuen ähnliche Wirkungen; und ebenso beeinträchtigt ein Ueberschuss von Kohlehydraten die Ausnutzung dadurch, dass Gährungen und Gährungsprodukte entstehen, welche reizend auf die Darmschleimhaut und die Darmbewegung wirken. Sehr verschieden gestaltet sich ferner die Ausnutzung je nach der Mischung verschiedener Nahrungsmittel. — Von grosser Bedeutung für die Ausnutzbarkeit ist die Zubereitung der Nahrungsmittel, durch welche das Volumen derselben geändert,

(ulose entfernt, Fett und Kohlehydrate zugefügt oder beseitigt werden unten).

Trotz dieser zahlreichen, einflussreichen Momente lassen sich gewisse Durchschnittszahlen aufstellen (s. Tabelle). Die Zahlen zeigen in der ausgesprochenen Weise, dass die animalische Nahrung im Ganzen eine weit bessere Ausnutzung gestattet, während bei Vegetabilien die gesamte Ausnutzung der Nährstoffe schlechter und die Ausnutzung der Eiweissstoffe in ganz besonderer Weise verringert ist.

In neuerer Zeit ist es zweifelhaft geworden, ob der Koth, den man als den nicht resorbirten Theil der Nahrung betrachtet, nicht zum wesentlichsten Theil aus Darmsecreten entsteht, die bei schwer resorbirbarer Nahrung in grösserer Menge abgesondert werden. Insofern ist es richtiger, von mehr oder weniger Koth bildenden Nahrungsmitteln zu sprechen, als von mehr oder weniger ausnutzbaren (LAUSCHITZ).

Es wurden nicht resorbirt in Procenten (RUBNER):

Nahrungsmittel	Von der Trocken- substanz	Vom Eiweiss	Vom Fett	Von den Kohle- hydraten
bratenes Fleisch	5.3	2.6	—	—
hellfischfleisch	4.3	2.5	—	—
arte Eier	5.2	2.6	4.4	—
ch	8.8	7.1	5.3	—
ch und Käse	6.4	3.3	5.2	—
eisenbrot, feinstes Mehl	4.2	21.8	—	1.1
„ grobes Mehl	12.2	30.5	—	7.4
ggenbrot, grobes Mehl	13.1	36.7	—	7.9
„ aus ganzem Korn	20.9	46.6	—	14.3
ccaroni	4.3	17.1	—	1.2
is (Risotto)	4.1	20.4	—	0.9
is (Polenta)	6.7	15.5	—	3.2
bsen	9.1	17.5	—	3.6
hnen	18.3	30.2	—	—
rtoffelbrei	9.4	30.5	—	7.4
lbe Rüben	20.7	39.0	—	18.2

Von der Ausnutzbarkeit verschieden ist die Leichtverdaulichkeit der Nahrungsmittel. Erstere misst den Antheil der Nährstoffe, welcher überhaupt schliesslich zur Resorption gelangt, unbekümmert um etwa dabei auftretende Verdauungsbeschwerden. Unter einem leicht verdaulichen Nahrungsmittel dagegen verstehen wir ein solches, welches auch in grösserer Menge genossen, rasch resorbirt wird, und

Dieser Zweck wird erreicht a) durch Abtrennen der Abfälle. Die aus grober Cellulose bestehenden Hüllen der Gemüse, die Sehnen und Fascien des Fleisches u. s. w. werden entfernt. Ueber die Menge der Abfälle siehe die Tabelle S. 239. b) Durch mechanisches Bearbeiten. Klopfen des Fleisches sprengt die Bindegewebshüllen; Zerkleinern und Zermahlen bewirkt bei vegetabilischen Nahrungsmitteln eine Trennung der das Eiweiss und die Stärke einschliessenden Hüllen, vergrössert die Oberfläche und arbeitet dem Kauen der Nahrung vor. c) Durch Kochen mit Wasser, Dämpfen, Braten, Backen werden Cellulosehüllen gesprengt, Stärkekörner in lösliche Stärke oder Dextrin übergeführt, das Eiweiss zum Gerinnen gebracht. Die Nahrungsmittel verlieren dabei theils Wasser, theils nehmen sie mehr Wasser auf. Manche lösliche Stoffe gehen in das Kochwasser über. — Anhaftende Parasiten und Infektionserreger werden vernichtet. d) Durch Gährungsprocesse, mittelst deren Brotteig, Backwerk u. s. w. aufgetrieben und gelockert, oder Fleisch oder cellulosereichere Vegetabilien verdaulicher gemacht werden (Einlegen von Fleisch in saure Milch; Gährung des Sauerkohls).

Beachtenswerth sind die neueren Kochverfahren von BECKER, GROVE und Anderen, welche in öffentlichen Anstalten bereits vielfach Eingang gefunden haben. Bei denselben lässt man Dampf von 60—70° sehr lange auf die Speisen einwirken. Ein Anbrennen, Ueberkochen u. s. w. kann nicht stattfinden, die Beaufsichtigung ist daher sehr einfach; ferner findet kein Auslaugen der Speisen statt. Fleisch wird zart und saftig, Gemüse werden völlig weich, die Stärke wird besser aufgeschlossen. Ob wirklich, wie Einige behaupten, auch eine bessere Ausnutzung der vegetabilischen Eiweissstoffe durch dies Kochverfahren möglich wird, ist noch nicht mit Sicherheit zu entscheiden.

Bezüglich des Materials der Kochgeschirre ist Vorsicht geboten, da nicht selten Gifte aus denselben in die Speisen übergehen und zu Vergiftungen Anlass geben. — Kupfer- und Messinggefässe sind mit Vorsicht zu verwenden. Dieselben dürfen nur in völlig blankem Zustande ohne jeden Ansatz von sog. Grünspan zum Kochen benutzt werden. Sauere Speisen dürfen überhaupt nicht in Kupfergeschirren bereitet werden; verschiedenste mehl- und zuckerhaltige Speisen dürfen nicht in denselben aufbewahrt werden, weil durch allmähliche Bildung organischer Säuren Kupfer gelöst werden könnte. Zweckmässig kommen nur verzinnte oder besser vernickelte Kupfergeschirre in Gebrauch. — Verzinnte Kochgefässe, Conservebüchsen u. s. w., ferner glasierte resp. emaillierte irdene oder eiserne Gefässe enthalten oft Blei. Ueber die mit Bezug hierauf gebotenen Vorsichtsmaassregeln s. Kap. IX. — Vernickelte Gefässe lassen in saure Speisen geringe, aber wie es scheint unschädliche, Spuren von Nickel übergehen. Aehnlich verhalten sich Aluminiumgeschirre.

Da mit den Nahrungsmitteln vielfach Krankheitserreger eingeschleppt werden, ist peinlichste Reinlichkeit in Bezug auf alle Küchenutensilien und gelegentliche Desinfektion mit kochender Sodalösung erforderlich.

3. Das Volum der Nahrung.

Eine an Nährstoffen ausreichende, aber zu wenig voluminöse Kost würde kein Sättigungsgefühl hervorrufen und dadurch an einem schweren Fehler leiden. Im Mittel ist zur Sättigung eines Erwachsenen die fertig zubereitete feste Nahrung in einem Quantum von 1800 g erforderlich; doch kommen bedeutende individuelle Abweichungen vor und namentlich ist bei Menschen, die wesentlich von Vegetabilien und fett-armer Kost leben, das Volum höher (auf 2500—3000 g) zu bemessen.

Das Volum, in welchem die einzelnen Speisen die gleichen Mengen von Nährstoffen gewähren, hängt ab von den nach der Bereitung vorhandenen Wassermengen. Im Allgemeinen sind die animalischen Nahrungsmittel die concentrirteren, weil sie bei der Zubereitung noch Wasser verlieren, während die Vegetabilien als fertige Speise sehr viel mehr Wasser enthalten, als im Rohzustande. Es beträgt der Wassergehalt von:

Rindfleisch, frisch	75	Procent.	Weizenmehl	13	Procent
„ gekocht	57	„	Weizenbrod	38	„
„ gebraten	59	„	Erbsen, roh	14	„
Kalbfleisch, frisch	78	„	Erbsenbrei	73	„
„ gebraten	62	„	Erbsensuppe	90	„
			Kartoffel, roh	75	„
			Kartoffelbrei	78	„

Leguminosen, Kartoffeln und die meisten anderen Gemüse können deshalb überhaupt nicht über ein gewisses Maass hinaus genossen werden, weil sonst das Volum der Gesamtnahrung ganz abnorm vermehrt und die Ausnutzung wesentlich herabgesetzt werden würde.

Handelt es sich allerdings darum, eine möglichst leicht verdauliche Kost herzustellen, so ist flüssige oder breiige Consistenz im Allgemeinen vorzuziehen. Im Kindesalter ist zweifellos eine solche Beschaffenheit der Kost einzig indicirt; ebenso ist sie bei Kranken und Reconvalescenten empfehlenswerth, obwohl hier in vielen Fällen consistentere, aber gut zerkleinerte Nahrung ebenso gut vertragen wird.

Für den gesunden Erwachsenen ist breiige und flüssige Kost nur in Abwechselung mit fester Nahrung zulässig, weil sonst die nöthige Nährstoffmenge nicht zugeführt werden kann, und die reizlose Beschaffenheit der Kost leicht Widerwillen hervorruft (Gefängnisskost).

4. Die Temperatur der Nahrung.

Als normal ist für den Säugling eine Temperatur der Nahrung zwischen $+ 35^{\circ}$ und $+ 40^{\circ}$, für den Erwachsenen zwischen $+ 7^{\circ}$ und $+ 55^{\circ}$ zu bezeichnen. Niedriger temperirte Speisen und Getränke

hren leicht zu gastrischen Störungen, bedingen ausserdem Verlangung der Herzthätigkeit und bei grösseren Flüssigkeitsmengen ein sinken der Körpertemperatur. — Habituellem Eisgenuss in der warmen Jahreszeit ist entschieden bedenklich, ganz abgesehen von der Infektionsgefahr, der man sich durch den Genuss des Roheises aussetzt.

Zu heisse Speisen können Verbrennung oder wenigstens Hyperämien und Epithelschädigungen der Mund- und Magenschleimhaut wirken; vielleicht sind sie im Stande die Verdauungsfermente zu einträchtigen; ausserdem erfolgt durch heisse Getränke Steigerung der Pulsfrequenz und eventuell der Körpertemperatur.

Bei der Zusammensetzung einer rationellen Kost genügt es vielleicht, wenn man nur den Kraftwechsel ins Auge fasst und den Nährwerth der Nahrungsmittel nach Calorien berechnet. Folgende Tabelle gibt für einige der wichtigsten Nahrungsmittel den Betrag der physiologisch verwertbaren Calorien:

100 g mageres Fleisch liefern 100 Cal.	100 g Schwarzbrot liefern 220 Cal.
100 „ Fisch „ 70 „	100 „ Weissbrot „ 210 „
1 Ei „ 80 „	100 „ Reis „ 350 „
1 Eigelb „ 60 „	100 „ Mehl „ 330 „
10 „ Milch „ 65 „	100 „ Erbsen „ 310 „
10 „ Butter „ 770 „	100 „ Kartoffeln „ 90 „

Eine Kost, welche die erforderlichen Calorienmenge deckt, kann dess, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, durch eine unrichtige Vertheilung von Eiweiss, Fett und Kohlehydraten doch noch zu Belästigungen und Schädigungen des Körpers führen. Auch die einzelnen Nährstoffe werden daher in rationeller Weise gruppiert werden müssen. Dabei kommen folgende Gesichtspunkte in Betracht:

Es stehen uns zur Deckung des Nahrungsbedarfs theils vegetabilische, theils animalische Nahrungsmittel zur Verfügung. Die Zusammensetzung der wichtigsten derselben geht aus nebenstehenden Tabellen hervor. Vergleicht man den Gehalt beider an Nährstoffen, so ist ersichtlich, dass bezüglich des Eiweissgehaltes die animalischen Nahrungsmittel, z. B. Fleisch, Milch, Käse, den ersten Platz einnehmen. Sie enthalten procentisch die grösste Menge Eiweiss und dieses in einer völlig ausnutzbaren Form; unter den Vegetabilien nehmen sich nur die Leguminosen durch einen höheren Eiweissgehalt aus, der aber wesentlich dadurch beeinträchtigt wird, dass diese Eiweissstoffe nur zu 50 bis 70 Procent ausnutzbar sind. Kartoffeln, Kohl und andere Gemüse kommen bezüglich der Eiweisszufuhr so gut wie

Chemische Zusammensetzung der Nahrungsmittel.

Animalische Nahrungsmittel.

	Wasser	Eiweiss (6.25 × N)	Fett	Kohlehydrate und N-freie Extractiv- stoffe	Asche
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Frauenmilch	89.2	2.1	3.4	5.0	0.2
Kuhmilch	87.5	3.4	8.6	4.8	0.7
Ziegenmilch	86.91	3.69	4.09	4.45	0.86
Stutenmilch	90.71	1.99	2.05	5.70	0.37
Eselsmilch	90.04	2.01	1.39	6.25	0.31
Butter	14.14	0.68	83.11	0.70	1.19
Käse (fett)	35.75	27.16	30.43	2.53	4.13
„ (halbfett)	46.82	27.12	20.54	1.97	3.05
„ (mager)	48.02	32.65	8.41	6.80	4.12
Abgerahmte Kuhmilch	90.63	3.06	0.79	4.77	0.75
Ochsenfleisch, mittelfett	72.25	21.39	5.19	—	1.17
Kalbfleisch, mager	78.82	19.86	0.82	—	1.33
Schweinefleisch, fett	47.40	14.54	37.34	—	0.72
Schinken, geräuchert	27.98	23.97	36.48	1.50	10.07
Leberwurst	48.70	15.93	26.33	6.38	2.66
Häring, frisch	80.71	10.11	7.11	—	2.07
„ gesalzen	46.23	18.90	16.89	1.57	16.41
Schellfisch	80.92	17.09	0.35	—	1.64
Pöklung	69.49	21.12	8.51	—	1.24

Vegetabilische Nahrungsmittel.

	Wasser	Eiweiss (6.25 × N)	Fett	Zucker	Sonstige N-freie Extractiv- stoffe	Holz- faser	Asche
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Weizen	13.56	12.42	1.70	1.44	66.45	2.66	1.77
Roggen	15.26	11.43	1.71	0.96	66.86	2.01	1.77
Weizenmehl, feinstes	14.86	8.91	1.11	2.32	71.86	0.33	0.61
Roggenmehl	14.24	10.97	1.95	3.88	65.86	1.62	1.43
Gerstemehl (Gries)	15.06	11.75	1.71	3.10	67.80	0.11	0.47
Weizenbrot, feines	38.15	6.82	0.77	2.37	40.97	0.38	1.18
Roggenbrot, frisch	44.02	6.02	0.48	2.54	45.83	0.30	1.31
Pumpnickel, westf.	43.42	7.69	1.51	3.25	41.87	0.94	1.43
Nudeln	13.07	9.02	0.28	—	76.79	—	0.84
Reis (enthülst)	13.23	7.81	0.69	—	76.40	0.78	1.09
Bohnen	13.60	23.12	2.28	—	53.63	3.84	3.53
Erbsen	14.31	24.81	1.85	—	54.78	8.85	2.47
Steinpilze	12.81	36.12	1.72	—	37.26	6.71	6.38
Kartoffeln	75.77	1.79	0.16	—	20.56	0.75	0.97
Möhren	87.05	1.04	0.21	6.74	2.66	1.40	0.90
Rothkraut	90.06	1.83	0.19	1.74	4.12	1.29	0.77
Gurke	95.60	1.02	0.09	0.95	1.33	0.62	0.39
Aepfel	83.58	0.39	—	7.73	6.01	1.98	0.31
Weintrauben	78.17	0.59	—	14.36	2.75	3.60	0.53
Wallnuss	4.68	16.37	62.68	—	7.89	6.17	2.08

r nicht in Betracht. — Eine Fettzufuhr wird nur durch fettes Fleisch, Milch, Butter und fetten Käse gewährt. Die für die tägliche Kost in Betracht kommenden Vegetabilien enthalten Fett in kaum nennenswerther Menge. — Kohlehydrate dagegen sind ausschliesslich in Vegetabilien enthalten; nur die Milch ist ausgenommen, welche indess eine reichlichere Zufuhr bei Erwachsenen ausser Betracht bleibt.

Daraus ist nun ohne Weiteres zu entnehmen, dass wir in Folge unseres bedeutenden Bedarfs an Kohlehydraten auf eine gewisse Masse Menge von Vegetabilien durchaus angewiesen sind. Während wir mit den Vegetabilien den Bedarf an Kohlehydraten decken, bekommen wir einen kleinen Theil Fett und eine nicht unbedeutende Menge Eiweiss gleichzeitig zugeführt, und es wird darauf ankommen, die Menge auch dieser anderen Nährstoffe genauer zu bestimmen, um darnach herauszurechnen, was noch für weitere Nahrungsmittel der täglichen Kost zuzufügen sind.

Rechnen wir für den körperliche Arbeit leistenden Mann einen Bedarf von 500 g Kohlehydrate, so sind diese z. B. enthalten in 100 g Reis oder 1100 g Brot oder 2500 g Kartoffeln oder 900 g Leguminosen. Für gewöhnlich wird der grösste Theil durch Brot gedeckt; bei Soldaten und Arbeitern hat man festgestellt, dass pro Kopf und Tag 500—700 g Brot zu rechnen sind, im Mittel 600 g. In diesen finden sich 230 g Kohlehydrate; es bleiben dann also noch 270 g Kohlehydrate anderweitig zu decken und diese sind enthalten in circa 200 g Reis oder 800 g Kartoffeln oder 270 g Leguminosen.

Wie viel Eiweiss haben wir nun durch die Einführung dieser Vegetabilien gewonnen? In 600 g Brot sind 36 g Eiweiss enthalten, in 200 g Reis 15 g, in 800 g Kartoffeln 14 g, in 270 g Leguminosen 5 g Eiweiss. Von diesem Eiweiss dürfen wir aber nur einen Theil auszunutzen rechnen; im Brot erhalten wir 28 g verdauliches Eiweiss, im Reis 10 g, in den Kartoffeln 9 g, in den Leguminosen 45 g, Summa der Tagesration also 38 oder 37 oder 73 g verdauliches Eiweiss.

Bei Zugabe von Leguminosen ist die Eiweisszufuhr demnach weit beträchtlicher; es ist indessen nicht möglich, pro Tag eine Menge von 270 g Leguminosen zu verzehren. Diese sind nämlich, wie bereits oben erörtert wurde, stets nur in sehr wasserreicher Form aufzunehmen und bieten ein ausserordentlich grosses Nahrungsvolumen dar. 270 g Leguminose liefern in Form von dickstem Brei etwa 900 g, in Form einer Suppe etwa 2500 g fertiger Speise! Es kann daher stets nur ein kleiner Theil des Kohlehydratbedarfs mit Leguminose gedeckt werden,

während für den Rest stickstoffärmere Nahrungsmittel, Kartoffeln u. dergl. an die Stelle zu setzen sind.

Sonach gewinnt man durch die Vegetabilien im Mittel nur etwa 45 g verdauliches Eiweiss. Es fehlen dann noch zu einer vollständigen Deckung des Eiweissbedarfs 60 g verdauliches Eiweiss.

Wollte man nun diese 60 g verdauliches Eiweiss auch noch durch vegetabilische Nahrung decken, so würde man offenbar einen grossen Fehler begehen. Wir würden dann unvermeidlich noch mehr Kohlehydrate bekommen und den gesammten Kraftwechsel in lästiger Weise steigern; ausserdem würde die Ausnutzung der gesammten Nahrung verschlechtert, und das ganze Volumen der Nahrung würde, weil alle Vegetabilien bei der Zubereitung viel Wasser aufnehmen, entschieden zu gross werden. Versucht man es trotzdem mit ausschliesslich vegetabilischer Kost auszukommen, so wird meistens nicht vollständig genügend Eiweiss in den Körper aufgenommen, dagegen ein entschiedener Ueberschuss von Kohlehydraten, und es entsteht bei dieser Art der Ernährung leicht ein eiweissarmer, dagegen fettreicher Körper.

Einzig rationell ist es vielmehr, jene 60 g verdauliches Eiweiss durch animalische Kost zu decken. Dieselben sind z. B. enthalten in ca. 300 g Fleisch, 1500 ccm Milch, 500 g (= 10 Stück) Eiern, 250 g Käse. Selbstverständlich sind auch hier verschiedene Nahrungsmittel zu combiniren, also z. B. 200 g Fleisch + $\frac{1}{2}$ Liter Milch oder 200 g Fleisch = 3 Eier u. s. w.

Nicht selten fehlt es der Nahrung noch an Fett. Nur wenn Milch, Käse, fettes Fleisch zur Deckung des Eiweissbedarfes verwendet wird, ist Fett meist genügend vorhanden; andernfalls muss dasselbe noch extra in Form von Butter, Speck u. s. w. zugefügt werden, und auf diese Ergänzung ist bei körperlich arbeitenden Menschen besonderer Werth zu legen.

Mit der vorstehenden Rechnung haben wir auch eine präzise Antwort auf die Frage erhalten, in welchem Verhältniss Pflanzen- und Thierkost genossen werden soll und ob wir etwa ausschliesslich auf Pflanzenkost angewiesen sind. Das Fehlen eines ausgedehnten Blinddarms, die verhältnissmässig geringe Länge unseres Darms, die vergleichsweise kurze Aufenthaltszeit der Nahrung im Darm stellen uns entschieden den Fleischfressern näher. Indessen ist auf diese Vergleiche wenig Werth zu legen; maassgebend ist allein die Thatsache, dass die meisten Menschen mit ausschliesslicher Pflanzenkost nicht existiren können, ohne Einbusse an Körpereiwiss und an Energie zu erfahren. Manche Menschen können wohl die vegetabilische Nahrung so vortrefflich ausnutzen, dass sie sich mit solcher Kost im Gleichgewicht halten; sehr leicht

t aber auch in solchen Fällen, sobald die übergrosse Nahrungsaufnahme aus and welchen Gründen beschränkt werden muss, eine gewisse Eiweissverarmung Körpers ein. Die Vegetarianer weisen vielfach hin auf fremde Völker, die rein vegetabilische Kost geniessen und dabei hoher Kraftentwicklung ig sein sollen; es ist indess durch zahlreiche gute Beobachtungen constatirt, s auch die Japaner, Chinesen, Inder u. s. w. eine kleine, allerdings nicht die Augen fallende und daher oft übersehene Menge von animalischem Eiweiss in Form von Käse, getrockneten Fischen u. dergl. geniessen. Auch bei ist ja die Menge der animalischen Nahrung im Vergleich zur vegetabilischen serordentlich gering; namentlich in gewissen Schichten der Bevölkerung, so der ganzen ländlichen Bevölkerung, besteht die ganz überwiegende Menge Nahrung aus Vegetabilien, und die animalische Kost tritt scheinbar gänzlich rück. Wie wichtig aber gerade die kleine Zuthat animalischer Kost für den menschen ist, das sehen wir z. B. in denjenigen Distrikten, wo die Bevölkerung arm ist, um irgend welche animalische Kost zu geniessen, ferner an den Gefangenen, welche bis vor wenigen Jahren ausschliesslich als Vegetarianer nährt wurden. Erst in Folge der ausserordentlich schlechten Erfahrungen, e man mit diesem Kostregime der Gefangenen machte, ging man schliesslich einer geringen animalischen Zukost über, und seitdem ist der Ernährungs- stand derselben entschieden gebessert.

Etwas Gutes liegt übrigens, wie in allen derartigen Agitationen, auch in r vegetarianischen Bewegung; sie hat uns vor der Ueberschätzung der animalischen Kost gewarnt, welche früher unter dem Einflusse der LIEBIG'schen ehren vorherrschend geworden war.

Ein Moment, das sehr oft zu einem unzweckmässigen Ueberwiegen er vegetabilischen Nahrung verführt, ist der Preis der Nahrungs- mittel. Kommt es auf diesen nicht an, so ist eine rationelle Composition er Kost verhältnissmässig leicht; wo aber mit dem Gelde gespart werden muss, da fällt gewöhnlich gerade das animalische Eiweiss und das Fett u knapp aus, weil beides relativ theuer ist.

Gewöhnlich sucht man ein Urtheil über die Preiswürdigkeit der Nahrungs- mittel in folgender Weise zu gewinnen (DEMUTH): Im Durchschnitt aus den erschiedensten Nahrungsmitteln bekommt man für 1 Mark 185 g Eiweiss, 07 g Fett, 495 g Kohlehydrate. Kauft man Fett allein, so stellt sich der Preis von 1 g auf durchschnittlich 0.12 Pfennig. Da 240 g Kohlehydrate 00 g Fett in der Leistung für den Körper zu vertreten im Stande sind, be- ifert sich demnach der Werth von 1 g Kohlehydrate auf 0.05 Pfennig. In er obigen Durchschnittsberechnung hat man somit: $100 \text{ Pfennige} = 107.0.12 + 495.0.05 + 185.x$; rechnet man das x aus, so erhält man den Werth von g Eiweiss zu 0.83 Pfennig. Auf Grund dieser Zahlen lässt sich der „Nähr- geldwerth“ jedes Nahrungsmittels berechnen und bestimmen, in wie weit er Kaufpreis von dem wirklichen Werth der darin enthaltenen Nährstoffe abweicht. Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht des Kaufpreises, der ge- ferten Nährstoffe und Wärmemenge und des Nährgeldwerths verschiedener Nahrungsmittel:

Für eine Mark erhält man:

Nahrungsmittel	Gewichtsmenge	Resorbirbare Nährstoffe (Gramm)			Wärmeeinheiten (grosse)	Nährgehalt (Pfennige)
		Eiweiss	Fette	Kohlehydrate		
Rindfleisch	666 g	136	33	3	1027	48.7
Kalbfleisch	727 „	134	51	1	1197	50.3
Häringe	1000 „	184	161	16	2531	55.4
Milch	6250 „	203	217	307	4409	108.0
Magermilch	10000 „	296	70	475	4173	129.7
Magerkäse	1250 „	420	135	68	3783	158.1
Roggenbrot	4000 „	188	16	1890	8878	158.8
Kartoffeln	16666 „	221	23	3292	14874	240.3
Reis	1500 „	70	26	1167	5400	84.0
Erbsen	2500 „	457	41	1481	8640	227.2
Gelbe Rüben	50000 „	312	99	4320	20801	330.8

In den meisten Fällen sind indess vegetabilische und animalische Kost gar nicht direct in Bezug auf ihren Preis vergleichbar, weil sie ganz verschiedene Funktionen haben. Nur diejenigen Nahrungsmittel lassen sich mit einander in Vergleich setzen, mit welchen man den gleichen Zweck erreicht, also entweder nur diejenigen, mit welchen man die Kohlehydrate, oder aber diejenigen, mit welchen man die Eiweisstoffe einführt.

Handelt es sich um Deckung der Kohlehydrate, dann concurren ausschliesslich Vegetabilien unter einander und die Preiswürdigkeit dieser geht aus folgender Tabelle hervor.

500 g Kohlehydrate sind enthalten in:	und diese Nahrung kostet ¹
650 g Reis	31 Pfennige
1100 „ Brot	26.5 „
3340 „ Kartoffeln = 2500 g geschält .	20 „
900 „ Erbsen	19 „
15000 „ Kohlrüben	75 „

Handelt es sich dagegen um Deckung jener 60 g Eiweiss und 60 g Fett, welche nach der Zufuhr der Vegetabilien noch übrig

¹ Breslauer Marktpreise.

en, so kommen die Vegetabilien gar nicht in Betracht, weil sie diesen Zweck nicht die richtigen Nährstoffe bieten. Zur Deckung 60 g müssen wir daher unter den animalischen Nahrungsmitteln billige herauszufinden suchen; und solche existieren in der . Fleischpräparate, z. B. billige Würste, namentlich aber Fische frisch wie im geräucherten und gesalzenen Zustande), abgerahmte Milch und die verschiedenen Arten Käse liefern Eiweiss und eventuell Fett zu relativ billigem Preise (s. Tabelle).

g verdauliches Eiweiss sind enthalten in	Diese Nah- rung kostet	Dieselbe enthält ausser Eiweiss
g Fleisch (80 g Abfall) . . .	49 Pfennige	—
„ Ei	40 „	60 g Fett
„ Milch	22 1/2 „	60 „ „ 60 g Kohlehydrate
„ Blutwurst	44 „	60 „ „ —
„ Schellfisch (150 g Abfall) .	25 „	—
„ frischer Hering (200 g Abfall)	16 „	42 „ „ —
„ Salzhering (130 g Abfall) .	20 „	54 „ „ —
„ abgerahmte Milch	10 1/2 „	7 „ „ 60 g Kohlehydrate
„ Magerkäse	10 „	16 „ „ —
„ Reis	50 „	— 800 g Kohlehydrate
„ Roggenbrot	28 „	— 580 „ „
„ Weissbrot	40 „	— 490 „ „
„ Kartoffeln	80 „	— 900 „ „
„ Erbsen	7 „	— 180 „ „

In Form von Vegetabilien ist das Eiweiss durchaus nicht etwa gar zu beschaffen. Wie aus vorstehender Tabelle hervorgeht, können wir höchstens mit Leguminosen zu einer ebenso billigen oder geringeren Deckung des Eiweissbedarfs, die jedoch aus den oben anführten Gründen praktisch gar nicht in Concurrenz treten können.

Demnach lässt sich die Nahrung eines Arbeiters z. B. in folgender Weise zusammensetzen:

	Verdaul. Eiweiss	Fett	Kohle- hydrate	Preis
1) g Schwarzbrot	28 g	3 g	290 g	15.9 Pf.
2) „ roh = 1000 g gesch. Kartoffeln	1.5 „	—	200 „	8 „
3) „ roh = 200 g rein Salzhering	20 „	14 „	—	10 „
4) „ Wurst	22 „	24 „	—	16 „
5) „ Magerkäse	23.5 „	6 „	—	4 „
	105 g	47 g	490 g	53.9 Pf.

Für einen Menschen, der nicht körperlich, sondern geistig arbeitet und kleinere Mengen von Kohlehydraten, mehr Fett und Eiweiss, u. einer leicht verdaulichen Kost bedarf, stellt sich die Berechnung etw folgendermaassen:

	Verdaul. Eiweiss	Fett	Kohle- hydrate	Preis
300 g Weissbrot	17.0 g	4 g	135 g	10 P
530 „ roh = 400 g geschälte Kartoffeln	5.4 „	—	80 „	3 „
100 „ Reis zu Milchreis	5.8 „	—	76 „	5 „
500 ccm Milch zu Milchreis	20.0 „	20 „	20 „	7.5 „
100 g (= 110 g roh) Ei	12.5 „	12 „	—	8 „
250 „ (= 317 g roh) Fleisch	50.0 „	—	—	43 „
60 „ Butter	—	50 „	—	15 „
	110.7 g	86 g	311 g	90.5 P

Die ausserdem erforderlichen Geschmacksmittel, Gewürze, Brat- und sonstige Zubereitungskosten, sowie die ebenso unentbehrlichen (Nussmittel sind auf mindestens 20—30 Pf. zu veranschlagen.

Die zu Grunde gelegten Bedarfszahlen gelten für einen kräftig stark arbeitenden Mann; im Mittel darf man den Eiweissbedarf 20 g, die Kohlehydrate um 50 g niedriger rechnen. Unter Berücksichtigung dieser beiden Momente stellt sich der Minimal-Preis täglicher Arbeiternahrung inclusive Genussmittel auf etwa 70 Pf. 1 eine Familie, bestehend aus Mann, Frau und 2—3 Kindern, die insgesamt drei Erwachsenen gleich zu rechnen sind, ist also ein Aufwand für Nahrung erforderlich in der Höhe von 2 M. 10 Pf. Da Nahrung in dem Budget einer Arbeiterfamilie sich auf circa 60 Proc der Ausgaben bezieht, so kann erst ein tägliches Einkommen (Sonntage und Feiertage nicht ausgenommen!) von etwa 3 M. 50 Pf. ein Arbeiterfamilie eine rationelle Ernährung ermöglichen.

Wo die Lage der Industrie und des Handwerks der Art ist, d. dieser Forderung der Hygiene nicht entsprochen werden kann, muss versucht werden, dem Arbeiter die nothwendigen Nahrungsmittel billigerem Preise zu verschaffen.

Dies kann einmal dadurch geschehen, dass dem Arbeiter Nahrungsmittel nicht zu Markt- sondern zu Engrospreisen gebohrt werden, wie in den öffentlichen Anstalten, beim Militär u. s. w. Hier werden alle Nahrungsmittel so viel als möglich direct und in grossen Massen gekauft, das Vieh selbst geschlachtet u. s. w. Die Preisschiede sind schon in Bezug auf Vegetabilien und Brot erheblich, ne

deutender aber in Bezug auf Fleisch, das pro 1 kg im Engrospreise 90—90 Pf., ohne Abfall 1 M. kostet. Für die Ernährung eines Mannes brauchen daher nur 28—36 Pf., für die Ernährung eines Soldaten 30—35 Pf. pro Kopf und Tag verausgabt zu werden. — Auch die ärmere Bevölkerung kann die Nahrung zu derartig niedrigem Preise beziehen durch Vermittelung von Consumvereinen, ferner durch Benutzung von Volksküchen, welche ein ausreichendes Mittagessen für billigen Preis gewähren.

Ausserdem kann für die Arbeiterernährung viel genützt werden durch Anleitung zu einer rationellen Auswahl der Nahrungsmittel. Aufklärungen über den Nährstoffgehalt der Nahrungsmittel und speciell über diejenigen, welche Eiweiss und Fett billig liefern, sind durch Koch- und Haushaltungsschulen und durch Flugblätter zu verbreiten. Selbstverständlich müssen die empfohlenen Nahrungsmittel Geschmacksreize haben, die dem Arbeiter gewohnt und angenehm sind; von der Anpreisung von Nahrungsmitteln, die fremde Geschmacksreize und ungewohntes Aussehen haben, ist nichts zu erwarten. Aber gerade auch unter den heimischen beliebten Nahrungsmitteln werden oft die billigen Eiweisslieferanten bei weitem nicht genügend geschätzt. — Besonders wichtig in dieser Beziehung sind die frischen, gesalzenen und geräucherten Fische, durch welche der Eiweissbedarf in ausserordentlich billiger Weise zu ergänzen ist. Eine ähnliche Rolle spielen die Molkereiprodukte; Magerkäse, Quark und insbesondere abgerahmte Milch haben auf dem Lande fast keinen Werth, können aber bei der jetzigen Behandlungsweise der Milch sehr wohl in nahe gelegene Städte transportirt und dort der Bevölkerung zu ausserordentlich billigen Preisen verkauft werden.

Endlich sucht man in der Neuzeit Surrogate herzustellen, wie z. B. die Kunstbutter, welche billige Fette schmackhaft und im Haushalt verwendbar zu machen sucht.

Wenig bewährt hat sich bis jetzt ein Fleisch-Import von überseeischen Ländern, in welchen die Production des Fleisches wenig oder gar nichts kostet (s. u. „Fleisch“). Vor einigen Jahren erregte namentlich das „Carne pura“ (s. ebenda) viel Aufsehen. Aber auch dieses Präparat war, ebenso wie die übrigen importirten Fleischarten entschieden zu theuer, als dass es für die Volksernährung ernstlich in Betracht kommen konnte. 60 g verdauliches Eiweiss waren beispielsweise enthalten in 86 g Carne pura und kosteten 26 Pf.; neben dem Eiweiss wurden in dieser Portion nur noch 4 g Fett geliefert. Das Präparat war demnach durchaus nicht billiger, wie manche einheimische Präparate, war aber selbstverständlich dem Geschmack ausserordentlich viel weniger angepasst, wie die letzteren. — Genau das gleiche gilt von den zahlreichen im Inland hergestellten eiweissreichen Präparaten, z. B. Tropon. Auch bei diesem erscheint das Eiweiss nur relativ billig, wenn man mit reinem fettfreien Rind-

fleisch vergleicht; nicht aber wenn man die für die Volksernährung wirklich in Betracht kommenden billigen heimischen Fleisch-, Fisch- und Milchpräparate als Maassstab nimmt. Und dabei fehlen dem Tropon völlig die angenehmen Geschmacksreize dieser Nahrungsmittel.

Die Frage, wie die Tageskost in zweckmässigster Weise auf Mahlzeiten vertheilt wird, lässt sich nicht mit einer allgemein gültigen Regel beantworten. Empfindliche Individuen von geringer Capacität des Magens und geringer Verdauungskraft bedürfen einer stärkeren Repartirung der Nahrung als robuste Menschen. Beim Gesunden variiert die Eintheilung nach der Beschäftigung und nach der Art der Kost. Bei körperlicher Arbeit und vorzugsweise vegetabilischer, voluminöser Kost sind häufigere (5) Mahlzeiten zweckmässig, in der Tagesmitte die stärkste, welche ungefähr die Hälfte der ganzen Ration umfasst. Bei geistiger Arbeit und eiweiss- und fettreicher Kost ist die englische Sitte, früh eine reichliche Fleischmahlzeit, im Laufe des Tages nur wenig leichte Speisen und die Hauptmahlzeit am späten Nachmittag resp. Abend einzunehmen, am empfehlenswerthesten.

Bei Arbeitern sind im Mittel 40—50 Procent der täglichen Eiweissration, 50—60 Procent des Fettes, 30 Procent der Kohlehydrate in der Mittagsmahlzeit gefunden; etwa 30 Procent vom Eiweiss, 30 Procent vom Fett und 30 Procent von den Kohlehydraten entfallen auf die Abendmahlzeit; der Rest der Kohlehydrate vertheilt sich in Form von Brot auf die verschiedenen kleinen Mahlzeiten.

Besonders wichtig ist die richtige Anwendung der in Vorstehendem entwickelten Ernährungsgrundsätze bei der Kost in öffentlichen Anstalten, in welchen der Einzelne nicht entsprechend seinem individuellen Bedürfniss und geleitet von einem im Allgemeinen zuverlässigen Instinkt seine Kost wählen darf, sondern wo er auf die von der Aufsichtsbehörde zugetheilte und von dieser als ausreichend erkannt Durchschnittskost angewiesen ist.

In der verantwortlichen Lage, in welcher sich hier die Aufsichtsbehörde befindet, ist genaueste Berücksichtigung der einzelnen Anforderungen an eine Normalkost, insbesondere an ausreichenden Nährwert der Kost und an eine entsprechende Abwechselung der Geschmacksreize, durchaus nothwendig. Die Ausführung ist indess um so schwieriger, als der Preis der Kost gewöhnlich auf einer ausserordentlich

trigen Stufe gehalten werden muss und daher nur ein für kleinere Individuen und für mässige Arbeitsleistung geltender Kotsatz zu Grunde genommen wird. Ein gewisser Ausgleich der sehr verschiedenen Ansprüche so viel als möglich durch eine individuell variirte Zukost zu finden. In der Armee sind nur Wenige, welche nicht in der Lage sind, eigenen Defekten ihrer Kost etwas nachzuhelfen; und auch in den Anstalten kann theils durch Verordnungen des Anstaltsarztes, theils durch eine aus dem Erlös der Arbeit beschaffte Zukost einem individuellen Mehrbedarf Rechnung getragen werden.

In Folgendem seien einige Kotsätze aus öffentlichen Anstalten als Beispiele angeführt:

1. Kost im Münchener Waisenhaus.

Täglich im Durchschnitt 275 cem Milch, 97 g Fleisch, 243 g Brot, 162 g Kartoffeln, 97 g Gemüse; und darin:

79 g Eiweiss, 37 g Fett, 247 g Kohlehydrate.

2. Deutsche Armee.

a) Kleine Friedensportion; bietet im Mittel 103 g Eiweiss, 21 g Fett, 501 g Kohlehydrate; in Form von:

750 g Brod, 150 g Fleisch, 90 g Reis oder
120 g Graupen oder
230 g Leguminosen oder
1500 g Kartoffeln.

b) Grosse Friedensportion; 107 g Eiweiss, 77 g Fett, 511 g Kohlehydrate; in Form von:

g Brot, 250 g Fleisch oder 150 g Speck, 25 g Salz, 15 g gebr. Kaffee,
125 g Reis oder
125 g Graupen oder
250 g Leguminosen oder
1500 g Kartoffeln.

c) Kleine Krieksportion; 135,3 g Eiweiss, 39 g Fett, 504 g Kohlehydrate; in Form von:

g Brot oder 375 g Fleisch oder 125 g Reis od. 25 g Salz, 25 g gebr. Kaffee.
g Zwieback, 200 g Rauchfleisch od. 125 g Graupen
200 g Fleischconserven. u. s. w.

d) Grosse Krieksportion; 154 g Eiweiss, 47 g Fett, 504 g Kohlehydrate, w. 165 g Eiweiss, 48 g Fett, 555 g Kohlehydrate; in Form von:

g Brot, 500 g Fleisch oder 267 g Rauchfleisch, 170 g Reis, 323 g Hülsenfrüchte u. s. w.

e) Eiserner Bestand, d. h. die Ration, welche für jeden Soldaten in Kriegs- und Manöverzeiten stets mitzuführen ist, und die aus einer haltbaren, compensirten, möglichst leichten und rasch zuzubereitenden Nahrung bestehen muss.

Der eiserne Bestand soll pro Tag 29 g Eiweiss, 180 g Fett und 270 g Kohlehydrate enthalten, z. B. in Form von: 150 g Gemüsekonserven (Erbswurst), 250 g Zwieback, 25 g Kaffee, 25 g Salz. Oder: 400 g Fleischzwieback, 200 g Fleischgemüsekonserven, 25 g gebr. Kaffee und 25 g Salz.

3. Gefangenenkost.

Die tägliche Kost enthält:

in den preussischen Strafanstalten, alter Etat: 110 g Eiw., 25 g Fett, 677 g K.
 " " " " neuer " 100 g " 50 g " 553 g "
 im Gefängniß Plötzenssee 117 g " 32 g " 597 g "
 und zwar in Form von 625—650 g Brot, 30—43 g Fleisch; im übrigen Kartoffeln, Leguminosen, abgerahmte Milch, Häring u. s. w.

4. Volksküchen.

Die Mittagsmahlzeit, die in Volksküchen gereicht wird, soll, entsprechend den S. 260 mitgetheilten Zahlen, im Mittel enthalten:

40—50 g Eiweiss, 30 g Fett, 160 g Kohlehydrate.

In den Berliner Volksküchen werden für den Preis von 25 Pf. beispielsweise verabreicht:

- a) Gelbe Erbsen und Kartoffeln, 1000 g; Speck 50 g; darin:
55.5 g Eiweiss, 41 g Fett, 120 g Kohlehydrate.
- b) Milchreis, 1000 g; Schmorfleisch 100 g; und darin:
38 g Eiweiss, 18 g Fett, 120 g Kohlehydrate.
- c) Kohl und Kartoffeln, 1000 g; Schweinefleisch 100 g; und darin:
39 g Eiweiss, 68 g Fett, 163 g Kohlehydrate.
- d) Grüne Bohnen, 1000 g; fettes Schweinefleisch oder Speck 60 g; und darin:
20 g Eiweiss, 53 g Fett, 133 g Kohlehydrate.

Das Minus an Fett und Eiweiss, das an einzelnen Tagen hervortritt, wird durch ein Plus dieser Nährstoffe an anderen Tagen ungefähr ausgeglichen. Im Mittel werden 35 g Eiweiss, 20 g Fett und 180 g Kohlehydrate, von letzteren also etwas zu viel, von ersterem etwas zu wenig geliefert.

Litteratur: C. v. VORR, Physiologie des allgemeinen Stoffwechsels und der Ernährung, Leipzig 1881. — FORSTER, Ernährung und Nahrungsmittel, Handbuch der Hygiene von v. PETTENKOFER und v. ZIEMSEN, Theil 1. — Massenernährung, ebendas., Theil 2, 1882. — RUSNER, Lehrbuch der Hygiene, Leipzig und Wien 1900.

KÖNIG, Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, 5. Aufl. — MUNK und UFFELMANN, Die Ernährung des gesunden und kranken Menschen, Wien und Leipzig, 2. Aufl. 1895. — VORR, Untersuchung der Kost in einigen öffentlichen Anstalten, München 1877. — MEINERT, Wie ernährt man sich gut und billig? Berlin 1882. — MEINERT, Armee- und Volksernährung, Berlin 1880. — E. und K. HIRSH, die Kostordnung der psychiatrischen und Nervenkl. der Universität Halle, Jena 1897.

B. Die einzelnen Nahrungsmittel.

1. Die Kuhmilch.

Im Folgenden soll zunächst nur die Kuhmilch besprochen werden, sie als Marktwaare und als Nahrung für Erwachsene und ältere in Betracht kommt. In einem besonderen Abschnitt ist sodann Milch als Kindernahrung zu behandeln.

Die Kuhmilch ist eine Emulsion von Fett in einer Lösung von ziss, Zucker und Salzen. Normaler Weise zeigt sie gelblichweisse, ist schon in dünnen Schichten undurchsichtig, hat einen eigentlichen Geruch, leicht süsslichen Geschmack und amphotere ktion (gleichzeitig schwach alkalisch und schwach sauer). Im mikroskopischen Präparat erscheint sie erfüllt von zahlreichen Fetttropfchen verschiedener Grösse. Die chemische Analyse ergibt im Mittel folgende Zusammensetzung:¹ spec. Gewicht: 1029—33; Wassergehalt: 75 Procent, schwankend von 86,0—89,5 Procent; 3.5 Procent Eiweiss, darunter 2.9 Procent Kasein, 0.5 Procent Albumin; 3.5 Procent Fett; 4.6 Procent Zucker und 0.75 Procent Salze. Das Kasein findet sich nicht eigentlich in gelöstem, sondern in nur gequollenem Zustande.

Wie bei allen thierischen Sekreten kommen auch bei der Milch bedeutende Schwankungen in der chemischen Beschaffenheit vor; sie sind abhängig einmal von der Rasse und Individualität, dann von Zeitdauer der Laktation, von der Tageszeit u. s. w. Ganz bedeutende Grenzen resultiren ferner aus der Fütterung. Die Landwirthe unterscheiden namentlich zwischen der Fütterung mit frischem Gras und der Weide, und andererseits der sogenannten Trockenfütterung (Heu, Stenschnitz, Roggenkleie, Runkelrüben). Bei ersterer wird die Milch reicher und zeigt überhaupt bedeutende Schwankungen, Trockener dagegen liefert die gehaltreichste und gleichmässigste Milch. Auch ist die Zusammensetzung der Nahrung, der Gehalt derselben an Eiweiss u. s. w. von Einfluss. Manche aromatisch riechende oder schmeckende Stoffe des Futters gehen leicht in die Milch über und können sie widerlich machen, so namentlich Schlempe und Rübenschnitzel. — Eine eigenthümlich starke Verschiedenheit ergibt sich auch für die einzelnen Melkportionen; die erste Portion ist immer bedeutend — um das zwei- bis dreifache — fettärmer als die letzte, während Eiweiss und Zucker weniger Schwankungen zeigen.

¹ Die Zusammensetzung der Milch anderer Thiere s. in der Tabelle S. 252.

Trotz dieser Differenzen bietet die zum Markt gebrachte Milch im Ganzen doch eine gleichmässige Zusammensetzung dar, namentlich innerhalb der gleichen Jahreszeit. Es rührt dies wesentlich daher, dass die zu verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Kühen gewonnene Milch vor dem Transport gemischt wird. Es lassen sich daher sehr wohl Durchschnittsziffern aufstellen, so dass man berechtigt ist, jede Milch zunächst als verdächtig anzusehen, welche erheblich von diesem Mittel abweicht.

Die Ausnutzung der in der Milch gebotenen Nährstoffe ist eine relativ gute, wenn auch weniger gut als die des Fleisches. Das Eiweis wird zu mindestens 90 Procent, das Fett zu etwa 95 Procent, die Salze zu 50 Procent, der Zucker vollständig resorbiert. Bei Kindern ist die Ausnutzung eine noch bessere (s. unten).

Demnach stellt die Milch ein vorzügliches Nahrungsmittel dar, das bei kleinen Kindern zur vollen Ernährung ausreicht, bei Kindern vom zweiten Jahre an und bei Erwachsenen eine rationelle Ernährung sehr wesentlich unterstützt. Zu ausschliesslicher Ernährung Erwachsener ist die Milch nicht geeignet, weil selbst in der schwer resorbierbaren Menge von 4 Litern kaum genügend Calorien vorhanden sind.

Die Milch ist als Nahrungsmittel um so bedeutungsvoller, als sie für sehr billigen Preis das sonst so schwer zu beschaffende Eiweis und Fett gewährt (vergl. die Tabelle S. 257).

Der billige Preis erklärt sich indess daraus, dass die Milch eine Reihe von Nachtheilen aufweist, die ihre Verwendbarkeit beeinträchtigen. Einmal geht sie ausserordentlich rasch unter dem Einfluss von Mikroorganismen Zersetzungen ein, die sie zum Genuss ungeeignet machen; zweitens ist kein anderes Nahrungsmittel so leicht zu fälschen und im Nährwerth zu verschlechtern als gerade die Milch; drittens ist sie zur Verbreitung pathogener und infektiöser Bakterien und eventuell von Giftstoffen besonders disponirt. — Auf diese drei hygienisch wichtigen Nachtheile der Milch ist im Folgenden näher einzugehen.

a) Die Zersetzungen der Milch.

Die Veränderungen, welche die frisch gemolkene Milch allmählich durchmacht, bestehen 1) darin, dass bei ruhigem Stehen die Milchkügelchen an die Oberfläche steigen und dort die Rahmschicht bilden. Diese erscheint nach 24 Stunden als dicke, feste Decke, die sich abheben lässt. Man erhält dadurch im Gegensatz zur ursprünglichen „Vollmilch“ 2 Theile, den Rahm und die „abgerahmte Milch“

der „Magermilch“, welche letztere je nach der Vollständigkeit des Aufrahmens mehr oder minder fettfrei ist; werden Centrifugen zum Entrahmen benutzt, so verbleiben nur etwa 0.15 Procent Fett in der Magermilch.

2) Bei längerem Stehen der Milch beobachtet man sodann, dass auf der Oberfläche ein weisslicher, pilziger Ueberzug sich etablirt. Dieser besteht im Wesentlichen aus *Oidium lactis* (s. oben). Gleichzeitig entwickeln sich in der Flüssigkeit unter dem Rahm zahlreiche Bakterien, am schnellsten bei einer Temperatur von 25—30°. Am üppigsten pflegen sehr verbreitete Arten zu wuchern, die man schlechthin als Milchsäurebakterien bezeichnet (vergl. Cap. 1).

Durch diese Bakterien wird der Milchzucker vergohren, so dass freie Milchsäure (durch einige Arten ausserdem gasförmige Producte, wie CO_2) entsteht. Ist etwa 0.2 Procent Milchsäure gebildet, so tritt Gerinnung des Kaseins ein, der untere Theil der Milch scheidet sich damit wieder in 2 Abschnitte, in den Käse und das Serum (Molke). Ersterer enthält gewöhnlich die Reste von Fett eingeschlossen, so dass das Serum nur noch Milchzucker, Salze und Albumin aufweist. — Sehr häufig kommt es übrigens vor, dass Bakterien die Oberhand gewinnen, welche keine saure Reaction, aber trotzdem beim Erwärmen Kaseingerinnung bewirken; letztere erfolgt dann durch ein labähnliches Ferment, das von zahlreichen Bakterienarten producirt wird.

3) Lässt man Milch 8—10 Tage stehen, so bekommt sie ein verändertes Ansehen; es entwickelt sich Gestank nach Buttersäure und es entsteht reichliches Gas (Wasserstoff); zuweilen wird gleichzeitig das Kasein peptonisirt. Alsdann sind Buttersäurebacillen in den Vordergrund getreten. Die meisten betheiligten Arten sind Anaëroben, sind nach GRAM färbbar, bewirken Buttersäuregährung aus dem Milchzucker und liefern daneben oft reichlich Milchsäure. — Will man die reine Wirkung der Buttersäurebacillen ohne die Milchsäuregährung zur Anschauung bekommen, dann muss man die Milchsäurebakterien abtöden. Es gelingt dies meist durch $\frac{1}{2}$ stündiges Erhitzen der Milch auf 100°. Die Sporen der Buttersäurebacillen bleiben bei dieser Behandlung am Leben; werden die Flaschen mit der erhitzten Milch dann fest verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 30 und 35° gehalten, so ist binnen 20 Stunden die Milch in lebhafter Buttersäuregährung.

4) Hält man die durch Erhitzen von Milchsäurebakterien befreite Milch in offenen Gefässen bei 30—40°; oder kocht man die Milch vorher mindestens eine Stunde lang, so dass auch die Sporen der

Buttersäurebacillen abgetödtet sind, dann wird wieder eine andere Gruppe von Bakterien und eine andere Zerlegung bemerkbar. Die Milch verändert sich nunmehr äusserlich wenig, das Kasein gerinnt nicht, saure Reaktion fehlt oder ist geringfügig. Dass solche Milch überhaupt von Bakterien erfüllt und zersetzt ist, sieht man nur daran, dass sich unter der Rahmschicht langsam eine transparente Zone ausbildet, die allmählich breiter wird. Die Milch giebt dann deutliche Peptonreaktion; gleichzeitig ist der Geschmack bitter und kratzig geworden. — Diese langsame Zersetzung wird durch Bakterien aus der Gruppe der Heubacillen bewirkt. Die Sporen derselben sind gleichfalls sehr verbreitet; sie vertragen 1—6 stündige Erhitzung auf 100°. Unter den häufig vorkommenden Heubacillen der Milch wurden mehrere Arten gefunden, deren Reinkultur in Milch toxische Wirkungen ausübt (s. unten).

Alle die beschriebenen Phasen des Bakterienlebens lassen sich mit geringfügigen Abweichungen in jeder Milch beobachten; die betreffenden Bakterien sind offenbar überall verbreitet. Theils entstammen dieselben den Ausführungsgängen der Euter, in denen sich Massen von Bakterien zwischen den Melkzeiten zu entwickeln pflegen; theils gelangen sie durch Kuhexcremente in die Milch; fast jede Milch lässt nach dem Absitzen sogar makroskopisch eine Beimengung von Kuhexcrementen erkennen. Auch die zum Sammeln der Milch dienenden Eimer und Gefässe, die Hände des Melkenden, die in die Milch fallenden Fliegen, der Heustaub, der beim Verfüttern trockenen Heus oft in Massen die Luft erfüllt, sind Quellen der Milchbakterien.

Wird der Inhalt der Eutergänge zu Anfang jedes Melkens entfernt und nicht mit in den Eimer gebracht, wird der Euter sorgfältig gereinigt, der Schwanz der Kuh festgebunden, werden Hände und Gefässe völlig sauber gehalten und wird das Heu nur in angefeuchtetem Zustand in den Stall gebracht, um Heubacillen-haltigen Staub zu vermeiden, so kann eine nahezu sterile, ausserordentlich bakterienarme Milch gewonnen werden.

Zuweilen kommen Abweichungen von den normaler Weise in der Milch ablaufenden Zersetzungen vor, und zwar dadurch, dass weniger verbreitete Bakterienarten zufällig in grösserer Menge in die Milch gelangen und dort die Oberhand gewinnen, so z. B. die Bacillen der blauen Milch, welche ein Chromogen produciren, das bei Luftzutritt und saurer Reaktion dunkelblau wird. Sind diese Bacillen in einer Milchkammer erst einmal zur Entwicklung gelangt, so befallen sie dort immer wieder neue Vorräthe, bis sie durch gründliche Desinfektion des Raumes und der Gefässe vernichtet sind. — Zuweilen tritt rothe oder gelbe Milch auf durch Wucherung anderer Bakterienarten, zuweilen schleimige fadenziehende, in anderen Fällen bittere Milch. Alle

Die abnormen Bakterienansiedelungen haben nicht gerade directe hygienische Bedeutung, aber machen die Milch wegen der starken Veränderung ihres Aussehens oder Geschmacks unverkäuflich.

b) Die Fälschungen der Milch.

Die Fälschung besteht gewöhnlich im Entrahmen oder im Wasserzusatz oder in einer Combination von beiden Manipulationen. Solche theilweis entfettete und verdünnte Milch hat natürlich einen entsprechend geringeren Nährwerth. Ausserdem können durch den Wasserzusatz Infektionserreger in die Milch gelangen. — Andere Fälschungen, z. B. Zusatz von Stärke, Dextrin, Gyps, Gehirn u. s. w., sind nur Curiosa ohne grössere Bedeutung. Dagegen werden der Milch sehr häufig Conservierungsmittel zugefügt, welche bestimmt sind, die Milch länger haltbar zu machen. Der Händler wendet aber diese Mittel gewöhnlich dann an, wenn schon ein gewisser Bakterienreichtum in der Milch vorhanden ist und die bald zu erwartende äusserlich sichtbare Veränderung der Milch, die Gerinnung, noch eine Zeit lang hinausgeschoben werden soll. Zu diesem Zweck wird am häufigsten Soda oder Natron bicarbonicum oder Borax benutzt. Alle diese Mittel hindern aber das Bakterienleben in der Milch in keiner Weise, vielmehr wird im Gegentheil eher begünstigt, und lediglich die Entwicklung freier Säure und damit die Gerinnung wird (übrigens auch nur für sehr kurze Zeit) verzögert. Diese Mittel sind also ganz besonders gefährlich, weil sie nur das äussere Kennzeichen einer schlechten Beschaffenheit der Milch verdecken, während sie dagegen Zahl und Arten der Bakterien nicht vermindern. Sehr häufig wird im Hochsommer die Milch in den Handlungen aufgeköcht, ehe der Siedegrad bis zur Gerinnung der Milch gesteigert ist. Auch dadurch wird eine zu lange oder unzweckmässige Aufbewahrung und in Folge dessen eine intensive Zersetzung der Milch nur verschleiert, und das Bakterienleben oft derartig verschoben, dass gerade die bedenklicheren Zersetzungserreger bei fortgesetzt unzweckmässiger Aufbewahrung in den Vordergrund gelangen. — Borsäure zeigt so gut wie gar keine konservirende Wirkung. Besseren Effekt haben Salicylsäure und Wasserstoffsuperoxyd, die in einer Menge von 0.75 resp. 2.0 o mille die Entwicklung der Bakterien kräftig hemmen, ohne den Geschmack der Milch zu sehr zu alteriren. Wasserstoffsuperoxyd tötet sogar in der angegebenen Concentration die meisten saprophytischen und pathogenen Bakterien. Alle derartige Conservierungsmittel in der Milch dürfen indess nicht geduldet werden, weil sie bei anhaltendem Genuss keineswegs als indifferent, insbesondere für den kindlichen Organismus, anzusehen sind.

c) Krankheitserreger und Gifte der Milch.

Die gewöhnlichen, bei Temperaturen unter 24° gewucherten Saprophyten der Milch scheinen selbst in grosser Menge unschädlich sein. Die in den Milchstuben geronnene Milch, ebenso Kephir ähnliche Präparate, welche enorme Mengen von Milchsäurebakterien enthalten, werden im Allgemeinen ohne Nachtheil ertragen. — A den Buttersäurebacillen scheint keine erheblichere schädigende Wirkung zuzukommen; dieselben finden sich in jedem menschlichen Darm, in jedem Wasser u. s. w.

Nicht unbedenklich erscheinen dagegen einige Arten aus Heubacillengruppe, welche heftige Giftwirkung veranlassen. füttert man Milch, die eine Reincultur dieser Bacillen enthält, an junge Hunde oder Meerschweinchen, so erkranken dieselben schon nach wenigen Stunden an profusen Durchfällen und gehen nach 4—6 Tagen zu Grunde. Wird die inficirte Milch nach 1—2 Tagen durch sterile Milch ersetzt, so erholen sich die Thiere wieder. Sehr deutlich tritt die toxische Wirkung einer Cultur der Heubacillen in Milch bei intraperitonealer Injektion hervor; schon 1 ccm einer 12 Stunden alten Cultur tödtet die Thiere innerhalb eines Tages. — Das Toxin ist in der Leibessubstanz der lebenden Bacillen enthalten; Filtrate oder abgetödtete Culturen sind unwirksam. — Diese Bacillen sind gegenüber dem empfindlichen Organismus des Kindes jedenfalls indifferent; sie sind möglicher Weise bei einem Theil der im Hochsommer vorkommenden akuten Darmkrankheiten der Säuglinge betheiligt, mal sie sich gerade bei höherer Temperatur (über 24°) erst lebhaft vermehren, die Milch nicht sichtbar verändern und durch Kochen die Milch nicht getödtet werden.

Nicht selten werden ferner durch die Milch die Erreger mancher Infektionskrankheiten verbreitet. Kommt in einer Milchwirtschaft ein solcher Krankheitsfall vor, so vollzieht sich die Uebertragung der Infektionserreger auf die Milch theils dadurch, dass die mit Kranken, dessen Wäsche u. s. w. beschäftigten Personen, selbst wenn sie sich nach ihrer Meinung gründlich reinigen, Infektionserreger an den Händen behalten, und in die Milch bringen, wenn sie nachher mit dieser hantiren; theils durch das Wasser eines inficirten Brunnen gelegentlich der Spülung der Gefässe oder der Fälschung der Milch. Die auf diese Weise in die Milch gelangten pathogenen Bakterien finden dort einen guten Nährboden und können sich in steriler Milch, meist ohne jede sichtbare Veränderung derselben, lebhaft vermehren. In der nicht sterilisirten, natürlichen Milch ist allerdings

Vermehrung dieser Bakterien durch die Concurrenz mit den gewöhnlichen Milchsaprophyten einigermaassen erschwert, und namentlich die Säureproduktion der letzteren hemmt die Entwicklung der meisten pathogenen Arten. Jedoch werden dieselben mindestens längere Zeit conservirt. — In manchen Fällen werden die Uebertragungen vom Krankenpersonal direct oder durch Vermittelung der Gefässe u. s. w. ausgehen.

Zahlreiche Erfahrungen zeigen, dass in der That Infektionen durch Milch häufig stattgefunden haben. In einer Anzahl von Typhus-, Cholera-, Diphtherie- und Scharlachepidemien konnte die Milch mit Bestimmtheit als Vehikel der Keime angeschuldigt werden, weil der Versorgungsbezirk einer bestimmten Milch sich genau mit der Ausbreitung der Krankheit deckte.

Weiter ist die Milch noch dadurch bedeutungsvoll, dass sie vom erkrankten Thier aus Infektionserreger auf den Menschen übertragen kann. In erster Linie ist hier die Tuberkulose zu nennen, die Perlsucht des Rindviehs. Man darf annehmen, dass in städtischen Milchwirthschaften mehr als 10 Procent der Kühe tuberkulös sind; sie häufen sich dort, weil tuberkulöse Kühe nicht concipiren und nicht fett werden, und deshalb aus den auf Thierzucht oder Mast eingerichteten ländlichen Wirthschaften möglichst ausrangirt werden. Etwa die Hälfte der tuberkulösen Kühe liefert, auch wenn keine Erkrankung des Euters bemerkbar wird, eine Tuberkelbacillen-haltige Milch. — Betreffs den neuerdings aufgetauchten Zweifel an der Identität der menschlichen Tuberkulose und der Perlsucht s. Cap. 1.

Ferner wird in seltenen Fällen die Maul- und Klauenseuche der Rinder auf den Menschen übertragen. Einzelne Kinder erkranken nach dem Genuss frischer Milch von solchen Kühen unter Fieber, Verdauungsstörungen und bekommen einen Bläschenausschlag auf Lippen und Zunge, zuweilen an den Händen. — Ob Milzbrand und Wuth durch Milch übertragen werden können, ist zweifelhaft. — Wiederholt sind von Kühen, die an Mastitis erkrankt waren, Streptokokken durch die Milch übertragen, die Darmkatarrhe veranlasst haben. Auch die Erreger von Enteritis der Kühe sind zweifellos durch Infektion der Milch mittelst Kuhkoththeilchen auf Menschen übertragen.

Von Giften kommen anscheinend hauptsächlich Colchicin, vielleicht auch die Gifte von Hahnenfuss, Dotterblumen u. s. w. in Betracht, die mit dem Futter aufgenommen werden und Darmaffektionen bei Kindern veranlassen können. Auch das Solanin verdorbener Kartoffeln, ferner gewisse Medikamente gehören vielleicht hierher.

Die prophylaktischen Maassregeln gegen die aus dem Milchgenuss erwachsenden Gefahren bestehen 1) in der Controlle der Marktmilch, 2) in der Ueberwachung der Milchwirthschaften, 3) im Präpariren der Milch im grossen Maassstabe vor dem Verkauf derselben, 4) in Präpariren der Milch durch den Einzelnen nach dem Kauf.

1. Die Untersuchung und Controlle der Milch.

Eine normale Milch soll keinerlei Fälschung oder Zusatz erfahren haben, frisch und unzersetzt sein und keine Krankheitserreger enthalten. Die Controlle kann zunächst Fälschungen dadurch erkennen oder ausschliessen, dass sie a) das specifische Gewicht ermittelt (dasselbe schwankt bei normaler Milch zwischen 1029 und 1033; der Trockenrückstand beträgt mindestens 10.5 Procent); b) durch die Fettbestimmung: normale Milch enthält mindestens 2.7 Procent Fett; c) durch Auffindung von Nitraten, die in normaler Milch fehlen und deren Anwesenheit auf einen Zusatz von Brunnenwasser deutet; d) durch den Nachweis conservirender Zusätze.

Zweitens ist es Aufgabe der Controlle, nachzuweisen, dass die Milch unzersetzt und vom völligen Verderben noch hinreichend weit entfernt ist.

Drittens ist auf pathogene Bakterienarten und auf Gifte zu untersuchen.

a Die Bestimmung des specifischen Gewichts: Zwei Componenten wirken auf eine Abweichung des specifischen Gewichts der Milch von dem des Wassers. Eiweiss, Zucker, Salze machen die Milch schwerer, das Fett dagegen leichter; das Gesamtergebniss ist, dass sie immer schwerer ist als Wasser, aber um so weniger, je mehr Fett oder je mehr Wasser vorhanden ist. Hohes specifisches Gewicht kann durch Reichthum an festen Bestandtheilen und Wasserarmuth, ebensowohl aber auch durch Fettmangel bedingt sein; niedriges specifisches Gewicht durch abnorme Verdünnung mit Wasser oder durch Fettreichthum. Abrahmen und nachfolgender Wasserzusatz lässt daher das ursprüngliche specifische Gewicht der Milch eventuell wieder hervortreten. Weiss der Fälscher, dass das specifische Gewicht controllirt wird, so kann er in der That in der Weise verfahren, dass er durch Abrahmen und Wasserzusatz eine stark gefälschte Milch von normalem specifischen Gewicht liefert. Indess gehört zu dieser Manipulation Zeit und Sorgfalt, und für gewöhnlich weicht jede gefälschte Milch, entrahmte oder gewässerte, von dem durchschnittlichen specifischen Gewicht ab. In vielen Fällen wird man daher durch die Bestimmung des

fischen Gewichts allein die Fälschung entdecken, wenn es auch weiterhin sicherer ist, daneben die Fettbestimmung auszuführen.

Zur Bestimmung des specifischen Gewichts benutzt man Aräometer (sogenannte Milchwaagen, Laktodensimeter). An dem gebräuchlichsten Instrument **QUEVENNE-MÜLLER** finden sich an der Spindel zur Bezeichnung des specifischen Gewichts nur zweistellige Zahlen, vor welchen die Zahlen 1.0 fortgelassen, also statt 1.029 nur die Zahl 29. Beim Ablesen ist das Auge in gleiches Niveau mit dem Skalenthail zu stellen; ferner ist vor der Prüfung die Milch durchzumischen und mit Hilfe von Tabellen eine Temperatur-Correction zu bringen, resp. die Milch auf 15° zu erwärmen oder abzukühlen. — Die Skalen des **MÜLLER'schen** Laktodensimeters sind sehr eng und die Ablesung deswegen ungenau. Sollen die Grade grösser ausfallen, so muss die Spindel dünner gemacht werden. Nach diesem Princip sind die neueren Instrumente von **ELST** und **APEL** construirt; ferner giebt das **RECKNAGEL'sche** Aräometer aus Gummi gute Resultate.

b) Die Fettbestimmung geschieht entweder:

Mit dem Cremometer. Man lässt die Milch 24 Stunden bei mittlerer Temperatur, 36—48 Stunden bei niedriger Temperatur, stehen und liest dann die Höhe der Rahmschicht an einer Skalenthailung ab. Gute Milch liefert 14 Procent Rahmschicht; 3.2 Skalenthailen entsprechen ungefähr 1 Procent Fett. Die Resultate sind oft fehlerhaft.

Oder mit optischen Methoden. Je fettreicher die Milch, um so undurchsichtiger wird sie. Darauf sind eine Reihe von Instrumenten gegründet, von denen das beste das **FESER'sche** Laktoskop ist. In dasselbe werden 20 ccm Milch eingeblasen und dann wird allmählich Brunnenwasser zugefügt, bis nur noch wenige Linien auf einem am Boden des Gefässes befindlichen Milchglaszapfen sichtbar werden. An einer Skalenthailung liest man direct die Fettmenge ab. — Alle optischen Methoden sind dadurch unzuverlässig, dass viel die Beleuchtung und das Auge des Beschauers ankommt, namentlich aber durch, dass die Durchsichtigkeit von der Zahl und Grösse der Milchkügelchen abhängt; Milch von gleichem procentischen Fettgehalt kann je nach der Grösse der einzelnen Fetttröpfchen sehr verschieden durchsichtig sein. Ausser dem Fett kommt aber auch noch das Kasein für die Durchsichtigkeit in Betracht.

Oder durch das **MARCHANT-TOLLENS'sche** Laktobutyrometer. Die Milch wird mit Aether geschüttelt, dieser löst das Fett und zwar am leichtesten, wenn ein Paar Tropfen Natronlauge hinzugefügt werden. Dann wird Alkohol zugesetzt und man erhält nun eine Aetherfettlösung, welche oben auf dem Wasser schwimmt. Die Höhe derselben liest man ab und entnimmt dann aus einer Tabelle, welche dem Apparat beigegeben wird, den Fettgehalt der Milch. Bei Magermilch giebt die Methode ungenaue, bei voller Milch dagegen sehr gute Resultate.

Eine genauere Bestimmung des Fettes ist möglich mit Hilfe des **SOXHLET'schen** Verfahrens, bei welchem man das specifische Gewicht des Aetherextractes der Milch zu bestimmen sucht. 200 ccm Milch werden mit 10 ccm Aether und 60 ccm Aether kräftig geschüttelt. Nach einer Viertelstunde wird die oben angesammelte Aetherfettlösung in ein Glasrohr gebracht, das oben von einem Kühlrohr umgeben ist und mit Hilfe dessen stets die gleiche Temperatur von 17½° hergestellt wird. In der Aetherfettlösung lässt

man dann ein Aräometer schwimmen und bestimmt deren spezifisches Gewicht. Mittels einer Tabelle findet man aus dieser Ablesung den Fettgehalt.

Ferner gelingt die Fettbestimmung schnell und sicher mittels des GERBER'schen Butyrometers. In besonders construirten, an einer Stelle an einer graduirten Röhre verjüngten Glasgefäßen wird die Milch (11 ccm) mit concentrirter Schwefelsäure und etwas Amylalkohol versetzt; es entsteht eine Lösung aller Stoffe, aus welcher sich durch Centrifugiren auf einer kleinen Handcentrifuge (Laktokrit) die Fettlösung so abseheidet, dass ihr Volum an der Theilung des graduirten Rohrs abgelesen werden kann.

c) Nachweis von Nitraten und Zusatz von Brunnenwasser.

Die Milch wird durch Zusatz von Essigsäure oder Chlorecalciumlösung (pro 100 ccm Milch 1.5 ccm einer 20 procentigen Lösung) und Kochen coagulirt, und das Filtrat tropfenweise einer Lösung von Diphenylamin in concentrirter Schwefelsäure zugefügt.

d) Conservierungsmittel.

Die alkalisch reagirenden (Soda, Natr. bic., Borax) erkennt man am einfachsten daran, dass sie die Milch nach 1—2stündigen Kochen dunkelgelb bis braun färben. — Ferner deutet Rosafärbung nach Zusatz von Alkohol und einigen Tropfen Rosolsäure auf alkalische Beimengungen. — Salicylsäure ist durch die Violettfärbung, die einige Tropfen Eisenchlorid in der Milch hervorgerufen, Wasserstoffsuperoxyd durch die Bläuung von Jodkaliumstärkepapier leicht zu erkennen. — Um gekochte Milch nachzuweisen, übersättigt man die Milch mit Kochsalz, erwärmt auf 30—40°, filtrirt und prüft im Filtrat, ob noch durch Kochen gerinnendes Albumin vorliegt.

Um die Zersetzung der Milch zu erkennen, kann man 1) gleiche Volumina Milch und 70procentigen Alkohol mischen; zersetzte Milch gerinnt. — 2) Zur genaueren Feststellung des Grades der Zersetzung ist die von SOXHLET angegebene Titrirung des Säuregrades zu verwenden. 50 ccm Milch werden mit Phenolphthalein versetzt, und dann mit $\frac{1}{4}$ Normalnatronlauge titrirt bis zur Rothfärbung. Für Verkaufsmilch, welche keine zu lange „Inkubationszeit“ hinter sich hat bzw. nicht zu warm aufbewahrt war, findet man etwa 3.5 cm Verbrauch von Natronlauge. Die Anzahl ccm $\frac{1}{4}$ Normalnatronlauge, welche zur Neutralisation von 100 ccm Milch erforderlich sind, bezeichnet man als „Säuregrade“; zulässig sind also noch 7 Säuregrade. — 3) Nicht selten tritt bei einer bakterienreichen Milch die saure Reaktion zurück, zumal wenn die Milch, wie es im Hochsommer häufig geschieht, aufgekocht und dann bei hoher Temperatur aufbewahrt war. Die unter diesen Umständen entwickelten Bacillen (darunter die Heubacillen) produciren wenig Säure, statt dessen aber Labferment, und dieses bringt die Milch beim Erwärmen zum Gerinnen. Sicherer ist daher die Feststellung der Bakterienzahl, die durch Gelatineplatten mit $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{10}$ und 1 Tropfen Milch und Zählung der Colonieen leicht gelingt. Beilich behandelte ganz frische Milch enthält im Mittel höchstens 2000 bis

00 Keime in 1 ccm; deutliche Zunahme ist erst nach 4—5 stündigem Aufenthalt der Milch bei 20—25° zu bemerken. Ein Gehalt von mehr 100 000 Keimen in 1 ccm deutet auf längere unzweckmässige Aufbewahrung der Milch oder starke Bakterieneinsaat und zeigt an, dass die Milch nur kurze Zeit von dem Stadium der vollständigen Zersetzung und Gerinnung entfernt war.

Eine Prüfung auf pathogene Arten von Bakterien durch Cultur wird in den meisten Fällen vergeblich sein. Perlsucherreger sind durch Ueberimpfung eines Gemenges aus Rahm und Bodensatz der Milch auf Meerschweinchen nachzuweisen. — Für die Auffindung von Futtergiften bestehen gleichfalls keine praktisch verwendbaren einfachen Methoden.

Zu einer Controle auf dem Markte und in den Verkaufsläden wird nur die Aräometerprobe und höchstens noch das FESZAR'sche Laktoskop benutzt. Ist das spezifische Gewicht abnorm, so wird der weitere Verkauf der Milch einstellen inhibirt und eine Probe im Laboratorium mittels des GRASSE'schen Lactymeters oder der SOXHLET'schen Methode auf den Fettgehalt geprüft. Wird hierdurch eine zu niedrige Fettmenge oder im Verein mit der Aräometerprobe ein zu hoher Wassergehalt erwiesen, so ist die betreffende Milch unter allen Umständen als minderwerthig zu confisciren, nebenbei die Herkunft, Anzahl der Kühe u. s. w. sorgfältig zu notiren. Es fragt sich dann aber noch, ob eine Fälschung vorliegt, die nach dem Nahrungsmittelgesetz streng bestraft wird, oder ob etwa die abnorme Beschaffenheit der Milch durch die Art der Fütterung bedingt ist.

Zu diesem Zweck wird eine weitere Probe der Milch der genaueren Analyse (z. B. auf Nitrate) unterworfen. Ergiebt sich daraus mit Sicherheit die Fälschung, so wird die Bestrafung erkannt oder Anklage erhoben. Ist auch nach der genauen Analyse die Einrede möglich, dass mangelhafte Fütterung die Ursache der Abweichung sei, so ist eventuell die „Stallprobe“ vorzunehmen. Dieselbe soll mindestens innerhalb dreier Tage nach der Confiscation, ohne dass inzwischen die Fütterung der Thiere geändert ist, ausgeführt werden und zwar in der Weise, dass alle betheiligten Kühe gut ausgemolken, die Milch gemischt und dann untersucht wird. Dieselbe darf höchstens um 2 Grad im spezifischen Gewicht, um 0.3 Procent Fett von der beanstandeten Milch abweichen, widrigenfalls die Fälschung als erwiesen anzunehmen ist.

Bis jetzt berücksichtigt die marktpolizeiliche Controlle der Milch lediglich die etwaige Fälschung. Vom hygienischen Standpunkt aus ist diese aber nicht als so bedeutungsvoll anzusehen, wie eine zu fortschrittene Zersetzung der Milch. Diese lässt sich mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln sehr wohl controlliren, und es wäre zu wünschen, dass eine solche Controlle neben oder statt der bisherigen Untersuchung stattfände, und dass das wiederholte Vorkommen eines abnormen Säuregrades oder einer abnormen Bakterienzahl zur Bestrafung des Händlers führte. — Bezüglich der Gefahr

einer Infektion oder Intoxikation vermag die Controle nichts zu leisten, und wir sind in dieser Beziehung auf andere prophylaktische Maassregeln angewiesen.

2. Die Ueberwachung der Milchwirthschaften.

Eine Verschleppung von Perlsucht, Maul- und Klauenseuche kann dadurch theilweise gehindert werden, dass die Thiere der Milchwirthschaften in regelmässigen Zwischenräumen von einem Thierarzt, unter Zuhülfenahme von Tuberculininjektionen, untersucht und eventuell sofort ausgerärt werden. Neuerdings wird allerdings die Ansicht vertreten, dass es genügt, wenn nur die klinisch diagnosticirbaren Erkrankungen und namentlich diejenigen mit Eutertuberculose ausgemerzt werden; ist die Reaktion auf Tuberculin das einzige Symptom, so soll die Milch Uebertragungen auf andere Thiere nicht bewirken können.

Um ferner die Uebertragung von Typhus- und Cholerabacillen oder anderen Infektionskrankheiten zu verhüten, sind Krankheitsfälle dieser Kategorie in Milchwirthschaften mit besonderer Vorsicht zu behandeln, für Absperrung und Desinfektion ist zu sorgen, die Brunnenanlage zu revidiren und eventuell der Milchverkauf zeitweise zu verbieten.

Die Einsaat abnormer Saprophyten ist durch peinliche Reinlichkeit aller Räume und Gegenstände, die mit der Milch in Berührung kommen, zu vermeiden. Der Stall, die Euter der Kühe sind möglichst rein zu halten; die Gefässe, Milchkühler u. s. w. sollen durch Ausscheuern mit heisser Sodalösung stets völlig frei bleiben von Milchresten, ausserdem sind sie eventuell von Zeit zu Zeit nach erfolgter Reinigung mit Sodalösung auszukochen oder mit Wasserstoffsuperoxyd (1:200) zu desinficiren. Die Aufbewahrungsräume sollen kühl, luftig, leicht zu reinigen und geschützt gegen Fliegen sein. Jede Unsauberkeit ist zu bestrafen.

Eine derartige Ueberwachung der Milchwirthschaften und Verkaufslöcäle ist vom hygienischen Standpunkt entschieden bedeutungsvoll, aber bis jetzt kaum irgendwo in vollem Umfang durchgeführt.

3. Präparation der Milch vor dem Verkauf.

Theils die finanzielle Schädigung durch das leichte Verderben der Milch, theils die Gefahr der Uebertragung pathogener Mikroorganismen hat zu Versuchen geführt, vor dem Verkauf der Milch die hinein gelangten Bakterien zu tödten und dadurch die Milch haltbarer und frei von pathogenen Keimen zu machen.

Nachdem der Zusatz chemischer Substanzen sich als entschieden unzureichend erwiesen hatte, sind Kälte und Hitze als die am leichtesten anwendbaren desinficirenden Mittel in Gebrauch gezogen.

Durch sofortiges Abkühlen der frisch gemolkenen Milch, Aufbewahren in kühlen Räumen und Transport in Eispackung lässt sich die Bakterienentwicklung in der Milch und die Zersetzung derselben beträchtlich verzögern; insbesondere wenn gleichzeitig durch die oben angeführten Vorsichtsmaassregeln für geringe Bakterieneinsaat gesorgt wird. Diese Mittel sollten daher in jeder Milchwirtschaft so viel als möglich Verwendung finden.

Der Effekt ist jedoch immerhin unvollkommen, zumal die Abkühlung im Mittel der ganzen Zeit bis zum Verkauf höchstens bis auf 10° sinkt; eine gewisse Vermehrung der Bakterien findet auch bei niedriger Temperatur noch statt; ausserdem bleiben die pathogenen Keime lebensfähig. Von CASSE und HELM wird gleichwohl die Herstellung von Eismilch empfohlen; die Milch wird mittelst Kaltluftmaschine gekühlt und für den Transport mit 15—30 Procent gefrorener Milch versetzt. Für die Conservirung leistet dies Verfahren Gutes; hygienisch einwandfrei ist aber solche Milch erst, wenn vor dem Abkühlen die pathogenen Keime durch Hitze (Pasteurisiren) abgetödtet sind, oder wenn die Eismilch zunächst in Centralmolkereien kommt, wo nachträglich pasteurisirt werden kann.

Vollkommenere Resultate namentlich gegenüber den Krankheitsregnern können durch Hitze erzielt werden. Hier kommen drei Methoden in Frage:

a) Das Pasteurisiren, d. h. kurzes Erhitzen auf $65-90^{\circ}$ und nachfolgendes rasches Abkühlen, so dass der Rohgeschmack der Milch möglichst erhalten bleibt.

Das Pasteurisiren wurde früher gewöhnlich so ausgeführt, dass man die Milch langsam über die gewölbten inneren Wandungen eines Cylinders fliessen lässt, der an seiner äusseren Fläche durch Wasserdampf oder Wasser erhitzt wird. Zufluss und Abfluss ist so geregelt, dass die in ganz dünner Schicht ablaufende Milch zuletzt auf die Temperatur von 70° , aber allerdings nur sehr kurze Zeit, gebracht wird. Aus dem Ablauf kommt die Milch sofort in einen Kühler.

Bei solcher Behandlung der Milch geht von den Saprophyten nur ein Theil zu Grunde; Typhusbacillen, Tuberkelbacillen, Staphylokokken werden nicht sicher vernichtet. Die Unvollkommenheit der Wirkung beruht darauf, dass die Erhitzungsdauer zu kurz ist, und dass speciell die höchste Temperatur $60-70^{\circ}$ nur für einen Moment einwirkt.

Die angeführten Fehler der älteren Pasteurisirapparate werden vermieden, wenn die Apparate mit sogenannter gezwungener Führung, in welchen die Milch mehrere Minuten auf der Maximaltemperatur verbleibt. Am günstigsten ist

die Einwirkung von 85° zwei Minuten lang; dabei werden auch Tuberkelbacillen sicher abgetödtet und der Geschmack der Milch sehr wenig verändert.

b) Partielles Sterilisiren durch Erhitzen der in bakteriendicht verschlossene Flaschen eingefüllten Milch während 30—60 Minuten auf 100—103°.

Gewöhnlich benutzt man strömenden Dampf von 100—103° und die gebräuchlichen Desinfektionsöfen, z. B. THOMAS' schein'scher Construction, denen leicht eine für die Aufnahme von Milchflaschen passende Einrichtung gegeben werden kann. Als Flaschen sind solche mit Patentverschluss (wie bei den Bierflaschen) zu $\frac{1}{2}$, oder 1, Liter Inhalt besonders geeignet. Die Flaschen werden mit lose aufgelegtem Verschluss in den Ofen eingesetzt, dann wird erhitzt bis zur Maximaltemperatur; hat diese 5 Minuten eingewirkt, so öffnet man den Ofen, rollt den Einsatz mit Milchflaschen heraus und schliesst dieselben durch Andrücken des Verschlusses. Dann schliesst man den Ofen wieder und lässt die Temperatur von 100—103° noch $\frac{1}{2}$ Stunde bis 1 Stunde einwirken. — Von verschiedenen Fabrikanten sind Öfen construiert, in welchen der definitive Verschluss der Flaschen ohne Oeffnen des Ofens vorgenommen werden kann.

Die Wirkung dieses Sterilisirens ist die, dass die Infektionserreger und die Saprophyten mit Ausnahme der Sporen der Heubacillen abgetödtet werden. Letztere können bei warmer Aufbewahrung der Milch wuchern und Toxine liefern. Solche Milch ist daher kühl aufzubewahren, und hat begrenzte Haltbarkeit; sie darf nicht als „keimfreie Dauermilch“ verkauft werden.

Bei längerer Aufbewahrung tritt ausserdem eine Veränderung des Rahms ein, der Art, dass derselbe beim Schütteln nicht mehr vollständig emulgirt wird, sondern zum Theil in grosse, nicht mehr zertheilbare Fetttropfen umgewandelt ist. Namentlich beim Schütteln der unvollständig gefüllten Flaschen auf dem Transport wird diese Zersetzung des Rahms begünstigt. Anhaltender Land- oder Seetransport pflegt vollständiges Ausbuttern der Milch zu veranlassen. — Für kleinere Kinder ist schon aus diesem Grunde die käufliche sterilisirte Milch nicht als gleichwerthig mit der im Hause gekochten anzusehen. Ferner ist aber nach dem anhaltenden Gebrauch sterilisirter Milch bei Kindern mehrfach die BARLOW'sche Krankheit beobachtet, eine Art von Scorbut, der vielleicht auf einen Mangel der lange erhitzten Milch an resorbirbaren Phosphaten (oder Eisen?) zurückzuführen ist.

c) Vollständige Sterilisation der Milch kann erzielt werden durch etwa 6stündiges Erhitzen auf 100°; dabei wird aber die Milch braun und im Geschmack völlig verändert. Besser geeignet ist die Anwendung gespannten Dampfes von ca. 120—125°. Die Sterilisation erfolgt dann innerhalb erheblich kürzerer Zeit, und Farbe, Geruch und Geschmack der Milch werden wenig verändert.

Die „Natura-Milch“-Gesellschaft in Waren in Mecklenburg stellt nach letzterem Verfahren eine in der That völlig sterile Milch her, bei welcher auch das Ausbuttern auf dem Transport vermieden wird, dadurch dass die ohne jeden Schüttelraum zum Versandt gelangt.

d) Condensirte Milch. Die Milch ist im Vacuum eingetrocknet $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{5}$ ihres Volumens, dann in zugelötheten Büchsen auf 100° abgekühlt. — Damit das Präparat auch nach dem Oeffnen der Büchsen noch haltbar sei, wird meistens so viel Rohrzucker zugesetzt, dass keine Bakterien-Entwicklung stattfinden kann, für 1 Liter Milch ca. 50 g Zucker.

Die Indikationen für die Anwendung der genannten Conservungsverfahren gehen ziemlich weit auseinander. In milchreichen Ländern ist es — ganz abgesehen von den oben bezeichneten Gefahren: kleinere Kinder — keinesfalls empfehlenswerth, die partiell oder völlig sterilisirte Milch in grösserem Umfang auf den Markt zu bringen, schon wegen der erheblichen Vertheuerung. Mit der Veränderung der Farbe und mit dem Verlust des Geschmacks und des Geruchs der natürlichen Milch sind ausserdem alle die Kriterien verschwunden, deren sich bisher das Publikum mit Recht bediente, um eine normale, gehaltreiche, in sauberen Stallungen gewonnene und reinlich behandelte Milch von abnormer und verschmutzter Milch zu unterscheiden.

In grösserer Ausdehnung empfiehlt sich für den Markt milchreicher Länder nur das Pasteurisirverfahren, das alle jene Kriterien für die Beurtheilung der Milch intakt erhält, dabei sicher vor Infektionskeimen schützt, einer übermässigen Entwicklung von Saprophyten vorbeugt, sofern nicht eine abnorm verschmutzte und bereits halb verdorbene Milch dem Pasteurisiren unterworfen wird, und dabei so billig ist, dass die Vertheuerung weniger als 1 Pf. pro Liter Milch beträgt. Zu einer Art von Pasteurisirzwang würde z. B. eine gesetzliche Vorschrift über die Grenze der Bakterienzahl in der Verkaufsmilch führen. Ist ein Gehalt von 100000 Bakterien pro 1 ccm normirt, so kann dieser durch penibelste Reinlichkeit und sorgfältigste Eiskühlung, oder aber einfacher und sicherer durch Pasteurisiren erzielt werden. — Zu beachten ist, dass beim Pasteurisiren die Heubacillen nicht vernichtet werden, dass also kühle Aufbewahrung und für Säuglinge Aufkochen vor dem Gebrauch unbedingt erforderlich bleibt.

Für die Versorgung milcharmer Länder, ferner für Reisende, für die Schiffsversorgung u. s. w. ist die total sterilisirte Milch in Büchsen ohne Schüttelraum von grosser Bedeutung und weit mehr zu empfehlen wie die condensirte Milch. Die durch Verdünnen mit Wasser aus condensirter Milch hergestellte Milch steht einer gut sterilisirten Milch in Aussehen, Geruch und Geschmack erheblich nach, ist umständlich zu bereiten und zeigt in der Zusammensetzung fast stets gewisse Abweichungen von der frischen Milch.

4. Präparation der Milch nach dem Kauf.

Der Einzelne kann sich gegen die aus dem Gehalt der Milch an Bakterien hervorgehenden Gefahren leicht schützen durch Kochen der Milch. Erhitzt man dieselbe 10 Minuten lang auf 97—100°, so sind alle Milchsäurebakterien, die von kranken Menschen oder Thieren stammenden Parasiten, sowie die sporenfreie Buttersäure- und Heubacillen vernichtet. Nur die Sporen der letzteren bleiben am Leben, können indess durch Kühlhalten der Milch (unter 20°C.) an der Wucherung verhindert werden. Bekanntlich gehört aber eine gewisse Aufmerksamkeit zu einem anhaltenderen Erhitzen der Milch; es tritt dabei leicht Ueberkochen und Anbrennen ein, und daher ist es Sitte, Milch nur aufzukochen, d. h. dieselbe nur für kürzeste Zeit bis in die Nähe des Siedepunktes, gewöhnlich aber auf noch geringere Wärmegrade zu erhitzen. Dabei erfolgt keine Tödtung der pathogenen Keime.

Um ohne die Gefahr des Ueberkochens Milch mehrere Minuten lang zu erhitzen, bedient man sich daher zweckmässig der „Milchkocher“ die im folgenden Abschnitte näher beschrieben sind.

2. Die Ernährung der Kinder mit Milch und Milchsurregaten.

Der Nährstoffbedarf des Kindes.

Die Gewichtszunahme des wachsenden menschlichen Körpers erhält aus folgender Tabelle:

Alter	Tägliche Zunahme		Alter	Tägliche Zunahme		Alter	Tägliche Zunahme	
	Gramm	Absolutes Gewicht Kilo		Gramm	Absolutes Gewicht Kilo		Gramm	Absolutes Gewicht Kilo
0	0	3.5	7 Monate	12	8.33	9 Jahre	5.0	24.1
1 Woche	0	3.4	8 „	10	8.63	10 „	5.5	26.1
2 Wochen	43	3.85	9 „	10	8.93	11 „	5.0	27.9
3 „	50	4.25	10 „	9	9.2	12 „	8.8	31.0
4 „	43	4.25	11 „	8	9.45	13 „	11.8	35.3
5 „	43	4.8	12 „	6	9.6	14 „	14.0	40.5
6 „	30	5.0	2 Jahre	6.7	12.0	15 „	16.2	46.4
7 „	30	5.2	3 „	4.6	13.6	16 „	19.2	53.4
8 „	30	5.4	4 „	4.6	15.1	17 „	11.0	57.4
3 Monate	28	6.35	5 „	4.4	16.7	18 „	10.7	61.3
4 „	22	7.05	6 „	3.5	18.0	19 „	5.5	63.3
5 „	18	7.55	7 „	6.0	20.2	20 „	4.7	65.0
6 „	14	7.97	8 „	6.0	22.3			

Demnach ist die Zunahme des Körpergewichts weitaus am bedeutendsten in den ersten 3—4 Lebensmonaten; von da ab beginnt

Der Verlauf der Curve sich allmählich abzuflachen, bis zwischen dem 12. und 16. Jahre nochmals ein steileres Ansteigen erfolgt, so dass im 16. Jahre die tägliche Gewichtszunahme derjenigen des 4.—5. Lebensalters gleichkommt.

Es würde jedoch irrig sein, wollte man wesentlich aus dieser Gewichtszunahme die Nothwendigkeit einer erheblich gesteigerten Nahrungszufuhr ableiten. Die beim Wachsthum angesetzte Körpersubstanz wächst nicht nur in den ersten Lebenswochen wohl einen bedeutenden, später aber einen sehr geringen Bruchtheil der erforderlichen Nahrung aus. Auf feste Substanz berechnet setzt das 10wöchentliche Kind täglich etwa 10 g Eiweiss und Fett an, die im 5. bis 10. Theil der täglich aufgenommenen Nahrung enthalten sind.

Der hauptsächlichste Grund für das relativ grosse Nahrungsdürfniss des jugendlichen Körpers ist vielmehr darin zu suchen, dass

Folge der relativ grösseren Oberfläche die Wärmebildung auf die Körpergewichtseinheit berechnet bedeutend höher ist als beim Erwachsenen. Experimente im Respirationsapparat haben gezeigt, dass Kinder schon im Alter von 3—7 Jahren pro 1 Kilo Körpergewicht mehr als doppelt so viel Kohlensäure ausscheiden als Erwachsene. Ein 5wöchentliches Kind von 4,5 Kilo Gewicht lieferte pro Tag 352 Calorieen, also pro Kilo 80 Calorieen, während beim Erwachsenen nur 40 Calorieen pro Kilo zu rechnen sind.

Aus dem Kostmaass gesunder, in der Säuglingszeit theils mit Frauenmilch, theils mit Kuhmilch genährter Kinder sind folgende Zahlen für den Nahrungsbedarf des Kindes gewonnen:

	Bedarf pro 1 Kilo Körpergewicht			Calorieen
	Eiweiss	Fett	Kohlehydrate	
	Gramm	Gramm	Gramm	
3. Tag	2.4	2.8	2.9	47.8
Ende der 1. Woche	3.7	4.3	4.4	73.2
„ „ 3. „	4.8	5.0	5.7	89.6
„ „ 8. „	4.5	5.2	5.4	88.6
„ des 5. Monats	4.5	4.8	5.6	86.2
„ „ 12. „	4.0	4.0	8.0	86.2
„ „ 18. „	4.0	3.5	9.0	85.8
„ „ 2. Jahres	4.0	3.0	10.0	85.3

Vollbefriedigendes Wachsthum findet nur statt, wenn der Energiequotient der Nahrung (d. h. die tägliche Calorieenzufuhr pro Kilo Körpergewicht) nicht unter 100 Cal. sinkt (HEUBNER).

Beachtenswerth ist, dass erfahrungsgemäss etwa vom 7. Monat die Zufuhr von Eiweiss und Fett ungefähr gleich bleiben darf, während die Menge der zerlegten Kohlehydrate wesentlich ansteigen muss; d. h. es hat von da ab das Milchquantum annähernd gleich zu bleiben, aber es sind Kohlehydrate in anderer Form zuzufügen.

Auch bei älteren Kindern ist die Ernährung genau zu überwachen, besonders in den Jahren der Pubertätsentwicklung. Die Gewichtszunahme ist immer noch bedeutend, der Umsatz relativ hoch, und die Nahrungszufuhr muss daher quantitativ und qualitativ sorgfältig angepasst sein. Nach HEUBNER und CAMERER braucht ein Kilo Kind an Nahrung:

Alter	Eiweiss	Fett	Kohlehydrate	Calorien
2— 4 Jahre	3.6 g	3.1 g	9.2 g	75.3
5— 7 „	3.2 „	2.2 „	10.8 „	73
8—10 „	2.7 „	1.3 „	10.2 „	60
11—14 „	2.5 „	1.0 „	8.0 „	55

Bei Kindern, welche reichliche körperliche Bewegung im Freien haben, pflegt in dieser Zeit Appetit und Verdauungskraft derartig zu sein, dass sie auch ohne besondere Auswahl der Kost stets die ausreichenden Nährstoffe erhalten. Bei mehr ruhiger, sitzender Lebensweise in Zimmerluft (Schüler höherer Lehranstalten, Handwerkerlehrlinge u. s. w.) ist dagegen Fürsorge für einen ausreichenden Gehalt der Nahrung an Eiweiss, Fett und Salzen (Eisen) durchaus erforderlich, wenn nicht der Grund zu dauernden Ernährungsstörungen, Eiweissverarmung, Anämie und Hydrämie, sowie auch zu der Unfähigkeit der Mütter zum Selbststillen der Kinder gelegt werden soll.

Der Säugling bedarf nicht nur einer besonders reichlichen Nahrungszufuhr, sondern er ist auch in Bezug auf die Qualität der Nahrung weit empfindlicher als der Erwachsene. Das nöthige Nahrungsquantum muss daher dem Säugling ausschliesslich in Form einer leicht verdaulichen, in den ersten Monaten amyllumfreien, reizlosen und keine Bakterien enthaltenden Kost geboten werden.

a) Die Ernährung des Kindes mit Frauenmilch.

Den vorstehenden Anforderungen entspricht naturgemäss am besten die Frauenmilch und zwar soll der Säugling, wenn irgend möglich, von der eigenen Mutter genährt werden: nur übertragbare Krank-

iten, hochgradige Anämie und Verdacht auf Tuberkulose sollten von m Versuch einer solchen naturgemässen Ernährung zurückhalten.

Die Frauenmilch ist gelblichweiss, von stark süßem Geschmack, lgt alkalische Reaktion, ein specifisches Gewicht von 1028—34 und thält nach HEUBNER und RUBNER folgende Bestandtheile:

88.6 Procent Wasser; 11.4 Procent Trockensubstanz; 0.16 Procent Eiweiss-Stickstoff = circa 1 Procent Eiweiss (etwa 12 Procent das Gesamt-N.'s ist auf Extraktivstoffe zu rechnen); 3.0 Procent Fett, 7.0 Procent Salze. — 100 g Milch liefern 58 nutzbare Calorien.

Die Eiweissstoffe bestehen grösstentheils aus Albumin, daneben s kleinen Mengen Kasein, Protalbumin und Pepton; durch Magensaft rintt das Eiweiss in weichen Flocken; das geronnene Kasein reagirt alisch, wird leicht gelöst und peptonisirt. — Das Fett besteht aus iglyceriden der Olein-, Palmitin- und Stearinsäure. — An Aschen- standtheilen enthält die Frauenmilch in 1 Liter:

0.7 g Kali, 0.25 Natron, 0.33 Kalk, 0.06 Magnesia, 0.004 Eisen, 0.47 Phosphorsäure, 0.43 Chlor.

Die Zusammensetzung schwankt ähnlich wie die der Kuhmilch nach dem Alter und der Individualität, nach der Zeitdauer der aktation, nach der Nahrung und dem Ernährungszustand, namentlich er je nachdem die Probe zu Anfang des Saugens der noch vollen rust oder aber gegen Ende der fast entleerten entnommen ist.

Die Ausnutzung der Frauenmilch durch den Säugling ist eine usserordentlich vollkommene; von den gelieferten Calorien sind 91.6 rocent verwerthbar. Auch die Salze werden zu 90 Procent ausgenutzt. ie Fäces enthalten vorzugsweise Fettsäuren, Kalk, geringe Spuren von iweiss und machen etwa 3 Procent der genossenen Nahrung aus.

Bezüglich der Menge der dem Säugling zu gewährenden Frauen- ilch besteht die Vorschrift, dass am ersten Tage nach der Geburt —3, an den folgenden Tagen im Mittel 6—7 Mahlzeiten gereicht erden und zwar stets in den gleichen regelmässigen Abständen mit ausen von mindestens $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ Stunden. Jede Mahlzeit dauert wa 20 Minuten. Der Säugling verzehrt:

pro Mahlzeit:			pro 24 Stunden:		
am 1. Tag	10 g	am 6. Tag	50 g	in der 1. Woche	298 g
" 2. "	20 "	" 10. "	70 "	" 2. "	363 "
" 3. "	30 "	" 20. "	100 "	" 10. "	986 "
" 4. "	40 "	" 40. "	130 "	" 12. "	940 "
" 5. "	50 "	" 100. "	150 "	" 20. "	950 "

Zeigen die mit Frauenmilch genährten Kinder keine normale Entwicklung, so kann — soweit die Nahrung in Betracht kommt — die Ursache zunächst in der Art der Darreichung, namentlich in zu kurzen Pausen und zu häufigen Mahlzeiten liegen. Ist dies ausgeschlossen, so muss in einer quantitativ unzureichenden Produktion der Milch oder in einer qualitativ abnormen Beschaffenheit derselben die Ursache gesucht werden. Die Quantität der von der Mutter resp. Amme gelieferten Milch lässt sich leicht dadurch feststellen, dass der Säugling an einem Tage vor und nach jedem Anlegen gewogen, dass dann die einzelnen so ermittelten Nahrungsmengen addirt und mit dem normalen 24 stündigen Nahrungsquantum verglichen werden. Ist die Quantität genügend gefunden, so ist an eine abnorme Beschaffenheit der Frauenmilch zu denken, z. B. an einen zu hohen Fettgehalt u. s. w.

Vom 7. Monat ab ist eine Zugabe, namentlich von Kohlehydraten und Salzen erforderlich; erstere können in Form von Zwieback, Gries u. s. w., letztere hauptsächlich in Form von Spinat, Carotten u. dgl. gereicht werden. Etwa vom 10. Monat ab ist die Frauenmilch durch Kuhmilch zu ersetzen.

b) Die Ernährung des Kindes mit Kuhmilch.

Ist Frauenmilch nicht zu beschaffen, so muss dem Säugling das der Frauenmilch immerhin ähnlichste Nahrungsmittel, die Thiermilch, gegeben werden. Die Milch von Stuten und Eselinnen scheint die weitgehendste Aehnlichkeit mit der Frauenmilch zu haben; doch liegen zu wenig Erfahrungen über ihre Bekömmlichkeit vor und ihre Beschaffung in ausgedehnterem Maassstabe stösst auf grosse Schwierigkeiten.

Wir sind daher fast lediglich auf die Kuhmilch angewiesen, die allerdings sehr bedeutende Differenzen gegenüber der Frauenmilch erkennen lässt. Dieselben betreffen:

1) Die chemische Zusammensetzung. Die Kuhmilch enthält im Mittel: 87.5 Procent Wasser, 3.4 Procent Eiweiss, 3.6 Procent Fett, 4.8 Procent Zucker, 0.7 Procent Salze; an Salzen enthält 1 Liter Milch: 1.8 g Kali, 1.1 Natron, 1.6 Kalk, 0.2 Magnesia, 0.003 Eisen, 2.0 Phosphorsäure, 1.7 Chor. Die hauptsächlichsten Differenzen lassen sich folgendermaassen zusammenfassen:

Frauenmilch	Kuhmilch
Weniger Eiweissstoffe.	Mehr Eiweissstoffe.
Mehr Zucker.	Weniger Zucker.
Alkalische Reaktion.	Amphotere Reaktion.
Wenig Kasein.	Die Eiweissstoffe bestehen hauptsächlich aus Kasein.
Mit Magensaft weiche flockige Gerinnung.	Mit Magensaft derbe Gerinnung.

Frauenmilch**Kuhmilch**

Das Kaseiningerinnsel reagirt alkalisch. Das Kaseiningerinnsel reagirt sauer.

Viel weniger Salze, namentlich Phosphorsäure, Kalk und Chlor. Erheblich mehr Salze.

Dazu kommt, dass die Kuhmilch sehr bedeutenden Schwankungen ihrer Zusammensetzung unterliegt, und dass diese Verschiedenheiten vom Säugling schlecht vertragen werden. Es ist das nicht dadurch auszugleichen, dass die Milch von ein und derselben Kuh bezogen wird; vielmehr treten auch dann je nach dem Futter, der Tageszeit u. s. w. grelle Wechsel in der Beschaffenheit der Milch auf. Im Gegentheil zeigt die von mehreren Kühen und Tageszeiten gemischte Milch die constantere Zusammensetzung und wird erfahrungsgemäss vom Säugling besser vertragen.

2) Die Ausnutzung und Verdaulichkeit. Die Ausnutzung ist im Ganzen bei der Kuhmilch etwas schlechter als bei der Frauenmilch. Die Menge der Fäces beträgt 6—7 Procent der Nahrung; das Eiweiss wird zu 98 Procent, das Fett zu 94 Procent, die Salze nur zu 56 Procent, der Kalk nur zu 30 Procent ausgenutzt. Der Koth besteht grösstentheils aus fettsaurem Kalk, enthält aber auch deutliche Spuren von Eiweiss. — Ferner ist die Kuhmilch schwerer verdaulich, weil sie gehaltreicher ist und insbesondere viel derbere Kaseiningerinnsel liefert, in welche die Verdauungssäfte nur langsam vordringen.

3) Der Bakteriengehalt. Die Frauenmilch enthält nicht selten Bakterien, die von der äusseren Haut her in die Ausführungsgänge der Drüsen hineingewuchert sind und daher in den erstentleerten Milchportionen am reichlichsten vorkommen. Vorzugsweise handelt es sich dabei um *Staph. pyog. albus*. Im Uebrigen ist die Frauenmilch frei von schädigenden Keimen. Dagegen können mit der Kuhmilch die zahlreichen oben aufgezählten saprophytischen und infektiösen Bakterien in den Darm des Kindes gelangen.

Man versucht, diese Abweichungen der Kuhmilch nach Möglichkeit zu beseitigen:

1) Durch Kindermilchanstalten, wie sie jetzt in den meisten grösseren Städten eingerichtet sind, und durch welche eine gleichmässige und möglichst reinlich gehaltene Milch geliefert wird.

Die dazu benutzten Kühe gehören Rassen an, welche für Perlsucht möglichst wenig empfänglich sind; dieselben werden bis höchstens 10 Monate nach dem Kalben zur Milchproduktion verwendet; das ganze Jahr hindurch wird ein bestimmtes gleichmässiges Trockenfutter (pro Tag 13 Kilo Heu und Grummet,

3 Kilo Gerstenmehl, 3 Kilo Kleie oder 2 Kilo Weizen- oder Maismehl, 6 g Salz gereicht; und die Milch aller Kühe, ebenso die Morgen- und Abendmilch wird gemischt. — Gleichzeitig ist auf möglichstes Fernhalten saprophytischer und pathogener Bakterien Bedacht genommen. Ein Thierarzt untersucht die neu angekauften Thiere und monatlich einmal die Standthiere. Ferner werden der Stall, die Futtertröge, die Thiere, namentlich aber die Gefässe und Flaschen penibel reinlich gehalten. Die Flaschen oder Kannen sind mit sicherem Verschluss (Plomben) versehen; der Transport geschieht im Sommer in Eispackung. — Der geschilderte Betrieb der Anstalten verursacht selbstverständlich bedeutendere Kosten und der Preis solcher Kindermilch stellt sich daher auf 30—50 Pf. pro Liter. Der Preisunterschied gegenüber beliebiger Marktmilch beträgt also im Mittel 20 Pf.; was bei einem durchschnittlichen täglichen Consum von 1 Liter immerhin nur 6 Mark im Monat und für die gesamte Ernährung eines Säuglings etwa 60 Mark ausmacht.

2) Durch eine Präparation der Milch, die darauf hinausgeht, die Kuhmilch in Bezug auf die chemische Zusammensetzung der Muttermilch ähnlicher zu machen. Am einfachsten sucht man durch Wasserzusatz die Eiweissstoffe und Salze, die in der Kuhmilch in zu grosser Menge vorhanden sind, zu verdünnen und durch Zuckerzusatz das Minus der Kuhmilch in dieser Beziehung auszugleichen. Erfahrungsgemäss ist an den ersten Lebenstagen 1 Theil Milch mit 3 Theilen Wasser zu verdünnen, vom 3. bis 30. Tage 1 Theil Milch mit 2 Theilen Wasser, vom 30. bis 60. Tage 1 Theil Milch mit 1 Theil Wasser und so allmählich abnehmend, bis etwa vom 8. Monat ab reine Kuhmilch gereicht wird. Ferner sind, um den Zuckergehalt der Kuhmilch dem der Frauenmilch zu nähern, pro 1 Liter fertiges Gemisch 26 g Zucker zuzufügen (am besten Milchzucker).

Nach HEUBNER-HOFMANN soll der Säugling pro Tag erhalten:

- im 1. Monat: 300 ccm Milch + 300 ccm Wasser + 6 Kaffeelöffel voll Milchsucker (vertheilt auf 8 Flaschen à 75 ccm);
- im 2. u. 3. Monat: 450 ccm Milch + 450 ccm Wasser + 9 Kaffeelöffel voll Milchsucker (vertheilt auf 7 Flaschen à 125 ccm);
- im 3.—9. Monat: 600 ccm Milch + 600 ccm Wasser + 12 Kaffeelöffel voll Milchsucker (vertheilt auf 6—8 Flaschen à 150 ccm).

Die so präparirte Milch hat dann noch einen abnorm geringen Fettgehalt, 1,5 Procent statt 3 Procent. Um dies auszugleichen, lässt man die Milch vor dem Verdünnen mit Wasser circa 1 Stunde in flachen Gefässen stehen und schöpft nur die oben angesammelte Sahne in das Milchgefäss. Die verdünnte Milch enthält dann etwa 2,6 Procent Fett — Noch vollkommener ist der Ausgleich in der GÄRTNER'schen Fettmilch, die aber nur partiell sterilisirt in Flaschen und relativ theuer zu beziehen ist.

3) Durch Tödtung der in der Kuhmilch enthaltenen Bakterien also durch Kochen, Pasteurisiren, Sterilisiren.

Soll die Milch im Hause gekocht werden, so genügt es, dieselbe geeigneten Milchkochapparaten 5—10 Minuten auf 97—100° abzukochen, um die vorhandenen Krankheitskeime und fast alle Gärungserreger zu vernichten.

Hierbei kommen folgende Gesichtspunkte in Betracht:

Höhere Temperaturen, durch Erhitzen unter Druck gewonnen, sind völlig erflüssig, ebenso ist es unnötig, die Temperatur von 97—100° länger als Minuten einwirken zu lassen; denn eine Abtötung auch der widerstandsfähigeren Milchbakterien gelingt doch erst bei 6stündiger Erhitzung. Auch ist gar nicht erforderlich, dem Säugling eine völlig keimfreie Milch zu liefern. Bakterien gelangen in den Darm des Säuglings unter allen Umständen durch den Finger und verschiedenste Berührungen. Es kommt nur darauf an, die Milch von parasitären Bakterien zu befreien und eine Wucherung toxisch wirkender Saprophyten in der Milch zu verhüten.

Ferner ist zu beachten, dass die gekochte Milch meistens längere Zeit bis zu 24 Stunden — aufbewahrt werden soll.

Dies ist ohne Zersetzung der Milch nur dann möglich, wenn die Milch nach dem Kochen rasch abgekühlt und bei einigermaßen niedriger Temperatur (unter 20° Celsius) aufbewahrt wird. Diejenigen Gärungserreger, welche durch das vorausgehende Erhitzen nicht getötet werden — und solche sind fast immer vorhanden —, vermehren sich bei niedriger Temperatur äusserst langsam, dagegen rasch bei einer Wärme von mehr als 20°. Am bedenklichsten ist in dieser Beziehung ein langsames Abkühlen grösserer Portionen gekochter Milch. Dieselben halten sich viele Stunden auf Temperaturen zwischen 20° und 45°, d. h. auf Wärmegraden, bei denen rascheste Wucherung der betreffenden Bakterien erfolgt.

Ausserdem aber muss die aufbewahrte Milch vor dem Hineingelangen neuer Krankheitskeime und solcher Gärungserreger geschützt werden, welche sich bei niedriger Temperatur rasch wuchern und die Milch verderben. Dazu ist vor allem nötig, dass man die Milch während der ganzen Zeit in den Kochgefässen belässt, und aus diesen eventuell nur die jeweils gebrauchten Portionen in Saugflaschen, Tassen u. s. w. abgiesst. Wollte man die Milch in Gefässen, welche in üblicher Weise gereinigt sind, umgiessen und in diesen aufbewahren, so würde sie rasch verderben, weil solche Gefässe stets zahlreiche, rasch vermehrende Gärungserreger enthalten.

Auch der Luft soll die Milch während ihrer Aufbewahrung keine zu grosse Berührungsfläche darbieten; es fallen sonst Staub und Schmutz und mit diesen reichliche Bakterien hinein. Eine kleine Berührungsfläche mit der Luft bedarf dagegen nichts; die Luft führt gewöhnlich nur spärliche Bakterien, und diese sind in der Form des trockenen Staubes so lebensschwach, dass sie in der Milch gelangt, erhebliche Zeit gebrauchen, ehe sie anfangen, sich zu vermehren. Stellt man z. B. zwei Saugflaschen mit der gleichen sterilisierten Milch, eine mit Wattepfropf, die andere offen, in demselben Zimmer resp. Brütöfen auf, so macht sich kaum ein Unterschied bezüglich der Haltbarkeit der Milch geltend, und jedenfalls nicht innerhalb der ersten 24 Stunden.

Vorstehende Gesichtspunkte wurden in früheren Jahren nicht ausreichend beachtet; daher ging man bei den älteren Apparaten zum Milchkochen vielfach auf hinaus, die Töpfe beim Kochen möglichst hermetisch zu schliessen, Tem-

peraturen über 100° zu erzielen, diese sehr lange einwirken zu lassen und bei der Aufbewahrung namentlich die Luft von der Milch fern zu halten. In Folge dessen waren die Constructionen sehr complicirt, und Geschmack und Farbe der Milch wurden stark verändert.

Für das Kochen kleinerer Portionen Milch, die nicht aufbewahrt, sondern kurz nach dem Kochen verbraucht werden sollen, dienen:

1. **Wasserbäder.** Ein grosser offener Blechtopf, der innen drei vorspringende Leisten trägt, dient als Wasserbad; in den Ausschnitt der Leisten passt ein kleinerer emailirter oder porzellanener, mit Deckel versehener Milchtopf. Das Erhitzen der Milch bedarf keiner Beaufsichtigung; Ueberkochen kann nicht stattfinden; nach 20 Minuten vom Sieden des Wassers ab gerechnet sind selbst Milzbrandsporen vernichtet.

2. **SOLTMANN's Milchkocher.** Durch einen besonders construirten Blecheinsatz wird ein stetes Rücklaufen der aufwallenden Milch in das Kochgefäss bewirkt und dadurch ein Ueberkochen vermieden. — Da das Gefäss offen sein muss, kocht die Milch sehr stark ein.

3. **Irdene Töpfe mit durchlocthem Deckel;** die aufwallende Milch läuft durch die Löcher wieder in das Gefäss zurück. Das Einkochen ist geringer, wie beim SOLTMANN'schen Kocher; s. unten.

Die Milchkocher von **BERTLING, COHN, RORDER, HARTMANN** haben nur unnöthige Complicationen.

Für das Kochen grösserer Portionen Milch, insbesondere der ganzen Tagesration des Säuglings sind zu empfehlen:

1. **SOXHLET's Milchkocher.** Die mit Wasser und Zucker gemischte Milch wird je nach dem Bedarf des Säuglings in 6—10 kleine Saugflaschen




Fig. 76. SOXHLET's Milchkocher.

gefüllt; diese werden mit durchbohrten Kautschukstopfen verschlossen im Wasserbad erhitzt; war das Wasser einige Minuten im Kochen, so wird die Bohrung des Stopfens mit einem Glasstäbchen verschlossen, und dann wird noch weitere 10 Minuten erhitzt. Sämmtliche Fläschchen bleiben dann an kühlem Orte stehen; unmittelbar vor dem Gebrauch wird der Stopfen des einzelnen Fläschchens durch den Saugstopfen ersetzt. — Bürsten u. s. w. zur Reinigung der Flaschen werden beigegeben.¹

¹ Zu beziehen von Dr. LEHMANN, Berlin C., Heiligegeiststrasse 43 für den Preis von 13 bis 20 Mark.

Der SOXHLET'sche Apparat war der erste, der in rationeller Weise die Aufbewahrung grösserer Milchquantitäten ermöglichte; er hat mit Recht weiteste Verbreitung gefunden.

Einige Nachteile des Apparats werden bei einer neueren Construction vermieden, welche kleine Gummischeiben als Verschluss der Flaschen verwendet. Die Scheiben werden lose auf die Flaschen aufgelegt, nur seitlich durch eine Metallhülse fixirt, und lassen während des Kochens Luft und Wasser-




Fig. 77.

SOXHLET's Gummischeiben-Verschluss; a vor dem Kochen, b nach dem Kochen und Abkühlen.

dampf entweichen, beim Erkalten werden sie aber durch den Luftdruck derartig aufgepresst, dass sie einen festen Verschluss bilden.

Der Kautschukverschluss, der zu schlechtem Geschmack Anlass giebt, lässt sich ganz vermeiden dadurch, dass die Fläschchen mit kleinen Glashütchen bedeckt werden; Einkerbungen an deren unterem Rand (Fig. 78 c) verhüten in Abgleiten der Hütchen. Dieselben haben solchen Abstand vom Flaschen-




Fig. 78. Milchflaschen mit Glashütchen.

A Die Flaschen im Kochtopf. B Flaschenhals mit Hütchen, bei a Einkerbungen, um das Abgleiten zu hindern. C Flaschenhals und Hütchen im Querschnitt; a Einkerbungen, b Rand des Hütchens, c Flaschenhals.

hals, dass die Aussenluft in freier Communication vom Flaschenhals mit dem Innenraum der Flasche steht, dass also der Wasserdampf beliebig entweichen und beim Erkalten Luft in die Flasche eintreten kann.¹

Trotz der freien Communication mit der Aussenluft ist der Verschluss völlig bakterien dicht. Es ist längst erwiesen (s. Kap. 1), dass den in der Luft

¹ Zu beziehen von BÜCHLER, Breslau, Carlstrasse; ausserdem nach den Angaben im Text in jedem Geschäft für chemische Utensilien leicht herzustellen.

schwebenden Bakterien meist eine gewisse Schwere zukommt, dass sie daher — abgesehen von sehr heftigen Luftströmungen — für gewöhnlich nicht vertikal aufwärts geführt werden können. Dass auch thatsächlich die Milch in den mit Hütchen verschlossenen Fläschchen genau ebenso lange Haltbarkeit zeigt, wie in den mit Kautschukstopfen oder Watte verschlossenen, ist durch besondere Versuchsreihen erwiesen.

Der Kochtopf wird zweckmässig nach Art des Koch'schen Dampfotens mit konischem, oben durchbohrtem Deckel verschlossen (Weite der Bohrung nicht über 0.5 cm). Sobald der Dampf aus der Oeffnung in kräftigem Strahl auströmt, ist derselbe 100° warm; von diesem Moment ab belässt man das Wasser noch 10 Minuten im Sieden. Man hat also nur die gefüllten und verschlossenen Fläschchen in den Kochtopf einzusetzen, anzuhetzen, bei gelegentlichem Vorbeigehen nachzusehen, wann der Dampf kräftig ausströmt, und von da ab noch 10 Minuten auf dem Feuer zu belassen.

Mag man die eine oder die andere Art von Soxhletkochen benutzen, in jedem Falle ist es von Wichtigkeit, die gekochte Milch rasch abzukühlen. Am besten lässt man den Einsatz mit Flaschen zunächst $\frac{1}{2}$ Stunde in der Luft sich abkühlen; dann füllt man in den Kochtopf kaltes Wasser und belässt die Flaschen hierin 1 Stunde; darauf bewahrt man den Einsatz im leeren Topf in einem kühlen Raum auf.




Fig. 79. Milchkocher in Kannenform.

2. Milchkocher in Kannenform. Eine 2 Liter fassende Kanne aus emailirtem Blech passt in den beim vorigen Apparat verwendeten Kochtopf. Sie wird mit Milch gefüllt und in strömendem Dampf von 100° 10 Minuten erhitzt. Die herausgenommene Kanne wird zweimal in kaltem Wasser gekühlt, und bleibt dann in dem entleerten Kochtopf an kühlem Orte stehen; aus derselben wird unmittelbar vor dem Gebrauch die jedesmal nöthige Portion Milch ausgeschenkt. — Die Milch ist in solcher Kanne auch bei häufigem Ausschenken nach 24 Stunden noch

nahezu bakterienfrei und kann Kindern ohne jede Gefahr verabreicht werden. — Erheblich billiger als SOXHLET-Apparate.

3. Töpfe mit durchlochem Deckel für halbe Tagesportionen (12 Stunden). Die Deckel haben in der Mitte ein kurzes Rohr von ca. 2 cm weitem Durchmesser, in der Peripherie 4 oder 5 Löcher von 1 cm Durchmesser (s. Fig. 80). Kocht man die Milch in solchem Topf auf lebhaftem Feuer, so wallt sie durch die mittlere Oeffnung in die Höhe und fliesst durch die anderen Löcher des Deckels wieder in den Topf zurück; Ueberkochen findet auf Herdfeuer nie statt. Die Töpfe werden aus emailirtem Eisenblech oder aus glasirtem Thon (Bons-lauer Geschirr) hergestellt; letztere kosten bei $1\frac{1}{2}$ Liter Inhalt 60 Pf.

Die Milch ist bei 24stündiger Aufbewahrung nicht so keimarm wie bei den vorgenannten Methoden; es ist daher in diesen Töpfen besser 2mal täglich eine Portion Milch zu kochen. Nothwendig ist die Einhaltung folgender Gebrauchsvorschriften, die zweckmässig jedem Topf gedruckt beigegeben sind:

„Man messe so viel Milch ab, wie das Kind in einem halben Tage trinkt und verdünne dieselbe für jüngere Säuglinge in der üblichen Weise mit Wasser (bis zum Alter von 1 Monat 1 Th. Milch und 2 Th. Wasser, von da ab 1 Th.

Milch und 1 Th. Wasser, vom 4. Monat das Wasser allmählich abnehmend, vom 8. Monat ab reine Milch; ferner zu je 1 Liter fertigen Gemisches 25 g Milchzucker). Jedem Liter der zu kochenden Milch, sei dieselbe unverdünnt oder verdünnt, füge man ferner 5 Theilstriche der Saugflasche (= $\frac{1}{10}$ Liter) Wasser vor dem Kochen zu; dieses Wasser verdampft wieder bei dem nachfolgenden Kochen. Sodann setze man den Topf auf's Feuer und beobachte, wann die Milch anfängt, über den Deckel heraufzusteigen. Von da ab lässt man noch 10 Minuten kochen. Hat man einen kühlen Raum zur Verfügung, so bewahre man den Topf mit der Milch ohne weiteres dort auf. Muss die Milch im warmen Zimmer aufbewahrt werden (z. B. im Hochsommer), so setze man den Topf mit der Milch in eine irdene Schale mit ca. 2 Litern kalten Wassers; bei starker Sommerhitze ist nach $\frac{1}{2}$ Stunde noch einmal frisches Kühlwasser einzugießen. Hat der Topf im Ganzen 1 Stunde im Wasser gestanden, so nimmt man ihn heraus und lässt ihn im Zimmer stehen. Die Saugflasche ist jedesmal erst unmittelbar vor dem Trinken mit Milch zu füllen und gleich nach dem Trinken zu reinigen.“



Fig. 80. Milchkochtopf mit durchlochttem Deckel.

Sind Polikliniken und Armenärzte in der Lage, für bereits erkrankte Kinder aus den ärmsten Bevölkerungsklassen bereits sterilisierte Milch gratis abzugeben, so kann dadurch zweifellos viel Segen gestiftet und manche sonst zum Tode führende gastrische Störung der Heilung entgegengeführt werden. Für diese Fälle ist am besten eine Milch zu verwenden, die bereits dem Alter des Säuglings entsprechend mit Wasser und Zucker vermischt und dann in kleinen Saugfläschchen partiell sterilisiert ist, damit jedes Manipulieren mit der Milch im Hause vermieden wird. Das an einem Tage hergestellte Milchquantum muss kühl gehalten und binnen 24 oder höchstens 48 Stunden verbraucht werden.

Für Reisen oder für den Fall, dass das Kochen im Hause momentan nicht mit der erforderlichen Sorgfalt geschehen kann, empfiehlt sich die Benutzung der in Blechdosen total sterilisierten Milch (s. oben). Dieselbe ist aus den Büchsen stets direct in die Saugflaschen zu gießen und in diesen eventuell mit gekochtem Wasser zu mischen.

Eine weitergehende Verwendung der vor dem Kauf sterilisierten Säuglingsmilch erscheint nicht zweckmässig. Vollständig sterilisierte Milch ist zu theuer; die partielle Sterilisierung liefert ein nur bei strenger Controle unbedenkliches Präparat. Jede einigermaassen sorgsame Mutter wird sich auf solche Präparate nur im Nothfall ver-

lassen, dagegen für gewöhnlich den Einkauf guter roher bezw. pasteurisierter Kindermilch und deren Zubereitung im Hause vorziehen.

Neuerdings sind auch Apparate construiert, um im Hause die Milch bei relativ niedriger Temperatur, 60—70°, ebenso zu sterilisiren, wie durch das Soxhletkochen; die Zeitdauer der Erhitzung muss dann entsprechend ausgedehnt werden (auf 1½ Stunden und mehr). Es soll dadurch chemischen Veränderungen der Milch noch besser vorgebeugt werden. Hierher gehören KORMAC's Pasteurisirapparat sowie die Thermophore; letztere scheinen nicht ganz gleichmässig zu wirken.

c) Die Ernährung des Kindes mit besonders präparierter Kuhmilch und Milchsurrogaten.

Die Beobachtung, dass manche Kinder die nach dem S. 284 gegebenen Vorschriften mit Wasser und Milchzucker versetzte Kuhmilch nicht vertragen, hat zu zahlreichen Versuchen geführt, die Kuhmilch der Frauenmilch ähnlicher zu machen. Entweder hat man eine leichtere Verdaulichkeit und eine Gerinnung des Kaseins in weicheren Flocken herbeizuführen gesucht durch Zusätze von Hafer- oder Gerstenschleim zur Milch; oder das Kasein ist durch Behandlung mit Verdauungsfermenten theilweise in Albumosen übergeführt (Präparate von Voltmer in Altona, und von Loefflund). — Ueber Buttermilch s. S. 295.

In einer zweiten Gruppe von Präparaten hat man das am meisten gefürchtete Kasein ganz oder fast ganz fortgelassen, oder auch andere Eiweisskörper in die kaseinfreie Milch einzuführen versucht (BACKHAUS' Milch; Mischung aus Rahm und Molke, so dass nur Molkenprotein und Albumin übrig bleiben. — BIEDERT's Rahmgemenge; Emulsion aus Eiereiweiss, Butterfett, Milchzucker und Milchsalzen).

Einer dritten Gruppe gehören die sog. Kindermehle an, die theils mit Wasser bereitet als zeitweises Surrogat der Kuhmilch dienen sollen, theils der Milch zugesetzt werden.

	Was- ser	Ei- weiss	Fett	Kohlehydrate		Salze
				in Wasser löslich	un- löslich	
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Nestlémehl (Vevey)	6.6	9.6	4.3	42.9	34.4	2.0
KUFEKE's Kindermehl	8.8	12.5	2.0	21.9	52.2	2.1
Lakto-Leguminose (GERBER in Thun)	6.3	16.7	5.6	43.2	24.4	3.0
Präparirtes Hafermehl (KNORR in Heilbronn)	10.0	12.6	6.1	5.6	63.7	1.4

In fast allen Präparaten ist ein Teil des Amylums durch Hitze oder durch Erhitzen mit wenig Säure oder durch diastatisches Ferment in lösliche Stärke,

rin, resp. Zucker übergeführt; die meisten enthalten aber immer noch ziemlich beträchtliche Mengen unveränderter Stärke, andere haben in Folge von Zuckerzusatz einen widerlich süssen Geschmack. Einige der gebräuchtesten haben die in obiger Tabelle angegebene Zusammensetzung.

Besonders günstige Erfahrungen liegen vor über die LIEBIG'sche Suppe, nach LIEBIG's alter Vorschrift durch allmähliches und anhaltendes Ermen von Milch mit Weizen- und Malzmehl, unter Zugabe von etwas Kalionicum, bereitet werden sollte, und bei welcher das Amylum fast vollkommen in Maltose verwandelt war. — Neuerdings haben CZEERNY und KELLER diese „Malzsuppe“ eine verbesserte Vorschrift gegeben: 50 g Mehl sollen $\frac{1}{2}$ Liter Milch gequirlt werden, dann ist eine Mischung von 100 g Malzextrakt $\frac{1}{2}$ Liter Wasser und 10 ccm einer 11 procentigen Kalicarbonicum-Lösung zuzufügen, und das Ganze kurz auf Siedetemperatur zu erhitzen.

Die aufgezählten Präparate kommen nur für den relativ kleinen Bruchtheil von Kindern in Frage, welche die übliche Kuhmilchmischung nicht vertragen, oder welche vorübergehend an Verdauungsstörungen leiden. Ueber die Indicationen für das eine oder andere Präparat hat im Einzelfall der Kinderarzt zu entscheiden. Die ausgedehnteste günstige Wirkung scheint der Malzsuppe zuzukommen.

Ausserdem sind die Mehlpräparate im späteren Säuglingsalter als Zugabe zur Milch zu verwenden.

3. Molkeerprodukte.

Butter wird aus Rahm oder Milch durch Schlagen hergestellt.

Der Vorgang, der dabei zum Ausscheiden der Butter führt, ist noch nicht vollständig aufgeklärt; am wahrscheinlichsten ist es, dass das Milchfett flüssig geschieden wird und flüssig bleibt, trotzdem die Milch unter den Erstarrungsbedingungen abgekühlt wird. Bei Bewegung findet dann plötzlicher Uebergang in festen Zustand und dabei leichte Vereinigung zu grösseren Massen statt. Aus Milch wird die Butter nicht so fettreich und so wohlgeschmeckend, daher die Darstellung aus Rahm vorgezogen. Um letzteren zu gewinnen, ohne die Milch sauer wird, ist die Milch entweder in sehr dünnen Schichten zu breiten, oder sie wird nach dem SWARTZ'schen Verfahren in höheren Schichten mit Abkühlung behandelt; oder aber nach dem BECKER'schen Verfahren auf 50–60° 2 Stunden erwärmt, wodurch sie ebenfalls gute Haltbarkeit erlangt. Neuerdings werden indessen hauptsächlich Centrifugen (Separatoren) benutzt, ursprünglich von LEFFELD construirt in Form einer rotirenden Trommel, in welcher die Milch sich vertikal aufrichtet und in mehrere Schichten theilt, nach der Schwere der Bestandtheile. Zu innerst lagert sich der Rahm, in der Mitte die Magermilch, in der Mitte die frisch zulaufende Milch; die beiden letzteren kommen gesondert zum Ablauf. — Später sind vielfache abweichende Constructionen in den Handel gekommen.

Ein besonderer Vortheil der Centrifugen liegt darin, dass man in kurzer Zeit des schnellen Betriebes frische und gut benutzbare abgerahmte Milch bekommt. Früher, wo das Aufrahmen 36–48 Stunden dauerte, wurde die abgerahmte Milch ein Artikel, der nur mit grösstem Missvergnügen gekauft werden konnte und unter den Händen verdarb. Jetzt

ist die abgerahmte Milch so haltbar wie Vollmilch, zumal wenn sie pasteurisirt wird, besitzt hohen Nährwerth und deckt ausserordentlich billig den Eiweissbedarf des Menschen; für 15—18 Pfennig wird der ganze Tagesbedarf an Eiweiss geliefert. Die Magermilch wird von der ärmeren Bevölkerung noch viel zu wenig consumirt, da dieselbe den Vortheil des jetzigen centrifugirten Productes gegenüber dem früheren nicht hinreichend beachtet.

Die Butter soll demnächst durch Kneten vom Wasser und den anderen Bestandtheilen der Milch, Casein, Milchzucker, Salzen, möglichst befreit werden; die andernfalls zurückbleibenden Beimengungen machen die Butter minderwerthig und beschleunigen erheblich die Zersetzung.

Die mittlere Zusammensetzung der Butter ist folgende: 13,6 Procent Wasser, 84,4 Procent Fett, 0,7 Procent Casein, 0,5 Procent Milchzucker, 0,66 Procent Salze. Der Schmelzpunkt der Butter liegt gewöhnlich zwischen 31 und 37°, der Erstarrungspunkt zwischen 19 und 24°.

Marktfähige Butter soll mindestens 80 Procent Fett und höchstens 2 Procent Kochsalz enthalten. Oft findet man Butter mit 30—35 Procent Wasser und erhält dann in 1 Pfund Butter nur 315 g Fett statt 425 g. — Um das leichte Verderben solcher wasserreicher Butter zu hindern, wird Kochsalz zugesetzt, 30 g pro 1 kg und mehr. Dadurch wird der Profit der Händler noch grösser. Die süddeutsche Sitte, die Butter ungesalzen in den Handel zu bringen, ist weit empfehlenswerther, weil solche Butter sehr sorgfältig behandelt werden muss, wenn sie nicht schnellem Verderben ausgesetzt sein soll.

Die Butter enthält meistens sehr zahlreiche lebende Bakterien, oft 1—10 Millionen in 1 g; und zwar nicht nur die aus längerer Zeit gestandenem Rahm bereitete Butter, sondern auch Butter aus Centrifugen-Sahne, weil beim Centrifugiren die Rahmtheilchen Bakterien mechanisch mitreissen. Enthält die Milch Tuberkelbacillen, so gehen diese nachweislich beim Centrifugiren in Sahne, Magermilch, Buttermilch und Centrifugenschlamm über. In Folge dessen finden wir Tuberkelbacillen — und unter Umständen andere infektiöse Milchbakterien — reichlich in der Butter vertreten. Sehr häufig begegnet man ferner in der Butter den S. 67 erwähnten „säurefesten“ Bacillen, die von der Ackererde auf Futtergräser, mit diesen in die Kuhexkremente und mit letzteren in die Milch zu gelangen scheinen. — Pasteurisiren des zur Butterbereitung verwendeten Rahms würde gegen die bakterielle Gefahr des Buttergenusses Schutz gewähren. Dasselbe stösst um so weniger auf Schwierigkeiten, als das zu pasteurisirende Quantum relativ klein ist, und als die Butter bei Einhaltung von 85° und 2 Minuten (s. S. 276) nicht an Geschmack einbüsst.

Eine erhebliche Geschmacksalteration und vermuthlich auch eine

die Verdauungsorgane nicht belanglose Aenderung erleidet die Butter beim Aufbewahren durch das Ranzigwerden, das hauptsächlich auf einem Freiwerden von Fettsäuren bezw. auf der Entstehung von Oxyfettsäuren beruht. Es wird in erster Linie durch Belichtung und durch Luftzutritt begünstigt, ausserdem durch Bakterienwucherung. Abschluss der Butter gegen Luft und Licht ist die zweckmässigste Schutzmaassregel.

Von Fälschungen der Butter kommt in Frage ein zu grosser Wasser- und Kochsalzgehalt (s. oben); ferner Beimengungen von Farbstoff, Mehl, Schwerspath u. s. w., namentlich aber von fremden Fetten. Letzteres erklärt sich aus den Preisverhältnissen; 1 kg Butter kostet im Mittel 2.60 Mark, 1 kg Rindstalg oder Schweineschmalz 1.30 Mark; noch billiger sind die importirten pflanzlichen Fette, Palmöl, Cocosbutter u. s. w.

Untersuchung der Butter. Zur Wasserbestimmung werden 5 g Butter in flacher Nickelschale 30—40 Minuten im Vakuumtrockenapparat getrocknet und gewogen. — Der Kochsalzgehalt wird durch die Bestimmung des Chlors im wässrigen Extrakt der Asche ermittelt. — Zur Feststellung des Grades der Ranzigkeit werden 5 g Butter in Aether gelöst und mit alkoholischer $\frac{1}{10}$ Normal-Kalilauge nach Zusatz von Phenolphthalein titirt. Als Säuregrade bezeichnet man die zur Sättigung von 100 g Fett verbrauchten Cubikcentimeter Normal-Kalilauge. Gute Tafelbutter hat meist weniger als 5 Säuregrade; doch kommen höhere Säuregrade ohne ausgesprochene Ranzigkeit vor und umgekehrt.

Genauere Erkennung der fremden Fette ist möglich durch das Mengenverhältniss der niederen und höheren Fettsäuren. Butter enthält 87 bis 88 Procent höhere und 12 bis 13 Procent niedere Fettsäuren. Andere thierische und pflanzliche Fette dagegen 95—96 Procent höhere und nur sehr wenig niedere Fettsäuren. Die höheren Fettsäuren sind im Wasser unlöslich, nicht flüchtig und bilden grosse Moleküle (C_{18} ...). Eine Lösung von 1 g braucht daher eine relativ geringe Zahl Alkalimoleküle zur Neutralisation. Die niederen Fettsäuren sind löslich in Wasser, flüchtig und haben kleinere Moleküle (C_4 ...), so dass für die Neutralisation von 1 g Substanz mehr Alkalimoleküle verbraucht werden. — Zur Untersuchung der Art der Fettsäuren werden die Fette zunächst verseift, die Seife wird in Wasser gelöst und mit Schwefelsäure zersetzt. Man bekommt so in der wässrigen Lösung die zwei Antheile der Fettsäuren in freiem Zustande: die unlöslichen, die durch Filtration abgetrennt und gewogen werden, und die löslichen, welche im Filtrat enthalten sind und durch Destillation desselben von der Schwefelsäure abgetrennt werden können. Das Destillat enthält bei Butter grosse Mengen, bei anderen Fetten nur Spuren von Säuren. Die Menge derselben lässt sich mit Alkalilösung von bekanntem Gehalt leicht quantitativ bestimmen. (HEHNER, KÖRSTORFER, REICHERT-MEISSL).

Ferner ist für die Unterscheidung fremder Fette die Bestimmung des Schmelz- und Erstarrungspunktes benutzbar; oder die Bestimmung des Brechungsvermögens mit dem ZEISS'schen Butterrefraktometer.

Die Kunstbutter.

Die Einführung guter Surrogate der Butter ist von grosser hygienischer Bedeutung, da das Fett eine sehr theuere Nahrung bildet und billigere Fette, Talg und Schmalz, nur zu wenigen Speisen zu gebrauchen sind.

Es gelang zuerst Mège-Mouriès ein Surrogat für Butter zu finden. Er verarbeitete Rindstalg so, dass zunächst durch Pepsin in Form von Schaf- oder Schweinemagen die einhüllenden Membranen des Fettes gelöst wurden; die erstarrte Masse wurde dann im Pressbeutel bei 25° unter eine hydraulische Presse gebracht, es blieben 40—50 Procent Stearin zurück, während 50—60 Procent flüssiges Oleomargarin durchgingen. Letzteres wurde mit Kuhmilch, Wasser und den löslichen Theilen von Kuheuter im Butterfass verarbeitet. — Später ist das Verfahren mannigfach modificirt worden; namentlich wird das Stearin nicht abgetrennt, sondern Pflanzenöl, das vorher mit überhitztem Wasserdampf behandelt ist, zugemengt. Die Fabrikation ist in Deutschland, Oesterreich und namentlich Nord-Amerika eine sehr ausgedehnte. Die in Düsseldorf etablirten Fabriken produciren allein jährlich mehrere Millionen Pfund.

Die Kunstbutter kommt jetzt unter den Namen Margarine (auch Oleomargarin, Sparbutter, Wiener Sparbutter, Holländische Butter u. s. w.) in den Handel. Sie kostet im Durchschnitt 1 Mark pro 1 kg; Bäcker und Konditoreien, Gast- und Speisewirthschaften verwenden sie in ausgedehntem Maasse. Sie soll nicht zum Rohgenuss dienen, namentlich ist das unmöglich, seit gesetzlich verboten ist, die Kunstbutter mit Naturbutter zu vermengen. Dagegen ist sie sehr zweckmässig für Kochen und Braten zu verwenden und einer schlechten Butter vorzuziehen, weil sie ein reineres Fett darstellt und weniger leicht ranzig wird. In Bezug auf die Ausnützung und die Bedeutung als Fettausnützung ist die Kunstbutter der Naturbutter ungefähr gleichwerthig. Wir haben also vom hygienischen Standpunkt ein entschiedenes Interesse an ihrer Verbreitung als Volksnahrungsmittel.

Allerdings ist eine gewisse Ueberwachung der Produktion nöthig, es könnten sonst ekelerregende Fette von Abdeckereien u. s. w. benutzt werden, und es ist das um so unzulässiger, als bei der Herstellung der Kunstbutter nicht immer Temperaturen angewendet werden, die zur Tödtung von Parasiten ausreichen. Die Ueberwachung stösst indessen auf geringe Schwierigkeiten, da die Herstellung fast nur in grossen Fabriken erfolgt.

In Deutschland ist durch Gesetz vom 15. Juni 1897 bestimmt, dass Verkaufsstellen für Margarinepräparate durch deutliche Plakate als solche kenntlich gemacht werden müssen. Zugleich ist jede Vermischung von Butter und Margarine verboten, und die zu Handelszwecken benutzten Margarinepräparate müssen einen die Erkennbarkeit mittelst chemischer Untersuchung erleichternden Zusatz enthalten. — Als solcher ist Sesamöl angeordnet, welches bei

mitteln mit alkoholischer Furfurolösung und Salzsäure Rothfärbung giebt, um Vorhandensein gewisser Farbstoffe ist allerdings eine complicirtere Vorrichtung erforderlich.

Buttermilch bleibt vom Buttern des Rahms zurück, enthält noch $\frac{1}{2}$, 1 Procent Fett, 3 Procent in Flocken geronnenes Kasein, ca. 3 Procent Milchzucker und etwas Milchsäure. Bei der gewöhnlichen Herstellungsweise kommen sehr zahlreiche Bakterien in das Präparat. Aus Centrifugenrahm gewonnene Buttermilch wird als leicht verdauliches Kindernährmittel empfohlen.

Käse bereitet man durch Fällen des Kaseins mittelst Lab (Extrakt aus Kälbermagen).

Etwa 30 Minuten nach dem Labzusatz und Erwärmen auf 35° erfolgt Gerinnung der Milch. Aus 10—12 Liter erhält man 1 kg Käse, letzterer wird durch Pressen und Liegenlassen an der Luft unter häufigem Umwenden getrocknet, dann lässt man ihn reifen. Man unterscheidet Weichkäse, bei niedriger Temperatur coagulirt und wenig gepresst; ferner überfette Käse aus Rahm, z. B. Rahm mit wenig Milchzusatz (z. B. Fromage de Brie, Gervaiskäse u. s. w.), ferner fette Käse aus ganzer Milch (z. B. Holländer, Schweizer u. s. w.), Magerkäse aus der abgerahmten, meist sauren Milch (Quark, Handkäse).

Beim Reifen tritt Verlust von Wasser ein, sodann eine Umwandlung des Kaseins in Pepton und Amide und sogar Ammoniak. Es entstehen niedere organische Säuren, ferner scharfe, bittere oder aromatische Produkte. Offenbar sind dies Bakterieneinwirkungen, die im Einzelnen noch nicht genau bekannt sind.

Der Käse repräsentirt ein sehr concentrirtes Nahrungsmittel, das namentlich Eiweiss und Fett in grosser Menge enthält. Die Zusammensetzung siehe S. 252.

Mit Rücksicht auf den Preis können die feineren Sorten nur als Luxusartikel gelten, aber schon Schweizer- und Holländerkäse sind ziemlich billige Eiweiss- und Fettlieferanten; der Magerkäse kostet gewöhnlich nur $\frac{1}{4}$ so viel als die vorgenannten und repräsentirt geradezu das billigste Eiweiss.

Die Ausnutzung des Käses ist eine gute und vollständige, aber für viele Menschen ist derselbe ein schwerverdauliches Nahrungsmittel, das namentlich die Magenverdauung lange in Anspruch nimmt. Daher ist der Käse nur in kleineren Mengen und fein zerkleinert verwendbar und steht an hygienischer Bedeutung hinter der abgerahmten Milch zurück.

Der Bakteriengehalt des Käses ist immer ein sehr bedeutender. Hauptsächlich sind Saprophyten vertreten, indess ist auch die Möglichkeit gegeben, dass Parasiten vorhanden sind oder dass solche Saprophyten sich stärker entwickeln, welche toxische Stoffwechselprodukte abgeben und durch diese „Käsevergiftungen“ hervorrufen.

Molken enthalten Milchzucker, etwas Milchsäure, Salze und Pepton; sie üben eine leicht laxirende Wirkung, können daher wohl den Ernährungszustand

indirect bessern, sind aber nicht selbst ein gutes Nährmittel, ihr geringer Gehalt an Pepton kommt hierfür nicht in Betracht.

Von sonstigen Milchpräparaten sei noch Kumis und Kefyr erwähnt, ersterer aus Stutenmilch, letzterer aus Kuhmilch bereitet und auch bei uns jetzt vielfach als Diäteticum gebraucht. — Durch das Kefyrferment, das aus Hefe und verschiedenen Bakterienarten besteht und in der gleichen Combination sich gut weiter züchten lässt, wird der Milchzucker zum Theil in Glycose umgewandelt. Aus dieser entsteht durch die Hefe Alkohol und Kohlensäure, so dass ein schwach berauschendes und moussirendes Getränk resultirt. Der Alkoholgehalt beträgt ca. 1 Procent. Ein anderer Theil des Milchsuckers wird ausserdem in Milchsäure verwandelt. Fertiger Kefyr enthält von letzterer etwa $1\frac{1}{2}$ Procent. Ferner gerinnt das Kasein in ausserordentlich feinen Flöckchen (rahmähnlich) und wird theilweise peptonisirt, so dass es sehr leicht verdaulich ist. — Bei den mohamedanischen Bergvölkern des Kaukasus ist die Bereitung des Kefyr von Alters her in Gebrauch und geschieht einfach dadurch, dass die frische Milch in Schläuche gefüllt wird, in welchen schon Kefyr bereitet war. Man hält die Schläuche mässig warm, von Zeit zu Zeit müssen sie geschüttelt oder gestossen werden. — Bei uns erfolgt die Bereitung in Flaschen mit trockenen Körnern, die vorher in Wasser und dann in Milch zum Quellen gebracht sind; oder mit frischen Körnern, die eben von fertigem Kefyr abgesiebt sind. Die Flaschen müssen gut verschlossen 1—2 Tage bei etwa 18° gehalten und häufig geschüttelt werden.

Kefyr scheint bei Verdauungs- und Ernährungsstörungen oft günstig zu wirken. Der Bakterienreichtum ist durchaus nicht bedenklich, die grosse Menge Milchsäure wirkt kräftig entwicklungshemmend und tödtend auf alle fremden und insbesondere pathogenen Bakterien.

Litteratur (Milch und Molkereiprodukte): KIRCHNER, Handbuch der Milchwirtschaft, 3. Aufl. — CZERNY und KELLER, Des Kindes Ernährung u. s. w. Ein Handbuch für Aerzte. Leipzig, Wien 1901. — BIEDERT, Die Kinderernährung, Stuttgart 1897. — HEUBNER und RUBNER, verschiedene Arbeiten über Stoffwechsel und Ernährung des Kindes im Archiv f. Hygiene, Zeitschr. f. Biologie und Jahrbuch f. Kinderheilkunde 1896—1902. — FLÜGGE, Die Aufgaben und Leistungen der Milchsterilisierung, Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 17. — LÖNNER, Die Giftwirkung der peptonisirenden Bakterien der Milch, ibid. Bd. 22. — Vergl. MUNK und UFFELMANN, KÖNIG, FORSTER, l. c. — Untersuchung von Milch und Milchpräparaten: THOMS-GILG, Nahrungsmittelchemie, Leipzig 1891.

4. Fleisch.

Als Marktwaare kommt vorzugsweise das Fleisch von landwirthschaftlichen Nutzhieren, nebenbei das Fleisch von Wild, Geflügel, Fischen, Austern u. s. w. in Betracht. Die Hauptmasse des Fleisches bilden die Muskeln; daneben Fett, Bindegewebe, Knochen, Drüsengewebe u. s. w. Ausser Fett, leimgebender Substanz und Salzen findet man Eiweissstoffe: Syntonin, Myosin, Muskelalbumin, Serumalbumin; ferner zahlreiche Extractivstoffe, wie Kreatin, Xanthin, Hypoxanthin, Milchsäure; kleine Mengen Inosit und Glycogen.

Die Zusammensetzung des Fleisches (vergl. Tab. S. 252) schwankt sehr bedeutend je nach der Thierspecies, nach dem Mästungszustande und Alter des Thieres. Auch die verschiedenen Muskeln des gleichen Tieres zeigen Unterschiede, jedoch vorzugsweise nur im Fettgehalt. Viel bedeutender sind die Differenzen zwischen den einzelnen Fleischsorten in Bezug auf specifischen Geschmack, Zartheit der Faser und Zähigkeit des Sarkolemmes sowie des eingelagerten Bindegewebes. Diese Differenzen sind für den Preis einer Fleischsorte viel mehr maassgebend als der Gehalt an Eiweiss und Fett.

Beim Ochsen werden als die zartesten und wohlschmeckendsten Partien geschätzt: Schwanzstück, Lendenbraten, Vorderrippe, Hüftenstück, Hinterschenkelstück; die schlechtesten und billigsten sind Kopf, Beine, Hals und Wanne; die übrigen Stücke rangiren dazwischen. — Als besonders zart, fettarm und leicht verdaulich gilt das Fleisch von jungem Geflügel und Wild; letzteres hat aber starkes Bindegewebe und muss daher längere Zeit abhängen oder in saure Flüssigkeit eingelegt werden. Kalbfleisch enthält mehr Wasser und Leimsubstanz und weniger Extractivstoffe als Ochsenfleisch; übrigens ist Geschmack und Nährwerth ganz abhängig vom Alter und Mastzustand. Schweinefleisch ist fettreich und deshalb schwerer verdaulich; als Volksnahrungsmittel besonders beliebt, weil Schweine beim Schlachten die geringsten Abfälle und leicht verstellbare Conserven liefern. Pferdefleisch hat einen unangenehm süsslichen Geschmack; ausserdem kommen meist abgetriebene oder verunglückte Thiere zur Schlachtbank. Fische haben theils ein fettarmes, leicht verdauliches, theils ein durch starke Fetteinlagerung in's Sarkolemm schwer verdauliches Fleisch (Aal, Lachs). — Austern, Muscheln u. s. w. haben grossen Wassergehalt, nur 5–6 Procent Eiweiss, und ihr absolutes Gewicht ist so gering, dass sie für die Ernährung kaum ernstlich in Betracht kommen können.

Die Ausnutzung sämmtlicher Fleischsorten ist eine vorzügliche. Eiweiss und Leim werden im Mittel zu 98 Procent, das Fett zu 95 Procent, die Salze zu 80 Procent resorbirt.

Der Fleischgenuss ist indess mit zahlreichen Gefahren für die Gesundheit verbunden. Erstens können im Fleisch thierische Parasiten (Trichinen, Finnen) enthalten sein, die sich im Menschen anheften; zweitens können pflanzliche Parasiten der Schlachttiere im Fleisch enthalten sein; drittens kann das Fleisch nach dem Schlachten pathogene und saprophytische Bakterien aufnehmen und in den Menschen einführen; viertens sind einige seltenere und weniger wichtige Abnormalitäten des Fleisches im Stande, die Gesundheit zu beeinträchtigen.

1. Thierische Parasiten des Fleisches.

a) Trichinen (Fig. 81–84). Die Trichinen werden vom Menschen im Schweinefleisch genossen.

Sie finden sich in den Muskeln des Schweins in Kapseln (s. Fig. 83, 84) eingeschlossen; diese werden im Magen des Menschen gelöst, die 0·7—1·0 mm langen Würmer werden frei und wachsen im Darm, bis das Männchen 2, das Weibchen 3 mm lang ist. Nach $2\frac{1}{2}$ Tagen sind die Darmtrichinen geschlechtsreif, sie begatten sich und 7 Tage nach der Begattung gebiert jedes Weibchen 1000—1300 Embryonen. Nach 5—8 Wochen sterben die Darmtrichinen ab, die Embryonen aber bohren sich durch die Darmwand hindurch und gelangen schliesslich in die Muskelprimitivfasern (Fig. 82). Eine geringe Zahl von Trichinen ruft keine Krankheitssymptome hervor. Die Schwere der Erkrankung richtet sich direct nach der Zahl der eingewanderten Embryonen.



Fig. 81. Eingekapselte und verkalkte Muskeltrichinen, nat. Gr.

Die Trichinen werden beobachtet beim Schwein, bei der Katze, Ratte, Maus, beim Fuchs, Marder u. s. w. Die Schweine acquiriren sie namentlich durch Ratten oder durch Abfälle von trichinösem Schweinefleisch. Künstlich, d. h. durch absichtliche Fütterung von trichinösem




Fig. 82. Wandernde Trichinen. 80:1.




Fig. 83. Eingekapselte Trichina. 80:1.



Fig. 84. Trichine mit verkalkter Kapsel. 80:1.

Fleisch sind sie auch auf Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde u. s. w. zu übertragen.

Die mikroskopische Untersuchung auf Trichinen erfolgt dadurch, dass $\frac{1}{4}$ cm breite und lange Streifen mit einer aufs Blatt gebogenen Scheere vom rothen Theil des Zwerchfelles, von den Interkostalmuskeln, von den Bauch- und Kehlkopfmuskeln abgetrennt werden. Von jedem Stück werden 6 Präparate angefertigt; die Muskeln werden etwas zerfasert und dann mit Wasser oder verdünnter Kalilauge oder Glycerin befeuchtet; zur Besichtigung genügt 50fache Vergrößerung. — Zur Feststellung, ob die unter dem Mikroskop gesehenen eingekapselten

ichinen noch lebend und infektiösfähig sind, müssen Fütterungsversuche angestellt werden.

a) Finnen (Fig. 85, 86). Die Finnen stellen ein Entwicklungsstadium der Bandwürmer dar; werden die in Fleisch, Leber u. s. w. angedauten Finnen genossen, so geht eventuell aus jeder Finne ein neuer Bandwurm hervor. — Beim Menschen kommt am häufigsten vor *Taenia solium*.




Fig. 85. Finnen im Fleisch, natürl. Gr.




Fig. 86. Schweinefinne.

a Receptaculum. b Dasselbe mit ausgestülptem Kopf. 4:1. c Kopf mit 4 Saugnapfen u. Hakenkranz. 40:1.

Bandwurm von 2—3 m Länge, dessen Kopf (von der Grösse eines Steckdellkopfes) mit Saugnapfen und doppeltem Hakenkranz versehen ist und am Darm haftet. Derselbe fungiert dann als Amme und aus ihm geht durch Ausscheidung eine Reihe von Gliedern hervor. In jedem Gliede liegen nahe beieinander männliche und weibliche Geschlechtsorgane; in den letzteren entstehen befruchtete Eier, kugelig, allmählich mit dicker Haut umgeben; diese enthalten schon einen fertigen Embryo mit Häkchen. Die Bandwurmglieder und die befruchteten Eier gehen fortgesetzt mit dem Koth ab, gelangen unter die Abfallstoffe, auf den Acker, in Brunnenwasser u. s. w. Von da aus werden sie von Schweinen aufgenommen. Gerathen sie in den Magen junger Schweine (unter 6 Monaten), so wird die Hülle der Eier gelöst, die Embryonen bohren sich durch die Darmwand und wandeln sich innerhalb 2—3 Monaten in irgend einem Organe, mit Vorliebe in dem intermuskulären Bindegewebe des Herzens und der Zunge, in eine Finne um (*Cysticercus cellulosae*).

Die Finnen erscheinen als mit blossem Auge sichtbare 1—20 mm lange Blasen mit wässerigem Inhalt (Fig. 85). Man unterscheidet an ihnen ein eingestülptes Receptaculum und in diesem den Scolex, den neuen Bandwurmkopf (Fig. 86). Die Kapsel der Finne wird im Magen des Menschen gelöst, der scolex wird frei und setzt sich wieder an der Darmwand fest, einen neuen Bandwurm bildend. *Taenia solium* haftet nur beim Menschen, die Finne kommt gelegentlich auch bei Hunden, Ratten u. s. w. vor.

Der im Darm parasitirende Bandwurm verursacht oft ziemlich schwere Verdauungs- und Ernährungsstörungen. Ausserdem aber kann

von den menschlichen Bandwürmern aus die Cysticercosenkrankheit des Menschen bewirkt werden dadurch, dass im Menschen selbst Bandwurmeier zu Finnen auswachsen (vgl. Fig. 87). Es müssen dem Bandwurmeier in den Magen des Menschen gelangen; das kann entweder, in seltenen Fällen, durch antiperistaltische Bewegungen geschehen, sodann durch unbewusste und unabsichtliche Berührungen und Verschleppungen, die durch den bei Bandwurmkranken gewöhnlich bestehenden Juckreiz am After befördert werden; oder aber es können mit Wasser, rohen Gemüsen und allerhand Esswaaren solche Bandwurmeier eingeführt werden, namentlich wenn Diejenigen, welche mit




Fig. 87. Schematische Darstellung des Wirthwechsels der Fleischparasiten, nach BOLLINGER.

den Esswaaren beschäftigt sind (Verkäufer, Bäckerjungen, Köchinnen), am Bandwurm leiden.

Taenia mediocanellata s. *saginata* ist ein Bandwurm mit grösseren Gliedern, ohne Hakenkranz, mit 4 Saugnäpfen, der ausschließlich beim Menschen vorkommt und dessen Finne in den Muskeln (Kau-muskeln, masseter) und inneren Organen des Rindviehs sich entwickelt. Der Mensch acquirirt diesen Bandwurm durch den Genuss finnigen Rindfleisches.

Botriocephalus latus kommt beim Menschen vor als Bandwurm mit kurzen, breiten Gliedern und ovalen Eiern; die Finne soll im Hecht, Lachs und anderen Fischen sich entwickeln.

Taenia echinococcus lebt als Bandwurm im Darm des Hundes, wird nur 4 mm lang; die Eier gelangen mit den Hundexcrementen auf Weide- und

Futterkräuter und von da in den Magen verschiedener landwirthschaftlicher Thiere. In diesen kommt es zur Bildung des Finnenzustandes in Form der Echinokokken, die sich vorzugsweise in der Leber etabliren. Verfütterung des Echinokokkenhaltigen Fleisches an Hunde bewirkt bei diesen die Bandwurmbildung. — Gelegentlich können die Eier auch in den Magen des Menschen gelangen und auch der Mensch ist für die Entwicklung der Finnen geeignet. Im innigem Zusammenleben mit Hunden gerathen die Eier durch allerhand unkontrollirbare Berührungen in den Mund und Magen des Menschen. Dasselbe kann geschehen durch Vermittelung von Wasser, roh genossenen Gemüsen, Salat u. dergl., die mit Hundeecrementen verunreinigt waren. Je mehr gehalten werden und je intimer der Mensch mit ihnen zusammenlebt, so ausgebreiteter ist die Echinokokkenkrankheit; in Island, wo durchschnittlich auf jeden Menschen 6 Hunde gerechnet werden, leidet etwa $\frac{1}{7}$ aller Menschen an Echinokokken.

Ausserdem kommen noch zahlreiche andere Würmer, Gregarinen u. s. w. im Fleisch der Schlachtthiere vor, die aber für den Menschen nicht gerade gefährlich sind. Hervorgehoben sei nur *Distoma hepaticum*, welches hauptsächlich von Schafen in Form eingekapselter Cercarien in Futterkräutern genommen wird. Die Kapsel der Cercarien wird im Magen verdaut, die gewordenen Würmchen wandern in die Gallengänge, entwickeln sich zu sogenannten Leberegeln, und die dort producirtten Eier gehen durch Gallenwege und den Koth ab. Aus ihnen entwickeln sich nach mehrwöchentlichem Aufenthalt im Wasser Embryonen, welche zunächst in Muscheln und Schnecken ihre weitere Entwicklung durchmachen und dann erst die Verwandlung in Cercarien erfahren. Da dieser complicirte Entwicklungsprozess eingehalten werden muss, hat der Genuss von Leberegeln keine Anfechtung der Parasiten im Menschen zur Folge, wohl aber ist die mit Egeln versezte Leber abnorm fäulnissfähig und ekelerregend und deshalb vom Genuss auszuschliessen.

2. Uebertragbare Krankheiten der Schlachtthiere.

a) Perlsucht, Tuberkulose. Im Schlachthaus in München wurden etwa 2-5 Procent, in Berlin über 4 Procent des geschlachteten Viehs tuberkulös gefunden. — Am häufigsten ist die Tuberkulose der serösen Häute; letztere sind mit hellgrauen oder bräunlichen hirsen- bis wallnussgrossen „Perlknoten“ besetzt, oft in enormer Ausdehnung, so dass das Gewicht der Neubildungen 20—30 Kilo betragen kann. — Ferner kommen oft käsige pneumonische Herde vor. — Fast stets sind die Lymphdrüsen stark entartet. Das Fleisch ist gewöhnlich marm und blass. — Im Muskelfleisch finden sich selten Tuberkelkugeln und jedenfalls ist gut zubereitetes Fleisch unschädlich; doch ist abgesehen von der Möglichkeit einer Infektion die offenbare Unerwerthigkeit solchen Fleisches für den Ausschluss desselben vom Verkauf.

b) Milzbrand. An den Eingeweiden, der stark vergrösserten Milz und Leber, eventuell unter Zuhülfenahme des Mikroskops leicht

zu erkennen. Im Fleisch findet man zuweilen Hämorrhagien und es zeigt einen widrig-ammoniakalischen Geruch; in anderen Fällen ist durchaus keine Abnormität am Fleisch zu bemerken. — Gefährlich namentlich für die beim Schlachten, Abhäuten, mit dem Zubereiten des Fleisches u. s. w. beschäftigten Menschen.

c) Rotz. Knoten oder diffuse Infiltrationen auf der Schleimhaut der Nase, des Kehlkopfs, der Lunge; stark geschwellte Lymphdrüsen. Gefahr der Uebertragung wie bei Milzbrand.

d) Wuth. Das Fleisch, oft auch die Eingeweide sind ohne gröbere Veränderungen. Die Erkennung der Krankheit erfolgt meist durch die am lebenden Thier hervortretenden Symptome.

e) Eiterungen, Septicämie und Pyämie. Ausser den Localaffektionen zeigen die erkrankten Thiere oft hämorrhagische Gastroenteritis, Ecchymosen auf den serösen Häuten, Milzschwellung u. s. w. Das Fleisch ist vielfach weiss und missfarbig. Derartige Erkrankungen können dem Menschen dadurch gefährlich werden, dass die Erreger in Wunden eindringen und Eiterung resp. Sepsis veranlassen; oder es entstehen sog. Fleischvergiftungen.

f) Die Erreger der Fleischvergiftung. Eine der häufigsten und wichtigsten Gesundheitsschädigungen durch Fleischgenuss sind die Fleischvergiftungen. Symptomatisch und ätiologisch sind zwei Kategorien zu unterscheiden: 1) Fleischvergiftungen mit vorwiegend oder ausschließlich gastrischen Symptomen, hervorgerufen durch das Fleisch kranker Thiere und die von diesen stammenden pathogenen Bakterien. Hier ist das Fleisch sofort nach dem Tode des Thieres und in allen seinen Theilen von schädlicher Wirkung. 2) Vergiftungen, bei denen neuro-paralytische Zustände in den Vordergrund treten, und die durch post-mortale Wucherung gewisser Bakterien in einzelnen Theilen des aufbewahrten Fleisches bedingt sind (Wurstvergiftungen).

Bei der ersten Art von Fleischvergiftung treten dann nach einer gewissen Incubationszeit entzündliche Erscheinungen der Verdauungsorgane in den Vordergrund; die Symptome erinnern entweder an typhöse Erkrankungen, oder in anderen Fällen an Cholera nostras oder an eine mehr chronische Gastroenteritis. Sie verlaufen relativ selten tödtlich; doch verhalten sich in dieser Beziehung die verschiedenen Epidemien sehr ungleich. Wiederholt konnten aus dem Fleisch der erkrankten Schlachtthiere (meistens Kühe im Puerperium) resp. aus den Organen der nach dem Genuss des Fleisches gestorbenen Menschen mehrere specifische (von einander verschiedene) Bacillen aus der Gruppe der Colibakterien isolirt werden, welche als Erreger der Krankheit

sehen waren. — Oft bewirken die von den specifischen Bakterien in dem Fleisch gebildeten Toxine, dass beim Rohgenuss des Fleisches schon wenige Stunden nach der Mahlzeit Krankheitserscheinungen auftreten; später schliesst sich dann die auf Vermehrung eingeführten Bakterien und der fortgesetzten Toxinproduktion bedingte Infektion an. Auch im gekochten Zustande vermochte das Fleisch in manchen Endemieen Vergiftungserscheinungen in hohem Grade hervorzurufen; nachweislich werden die durch die fäulnissbildenden Coliarten producirten Toxine durch Siedhitze zum Theil zerstört. — Ueber die von postmortal befallenem Fleisch ausströmenden Vergiftungen s. S. 304.

g) Actinomycose (s. S. 79). Uebertragung auf den Menschen erfolgt sowohl durch den Genuss des Fleisches, als durch Wunden der mit dem Fleische in Berührung gekommenen u. s. w. Beschäftigten.

h) Maul- und Klauenseuche. Das Fleisch bleibt unverändert und mag die Krankheit nicht zu übertragen.

i) Pocken kommen nur bei Schafen häufiger vor, sind dann aber auf Menschen nicht übertragbar und können höchstens in Folge von Eiterungen septischen Processen zur Infektion Anlass geben.

k) Schweinerothlauf. Haut hyperämisch. Bauchfell und Schleimhaut des Darmes entzündet und ecchymosirt; Peyers'sche Plaques geschwollen. Ueber Erreger s. S. 73.

Schweineseuche, mit vorwiegender Erkrankung der Lunge und Pleura, durch kurze ovale Stäbchen verursacht. — Bei beiden Krankheiten scheint aus einigen Beobachtungen das Fleisch hochgradig afficirter Thiere nicht von schädlichem Einfluss auf den Menschen zu sein.

l) Das Fleisch von an Rinderpest und Lungenseuche erkrankten Thieren ist in sehr zahlreichen Fällen ohne Schaden genossen.

3. Postmortale Veränderungen des Fleisches.

Das Fleisch bildet ein vorzügliches Nährsubstrat für Bakterien. Es kann zweifellos gelegentlich auch Infektionserregern zur Anzucht dienen, die von erkrankten Menschen aus auf das Fleisch übergehen. Haben die mit dem Fleischverkauf Beschäftigten gleichzeitig die Pflege eines an Typhus, Cholera, Diphtherie u. s. w. erkrankten Menschen zu thun, so ist die Uebertragung von Keimen in ähnlicher Weise möglich, wie dies S. 268 für die Milch geschildert wurde.

Ausserdem wird das Fleisch regelmässig von saprophytischen Bakterien occupirt, die bei feuchter Oberfläche des Fleisches und bei Temperaturen zwischen 14 und 35° sich rapide vermehren, aber selbst bei 7—15° noch proliferiren und sich weiter ausbreiten. Viele dieser Bakterien sind als unschädlich anzusehen, namentlich wenn das Fleisch

vor dem Genuss gut zubereitet wird. (Hautgott des Wildes). Verbreitete Fäulnisbakterien vermögen indess auch Toxine, wenngleich in relativ sehr geringer Menge, zu liefern. Durch BRIEGER sind aus zersetztem Fleisch Cadaverin, Putrescin, Neurin, Gadinin u. a. m. als zum Theil giftige Alkaloide isolirt, die sich gerade bei wenig tiefgreifender Zersetzung zu bilden scheinen.

Von weit erheblicherer Bedeutung ist aber die Ansiedelung und Wucherung gewisser specifischer Bakterien, des *Bac. botulinus* und vielleicht von Proteusarten im Fleisch. Der *Bac. botulinus* wächst anaërob und findet günstigste Lebensbedingungen im Inneren von Würsten, Pasteten, auch Schinken u. s. w. Aus seinen Kulturen haben VAN KEMENGE, BRIEGER und KEMPNER ein specifisches Toxin isolirt, welches in typischer Weise die Symptome des „Botulismus“ (Wurstvergiftung) hervorruft, wie sie vielfach nach dem Genuss gefaulten Fleisches beobachtet sind. Diese Symptome bestehen — oft nach vorübergehendem Erbrechen — in Lähmungen der Muskeln des Auges, des Schlundes, der Zunge und des Kehlkopfs und in Folge dessen in Erweiterung der Pupille, Ptosis, Accommodations- und Motilitätsstörungen des Auges, erschwerten Sprechen und Schlingen, Stuhl- und Urinverhaltung; zuweilen tritt unter den Erscheinungen der Bulbärparalyse der Tod ein.

Mit Rücksicht auf die Möglichkeit derartiger die Gesundheit schwer bedrohender Intoxicationen und mit Rücksicht auf das instinctive Ekelgefühl des normalen Menschen gegen übelriechendes und missfarbenedes Fleisch, ist jede verdorbene Waare vom Verkauf auszuschliessen.

Als abnorm ist das Fleisch anzusehen, wenn es keine frischrothe, sondern braune oder grünliche oder auffällige blasse Farbe hat; wenn auf Druck reichlicher, missfarbiger, alkalisch reagirender Saft hervorquillt; wenn das Fett nicht fest und derb, sondern weich und gallertig ist; wenn das Mark der Hinterschenkel nicht fest und rosafarben, sondern mehr flüssig und bräunlich erscheint. Ist das Fleisch oberflächlich mit Lösung von Kaliumpermanganat oder mit sog. Conservesalz (s. unten) behandelt und dadurch der Geruch teilweise beseitigt, so lässt sich derselbe dennoch constatiren, indem man ein in heissenes Wasser getauchtes Messer in das Fleisch einsticht und rasch wieder hervorzieht. — Mikroskopisch zeigt verdorbenes Fleisch verschwommene Querstreifen der Muskelfasern und ausserdem zahlreiche Bakterien.

Ausserordentlich verbreitet ist im Fleischhandel die Sitte, dem Fleisch, besonders dem Hackfleisch die frische, rothe Farbe länger zu erhalten durch Beimengen von Conservesalz, das theils aus Natriumsulfit, theils aus Natriumsulfat besteht. Auf 1 Kilo Hackfleisch werden gewöhnlich 10 g des Salzes zugesetzt. Seit nachgewiesen ist, dass nach der Verfütterung von schwefligsauren Salzen bei den Versuchsthieren Entzündungen und

norrhagieen in verschiedenen Organen, namentlich Nephritiden, aufen, ist die Verwendung eines derartigen Salzes zweifellos als gesundheitsschädlich zu beanstanden. Ausserdem wird durch die stliche Rothfärbung eine minderwerthige Beschaffenheit des Fleisches verschleiert. Mit Recht sind daher neuerdings derartige Zusätze boten.

4. Seltener Anomalien des Fleisches.

Bei einigen Thieren scheint es unter Umständen während des Lebens zu einer Anhäufung giftiger Stoffwechselprodukte, vorzugsweise der Leber, zu kommen. Es wird dies von manchen Fischen, sternen u. s. w. behauptet; ferner sind die mehrfach nach dem Genuss von Miesmuscheln beobachteten Erkrankungen auf ein hauptsächlich der Leber derselben zeitweise angesammeltes Gift, das Mytilotoxin, rückgeführt.

Giftige Arzneimittel, wie Arsenik, sind wohl zuweilen im Fleisch damit behandelten Schlachtthiere nachgewiesen, aber in solchen Mengen, dass kaum eine Gefahr für die menschliche Gesundheit resultiren kann.

Als entschieden minderwerthig ist das Fleisch junger Kälber anzusehen; bis zum 10. Tage liefern sie ein sehr blasses, graues, fettarmes Fleisch mit wässerigem, welkem Bindegewebe. Zwischen dem 10. und 5. Lebenswoche ist es am besten zum Verkauf geeignet.

Von unangenehmem Beigeschmack und Geruch und deshalb verwerflich ist das Fleisch von männlichen Zuchtthieren, von abgehetztem oder an Erschöpfung verendetem Vieh.

Sehr verbreitet ist die Unterschiebung von Pferdefleisch an Stelle von Rindfleisch, namentlich in Hackfleisch, Würsten u. s. w. Vom hygienischen Standpunkt ist dies kaum zu beanstanden, wohl aber wird der Käufer finanziell geschädigt. Die Erkennung von Pferdefleisch sties bisher auf grosse Schwierigkeiten; jetzt ist sie leicht ausführbar durch das Auszug von mit Pferdefleischinfus vorbehandelten Kaninchen, das im wässrigen Auszug aus Fleisch oder Wurst, denen Pferdefleisch beigemengt war, bei 40° binnen 4 Minuten eine deutliche Trübung hervorruft (UHLENHUTH, NÖTEL).

Gegen die geschilderten Gefahren des Fleischgenusses stehen uns eine Reihe von wirkungsvollen Maassregeln zu Gebote, welche theils die Haltung der Schlachtthiere während des Lebens betreffen, theils die Fleischschau während des Schlachtens, sodann in zweckentsprechender Aufbewahrung des Fleisches und in der Zubereitung desselben vor dem Genuss bestehen.

1. Vorsichtsmaassregeln bei der Viehhaltung.

Die Continuität des Wirthswechsels thierischer Parasiten der Schlachtthiere (vgl. Fig. 87) kann unterbrochen und damit die Gefahr der Weiterverbreitung grossentheils vermieden werden durch reinliche Haltung der Ställe und reinliche Fütterung. Giebt man den Schweinen keine Gelegenheit, durch Ratten oder trichinöses Schweinefleisch Trichinen zu acquiriren, hält man namentlich die Schweineställe dicht und gegen ein Eindringen von Ratten geschützt, so ist eine Verbreitung der Trichinose unmöglich. — Beseitigungen der menschlichen Dejectionen und Fernhalten derselben von den Schweinen resp. vom Rindvieh schützt gegen die Entwicklung der Finnen von *Taenia solium* und *T. mediocanellata* und somit gegen die Weiterverbreitung dieser Bandwürmer. — Einschränkung der Zahl der Hunde und Verhinderung des Zusammenlebens derselben mit den Schlachtthieren kann die Fälle von *Taenia echinococcus* wesentlich verringern. Daneben ist möglichste Vernichtung alles echinokokkenhaltigen Fleisches und grösste Vorsicht im Verkehr der Menschen mit Hunden indicirt.

Der Verbreitung der Zoonosen (Milzbrand, Rotz, Wuth u. s. w.) ist durch Seuchengesetze, speciell durch Anzeigepflicht, Sperren und Desinfektionsmaassregeln wirksam vorzubeugen.

Welch bedeutenden Einfluss die Art der Viehhaltung auf das Vorkommen von Parasiten beim Schlachtvieh hat, geht z. B. aus einem Vergleich der in den Regierungsbezirk Posen und Hildesheim im Durchschnitt von 7 Jahren gefundenen finnigen und trichinösen Schweinen hervor:

	Posen	Hildesheim
Es gelangten jährlich zur Untersuchung . .	75 000	130 000 Schweine
Davon waren finnig	253	47 "
also pro Mille	3.4	0.36 "
Trichinös wurden gefunden	381	7 "
also pro Mille	5.1	0.05 "


2. Fleischbeschau.

Da pathologische Veränderungen an den Muskeln nur sehr selten, dagegen fast regelmässig an den Eingeweiden auftreten, so ist eine Fleischbeschau nur während des Schlachtens durch Begutachtung der inneren Organe möglich. Diese Controle ist aber wiederum nur durchführbar, wenn nicht etwa zahlreiche Privatschlächtereien bestehen, sondern wenn das Schlachten ausschliesslich an einer Centralstelle, in einem städtischen Schlachthaus geschieht. Sobald ein solches eingerichtet ist, steht den Communen nach dem Gesetz von 1868 das Recht zu, Privat-Schlachtstätten zu verbieten.

In den grossen Städten sind die Schlachthäuser gewöhnlich mit dem Vieh-, mit Schienengleis nach dem Bahnhof, mit einem Börsengebäude, Marktplatz, ausgedehnten Stallungen u. s. w. verbunden (s. Fig. 88). Auf dem eigentlichen Schlachthof befinden sich: 1) das Polizeischlachthaus, das Observationshaus für verdächtiges Vieh. Dasselbst befinden sich auch eine Kasse für das confiscirte Fleisch und für dessen Vernichtung. Daneben eine Talgschmelze, Fellsalzerei, Düngerstätte u. s. w. 2) Rinderschlachthallen. Diese sind dieselben nach dem Zellsystem eingerichtet; von einer Mittelgasse, welche als Vorplatz zum Aushängen des Fleisches dient, gehen dann rechts und links kleine Abtheilungen, welche von je einem oder mehreren Thieren benutzt werden; oder es bestehen gemeinsame Schlachthallen, die durch Pfeiler unterbrochen sind (Fig. 89), und dieses System verdient vom hygienischen Standpunkt den Vorzug, weil dann die Beaufsichtigung leichter ist. In Folge der gegenseitigen Controle der Fleischer gleichmässiger ist. 3) Schweineschlachthallen mit 3 Abtheilungen, dem Abstechraum, dem Räucherraum, in welchem die getödteten Thiere abgebrüht werden, und der eigentlichen Schlachthalle. 4) Die Kühlhallen zur Aufbewahrung des geschlachteten Fleisches. 5) Eine besondere Pferdeschlächtereier. 6) Wohnung für den Director, Untersuchungszimmer für die Fleischbeschauer u. s. w.

Der Director ist Thierarzt und hat sachverständige Gehilfen. Das zu schlachtende Vieh kommt zunächst in die Stallungen, muss dort ruhen und wird erst im lebenden Zustande untersucht. Wird es nicht beanstandet, so wird es geschlachtet. Die dabei angewandten Methoden bestehen entweder in Betäubung und Schnitt durch Trachea und Carotiden, oder Genickschnitt; oder Betäubung und Einblasen von Luft durch eine Troikar in die Pleura; oder Schlag mit der Buterrolle, einem Hohlkeisen, welches mit einem Riemen verbunden resp. in eine Art Maske eingeschlossen ist und dem Thiere gegen das Gehirn getrieben wird; oder durch die sogenannten Schussmasken. Alle letztgenannten Methoden sind ungünstig, weil dabei das Blut im Fleische verbleibt und dadurch leicht ein Verderben und ein Missfarbigwerden des Fleisches hervorgerufen wird. Dass der Nährwerth des Fleisches durch das darin bleibende Blut wesentlich erhöht werde, ist unrichtig. — Nach dem Öffnen des Thieres werden die Eingeweide begutachtet und eventuell werden die Proben genommen zur Untersuchung auf Trichinen (s. S. 298).

Wird das Thier gesund gefunden, so wird es weiter zerlegt, das Fleisch gestempelt und zum Verkauf freigegeben. Fleisch von kranken Thieren kommt in's Observationshaus und wird gewöhnlich vernichtet; geschieht namentlich, wenn die Thiere an Milzbrand, Rotz, Wuth, verbreiteter Perlsucht, Sepsis und Eiterungen, Trichinen, viel Finnen, wenn Aktinomyces erkrankt waren. Ferner gehört hierher die mit Echinococcus oder Distoma behaftete Leber. Die Vernichtung geschieht durch Brennen oder in der Talgschmelze, oder gewöhnlich im PODÉWILS' schen Apparat (s. Kap. VIII). Bei leichteren Erkrankungen, z. B. nicht zu verbreiteter Tuberculose, bei mässiger Menge von Finnen, bei unreifen Thieren, bei krepirten oder abgehetzten Thieren, bei Lungenseuche, Laufvieh wird das Fleisch gewöhnlich nicht vernichtet, sondern auf



2 u. 3 Ställe,	3 für Schweine,	N Verwaltungshaus.	8 Schweine.
4 Schlachthaus,	4 Stall für Grossvieh,	O Beamtenwohnung.	4 Streuschuppen.
5 Desinfection.	5 Kuttelei	P Freibank.	F Markthalen:
B Fellsalzerei.	6 Stall für Kleinvieh.		1 für Grossvieh,
C Talgschmelze.	H Kühlraum:	II Viehmarkt.	2 für Schweine,
D Düngerhaus.	1 Maschinenraum,	A Börse.	3 für Kalber u. Hammel.
E Rossschlächtere.	2 Vorkühlraum,	B Pferdeauspannst.	4 Laderampe,
F Ueberständerhof.	3 Grösser Kühlraum.	C Laderampe.	5 Schweinewäsche.
	J Noth-Stall.	D Lokomotive.	G Desinfektions-Anstalt.

dem Schlachthof selbst als minderwerthig verkauft, am besten, nachdem es vorher in einem Dampfsterilisator, der mit $\frac{1}{2}$ Atmosphäre Ueberdruck arbeitet (HARTMANN, ROHRBECK u. A.) gekocht ist. Doch weichen in dieser Beziehung die örtlichen Bestimmungen sehr von einander ab. — Das finnige Fleisch ist nach zahlreichen Versuchen nicht mehr gefährlich, wenn es 4—6 Wochen im Kühlraum gehalten ist. Nach so langer Aufbewahrung, die in Schlachthäusern mit modernen Kühlhallen auf keine Schwierigkeiten stösst, kann es auch im rohen Zustande verkauft werden.

Ein besonderer Vorthail der Schlachthäuser liegt noch darin, dass das Fleisch daselbst möglichst reinlich behandelt, und dass somit der späteren Zersetzung energisch vorgebeugt wird.

Der Fussboden der Schlachthalle ist aus gerillten Fliesen hergestellt und mit solcher Neigung und mit Rinnsalen versehen, dass Verunreinigungen leicht abgeschwemmt werden können. Ueberall steht reichlich Wasser zur Disposition, ebenso ist für gute Lüftung gesorgt. Von den Abfällen, die in ungeheurer Masse geliefert werden, werden die flüssigen abgeschwemmt, wobei die festen Partikel durch Siebeimer zurückgehalten werden; der Dünger und Kehrlicht wird abgeholt und als werthvolles Düngemittel verwandt; im Uebrigen unbrauchbare Fleischabfälle werden gewöhnlich zur Schweinemast benutzt.

3. Aufbewahrung des Fleisches nach dem Schlachten.

Ein sofortiger Genuss des frisch geschlachteten alkalisch reagirenden

Fleisches ist zu widerrathen, weil dasselbe zäh ist und einen fade widerlich süßen Geschmack hat. Erst wenn das Fleisch 2—3 Tage aufbewahrt war, wird durch die sich bildende Säure das intrafibrilläre Bindegewebe und das Sarkolemm gelockert, und gleichzeitig entwickeln sich kräftige und angenehme Geschmacksreize. Es fragt sich, wie die Aufbewahrung des Fleisches vor sich gehen soll, ohne dass Saprophyten Infektionserreger oder üble Gerüche in das Fleisch eindringen.




Fig. 89. Schlachthalle für Kleinvieh.

Vielfach wird das Fleisch im Eisschrank aufbewahrt; es ist jedoch eine unzulängliche Methode. Bei der Temperatur des Eisschranks ($7-12^{\circ}$) hört das Bakterienwachsthum durchaus nicht auf; dazu kommt, dass sich im Eisschrank fortwährend Wasserdampf in der Luft condensirt und die Oberfläche des Fleisches allmählich stark durchfeuchtet wird. Gerade diese weiche Oberfläche bietet den Bakterien einen vorzüglichen Nährboden. Auch der Geschmack des im Eisschrank gehaltenen Fleisches leidet erheblich.

Ein weit richtigeres Verfahren besteht darin, dass man das Fleisch in bewegter Luft abhängen lässt, so dass die Oberfläche eintrock-

den Bakterien nicht möglich, in der oberflächlichen Schicht und von da in die Tiefe zu dringen. Ein solches Abtöten eben in den Kühlhallen der Schlachthäuser.

Bei diesen Eismaschinen wird durch einen Compressor Ammoniak comprimirt, die dabei entstehende Wärme durch Kühlung mit Wasser abgeführt. Die gekühlte comprimirte Ammoniak lässt man durch ein Ventil in einen Kühlraum ausströmen, d. h. in Röhren, welche ein Gefäss mit Salz- oder Salzlösung durchziehen; durch die plötzliche Expansion des Gases erfolgt eine Abkühlung der Salzlösung. Das Ammoniakgas gelangt darauf zum Compressor und beginnt seinen Kreislauf aufs Neue.

Die unter 0° abgekühlte Salzlösung wird zu einem Be-
 reitungs- oder Kühlkühler, geleitet, in welchem sie über eine grosse Oberfläche




Fig. 90. Kühlenanlage.

in kalte Scheiben) strömt; dort tritt Luft, die mittelst Ventilators einströmt, in innige Berührung mit der kalten Salzlösung. Letztere fließt, nachdem ihre Kälte an die Luft abgegeben hat, wieder zum Refrigerator.

Die abgekühlte Luft tritt durch Rohre unter der Decke des Kühlraums nach unten abwärts, erwärmt sich allmählich, bekommt dadurch ein Temperaturdeficit und austrocknende Wirkung auf die Oberfläche des Fleisches, steigt bei weiterer Erwärmung allmählich nach oben, an der Decke gelegenen Rohren, deren Oeffnungen nach oben aufgenommen und wieder dem Luftkühler zugeführt.

Wichtig ist bei der Aufbewahrung des Fleisches und in den Kühlräumen selbstverständlich die grösste Reinlichkeit nothwendig; die Verbindung der Verkaufslocale mit Wohn- und Schlafräumen zu vermeiden. In Fällen von infektiösen Krankheiten innerhalb der Fleischerei ist ähnliche Sorgsamkeit nothwendig, wie bezüglich der Fleischwirthschaften gefordert wurde (s. S. 274).

4. Zubereitung des Fleisches.

In Anbetracht der zahlreichen Gefahren, welche mit dem Genuß des rohen Fleisches verbunden sein können, sollte das Fleisch **niemals** im rohen Zustande genossen werden, auch dann nicht, wenn ein geordnete Fleischschau besteht. Einzelne Finnen werden z. B. leicht übersehen, aber selbst eine einzige genügt, um einen Bandwurm hervorzurufen; ebenso ist es nicht möglich, die Trichinenschau oben in hinreichend zuverlässiger Weise durchzuführen. — Soll ausnahmsweise einmal rohes Fleisch genossen werden, so ist es wenigstens aus einer bekannten Quelle im ganzen Stück zu beziehen, dann genau auf Finnen zu untersuchen und darauf erst zu zerkleinern. Das rohe Fleisch besitzt keinen höheren Nährwerth und ist nicht leichter verdaulich als das präparirte. Für gewöhnlich soll daher Kochen oder Braten des Fleisches oder aber zuverlässiges Conserviren desselben dem Genuß vorausgehen.

a) Kochen und Braten.

Durch mässige Hitze werden die Parasiten fast ausnahmslos zerstört. Trichinen sterben bei 65° ab, Finnen bei 52° , die meisten Contagien bei einer Hitze von $60-65^{\circ}$, die etwa $\frac{1}{4}-\frac{1}{2}$ Stunde einwirken. Nur manche Toxine bleiben auch nach Einwirkung höherer Temperaturen unzersetzt. — In gut gekochtem und gebratenem Fleisch steigt selbst im Innern die Temperatur regelmässig auf $60-70^{\circ}$, was also zur Tödtung der Parasiten ausreicht. Allerdings dringt die Hitze in grössere Stücke nur langsam ein; beispielsweise zeigt ein Stück Fleisch von $3\frac{1}{2}$ Pfund in kochendem Wasser erst nach $1\frac{1}{2}$ Stunden eine Temperatur von 62° im Innern. Halb gar gebratenes Fleisch, bei welchem beim Schneiden nur mühsam trüber Saft hervorquillt, und bei welchem also noch keine Gerinnung des Myosins stattgefunden hat, bietet natürlich auch keine Garantie gegen Parasiten.

Das Fleisch wird durch das Kochen und Braten nur in geringem Grade verändert. Beim Kochen wird es in 2 Theile zerlegt, das Eiweiss gerinnt, es wird Flüssigkeit ausgepresst und es entsteht so 1) Brühe. Diese enthält sehr wenig feste Substanzen, nur $2\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}$ Procent, von welchen über die Hälfte anorganische Salze sind. Die wasserlöslichen Bestandtheile, insbesondere die Eiweissstoffe, Myosin, der Blaufarbstoff bleiben ganz im Fleisch und nur unwägbare Spuren von Albumin gehen in die Brühe über, gerinnen dort durch die Hitze und werden mit dem hauptsächlich aus Fett bestehenden sogenannten Schaum geschöpft. Bei Knochenzuthat löst sich in der Brühe noch etwas Leim von 1 kg etwa 20 g. Jedenfalls bekommen wir in der Brühe immer:

eine ausserordentlich kleine Menge von Nährstoffen, so dass sie lediglich als Genussmittel angesehen werden kann. 2) Das gekochte Fleisch. Dasselbe hat viel Wasser und Extractivstoffe, aber nur eine sehr geringe Menge Nährstoffe verloren. 100 Theile frisches Fleisch geben 57 Theile gekochtes. Wird das Fleisch zunächst mit Wasser ausgelaugt und dann erhitzt, so wird es hart, zäh und geschmacklos aber durch feines Zerkleinern, Hacken und Schaben ist es gleichwohl verdaulich und nahrhaft zu machen. Besser von Geschmack bleibt es, wenn man grosse Stücke gleich in siedendes Wasser einbringt. Es bildet sich dann an der äusseren Fläche eine Hülle von geronnenem Eiweiss, welche das Innere vor weiterer Auslaugung schützt. Die Brühe wird in diesem Falle weniger schmackhaft, ist aber leicht durch Extract aufzubessern. — Gebratenes Fleisch hat etwa die gleiche Concentration wie gekochtes, 100 Theile frisch entsprechen 56 Theile Braten; im Uebrigen hat es seine Beschaffenheit wenig verändert. Sehr bald bildet sich auf der Oberfläche eine undurchlässige Kruste, so dass das Innere saftig bleibt. Das Bindegewebe wird in Leim verwandelt, das Myosin gerinnt; das Fleisch wird dadurch leichter verdaulich als in rohem Zustande; die brenzlichen Röstproducte geben ausserdem einen angenehmen Geschmacksreiz. Mit der Sauce zusammengenossen, welche viel Fett und namentlich freie Fettsäuren enthält, wird es von empfindlichen Menschen schlecht ertragen; dagegen ist es im kalten, feingeschnittenem oder geschabtem Zustande ausserordentlich leicht verdaulich.

b) Conservierungsmethoden.

Wegen der schlechten Haltbarkeit des Fleisches sind seit Jahren viele Versuche zur Conservirung desselben gemacht. Zum Theil verwendet man Mittel, welche die Fäulnisserreger tödten. Diese tödten dann zugleich auch die Contagien, Finnen und Trichinen, und solche Conserven sind ohne weitere Zubereitung geniessbar und vom hygienischen Standpunkt in keiner Weise zu beanstanden. Andere Mittel bewirken nur eine gewisse Hemmung der Bakterien und verhindern lediglich eine so starke Wucherung, dass Fäulnisserscheinungen auftreten. In diesem Falle bleiben die etwa vorhandenen pathogenen Bakterien und Parasiten eventuell lebendig und die Conserven bedürfen dann der besonderen Zubereitung vor dem Genuss. — Alle Conservierungsmethoden dürfen keine giftigen Stoffe in das Fleisch hineinbringen und dürfen den Nährwerth und den Geschmack des Fleisches nicht beeinträchtigen. Vorzugsweise in Betracht kommen folgende Methoden:

1) Kälte. Dieselbe wirkt entwicklungshemmend, tödtet aber nur wenig Bakterien (s. S. 51). Trotzdem hat man auch die Kälte zu einer längeren

Conservirung des Fleisches zu verwenden und namentlich die grossen FVorräthe Südamerikas und Australiens in Eispackung auf den europäischen Markt zu bringen versucht. Das Fleisch geht aber, sobald es aus der Verpackung herauskommt, in so ausserordentlich schneller Weise in Fäulnis dass ein Verkauf in vielen Fällen unmöglich wird. — Bessere Resultate in der Neuzeit erzielt mit Anwendung von Kaltluftkammern, die in Kühlräume der Schlachthäuser eingerichtet sind.

2) Wasserentziehung. Eine rasche Eintrocknung der Oberfläche hindert für lange Zeit den Eintritt der Fäulnis. Von diesem Mittel wird an allen Orten ausgiebiger Gebrauch gemacht, wo eine lebhaftere Windbewegung und eventuell ein niedriger Luftdruck die Wasserverdunstung begünstigt auf hohen Bergen. In Südamerika benutzt man seit langer Zeit die Sonnenwärme zum Austrocknen des Fleisches. Das Fleisch von mageren, abgetriebenen Thieren wird in Streifen geschnitten der Sonne ausgesetzt; da es aber nicht gelingt, die letzten Mengen von Wasser fortzubringen, muss dasselbe noch mit Kochsalz und Borsäure eingerieben werden, um vollkommen trocken zu werden. In dieser Form kommt es als Tassajo oder Charque in den Handel ist aber für den Menschen kaum geniessbar. — Ein besseres Fabrikat früher unter Anwendung von heisser Luft hergestellt, die sogenannte *Charque pura*. Auch dabei war indess ein gewisser Kochsalzzusatz zur völligen Conservirung des Präparates nöthig. Das getrocknete Fleisch kam in dieser förmigen Zustände in den Handel (vgl. S. 259).

3) Salzen, Pökeln. Imprägnirt man das Fleisch mit einer 8–10 procentigen Salzlösung (meist unter Zusatz von etwas Salpeter) oder legt man das Fleisch trocken in ein Salz-Salpetergemenge, so wird ein grosser Theil der Bakterien getödtet und alle werden an der Wucherung verhindert. Die Anwendung fährt bei Rind- und Schweinefleisch und bei Fischen (Hering, Sardellen) angewendet. Der Nährwerth wird etwas verringert, die Verdauung scheint nicht zu leiden.

4) Räuchern. Das Fleisch wird in einer Räucherammer dem abgekühlten Rauch von Buchen- oder Eichenholz, eventuell auch Wachholdersträuchern ausgesetzt. Daneben findet ein starker Luftzug und durch diesen ziemlich schnelle Austrocknung statt; oft werden die Fleischwaaren vorher stark mit Salz imprägnirt. — In neuerer Zeit hat man ausserdem eine sogenannte Kunst-Schnellräucherung eingeführt, welche nur im Eintauchen des Fleisches in eine Mischung von Wasser, Holzessig und Wachholderöl besteht. Bei dem letzteren Verfahren werden die Contagien und Parasiten durchaus nicht vollständig getödtet. Dagegen sind in den langsam in Räucherammern geräucherten stark ausgetrockneten Fleischwaaren gewöhnlich keinerlei lebende Parasiten mehr enthalten. Finnen haben überhaupt eine kurze Lebensdauer (nur 5–7 Wochen), werden also in solchen Conserven niemals gefunden. — Verbreitetsten Conserven, Schinken und Würste, sind seit Einführung der Schnellräucherung nicht ohne Bedenken zu geniessen, sobald man über ihre Herstellung und die Art ihrer Herstellung nicht unterrichtet ist. Zu Würsten vermischt man ausserdem erfahrungsgemäss alle möglichen Fleischabfälle, die sich nicht verworthen lassen, verbraucht. Sehr oft tritt in denselben nachträglich Fäulnis ein, namentlich im Inneren voluminöser Präparate, wo die Hitze des Rauchs nicht ordentlich eingedrungen ist. Daher die Gefahr der Vergiftung, welche bereits S. 301 näher geschildert wurde.

5) Chemikalien wie Borsäure, Salicylsäure werden nur ausnahmsweise zur Conservirung des Fleisches verwendet, zumal beide sich nicht völlig indifferent gegen den menschlichen Organismus verhalten. Neuerdings werden Kohlensäure und Formalin zu Conservirungsversuchen benutzt.

6) Erhitzen in bakteriendicht verschlossenen Gefässen. Schon Ueberessen des Fleisches mit heissem Fett führt zu einer langen Conservirung desselben; die anhaftenden Bakterien werden dabei getödtet, der Zutritt neuer Bakterien durch die Fetthülle verhindert. In solchem Zustande kann sogar Fleisch über See transportirt werden. — Am vollkommensten geschieht die Conservirung in Blechbüchsen (Appert'sches Verfahren). In denselben wird das Fleisch zunächst erhitzt, dann werden die Büchsen zugelöthet und die Erhitzung noch eine Zeit lang fortgesetzt. Dabei werden alle Bakterien und alle Congerien sicher getödtet. — In Handel kommen z. B. aus Amerika Zungen, das Corned Beef u. s. w. (In Deutschland zur Zeit ausgeschlossen.) Letzteres steht an heimischen Präparaten dadurch nach, dass in Folge des langen Kochens das Bindegewebe gelatinös geworden ist und dass dadurch die zähe Faserung des Fleisches stärker hervortritt. Ausserdem stammt das Fleisch fast niemals von Masthieren, sondern meist von abgetriebenem Vieh. Von den Löthstellen der Büchsen aus kann eine Bleivergiftung erfolgen.

7) Seit langen Jahren werden die zahllosen Rinderheerden Südamerikas auch dazu verworthen, aus dem Fleisch derselben Fleischextract herzustellen. Zu dem Zwecke wird das zerhackte magere Fleisch mit Wasser gekocht, das Albumin und Fett abgeschöpft, die Brühe eingedampft bis zur dicken Syrupconsistenz. Ein Rind liefert etwa 5 kg Fleischextract. Ausserdem werden die Schlachtabfälle zu einem Dungmittel, dem Fleischknochenmehl, verarbeitet. Das ausgekochte Fleisch wird zermahlen, mit Kochsalz und Kaliumphosphat versetzt und als Fleischfuttermehl für Schweine verkauft. — Der Fleischextract enthält 17 Procent Wasser, 20 Procent Salze, 63 Procent organische Stoffe, die grösstentheils aus Extractivstoffen, zu etwa 20 Procent aus löslichem Eiweiss bestehen. Der Fleischextract ist daher ein Genuss- und Reizmittel mit nur sehr geringem Nähreffect. Auch die neueren, im flüssigen Zustande unter Zusatz von viel Kochsalz präparirten Fleischextracte (CIBILA, MAGGI u. s. w.) sind nicht sowohl Nähr- als vielmehr Genussmittel (s. unten).

Im Folgenden sei noch besonders auf einige möglichst leicht verdauliche Fleischpräparate für Kranke und Reconvalescenten hingewiesen. — Vielfach hat man versucht, flüssige oder breiartige Präparate aus dem Fleische zu gewinnen. In dieser Absicht ist z. B. hergestellt:

Extractum carnis frigide paratum (LIEBIG); früher officinell. Fein zerhacktes Fleisch wird mit 1 p. m. Salzsäure $\frac{1}{2}$ —1 Stunde macerirt, die röthliche Brühe decantirt. Es geht Syntonin in Lösung; Kochsalz darf nicht zugesetzt werden, da sonst Fällung eintreten würde. Enthält 2.4 Procent feste Bestandtheile, 1.3 Procent Eiweiss; in einer Tasse also kaum 3 g Eiweiss, daher nicht nährend.

Beef tea. 300 g fettfreies Fleisch in kleine Würfel geschnitten, ohne Zusatz in einer weithalsigen Flasche mit lose aufgesetztem Kork in

warmes Wasser gestellt, letzteres langsam erhitzt und 20 Minuten im Sieden gehalten. Die abgossene gelbe Brühe (ca. 100 ccm) enthält: 7.3 feste Bestandtheile; darin 5.5 organisch, 1.8 g Eiweiss, Pepton und Leim. — Als Nahrungsmittel ungeeignet, aber von kräftigem Geschmack und bei Zugabe von nährenden Präparaten zu empfehlen.

Succus carnis. Das fein zerhackte Fleisch wird in Lagen von je 250 g durch grobe Leinwand getrennt unter eine Fleischpresse gebracht. 1 Kilo Fleisch liefert 230 g Saft, welcher 6 Procent Eiweiss, in einer Tasse also 12—14 g enthält. Vor dem Genuss ist der Saft auf 40° zu erwärmen und reichlich mit Salz und Gewürz (Fleischextract) zu versetzen. Bei höherer Temperatur würden die Eiweissstoffe coaguliren. — Das Präparat leistet eine nicht unerhebliche Eiweisszufuhr, aber für sehr hohen Preis, und ist von unangenehmen Geschmack.

Zahlreiche Versuche gehen ferner darauf aus, das Eiweiss des Fleisches zu peptonisiren. Bei der Magenverdauung und bei der künstlichen Verdauung entstehen bekanntlich zunächst vorwiegend Albumosen, sehr leicht lösliche und verdauliche, durch Salpetersäure noch fällbare Vorstufen der Peptone; erst späterhin überwiegen die nicht mehr fällbaren Peptone. Auf die Albumosen ist es bei Herstellung der Peptonpräparate in erster Linie abgesehen; dieselben haben nur faden, nicht unangenehmen Geschmack, während die Peptone wegen ihres bitteren, brenzlichen und adstringirenden Geschmacks durchaus nicht für Ernährungszwecke geeignet sind. — Präparate von Liebig-Kemmerich mit circa 35 Procent Albumosen, Extractconsistenz. Somatose, Fleischalbumose in Pulverform. Tropon s. S. 259. — Fluid beef, Fluid meat, Fleischsaft Puro, Fleischsaft Karno, in flüssiger Form mit 20—30 Procent löslichem Eiweiss. — In Abwechslung mit diesen Fleischpräparaten können Eiweisspräparate aus Milch: Nutrose, Plasmon, (Casein-Natrium), Eucasin (Casein-Ammoniak), alle in Pulverform; oder aus Getreide: Roborat, Aleuronat, Verwendung finden; auch aus Hefe werden neuerdings eiweissreiche Präparate hergestellt.

Sobald als möglich sollte dem Reconvallescenten resp. Kranken statt dieser für längere Zeit sehr ungenussigen und übermässigen theuren Präparate, festes aber fein vertheiltes Fleisch gereicht werden. Geschabtes resp. fein zerhacktes gebratenes oder gekochtes Fleisch, das in der Suppe suspendirt werden kann, ist ausserordentlich leicht verdaulich. Als Fleischsorten sind dazu Geflügel, Rindsfilet, Kalbfleisch u. s. w. geeignet.

Nicht zu vergessen ist, dass es bei Reconvallescenten von vornherein weniger darauf ankommt, grössere Mengen Eiweiss zuzuführen, als vielmehr Kohlehydrate (s. S. 243). Daher ist anfangs eine Combination der obengenannten Brühen und flüssigen Fleischpräparate, auch wenn sie nicht viel Eiweiss enthalten, mit leicht verdaulichen Kohlehydraten (s. unten) zweckmässig.

Anhang. Eier. Eier bieten eine sehr eiweissreiche Nahrung, die auch gut ausgenutzt wird, das Eiweiss zu 97 Procent, das Fett zu 95 Procent. Am leichtesten verdaulich sind sie in feinsten Zertheilung als Emulsion in Suppe,

durch
ist be-
wickelt
knehl,
carb. +
die aus
dem die
Wasser

form der
teig stellt
dar, die
folgender
42° ange-
nimmt dann
it zur Wir-
rt. Durch
führung ver-
erschiedene
fe thetheilt
; ausgezeich-
et, am reich-
2 Stunden ist
Minuten lang

s zugefügten
Brot hervor-
er festen Sub-
ze vollständig
gemacht. Die
wesentlich ver-
n und Gummi
len geronnenen
Brot eine po-
gssäften durch-

zu reichlichem
normem Wasser-
wird das Brot
ch Wasserverlust
erwärmt, wird es
beim Anwärmen
des Wassers an die
Körner ab. Lagert
unter 30 Procent,

2 Procent Fett, 67 Procent Stärke. Vor dem Vermahlen sind die Getreidekörner zunächst durch Reinigungsmaschinen von aussen anhaftendem Schmutz und Beimengungen zu befreien, und zwar der Reihe nach zuerst von Staub und Brandsporen, dann von Spreu und Stroh, dann von den kuglichen Unkrautsamen. Sodann sind sie durch Schälmaschinen von der werthlosen resp. störenden Hülse, Frucht- und Samenhaut, zu befreien (Decortication). Durch das Mahlen wird dann das Korn in zwei Antheile zerlegt; die Kleberschichten sind zäher und elastischer, während der spröde Mehlkern leicht in Pulver zerfällt. Der vorzugsweise aus Stärke und wenig Eiweiss bestehende Kern kann daher von jenen nur grob zerkleinerten, eiweissreichen Theilen der Hülle durch Beuteln oder Sieben getrennt werden. Die äusseren Partien des Korns sind ausserdem grau gefärbt; das Mehl wird daher um so dunkler und gröber, je mehr es von den äusseren Schichten enthält. Bei der sogenannten Hoch- oder Griesmüllerei, wo die Walzen resp. Steine anfänglich weit von einander stehen und allmählich einander genähert werden, bekommt man die meisten Sorten und zu Anfang die feinsten Mehle; bei der Flachmüllerei stehen die Steine von Anfang an nahe und durch die von Anfang an gewaltsame Zerkleinerung wird die Schale zum Theil in feine Splitter zerteilt, die sich dem Mehl beimengen und ihm eine grauen Farbe geben.

Die verschiedenen Getreide und die verschiedenen Mehlsorten aus dem gleichen Getreide zeigen relativ geringe Differenzen in der chemischen Zusammensetzung. Die gröberen Sorten und die Kleie enthalten aus den oben angeführten Gründen die grösste Eiweissmenge. Dies Plus von Eiweissstoffen ist indess zum Theil nicht ausnutzbar; die Cellulosehüllen der Kleberschicht sind schwer durchdringlich und ihre Zuthat verringert ausserdem noch die Ausnutzung der übrigen Nährstoffe (s. S. 246).

Auch in Bezug auf ihren Nährwerth zeigen die einzelnen Getreidearten nur relativ geringfügige Unterschiede.

Das Mehl ist im rohen Zustande schwer verdaulich; es müssen vorerst die Hüllen der Stärkekörner gesprengt, die Stärke zum Quellen und zur Kleister- oder Dextrinbildung gebracht werden. Ferner muss das Eiweiss in den geronnenen Zustand übergehen. Es gelingt dies Alles z. B. durch Erhitzen des Mehls mit Wasser. So lassen sich Suppen und Breie bereiten, die aber relativ wenig feste Substanz enthalten, ausser beim Reis, in dem leicht die ganze Tagesration von Kohlehydraten geliefert werden kann. Zu Suppen verwendet man zweckmässig Mehlpräparate wie Nudeln und Makkaroni; oder Sago (Reis- und Maisstärke), Graupen (kugelförmig gemahlene Gersten- und Weizenkörner), Gries (vermahlener Weizen), Grütze (geschälte und geschrotete Körner von Hafer, Buchweizen u. dergl.). Versucht man einen gehaltreicheren, conservirbaren Teig aus Mehl und Wasser herzustellen, so resultirt eine compacte, schwer verdauliche Masse; dieselbe wird erst brauchbar, nachdem sie durch die Brotbereitung porös und locker geworden ist.

Die Lockerung lässt sich beim Brotteig erreichen durch im Innern desselben entwickelte Gase und zwar deshalb, weil der Teig stark zusammenbackt, so dass die Gase nicht glatt entweichen, sondern die zähe Masse nur auseinander treiben. Kleberfreie, nicht backende Mehle sind zur Brotbereitung ungeeignet.

Das Gas kann bei sehr zäher Masse Wasserdampf sein. Brot wird dadurch wenn es viel Eiweiss enthält, etwas gelockert (Graham-Brot). Meist bekommt man Kohlensäure, die entweder aus mineralischem Material entwickelt z. B. Natron bicarbonicum + Salzsäure; oder LIEBIG-HORSFORD's Backmehl, end aus saurem Calciumphosphat und Natrium bicarb.; oder Natr. bicarb. + Säure; oder Ammoniumcarbonat (Hirschhornsalz). Es kann auch die aus alien entwickelte Kohlensäure durch Maschinen, welchen ausserdem die Bereitung des Teiges obliegt, in das zum Backen verwendete Wasser damit in den Teig eingepresst werden (DAUGLICH's Verfahren).

Gewöhnlich benützt man Hefe oder Sauerteig, erstere in Form der Hefe (s. S. 31), mit zahlreichen Bakterien verunreinigt. Der Sauerteig stellt sich auch unreinere, oft vorwiegend aus Spaltpilzen bestehende Hefe dar, die zum Backtermin zum anderen aufbewahrt wird. Beide werden in folgender Weise verwendet: 100 Theile Mehl werden mit 80 Theilen Wasser von 42° angewendet, so dass der Teig eine Temperatur von 33° zeigt. Es kommt dann erst ein in den Getreidekörnern enthaltenes diastatisches Ferment zur Wirkung, welches die Stärke theilweise in Dextrin und Maltose überführt. Durch die Wirkung der Hefe resp. des Sauerteiges wird nun die Maltose in Gährung verarbeitet, es entsteht reichlich Kohlensäure, daneben Alkohol und verschiedene andere Produkte. Vorzugsweise scheint bei dieser Gährung die Hefe theilhaftig zu sein; von Spaltpilzen namentlich der durch starke CO₂-Bildung ausgezeichneten Coli-Gruppe gehörige *Bac. levans*. Nebenbei entsteht, am reichlichsten beim Sauerteig, Essigsäure und Milchsäure. — In 2—12 Stunden ist der Teig aufgegangen; er wird dann bei 200—270° 30—80 Minuten lang gebacken.

Beim Backen des Brotes verdunstet ein Theil des zugefügten Wassers, so dass aus 100 Theilen Mehl 120—135 Theile Brot hervorkommen. Ferner geht durch die Gährung 1—2 Procent der festen Substanz verloren. Die Fermente werden durch die Backhitze vollständig im Innern des Brotes getödtet bezw. unwirksam gemacht. Die Hefe und die Eiweisskörper sind nach dem Backen wesentlich verändert, erstere zum Theil in Kleister, theils in Dextrin und Gummi umgewandelt; das Pflanzenalbumin und der Kleber ist in den geronnenen Zustand übergeführt. Dabei bildet das Brot eine pollockere Masse, die sehr leicht von den Verdauungssäften durchgelöst wird.

In Folge von mangelhaftem Durchhitzen oder zu reichlichem Wasserzusatz bleiben schluffige Stellen zurück mit abnormem Wasser und ungeronnenem Protein. — Beim Liegen wird das Brot hart. Diese Aenderung ist nicht etwa durch Wasserverlust bedingt. Denn wenn man solches Brot auf 70° erwärmt, wird es wieder frischem Brot ähnlich. Wahrscheinlich giebt beim Anwärmen noch wasserhaltig gebliebene Kleber einen Theil des Wassers an die umher ausgetrockneten und hart gewordenen Stärkekörner ab. Lagert das Brot längere Zeit und sinkt der Wassergehalt unter 30 Procent,

dann gelingt es nicht mehr, dasselbe durch Erwärmen wieder frisch backen zu machen.

Die verschiedenen Brotsorten zeigen folgende Zusammensetzung

	Wasser	Eiweiss	Kohleydrate
Feines Weizenbrot	35.5	7.1	56.6
Grobes Weizenbrot	40.5	6.2	51.1
Semmel (mit Milch bereitet) . . .	28.6	9.0	59.5
Roggenbrot	42.3	6.1	49.3
Commisbrot	36.8	7.5	52.4
Pumpernickel	43.4	7.6	45.0

Das mit Milch bereitete Weizenbrot zeigt den höchsten Gehalt an verdaulichem Eiweiss. Das Eiweiss des aus groben Mehlsorten resp. aus dem ganzen Korn bereiteten Brotes ist, wie oben erwähnt nur zum Theil ausnuttbar. Vom Eiweiss des Weizenbrotes werden ca 80 Procent resorbirt, von dem des Pumpernickels nur 55—60 Procent. Die Kohleydrate des Weizenbrotes werden zu 98 Procent, die der gröberen Sorten zu 90 Procent resorbirt.

Die dunklere Farbe des mit Sauerteig bereiteten Brotes rührt von einer Einwirkung der Säuren (Milch- und Essigsäure) auf den Kleber her.

Für das Commisbrot der deutschen Soldaten bestehen folgende Vorschriften: Das Mehl soll durch Siebe, welche auf 1 qcm 17—18 Fäden zeigen, von gröberen Bestandtheilen befreit sein. 100 kg Mehl von ganzem Korn verlieren dadurch 15 kg Kleie. Das Brot soll gleichmässig aufgegangen, gut und locker und von angenehmem Geruch und Geschmack sein. Der Wassergehalt darf nicht mehr als 40 Procent betragen; der Gewichtsverlust eines Brotes von 3 kg soll am 1. und 2. Tage 34 g, am 3. Tage 56 g, nach längerer Zeit 72 g betragen. Die maximale tägliche Brotration ist auf 750 g zu bemessen.

Billige Brot-Surrogate (z. B. durch Zusatz von Maismehl) sind, auch wenn ihre gute Ausnuttbarkeit und Bekömmlichkeit nachgewiesen wird, praktisch meist ohne Bedeutung, weil ihr Geschmack weiteren Kreisen des Publikums nicht zusagt. — Aehnliches gilt von dem neuerdings viel empfohlenen Aleuronat-Brot. Unter der Bezeichnung „Aleuronat“ bringt die Stärkefabrik von HUNDHAUSEN in Hamm ein besonders präparirtes Mehl aus Weizenkleber in Handel, das sehr billig ist, da der Kleber als Abfallproduct bei der Stärkefabrikation gewonnen wird und früher unverwerthet blieb. Werden ein Theil Aleuronat und 3 Theile Weizenmehl verbacken, so erhält man ein eiweisereiches Brot mit ca. 19 Procent gut ausnuttbarem Eiweiss. Dabei ist das Aleuronat falls der Preis gleich niedrig bleibt, einer der billigsten Eiweissträger, der für 1 Mark ca. 800 g Eiweiss liefert. Die Einführung dieses Präparats bietet demnach für die ärmere Bevölkerung grosse Vortheile; aber es wird schwierig sein das Misstrauen derselben gegenüber der Aenderung der gewohnten Geschmacksreize zu besiegen.

Anomalien und Fälschungen des Mehls und des Brotes. In Betracht kommen vorzugsweise

a) Parasiten des Getreides: *Claviceps purpurea*, der Mutterkornpilz.

Siedelt sich in den Blüten von Roggen, Gerste und Weizen an und bildet zunächst ein Conidien tragendes Mycel, das sich allmählich in ein schwarzes, 3 cm langes und hornartig aus der Aehre hervorragendes Sklerotium umwandelt. Dieses Sklerotium keimt im Frühjahr auf feuchtem Boden und entwickelt kleine gestielte, rothe Köpfchen, an deren Oberfläche Perithezien mit Sporen eingesenkt sind.

Das Sklerotium (*secale cornutum* genannt) gelangt leicht mit in's Korn und in Mehl und Brot. Der anhaltende Genuss solchen Brotes ruft die Kriebelkrankheit oder den Ergotismus hervorgerufen, der auf einer Intoxication durch die im Mutterkorn enthaltenen Gifte, Cornutin und Sphacelinsäure, beruht. Entweder treten nervöse Erscheinungen, Digestionsbeschwerden, Gefühl von Kriebeln und Anfänge von Anästhesie in Fingern und Zehen, auch wohl Contracturen, Lähmungen, sensorielle Störungen in den Vordergrund, oder aber es werden die Zehen und Hände, seltener die Finger von trockener Gangrän befallen.

Nachweis des Mutterkorns. Die Farbe des Mehls ist grauer als gewöhnlich, oft zeigt es violette Flecke. Beim Versetzen mit Kalilauge und Erwärmen tritt der Geruch nach Trimethylamin auf in Folge einer Zersetzung des im Mutterkorn enthaltenen Chinolin. — Ferner ist im Mutterkorn ein Farbstoff enthalten, der in saurem Alkohol oder Aether löslich ist. 10 g Mehl werden mit 15 g Aether und 20 Tropfen verdünnter Schwefelsäure geschüttelt, nach der halben Stunde filtrirt, dann mit einigen Tropfen gesättigter Lösung von Natriumbicarbonat versetzt, welche allen Farbstoff aufnimmt. Eventuell kann noch die Prüfung im Spektralapparat erfolgen.

Brandpilze, *Ustilago carbo*, *Tilletia caries* u. s. w. lassen an Stelle der Getreidekörner schwarze klebrige und staubige Massen von Sporen austreten, die sich dem Mehl beimengen können; für Menschen ungefährlich; bei Hausthieren, welche die Körner in rohem Zustande aufnehmen, können sie Gesundheitsstörungen bewirken zu können.

Wahrscheinlich durch Parasiten des Mais oder durch verdorbenen Mais bedingt ist ferner die Pellagra.

Seit dem vorigen Jahrhundert ist diese Krankheit in Italien, Spanien, dem südlichen Frankreich, Rumänien u. s. w. endemisch. Dieselbe ist dadurch charakterisirt, dass im Frühjahr eine Art Erythem auftritt und daneben eine Reihe von leichten nervösen Erscheinungen. Zum Herbst bessert sich der Zustand; im nächsten Frühjahr aber recidivirt die Hautaffektion und die nervösen Symptome werden schwerer, es bilden sich Sehstörungen, Paresen, Krämpfe, Hyper- und Anästhesien, oft auch psychische Störungen aus; daneben bestehen häufig schwere Verdauungsstörungen. Die Krankheit zieht sich mit steter Milderung der Symptome durch mehrere Jahre hin und endet gewöhnlich tödtlich. In Italien werden zur Zeit über 100 000 mit Pellagra Behaftete gezählt. —

Allgemein wird die Krankheit auf den Genuss von Mais und auf ein damit aufgenommenes Gift zurückgeführt; ob aber Parasiten des Getreides (Brandpilze? Schimmelpilze?) das Gift liefern oder ob dieses erst in schlecht aufbewahrtem Mehl durch Saprophyten entsteht, ist noch unaufgeklärt.

β) Von Unkrautsamen sind Tausendkorn und Kornrade bedenklich, weil sie Intoxicationerscheinungen, namentlich narkotische Symptome hervorrufen können. Wachtelweizen und Rhinanthus-Arten sind ungiftig, bewirken aber grünblaue Färbung des Brotes. Der Farbstoff ist mit saurem Alkohol extrahierbar; im Uebrigen sind die Unkrautsamen durch mikroskopische Untersuchung zu erkennen.

γ) Bei unzuweckmässiger, feuchter Aufbewahrung der Körner und des Mehls können erstere keimen, letzteres faulen. Der Kleber geht dann durch Fermentwirkung in eine lösliche Modification über und das Mehl ist nicht mehr backfähig. — Schlechte Aufbewahrung des Brotes führt zur Verschimmelung oder zur Entwicklung von Bakterien, gelegentlich z. B. des *Bacillus prodigiosus*.




Fig. 92. Stärkeköerner. 350:1. a Weizen. b Roggen. c Gerste. d Hafer. e Reis. f Kartoffel.

δ) Zusätze. Das Mehl wird zuweilen mit Gyps oder Schwerspath versetzt; ferner mit Alaun und Kupfersulfat zur Aufbesserung der Farbe und zum Einteigen eines feucht aufbewahrten, nicht mehr bindenden Mehles. Die ersteren werden durch Schütteln des Mehls mit Chloroform und Wasser als Absatz auf dem Boden des Glases erkannt; Alaun und Kupfersulfat durch die Aschenanalyse. — Weit häufiger kommt eine Beimengung des billigeren Kartoffelmehls zu Weizen- oder Roggenmehl vor, nachweisbar durch das sehr charakteristische mikroskopische Bild der Stärkekörner (s. Fig. 92).

e) Blei- und Zinkvergiftungen mittelst Brot sind zuweilen dadurch vorgekommen, dass Fehlstellen der Mühlsteine mit Blei ausgegossen waren; oder dass zum Heizen des Backofens ein mit Bleiweiss gestrichenes, resp. mit Zinkvitriol imprägnirtes Holz (Bahnschwellen) benutzt war.

7) Verbreitete Gastricismen sind neuerdings beobachtet in Folge des Genusses von Brot (Milch- und Franzbrötchen), das sog. Brotöl enthielt. Um das Ankleben zu hindern, werden die Backbleche und die einzelnen Brote mit Butter, Schmalz, Margarine oder dergl. bestrichen. Jetzt wird dazu ein billigeres „Mineralöl“ empfohlen, das aus den bei 300° nicht flüchtigen Petroleum-Rückständen bereitet ist. Schon 1 g desselben ruft Brechen, Durchfall, Gliederschmerzen u. s. w. hervor. Die Verwendung verräth sich meist durch Geruch der Brote nach Petroleum (DUNBAR).

Conditorwaaren rufen nicht selten durch giftige Farben Gesundheitsstörungen hervor. Giftig resp. ungiftig sind folgende Farben:

Gelb. Giftig: Chromgelb (Blei, Chrom); Ultramarinegelb (Barium, Chrom); Kasseler Gelb (Blei); Neapelgelb (Blei, Antimon); Auripigment (Arsen); Pikrinsäure; Gummigutt. — Ungiftig: Safran, Safflor; Curcuma; Ringelblumen; Gelbbeeren.

Grün. Giftig: Schweinfurter-, Neuwieder-, Bremer-, Wienergrün, SCHNELE'S Grün (enthalten sämmtlich Arsen, Kupfer u. s. w.) — Ungiftig: Mischungen von Blau und Gelb; Spinatsaft.

Braun. Giftig: Sepia, Terrasiena (zuw. Arsen). — Ungiftig: Gebrannter Zucker; Lakritzensaft.

Roth. Giftig: Zinnober (Quecksilber); Chromroth (Quecksilber und Chrom); Mennige (Blei); Anilinfarben. — Ungiftig: Cochenille; Carmin; Krapproth; Saft von rothen Rüben und Kirschen.

Blau. Giftig: Bergblau (Kupfer); Thenardblau (Arsen); Smalte (Arsen). — Ungiftig: Indigolösung; Lakmus; Saftblau.

Weiss. Giftig: Bleiweiss; Zinkweiss. — Ungiftig: Feinste Mehle Stärke.

Schwarz. Giftig: Spiesglanz (Antimon). — Ungiftig: Chinesische Tusche.

b) Leguminosen.

Dieselben sind ausgezeichnet durch reichlichen Eiweissgehalt; jedoch fehlt ihnen der Kleber, und deshalb ist eine Brotbereitung nicht möglich, sondern sie sind nur mit sehr viel Wasser entweder in Suppenform mit 90 Procent Wasser, oder in Breiform mit 70—75 Procent Wasser geniessbar. In Folge dessen können die Leguminosen niemals in grosser Menge und dauernd aufgenommen werden. — Ferner kommt in Betracht die schlechte Ausnutzung (das Eiweiss zu 50—70 Procent), welche um so ungünstiger wird, je grösser das genossene Quantum ist. Die übertriebene Empfehlung der Leguminosen als Volksnahrungsmittel berücksichtigt daher viel zu einseitig die Ergebnisse der chemischen Analyse. — Die präparirten Mehle aus Leguminosen sind besser ausnutzbar (Eiweiss zu 85 Procent) und leichter verdaulich.

c) Kartoffeln.

Auf Grund ihres geringen Eiweissgehaltes sind die Kartoffeln vielfach angegriffen und als Nahrungsmittel in Misskredit gebracht, jedoch

mit Unrecht. Man betonte eben früher zu sehr den Werth der Eiweissstoffe für die Ernährung, während Fett und Kohlehydrate gerade so gut nothwendige Nährstoffe sind. Zur Lieferung von Kohlehydraten und Calorien sind die Kartoffeln vorzüglich geeignet; der Körper setzt sich sogar bei Kartoffelnahrung mit geringerer Eiweisszufuhr in's Gleichgewicht als z. B. bei Brotnahrung. Wollte man den Werth der Kartoffeln allein nach der Eiweisslieferung beurtheilen, so wäre das nicht anders, als wenn man den Werth des Fleisches nach den in demselben vorhandenen Kohlehydraten beurtheilen wollte. — Die Ausnutzung der Eiweissstoffe beziffert sich auf 70, die der Kohlehydrate auf über 90 Procent. Die Kartoffeln sind mit Recht ein so beliebtes Volksnahrungsmittel, weil sie sehr gute, selbst bei häufigerer Wiederholung keinen Widerwillen erregende Geschmacksreize bieten, sehr vielfache Verwendungsarten gestatten und ausserdem die Kohlehydrate für verhältnissmässig sehr billigen Preis liefern (s. S. 256). Es ist daher durchaus rationell, wenn man den Nahrungsbedarf neben dem nöthigen Eiweiss (namentlich neben einem gewissen Quantum animalischer Nahrung) wesentlich mit Kartoffeln deckt. Nur bei einem Fehlen sonstiger Eiweisszufuhr und ausschliesslicher Kartoffelnahrung treten Ernährungsstörungen auf.

Beim Aufbewahren der Kartoffeln ist darauf zu achten, dass sie nicht erfrieren und nicht keimen. Erfrorene Kartoffeln faulen leicht und haben stässlichen Geschmack. In gekeimten Kartoffeln entsteht das giftige Solanin; und zwar nach neueren Untersuchungen durch bestimmte Bakterien, die in den grauen und schwärzlichen Stellen gekeimter und verdorbener Kartoffeln sich reichlich vorfinden.

d) Die übrigen Gemüse

sind uns werthvoll durch ihre Geschmacksreize; ausserdem führen sie dem Körper grössere Mengen Salze zu, die grünen Gemüse insbesondere Eisen. Sie verdienen deshalb volle Berücksichtigung in der Kost, wenn auch ihr sonstiger Nährwerth durchweg unbedeutend ist. — Auch die Pilze enthalten im frischen Zustand nur 2—3 Procent Eiweiss, das überdies schlecht ausgenützt wird und sind also ähnlich wie die übrigen Vegetabilien zu beurtheilen. — Die Früchte zeichnen sich aus durch ihren Gehalt an löslichen Kohlehydraten und Fruchtsäuren; sie enthalten mit Ausnahme der Nüsse wenig Eiweiss, dagegen viel Wasser, so dass sie gleichsam den Uebergang zu den Getränken bilden.

Anomalien der Gemüse. Zu beachten ist, dass Parasiten und Infektionserreger an den Gemüsen haften können; an Salat, Kohl, Radieschen u. s. w. Bandwurmeier; an denselben Waaren und

ausserdem an Kartoffeln, Rüben, Wurzeln, Erdbeeren infektiöse Pilze aus dem gedüngten Boden. — Ferner ist durch Erkrankung der Verkäufer (Grünkramkeller) die Uebertragung von Contagien auf vegetabilische Nahrungsmittel möglich; ebenso durch Besprengen mit verdächtigem Wasser (Rinnsteinwasser). Es ist daher beim Rohgenuss der Gemüse und Früchte eine gewisse Vorsicht indicirt. Dieselben sind sorgfältig zu reinigen, ebenso die dabei benutzten Tische, Tücher und Utensilien der Küche; auch die Vegetabilien sollten so viel als möglich nur gekocht genossen werden.

Auf die Charakteristik der giftigen und der ungiftigen Pilze kann hier nicht eingegangen werden. Manche Pilze, wie z. B. die Morchel, verlieren ihre Giftigkeit, wenn man die getrockneten Pilze abbrüht und das Brühwasser weggiesst.

Die durch Kochen conservirten Gemüse sind vielfach kupferhaltig; sie verlieren ohne Kupferzusatz beim Kochen die frische Farbe; diese bleibt aber, wenn während des Kochens etwas Kupfersulfat zugefügt wird, pro kg etwa 30 bis 40 mg (Reverdissage). Um Vergiftungen herbeizuführen, ist die Menge des Kupfers kaum jemals bedeutend genug. — Die neuerdings vielfach in Handel gekommenen durch Trocknen conservirten Gemüse büssen das Aroma ein und haben meist einen heuartigen Geschmack.

Als besonders leicht verdauliche Vegetabilien für Kranke und Reconvalescenten sind zu empfehlen: Präparirtes Gersten- und Hafermehl, in welchem schon ein Theil der Stärke aufgeschlossen ist. Daraus sind Suppen zu bereiten, für welche höchstens 10 Theile Mehl auf 100 Theile Wasser verwendet werden. Man muss dieselben mindestens $\frac{1}{2}$ Stunde kochen lassen, um alle Stärke vollständig zu lösen. Die Suppe enthält dann im Mittel 1.5 Procent Eiweiss und 10 Procent Kohlehydrate; in einer Tasse also etwa 20—25 g Kohlehydrate. — Sollen die Kohlehydrate vermehrt werden, ohne die flüssige Consistenz zu verändern, so ist beispielsweise Malzextrakt zuzufügen (aus gekeimter Gerste extrahirt). Derselbe enthält etwa 30 Procent Wasser, 6—8 Procent Eiweiss, 30 Procent Dextrin und 30 Procent Zucker. Fügt man 2 Esslöffel davon einer Tasse Suppe hinzu, so vermehrt man den Kohlehydratgehalt um etwa 20 g.

Sobald als möglich sollte, falls grössere Mengen Kohlehydrate zu reichen sind, zu breiartigen oder festen Speisen übergegangen werden. Brei von Kartoffeln enthält in einer Tasse etwa 50—60 g Kohlehydrate, ebensoviel Reisbrei mit Bouillon oder Milch bereitet. Semmel, Zwieback, eventuell in Suppen eingeweicht, liefern weit erheblichere Mengen Kohlehydrate als grosse Volumina flüssiger Nahrung.

6. Genussmittel.

a) Alkoholische Getränke.

α) Bier. Durch Hefegährung ohne Destillation aus Gerste, Hopfen und Wasser hergestelltes Getränk, das sich im Stadium der Nachgährung befindet.

Das Malz wird erhalten, indem Gerste 2—3 Tage eingeweicht und in dichten Haufen bei niedriger Temperatur dem Keimen unterworfen wird, wobei sich reichliche Mengen Diastase bilden. In 6—13 Tagen hat der Keim etwa $\frac{1}{4}$ der Länge des Korns; dann wird durch Trocknen an der Luftmalz, durch Trocknen auf der Darre bei 40—80° das Darrmalz hergestellt. Aus dem geschroteten Malz wird durch Behandeln mit Würze gewonnen (durch Infusion oder Decoction). Die Diastase bewirkt die Umwandlung der ganzen Stärke in Zucker (Maltose) und Dextrin. — Dann wird die Würze von den unlöslichen Bestandtheilen abgeseiht und abgekocht unter Zusatz von Hopfen gekocht.

Der Hopfen besteht aus den weiblichen unbefruchteten Blüthen von *Humulus lupulus*. Unter den dachziegelförmig übereinanderliegenden Dolden finden sich kleine goldgelbe klebrige Kügelchen — Hopfenharz. Diese enthalten Hopfenharz (50—80 Procent), Hopfenbittersäure, als Konservierungsmittel wichtig, und Hopfenöl, das den feinen Hopfengeruch verleiht. Ausserdem enthält der Hopfen noch Hopfengerbsäure.

Beim Kochen der Würze wird diese concentrirt, das Eiweiss unter Beihülfe der Hopfengerbsäure — abgeschieden, die Diastase wird mit Lupulin gelöst.

Dann wird abgeseiht und im Kühlschiff rasch gekühlt; bei zu langsamer Kühlung erfolgt leicht Milchsäurebildung. Für obergähriges Bier wird die Würze auf 12—18°, für untergähriges auf 8—8° gekühlt. Dann wird die Gährbottiche gefüllt und auf 100 Liter $\frac{1}{2}$ Liter Hefe (jetzt meist reine Gärhefenrassen, vergl. S. 31) zugesetzt. Nach 4—12 Tagen wird auf Lagerung gefüllt und dort bei einer Temperatur unter 5° eine schwache Nachgährung unterhalten. Zur Klärung werden eventuell Buchenholzspähne, Kochsalz, oder auch Tannin oder Hausenblase zugesetzt.

Für Bock- und Exportbier werden gehaltreichere Würzen als für das gewöhnliche Schenkbiere verwendet. — Bei 40° gedarrtes Malz giebt die Biere; hoch gedarrtes oder geröstetes Malz die dunklen.

Das Bier enthält: Wasser, CO_2 ; Alkohol; dann die Stoffe, die in den genannten Extractes, Reste von Maltose und Dextrin, Pepton, Casein, Milch-, Essig-, Bernsteinsäure, harzige und bittere Stoffe aus dem Hopfen; ferner Salze (besonders phosphorsaures Alkali).

Je nach der Concentration der Würze, der Beschaffenheit des Malzes, der Anwendung der Infusion oder Decoction und dem Verlauf der Gährung finden sich starke Variationen der Zusammensetzung.

Zusammensetzung einiger bekannterer Biere:

	Spec. Gew.	Alkohol	Extrakt	CO ₂	Eiweiss	Zucker	Asche
Münchener Spaten	1.0207	3.23	6.61	—	—	—	—
Pilsener	1.0129	3.55	5.15	0.14	0.87	—	0.19
Bockbier	1.0213	4.74	7.20	0.22	0.62	1.25	0.26

Trotzdem sind bestimmte Anforderungen formulirt: Normales Bier soll glanzhell, vollmundig, gut moussirend sein. Der Alkoholgehalt soll 2.5—4.5 Procent, der Extract mindestens 4 Procent ausmachen; auf 1 Theil Alkohol sollen 1.2—1.6 Theile Extract kommen, am besten 1.6—1.8; Glycerin soll höchstens zu 0.5 Procent vorhanden sein.

Das Bier ist vorzugsweise Genussmittel; nur bei Aufnahme grosser Quantitäten kommt ein Nährwerth in Betracht, indem es dann einen nicht unerheblichen Theil des Bedarfs an Kohlehydraten deckt. — Die Ausnutzung der Nährstoffe ist zweifellos eine fast vollständige. Die Magenverdauung wird durch Bier etwas verlangsamt.

Der Consum beträgt pro Kopf und Jahr in Deutschland 90, in England 122, in Bayern 220, in München 566 Liter.

Anomalien und Fälschungen. Im Bier liegt ein künstliches Präparat vor, das auch bei normaler Beschaffenheit in dem Alkohol und in den zur Unterhaltung der Nachgährung nothwendigen Mikroorganismen differente, nicht unbedenkliche Bestandtheile enthält. Schlechtes Bekommen ist daher bei empfindlichen Individuen leicht möglich, selbst wenn das Bier vollkommen gut ist. Ausserdem aber kann sehr leicht der Brauprocess etwas abnorm verlaufen, ohne dass darum eine Fälschung vorliegt und solches Bier kann bei vielen Menschen Störungen hervorrufen. So z. B. führt ein etwas höherer Gehalt an Hopfenharz, der sich namentlich im Jungbier findet, zu heftiger und schmerzhafter Reizung der Blase; Bestreuen des Bieres mit etwas gepulverter Muskatnuss schützt erfahrungsgemäss gegen diese Affection.

Im Allgemeinen ist daher ein gewisses Risiko mit dem Genuss dieses Präparates immer verbunden. Zweifellos führen aber Anomalien und Fälschungen des Bieres viel leichter zu Störungen der Gesundheit wie normales Bier, und erfordern daher auch vom hygienischen Standpunkt eine gewisse Berücksichtigung.

Folgende billigere Surrogate werden verwendet:

Stärke oder Stärkezucker statt des Malzes.

Pikrinsäure, Enzian, Wermuth, Colchizin, Quassia etc. anstatt des Hopfens.

Glycerin zur künstlichen Herstellung der Vollmundigkeit des Bieres.

Alaun oder Schwefelsäure zur künstlichen Klärung trüben Bieres.

Alle diese Surrogate sind theils giftig, theils täuschen sie für schlechte und nicht haltbare Präparate eine gute Beschaffenheit vor.

Bei schlechter Aufbewahrung entstehen ferner abnorme Gärungen (hefetrübe Biere), die zu Verdauungsstörungen Anlass geben.

Sauer gewordenes Bier wird wohl mit kohlensaurem Alkali versetzt, um das äussere Symptom des sauren Geschmacks zu corrigiren.

Ferner wird schlecht haltbarem Bier saurer schwefligsaurer Kalk resp. Salicylsäure zugesetzt. Beide wirken in den in Frage kommenden Dosen nicht schädlich, verdecken aber die Minderwerthigkeit des Präparates, ohne dass der Entwicklung schädigender Mikroorganismen entsprechend vorgebeugt wird.

Versandbiere werden durch Pasteurisiren haltbar gemacht. — Dunkle Biere sind oft mit Zuckercouleur gefärbt, in manchen Gegenden mit Wissen und Willen des Publikums.

Nachweis der Anomalien des Bieres. Die normale Beschaffenheit des Bieres wird vor allem durch Bestimmung des specifischen Gewichts, der Alkohol- und der Extractmengen ermittelt. — Das specifische Gewicht des durch Schütteln im offenen Kölbchen von der CO_2 befreiten Bieres wird im Pyknometer oder mit der WESTPHAL'schen Waage bestimmt. Der Alkohol durch Destillation von 75 ccm mit Alkali neutralisirten Bieres, bis 50 ccm abdestillirt sind, die direct in's Pyknometer einfliessen; durch Wägung in letzterem erhält man die Gewichtsprocente Alkohol mit Hülfe von Tabellen. — Zur Extractbestimmung werden 5 g Bier in einer Trockenente im Oelbad 3 Stunden auf 85° im trockenen Luftstrom erwärmt, dann 4 Stunden über SO_2 getrocknet. — Oder indirect nach BALLING: 100 ccm Bier werden auf dem Wasserbad zur Hälfte eingedampft zur Verjagung des Alkohols, dann mit Wasser aufgefüllt und wieder das specifische Gewicht bestimmt.

Die einzelnen Bestandtheile des Extracts, namentlich das Glycerin, sind nur schwierig zu ermitteln. Am einfachsten ist noch die Phosphorsäurebestimmung, die durch directe Titrirung mit Uranlösung, wie im Harn, geschehen kann und oft Aufschluss über Verwendung von Malzsurogaten giebt. — Der Säuregrad des Bieres wird durch Titiren mit $\frac{1}{10}$ Normal-Natronlange bestimmt, nachdem die CO_2 durch Erwärmen entfernt ist.

Stärkezucker ist nachweisbar mit Hülfe der Dialyse des Bieres durch Pergament; das Dextrin bleibt zurück, das Amylin, die unvergärbaren, rechtsdrehenden Bestandtheile des Stärkezuckers gehen durch; es wird dann mit Hefe vergohren und im Polarisationsapparat geprüft.

Zum Nachweis der Pikrinsäure wird das eingedampfte Bier mit Alkohol, dann mit Aether extrahirt, die ätherische Lösung verdampft und mit Cynkalium resp. Zucker auf Pikrinsäure geprüft. — Die übrigen Hopfensurrogate sind nur durch complicirtes Verfahren nachweisbar.

Salicylsäure wird durch Ausschütteln des Bieres mit Aether, Verdampfen und Prüfen mit Eisenchlorid erkannt.

Das Ausschänken des Bieres geschieht vielfach mittelst der Bierdruckapparate. Dieselben benutzen entweder Luft zur Pression; indess wird das Bier rasch schaal und die Entnahmestelle für die Luft ist oft nicht einwandfrei. Besser ist die jetzt verbreitete Sitte, Cylinder mit comprimirter Kohlensäure zu benutzen, die unter Einschaltung von

uck-Regulatoren durch Zinnrohre und Schläuche mit dem Fass in Verbindung stehen, so dass durch den Druck der CO_2 auf die Oberfläche des Bieres letzteres zum Schanktisch aufsteigt. Die Apparate und nmtliche Verbindungen an denselben müssen peinlich sauber gehalten werden und überall der Reinigung zugänglich sein; die Rohre len aus bleifreiem Zinn hergestellt sein.

β) Wein. Ueberreife Trauben werden entleert, gequetscht; der Rest bleibt einige Tage mit Hülzen und Kernen in Berührung, um namentlich die Bouquetstoffe aufzunehmen. Der Weisswein wird dann durch Treten oder Maschinen ausgepresst; beim Rothwein wird erst nach der Gährung gepresst, weil nur der gesäuerte Alkohol den rothen Farbstoff löst. — Den Most lässt man ohne besonderen Hefezusatz bei offenem Luftzutritt gähren. Nach 10—30 Tagen folgt auf Lagerfässern 3—6 Monate dauernde Nachgährung. — Das Klären geschieht im Weisswein durch Hausenblase, beim Rothwein durch Eiweiss (Albumen), Blut, Gelatine) oder Kaolin.

Der fertige Wein enthält folgende Bestandtheile (s. Tabelle): Alkohol 9—12 Procent; Extract ca. 2.0 Procent; Zucker 0.1—0.8 Procent; Farb- und Gerbstoff bis 0.2 Procent; Asche 0.2 Procent; Wasser — 88 Procent; specifisches Gewicht 0.99—0.997. — Ferner Essigsäure, Bernsteinsäure, Aepfelsäure (auch frei), Weinsäure (gebunden); Gerbstoff; Oenanthäther (Caprin- und Caprylsäureester), Aldehyd. Der Wein ist demnach kein Nahrungsmittel, sondern lediglich Reiz- und Genussmittel.

Mittlere Zusammensetzung einiger Weinsorten:

	Spec. Gew.	Alkohol	Säure (als Weins.)	Zucker	Ex- trakt	Farb-u. Gerbstoff	Asche
Reinwein . . .	0.9977	12.1	0.608	0.204	1.885	—	0.203
Frankenwein . .	0.9958	11.5	0.455	0.378	2.299	—	0.169
Rein Wein . .	0.9956	11.6	0.534	0.522	2.390	—	0.162
Rein Rothwein	0.9947	9.4	0.589	0.616	2.341	0.616	0.217
Reinwein . . .	1.0045	16.4	0.47	3.99	6.17	0.17	0.29
Reinpagner . .	1.04	9.2	0.58	10.7	11.20	0.06	0.14

Anomalien und Fälschungen. Manche Zusätze geschehen in Absicht, ein besseres und bekömmlicheres Präparat herzustellen und sich vom hygienischen Standpunkt nicht zu beanstanden. So

a) Das Chaptalisiren. Zu saurer Most wird mit Marmorstaub neutralisiert und vor der Gährung mit Zucker versetzt. Geschieht namentlich bei Burdenweinen.

b) Gallisiren. Herstellung eines Normalmosts mit 24 Procent Z 0.6 Procent Säure und 75.4 Procent Wasser durch Zusatz von Wasser Zucker. Eventuell durch den geringeren Gehalt an Aschenbestandtheilen weisbar. Bei reinem Material nicht zu beanstanden.

c) Pétiotisiren. Sehr verbreitet, seit die Phylloxera ihre Verheer angerichtet hat. Die Trester (Schalen und Kerne) werden wiederhol Zuckerwasser vergohren. Es entstehen bouquetreiche Weine mit wenig feurig und schön von Farbe; der zu geringe Gerbstoffgehalt wird durch T Zusatz corrigirt. Sehr haltbar. — Oft durch die Analyse nicht von Wein zu unterscheiden, sobald reines Material genommen wird.

Häufig erfolgt Gypszusatz zum Most; dadurch wird Wasser ent die Klärung befördert, die Farbe verbessert, die Haltbarkeit erhöht. Die säure wird allerdings theilweise ausgefällt und dafür saures Kaliumsulf den Wein gebracht. Bei weniger als 2 g Kaliumsulfat pro 1 Liter (bei Wein 1 g) ist indess eine nachtheilige Wirkung irgend welcher Art nicht beobachtet.

Ferner wird oft durch Pasteurisiren conservirt. — Zuweilen Scheelisisiren angewendet, d. h. Zusatz von 1—3 Procent Glycerin, um Wein mehr Körper zu geben und ihn den gelagerten Weinen ähnlich machen. — Oft werden fremde Farbstoffe, namentlich beim Pétiot zugesetzt (Malven, Heidelbeeren, Fuchsin u. s. w.), nicht selten auch künst Weinbouquet oder Alkohol (Vinage).

Bei der hygienischen Beurtheilung aller dieser Fälsch kommen ähnliche Gesichtspunkte in Betracht, wie bei der Beurthe der Anomalien des Bieres. Für empfindliche Individuen ist schon Genuss normalen Weins leicht mit Gesundheitsstörungen verkn abnorme Präparate, namentlich mit schlechtem Stärkezucker gebesserte oder mit künstlichem Bouquet versehene, wirken bereits in ungleich kleinerer Quantität schädlich und sind deshalb beanstanden.

Die Untersuchung des Weins erfolgt ähnlich wie beim Bier Bestimmung des specifischen Gewichts, des Alkohol- und Extractgehaltes freie Säure kann mit Normalalkalilösung titirt werden.

Nachweis einiger Fälschungen. Stärkezuckerzusatz ist durch Polarisationsapparat zu erkennen. Reine Weine drehen die Polarisation gar nicht oder in Folge vorhandener Lävulose etwas nach links. Im S zucker sind dagegen unvergärbare rechtsdrehende Stoffe (Amylin) und behandelte Weine zeigen daher starke Rechtsdrehung.

Gypszusatz wird erkannt durch die Bestimmung der Schwefel Die Asche stark gegypster Weine zeigt keine oder sehr schwache Alkale

Um fremde Farbstoffe aufzufinden, kann man einige Tropfen Weins auf ein Stück gebrannten fetten Kalks fallen lassen; bei reinem entstehen dunkel-gelbbraune Flecken, bei gefärbtem röthliche oder v Nüancen. Oder man setzt dem Wein eine Mischung von gleichem Volu sättigter Alaun- und 15procentiger Natriumacetatlösung zu; bei grö Mengen von Heidelbeer- oder Malvenfarbstoff tritt blauviolette Färbun

esslke's Probe). Auch beim Versetzen mit Kalk gesättigter Brechweinsteinung treten Farbenunterschiede hervor. — Genauer Nachweis kleinerer Beimengungen erfordert complicirte Methoden.

γ) Branntwein. Aus verschiedenstem zuckerhaltigem Material, oder auch aus stärke- und cellulosehaltigem, nach Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure bezw. Diastase, werden durch Hefezusatz alkoholhaltige Flüssigkeiten gewonnen, die dann destillirt werden, um Flüssigkeiten von höheren Alkoholgehalt herzustellen. Hauptsächlich werden Kartoffeln benutzt, aber auch Früchte (Kirschen, Pflaumen, deren reine Bittermandelöl liefern); oder Zuckerrohrmelasse (Rum); oder Reis (Sake); oder Wein (Cognac).

Die Branntweine enthalten 35—75 Procent Alkohol; die feineren sind vielfach durch Methyl- und Aethylester der niederen Fettsäuren (Cognacaroma u. s. w.) gefälscht. Am bedenklichsten ist ihr Gehalt an Fuselöl (Gemenge von Propyl-, Amyl-, Butylalkohol und Furfurol), das im normalen Branntwein höchstens zu 1 p. m. enthalten ist und bei höherem Gehalt Uebelkeit und Kopfschmerzen erzeugt. Das Fuselöl ist leichter flüchtig als der Aethylalkohol, und gelangt daher insbesondere bei unvorsichtiger rascher Destillation in grösserer Menge in's Destillat.

Der Nachweis des Fuselöls kann entweder schon durch den Geruch erkannt werden, wenn eine Probe des Branntweins zwischen den Händen zerrieben wird; oder durch die Steighöhe des Branntweins in engen Capillarröhren mit Wassertheilung; am sichersten durch Ausschütteln mit Chloroform und Beobachtung der Volumzunahme des letzteren in besonderen Apparaten (Röse).

b) Kaffee, Thee, Cacao.

Kaffee. Die Samen der Kaffeestauden enthalten nach Entfernung der fleischigen Hülle 10 Procent Eiweiss, 15—16 Procent Fett, 5 Procent Asche, ätherisches Oel, Gerbsäure, Zucker und 1 Procent Caffein (beim). Letzteres ist ein Alkaloid (Methyl-Theobromin resp. Trimethylxanthin), welches leichte nervöse Erregung hervorruft. — Vor dem Kauen sind die Bohnen schwer zu pulvern und die Decocte haben einen stark adstringirenden Geschmack. Brennen (bei 200—250°) führt zur theilweisen Zerstörung der Holzfaser, des Zuckers und der Gerbsäure und zu einer Bildung empyreumatischer Substanzen, namentlich des Caffeols, eines Oels, das sich an der excitirenden und wahrscheinlich auch der nicht unbeträchtlichen antibakteriellen Wirkung des Kaffees theiligt.

In einer Tasse Infus aus ca. 8 g Bohnen bereitet, finden sich etwa 1 g Nährstoffe, 0.1 g Caffein, so dass also von einer nährenden Wirkung, selbst beim Genuss grosser Quantitäten nicht die Rede sein kann. Ebensowenig übt das Caffein einen sparenden Einfluss auf den

Stoffumsatz im Körper aus. — Dagegen können durch Mischung des Kaffeeinfuses mit Milch und Zucker nicht unerhebliche Nährstoffmengen eingeführt werden.

Fälschungen finden hauptsächlich statt bei schon gemahlenem Kaffee, der nur aus zuverlässigster Bezugsquelle entnommen werden sollte. Surrogate wie Cichorien, Feigen u. s. w. bieten wohl den brenzlichen Geruch und Geschmack, aber kein Coffein oder Kaffeol. Sacca- oder Sultankaffee ist aus den fleischigen Hüllen der Kaffee Frucht hergestellt und enthält nur Spuren von Coffein.

Thee. Die getrockneten Blätter des Theestrauchs enthalten mindestens 30 Procent feste Substanz, 3.0—2.0 Procent Asche, mindestens 7 Procent Gerbstoff; 0.5—2.0 Procent Coffein. Letzteres ist für die Wirkung des Thees maassgebend, die der des Kaffees sehr ähnlich ist. — Eine Tasse Infus, aus 5—6 g Thee bereitet, enthält noch etwas weniger Nährstoff und Coffein, als das eben erwähnte Kaffeeinfus.

Fälschungen mit anderen Blättern werden durch vergleichende Untersuchung der mit lauwarmem Wasser befeuchteten und auf einer Glasplatte ausgebreiteten Blätter unter Zuhilfenahme von Lupe und Mikroskop unschwer erkannt. — Schwieriger ist die sehr häufige Fälschung des Thees mit schon extrahirten und wieder getrockneten Theeblättern zu entdecken; die oben angegebenen Grenzzahlen des Gehaltes normalen Thees an verschiedenen Stoffen liefern hierfür Anhaltspunkte.

Cacao. Die von Keimen und Schalen befreiten, durch Rösten und Zusammenschmelzen präparirten, pulverisirten Cacaobohnen enthalten: 16 Procent Eiweiss, 50 Procent Fett (Cacabutter von 30—33° Schmelzpunkt), 3—4 Procent Asche, 1.5 Procent Theobromin.

Letzteres ist Dimethylxanthin, dem Coffein nahe verwandt und auch in der Wirkung demselben ähnlich. Da der übergrosse Fettgehalt belästigt, wird gewöhnlich entöhlter Cacao mit ca. 25—30 Procent Fett verwendet. Eine vollständige Entölung liegt durchaus nicht im hygienischen Interesse. — Holländischer Cacao enthält dadurch, dass die Bohnen mit Potasche, Soda oder Magnesia behandelt sind, mehr lösliche Substanzen. — Eine Tasse Cacao aus 15 g bereitet, enthält ca. 2 g Eiweiss, 4 g Fett und 4 g Kohlehydrate. Die Theobrominmengen sind so geringfügig, dass ein nervöser Einfluss fast ganz in Fortfall kommt; dagegen ist ein gewisser Nährwerth vorhanden, der jedoch meistens überschätzt wird.

Unter Chocolate versteht man eine Mischung von Cacao mit Zucker, Gewürzen, Stärke u. s. w.; sie enthält im Mittel 1.5—2.0 Procent Wasser, 9 Procent Eiweiss, 0.6 Procent Theobromin, 15 Procent Fett, 60 Procent Zucker, 3 Procent Asche. Eine Tasse aus 15 g bereitet liefert 1 g Eiweiss, 2 g Fett, 10 g Zucker.

c) Tabak.

Blätter der Nicotiana Tabacum. Die reifen Blätter werden getrocknet, in grossen Haufen einer Gährung unterworfen, bei welcher CO_2 , NH_3 , HNO_3 entsteht. Meist werden sie mit KNO_3 imprägnirt, um die Verbrennlichkeit zu erhöhen. Dann müssen die Blätter lagern;

abei erfolgt theilweise Oxydation der organischen Substanzen. Die Lagerung darf nicht zu lange dauern, da sonst auch Nicotin und ätherisches Oel verloren geht. Der wichtigste Bestandtheil ist das Nicotin $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2$, ein farbloses, sehr giftiges Oel.

Im syrischen Tabak, der stark betäubend wirkt, findet sich indessen kein Nicotin; ferner im Havannatabak weniger, als in schlechten Rauchtabaken; auch tritt in abgelagerten Cigarren starker Nicotinverlust ein. Demnach hängt die Wirkung des Tabaks nicht ausschliesslich vom Nicotiningehalt desselben ab; vielmehr sind noch präformirte, aromatische Bestandtheile und solche, welche sich während des Brennens bilden (Pyridinbasen) bei der Wirkung betheiligt.

Die Gesamtwirkung des Rauchtabaks besteht in einer leichten Erregung des Nervensystems, die bei einiger Gewöhnung je nach der Wahl des Tabaks und der Menge des Verbrauchs dem individuellen und zeitlichen Bedürfniss vortrefflich angepasst werden kann. Bei Tabakmissbrauch beobachtet man nervöse Herzschwäche, Skotome, Unempfindlichkeit für Farben u. s. w.

Im Tabaksrauch finden sich Nicotin, flüchtige Fettsäuren, Picolin- und Pyridinbasen, regelmässig Kohlenoxydgas, Kohlenwasserstoffe u. s. w. Bei empfindlichen, nicht gewöhnten Individuen vermag der Tabaksrauch zweifellos toxische Symptome, Kopfschmerzen, Reizungserscheinungen in Schlund und Magen hervorzurufen. Mit Rücksicht hierauf ist das Rauchen in allen öffentlichen, nicht ausdrücklich für Raucher bestimmten Räumen unbedingt zu verbieten.

d) Gewürze.

Ueber ihre Wirkung s. S. 236. Speciell erwähnt seien:

Der Pfeffer. In den Handel kommt schwarzer und weisser Pfeffer; ersterer ist die unreife getrocknete Beere, letzterer die reife Frucht des Pfefferstrauchs. Enthält circa 1 Procent scharfes ätherisches Oel und eine schwache organische Base, das Piperin. Der gepulverte Pfeffer ist sehr oft verfälscht und sollte nie gekauft werden. — Cayennepfeffer ist der Samen einer völlig anderen südamerikanischen Pflanze, *Capsicum baccatum*.

Senf. Aus den Senfsamen von *Sinapis nigra* und *alba* gewonnen. Die Körner werden in der Senfmühle unter Zusatz von Weinessig fein gerieben. Oft noch Zusätze von Zimmt, Nelken u. s. w.; dem englischen Senf wird Cayennepfeffer zugefügt. Im Senfsamen ist myronsaures Kalium enthalten; daneben Myrosin als Ferment; beim Anmachen des Senfmehls mit Wasser entsteht Senföl, Zucker und Kaliumsulfat. Das Senföl ($\text{C}_7\text{H}_7\text{N.C.S.}$), das zu 0.3—1.0 Procent im Senf enthalten ist, liefert den scharfen Geruch oder Geschmack. Es wirkt energisch antiseptisch, z. B. auf Milzbrandbacillen schon völlig hemmend bei einer Concentration von 1 : 33 000. — Der Senf ist sehr vielen Verfälschungen ausgesetzt, die am besten durch mikroskopische Untersuchung, resp. durch Bestimmung des S erkannt werden.

Essig. Durch Oxydationsgährung aus Branntwein, Wein, verdorbenes Bier gewonnen; enthält im Mittel 4 Procent Ac; daneben Extractstoffe. — Verfälschung hauptsächlich mit Schwefelsäure und Salzsäure.

Litteratur: S. die oben citirten Handbücher von FORSTER, KÖNIG, MUM und UFFELMANN, LEHMANN, v. LEYDEN; ferner HILGER, Vereinbarungen betref der Untersuchung und Beurtheilung von Nahrungs- und Genußmitteln, Berlin 1885. — THOMAS-GILG, l. c.

Siebentes Kapitel.

Kleidung und Hautpflege.

Die Seite 97 geschilderte Wärmeregulirung des Körpers reicht nicht aus, um denselben unter allen Verhältnissen gegen eine zu starke Wärmeabgabe zu schützen. Wir sehen daher, dass alle Menschen, nach den klimatischen Verhältnissen, unter denen sie leben, sich mit mehr oder weniger Kleidung umgeben und bei Schwankungen der Witterung durch die Kleidung zunächst eine Verminderung, dann aber auch eine Regulirung der Wärmeabgabe herbeizuführen versuchen.

In unserem Klima bedürfen wir einer sehr erheblichen Menge von Kleidung; die des Mannes wiegt im Sommer etwa 3, im Winter 7 kg, die der Frau etwas mehr. Ferner hat die wie gewöhnlich locker anliegende Kleidung im Mittel eine Schichtdicke von 8-6 mm; den weit überwiegenden Volumtheil derselben macht dann aber die zwischen den einzelnen Schichten der Kleidung eingeschlossene Luft aus.

Die Kleidung besteht zum kleinsten Theil aus dichten ungewebten Stoffen; gewöhnlich werden Stoffe benutzt, die aus vegetabilischen Fasern, oder aus Haaren von Thieren, oder aus Seidenfäden gewebt und porös, mit Zwischenräumen zwischen den einzelnen Fasern versehen sind.

Unter den Eigenschaften der Kleiderstoffe unterscheidet man — nach TURNER, dessen Arbeiten der folgenden Darstellung zu Grunde liegen — die primären, welche den Stoffelementen als solchen zukommen; und andererseits die sekundären, welche nach der Verarbeitung des Stoffes zum Gewebe und wesentlich nach Massgabe der Art der Verarbeitung zu Tage treten.

Eigenschaften der Stoffelemente der Kleidung.

Die Stoffelemente zeigen ein charakteristisches Verhalten unter dem Mikroskop, ferner meistens ein chemisches Verhalten, das zu ihrer Trennung beiträgt. Physikalisch unterscheiden sich die Stoffelemente namentlich durch ihr hygroskopisches Verhalten, ihre Benetzbarkeit mit Wasser und ihr Leitungsvermögen für Wärme.

Das mikroskopische Verhalten ist folgendes:




Fig. 93. Elemente der Kleidung. 150:1.

L Leinenfaser. H Hanffaser. J Jutefaser. B Baumwollfaser. S Seide. A Alpakawolle. E Elektoralwolle. W Schafwolle.

Aus vegetabilischen Fasern (Gefäßbündel aus Blättern, Stengeln, Wurzeln oder Samenhaare) bestehen:

a) Baumwolle (Kattun, Shirting, Musselin, Tüll, Köper, Barchent u. s. w.). Baumwollhaare verschiedener *Gossypium*-arten. Plattgedrückte meist gewundene Fasern (Fig. 93 B), 0.02—0.05 m lang, von 0.011—0.037 mm Durchmesser; an einem Ende kegelförmig zugespitzt, am anderen stumpf abgerundet. Im Inneren ist ein luftgefüllter Hohlraum; die Zellwand ist von beträchtlicher Festigkeit.

b) Leinen. Hergestellt aus der Bastfaser von Flachs (*Linum usitatissimum*). Das Bastgewebe des Flachsstrohs wird von der Oberhaut und dem Markkörper getrennt durch einen Fäulnisprozess (Rösten); dann wird die Bastung durch Klopfen, Brechen und Schwingen, schliesslich durch Hebeln vollständig. Gut gehebelte Flachse zeigen unter dem Mikroskop nur Bastzellen, die bis 4 cm lang und etwa 0.01 mm breit sind. Das Lumen ist meist als eine dunkle Linie reduziert, stellenweise ganz verschwunden; die Faser ist gestreift.

c) Hanf und Jute, aus Bastzellen von *Cannabis sativa* resp. indischen *Jutea* hergestellt, übrigens wie beim Flachs zubereitet; selten zu Kleidung verwendet.

Aus thierischen Materialien besteht:

a) Wolle; gewöhnlich wird Schafwolle benutzt. Je nach der Rasse ist die Wolle durch Länge, Kräuselung und Feinheit des Haares unterschieden. Im Rohzustand ist sie stark mit Schweiss und Fett verunreinigt. Bei der Entfettung durch Waschen mit Wasser und später mit alkalischen Flüssigkeiten verliert sie 20—70 Procent. Die Haare der gereinigten Wolle sind 4—32 cm lang, 0.014—0.06 mm dick; unter dem Mikroskop zeigen sie eine epithelartige Membran, die aus dünnen, sich dachziegelähnlich deckenden Cuticularplättchen besteht, so dass die Oberfläche ein schuppiges, tannenzapfenartiges Aussehen erhält (Fig. 91 W). Bei altem, getragenen Wollstoff zerfällt die Faser in Fibrillen, die Vorsprünge verschwinden, die Querstreifung wird weniger deutlich. — Die kurze, stark gekräuselte Wolle liefert die sogenannte Streichwolle (Flanell, Fries, Buckskin); die Kammwolle liefert das Material zu glatten Wollzeugen aus langen, sehr festen Haaren. — Von anderer Wolle wird noch gebraucht: Kaschmirwolle von den Kaschmirziegen, Vigognewolle vom südamerikanischen Schafkameel, Mohair von der Angoraziege u. a. m.

Häufig werden gemischte Gewebe benutzt. — Erwähnt sei besonders die jetzt sehr verbreitete Kunst- oder Lumpenwolle (Mungo, Shoddy). Dieselbe wird durch Zerreißen oder Zerkratzen von Wolllumpen und Mischen mit neuer Schafwolle zu Geweben verarbeitet. Oft sind auch Leinen- und Baumwollabfälle hineingemengt. Aeusserlich ist dieselbe von neuer Wolle nicht zu unterscheiden, dagegen wohl durch das Mikroskop.

b) Seide. Aus Absonderungen der Seidenraupe, *Bombyx mori*, gewonnen. Die im Frühjahr aus dem Ei hervorgekrochene Raupe spinnt sich nach mehrmaliger Häutung zur Verpuppung ein. Dazu sondert sie durch zwei schlauchförmige Drüsen ihres Kopfes eine klebrige Flüssigkeit in Form von zwei Fäden ab, die sich zu einem Doppelfaden vereinigen, und dieses bildet ununterbrochen fortlaufend den Cocon, welcher die Puppe umgiebt. In 12—21 Tagen ist aus der Puppe ein Schmetterling geworden. Dieser wird vor dem Durchbrechen des Cocons getödtet, falls man letztere gewinnen will. Der Faden wird dann vorsichtig abgewickelt und liefert die Rohseide. — Unter dem Mikroskop stellen die Fäden cylindrische, solide und homogene Fasern von 0.01—0.02 mm Dicke dar.

In Bezug auf das chemische Verhalten der Kleiderstoffe seien folgende Reaktionen erwähnt:

Thierische Fasern lösen sich beim Kochen in mässig concentrirter Kalilauge auf, sie färben sich nachhaltig (waschecht) mit Pikrinsäure und mit Anilinfarben, brennen angezündet nicht fort, liefern eine feste schwammige Kohle und starken Geruch von verbrannten Haaren oder Federn. In Kupferoxydammoniak bleibt Seide unverändert; Wolle quillt etwas.

Vegetabilische Fasern lösen sich nicht in Kalilauge, färben sich nicht dauernd in Pikrinsäurelösung, brennen angezündet fort, geben dabei eine leicht zerfallende Asche und keinen intensiven Geruch. In Kupferoxydammoniak ist Baumwolle leicht löslich; Leinwand quillt nur. Ein kleines Stück Gewebe aus Pflanzenfasern wird mit ca. 2 ccm concentrirter Schwefelsäure übergossen: auf Zufügen von 2 Tropfen gesättigter wässriger Thymollösung entsteht purpurrothe Färbung der Flüssigkeit.

Seide und Wolle sind durch die leichtere Lösung der ersteren in Salpetersäure und Ammoniak erkennbar. — Baumwolle und Leinen unterscheidet man durch kurzes Eintauchen in englische Schwefelsäure. Die Baumwollenen werden gallertartig resp. gelöst. Die Leinenfasen bleiben unverändert.

Das physikalische Verhalten der Stoffelemente lässt sich dahin charakterisieren, dass

a) Baumwollfasern wenig hygroscopisch sind; 100 Theile nehmen 6 Wasser auf; sie benetzen sich rasch mit Wasser; ihr Wärmeleitungsvermögen ist = 29.9, das der Luft = 1 gesetzt.

b) Leinen. Verhält sich ähnlich wie Baumwolle, benetzt sich noch schneller mit Wasser; verträgt häufiges Waschen ohne Veränderung und Verwundung. Wärmeleitungsvermögen wie bei Baumwolle.

c) Wolle. Sehr hygroscopisch, 100 Theile nehmen aus gesättigter Luft — 28 Theile Wasser auf. Benetzt sich schwerer mit Wasser; bei wiederholtem Waschen und Trocknen tritt stärkere Krümmung der Haare ein (Einkriechen der Wollstoffe); nasse Wolle legt sich in Folge ihrer seitlichen Stützhaare nicht glatt an Flächen an, wie andere Stoffe. Wärmeleitungsvermögen 6.1.

d) Seide. 100 Theile nehmen 16.5 Wasser aus feuchter Luft auf. Leicht benetzbar. Wärmeleitungsvermögen 19.2.

Eigenschaften der zu Geweben verarbeiteten Kleiderstoffe.

Von der Art der Verarbeitung hängt zunächst die Dicke und der Luftgehalt einer Kleidung ab. Glatte Leinen- und Seidenstoffe haben 0.16—0.4 mm Dicke; Trikotstoffe 0.6—1.2 mm; Flanell u. s. w. — 3 mm. — In glatten Geweben beträgt der Luftgehalt ca. 50 Procent, im Trikot 75—80 Procent, im Flanell 90 Procent, in der Haarabstanz der Pelze 98 Procent. Von dem Luftgehalt hängt wesentlich die Comprimirbarkeit der Stoffe, diejenige Eigenschaft der Kleidung, durch welche Stoss und Druck auf Körperstellen abgeschwächt werden sollen; ausser dem Luftgehalt, der durch die Webweise bestimmt wird, kommt noch die Dicke der Stoffe und bis zu einem gewissen Grade auch ihre Elementarzusammensetzung für diesen Schutz in Betracht. Die meisten Kleiderstoffe sind etwa bis auf $\frac{1}{3}$ comprimirbar.

Auch die wasserhaltende Kraft und die kapillare Aufsaugung hängen vorzugsweise vom Luftgehalt des Gewebes ab. Die meisten Stoffe saugen am langsamsten auf, nur tritt bei gleichem Gewebe eine besondere Verlangsamung der Aufsaugung bei Wollstoffen hervor. — Je lockerer der Stoff, um so mehr Poren bleiben auch nach der Benetzung mit Wasser lufthaltig und für Luft zugänglich.

Wollflanell	zeigt trocken	923	Porenvolum,	benetzt	803
Baumwollflanell	"	"	888	"	"
					723

Trikot-Wolle	zeigt trocken	833	Porenvolum, benetzt	612
„ Baumwolle	„ „	847	„ „	617
„ Leinen	„ „	733	„ „	318
Glatte Baumwolle	„ „	520	„ „	0.

Von dem Porenvolum, daneben aber besonders von der Grösse der Lufträume (die z. B. durch die Appretur beeinflusst wird) hängt ferner die Permeabilität der Kleider für Luft und andere Gase (Wasserdampf, CO_2) ab. Sie lässt sich angeben in der Anzahl Sekunden, welche es dauert, bis durch 1 qcm Fläche eines 1 cm dicken Stoffes 1 ccm Luft bei bestimmtem Druck (0,42 mm) gefördert wird. Die verschiedenen Stoffe ergeben dann folgende Zahlen:

Dichter Baumwollstoff	76
Waffenrock	10
Wolltrikot	6
Loden	3
Baumwollentrikot	1

Für die Permeabilität einer Gesamtmkleidung ist es wichtig, dass die über einander liegenden Schichten möglichst homogen sind; die Einlagerung einer wenig permeablen Schicht über leicht permeablen hebt den Durchtritt der Luft nahezu auf (z. B. glatte Leinen- und Baumwollstoffe über Wolltrikot).

Auch für das reelle Wärmeleitungsvermögen der fertigen Kleiderstoffe ist der Luftgehalt von grösster Bedeutung; daneben kommt besonders die Dicke der Stoffe und in geringerem Grade das Leitungsvermögen der Grundstoffe in Betracht. Bei gleicher Dicke verhält sich der Wärmedurchgang,

Baumwolltrikot	= 100 gesetzt,
bei Wolltrikot	= 68
„ Leinentrikot	= 119
„ Leinen glatt	= 133
„ Lodon	= 76

Durch hygroskopisches Wasser nimmt die Leitung bei Wolle um 110 Procent, bei Seide um 41 Procent, bei Baumwolle um 16 Procent zu. — Falls Wasser eingelagert ist, verhält sich die Leitung des trockenen Stoffs zum feuchten:

bei Wollflanell	wie	1:1.56
„ Wolltrikot	„	1:2.17
„ Lodon	„	1:2.58
„ glatter Baumwolle	„	1:3.39.

Die Abstrahlung der Wärme differirt wenig (zwischen 83 und 85°); sie ist am niedrigsten bei den glatten Stoffen (namentlich bei glänzender Seide), am stärksten bei rauher Trikotwolle. Bei nasser Oberfläche nimmt die Strahlung ab; gleichzeitig wirkt aber die Verdunstung im entgegengesetzten Sinne.

Auf Grund der dargelegten Eigenschaften vermag die Kleidung in geeigneter Auswahl den hygienischen Anforderungen zu entsprechen, die für dieselbe in Betracht kommen: sie soll erstens die Wärmeabgabe vom Körper in zweckentsprechender Weise herabsetzen, und zwar sowohl im trocknen, wie auch im feuchten Zustand, zweitens soll sie die normale Wasserdampfabgabe vom Körper ermöglichen; drittens soll sie die directe Bestrahlung des Körpers verhindern.

Weitere bei dem Gebrauch der Kleidung in Betracht kommende hygienische Gesichtspunkte betreffen die Farbe der Kleidung, durch welche keine giftigen Stoffe mit dem Körper in Berührung gebracht werden dürfen; ferner die Aufnahme und Verbreitung von Gasen und Gerüchen, sowie von Infektionserregern durch Kleidungsstoffe; endlich auch den Schnitt der Kleidung, durch welchen nicht selten enorme Druckwirkungen auf einzelne Körperteile ausgeübt werden.

1. Die Beziehungen der Kleidung zur Wärmeabgabe.

Durch directe Bestimmung theils der Wärmeausstrahlung (mit Hilfe einer Thermosäule und des Galvanometers), theils der gesammten Wärmeabgabe eines Körperabtheils (in RUBNER's Calorimeter) ist festgestellt, dass jedes Kleidungsstück eine deutliche, 10—40 Procent betragende Verminderung der Wärmeabgabe bewirkt.

Diese Verminderung der Wärmeabgabe könnte entweder durch Herabsetzung der Ausstrahlung der Wärme von der Oberfläche der Hautoberfläche zu Stande kommen, oder aber von einer Erschwerung der Wärmeleitung herrühren. Nun ergeben zwar directe Messungen, dass das Strahlungsvermögen der Kleider sogar etwas grösser ist als das der Haut, dafür hat aber der bekleidete Körper im Durchschnitt nur eine Temperatur von 21° an der Oberfläche, und deshalb ist auch die Wärmeabstrahlung geringer als von der nackten Körperoberfläche.

Jede Schicht Kleidung veranlasst natürlich eine weitere Hemmung der Wärmeabgabe. Misst man die Temperaturen, welche die einzelnen Kleidungs-schichten am Körper zeigen, so findet man:

für die Haut des unbekleideten Körpers 27—32°;

für die Haut des bekleideten thätigen Körper 29—31°; bei voller Ruhe resp. Schlaf oder bei zu hoher über 24° gelegener Aussentemperatur 34—35°.

Bei Bekleidung mit Wollhemd an der Aussenseite desselben 28.5°

Bei Bekleidung mit Wollhemd und Leinenhemd an der Aussenseite des letzteren 24.8°.

Bei Bekleidung mit Wollhemd, Leinenhemd und Weste an der Aussenseite 22.9°.

Bei Bekleidung mit Wollhemd, Leinenhemd, Weste und Rock an der Aussenseite 19.4° (RUBNER).

Soll der Körper mehr Wärme abgeben, so kann eine einzelne Schicht fortgelassen und damit die Temperatur der Aussenfläche erhöht werden. Die Anpassung an die klimatischen und Witterungsverhältnisse erfolgt daher am leichtesten durch eine zweckentsprechende Zahl der Kleidungsschichten.

Eine weitere Behinderung der Entwärmung des bekleideten Körpers kommt dann noch durch die schlechte Wärmeleitung der Kleidung zu Stande, die, wie oben gezeigt wurde, hauptsächlich von dem Luftgehalt des Gewebes und von seiner Dicke beeinflusst wird.

Ausserdem kommt die Permeabilität der Gesamtkleidung für ihre Wärmehaltung in Betracht. Starker Luftdurchgang kann den Wärmeschutz erheblich beeinträchtigen. — Ein gewisser Luftwechsel durch die Kleidung ist aber erforderlich; schon wegen der unten zu besprechenden wichtigen Beziehungen derselben zur Wasserdampfabgabe des Körpers. Die Grösse des Luftwechsels durch eine Kleidung lässt sich durch Bestimmung des CO_2 -Gehalts der Kleiderluft messen, wenn man die CO_2 -Production seitens der Haut als gleich annimmt. Unbehagen tritt schon ein, wenn jener CO_2 -Gehalt über 0.08 pro mille steigt. Durch einen einfachen Sommeranzug treten normaler Weise in der Stunde 935 Liter Luft ein.

Bei durchfeuchteter Kleidung (durch hygroscopisches oder in die Poren eingelagertes Wasser) wird zunächst das Gewicht der Kleidung bedeutend erhöht und oft geradezu belästigend. Dasselbe kann auf das Doppelte, also von 4 kg auf 8 kg steigen, lockere baumwollene und wollene Stoffe nehmen sogar das Dreifache ihres Gewichts an Wasser auf.

Ferner wirken die durchfeuchteten Kleider erheblich befördernd auf die Wärmeabgabe. Einmal sind sie weit bessere Wärmeleiter als die trockenen lufthaltigen Kleidungsstücke; sodann wirken sie durch die bei der Verdunstung des aufgenommenen Wassers entstehende Kälte

in einer völlig durchnässten Kleidung enthaltene Wassermenge versucht zu ihrer Verdunstung die gesammte Wärme, welche der Körper innerhalb 24 Stunden zu produciren vermag.

Feuchte Kleider müssen um so stärker abkühlend wirken, je schneller sie das Wasser einsaugen, je vollständiger die Luft aus den Poren verdrängt wird, und je rascher die Verdunstung des Wassers vor sich geht. Porös gewebte Stoffe zeigen in diesen Beziehungen das instigste Verhalten, weil die Menge des aufgenommenen Wassers geringer ist und das Wasser nur langsam eindringt (ausgenommen bei ungegetragener Wolle); die Faser wird daher nicht schlaff, und das Gewebe nicht in eine gleichmässig durchfeuchtete Masse verwandelt, sondern die Poren des Gewebes bleiben theilweise lufthaltig. Die Wollstoffe legen sich ausserdem nie so glatt an die Haut an, wie die übrigen nassen Stoffe.

Bei stark schwitzender Haut, z. B. auf Märschen, im tropischen Klima u. s. w. sind daher unbedingt lockere poröse Stoffe zu empfehlen. Bei manchen Individuen verursachen die Wollstoffe zu starke Reizungen der Haut, so dass sie nicht auf die Dauer getragen werden; ausserdem sind sie meist dicker gearbeitet, als andere Stoffe und wirken dadurch schweisstreibend. Poröse Baumwollstoffe (LAHMANN's Reform-Baumwolle oder VONDEL's aus Wolle, Baumwolle und Leinen gemischte Trikotstoffe) sind daher unter solchen Verhältnissen besser indicirt.

Eigenthümlich verschieden ist das Verhalten von Wolle einerseits, Leinen und Baumwolle andererseits gegenüber den Bestandtheilen des Schweißes. Wolle lässt dieselben durchwandern, so dass eventuell die Bekleider stark verschmutzt werden; in Leinen und Baumwolle bleiben sie stecken und man findet sie z. B. auch dann am reichsten an Kochsalz, wenn darunter noch eine Wollschicht getragen wird.

Ist der Körper häufigen Durchnässungen von aussen ausgesetzt, bedient man sich zweckmässig der imprägnirten, aber porösen Wollstoffe. Dieselben werden z. B. mit einer Mischung von Alaun, Weinsäure und Gelatine getränkt; dadurch wird die Adhäsion zwischen der Faser und dem Wasser vermindert und das capillare Aufsaugungsvermögen des Stoffes beseitigt. Wasser läuft an diesen Kleidern vollständig ab, während die Durchlässigkeit für Luft nur um 2—8 Procent vermindert ist. Sie sind den für Luft undurchlässigen und den Luftschmelzen durch die Kleidung völlig aufhebenden Stoffen aus Gummi und Kautschuk weit vorzuziehen.

2. Beziehungen der Kleidung zur Wasserdampfabgabe des Körpers.

Für die Wasserdampfabgabe des Körpers ist das eigenthümliche Klima, in welchem die Haut des bekleideten Körpers sich befindet, von grösster Bedeutung. Gewöhnlich zeigt die Luft zwischen Körper und Kleidung nur 30—40 Procent Feuchtigkeit und, zusammengenommen mit der Temperatur von ca. 31° (s. oben), ein sehr hohes Sättigungsdeficit. Durch die Kleidung wird daher der Körper ständig in eine ausserordentlich trockene, zur Wasserdampfaufnahme befähigte Atmosphäre eingehüllt, und nur in dieser fühlt sich der Mensch behaglich. Soll sich dieselbe aber erhalten, und der Körper in der gewohnten Wasserdampfabgabe nicht beschränkt werden, so muss ein gewisser Luftwechsel vor sich gehen und die Kleidung muss für Luft durchgängig sein. Bei undurchlässiger Kleidung, bei zu zahlreicher Kleiderschichten, ferner auch bei sehr warmer, feuchter und windstiller Aussenluft sehen wir in der That die Feuchtigkeit in der den Körper begrenzenden Luftschicht auf 60 Procent steigen; damit tritt aber zugleich eine merkliche Belästigung und ein Gefühl des Unbehagens ein.

Die oben angeführten Zahlen für die Permeabilität der Kleiderstoffe im trockenen und feuchten Zustande geben daher von diesem Gesichtspunkt aus die wichtigsten Anhaltspunkte für die Wahl der Kleidung. Den lockeren Trikotstoffen ist der Vorzug vor glatten Baumwoll- und Leinenstoffen zu geben. JÄGER'scher Wollstoff, LAHMANN's Reformwolle und VONDEL'sche Trikotstoffe ermöglichen den ausgiebigsten Luftwechsel durch die Kleidung und die leichteste Fortschaffung des Wasserdampfes. So lange die Wasserausscheidung durch die Haut nicht übermässig ist, wird es daher in solcher Kleidung überhaupt nicht zur Schweissbildung und zur Durchfeuchtung der Stoffe kommen. Auch wenn aber letztere eingetreten ist, so ermöglichen diese Stoffe immer noch eine weitere Wasserdampfabgabe, während dieselbe bei gewöhnlicher Baumwolle und bei Leinen völlig aufhört.

Die letztgenannten Stoffe sind dagegen dann indicirt, wenn die Haut wenig Wasserdampf producirt, trocken bleibt und wenn keinerlei stärkere Temperaturdifferenzen auf den Körper einwirken, also für eine sog. Ruhekleidung, z. B. beim Aufenthalt im Zimmer und namentlich im Bett.

3. Schutz des Körpers gegen Wärmestrahlen.

Der unbedeckte Körper erträgt die directe Insolation nur nach längerer Gewöhnung ohne Schaden. Für gewöhnlich ist ein Schutz gegen dieselbe erforderlich (s. S. 100), der am besten durch hellfarbige,

oder hellgelbe Kleiderstoffe gewährt wird, während die Qualität des Stoffes wenig oder gar nicht in Betracht kommt. Setzt man das Absorptionsvermögen weisser Stoffe für die leuchtenden Wärmequellen = 100, so beträgt dasselbe für hellgelbe 102, für dunkelgelbe 140, für hellgrüne 152, für rothe 168, für hellgraue 198, für schwarze 208.

Auch gegen die Strahlung von Flammen aus ist die Haut ebenfalls durch Kleidung zu schützen. Besonders geeignet sind für die in dieser Weise exponirten Arbeiter die zugleich unverbrennbaren Asbestkleidungsstücke (z. B. Hauben, Gamaschen u. s. w.), resp. die mit Flammenverwehmitteln (Ammoniumphosphat oder Ammonsulfat oder Bleiessigwasserglas) imprägnirten Stoffe.

Die ferneren Anforderungen an die Kleidung betreffen zunächst das Fehlen giftiger Farben.

Die Seite 323 aufgeführten, Arsenik, Blei und Kupfer enthaltenden Farben sind nicht selten zur Färbung der Kleider verwendet. Grosse Mengen dieser sind namentlich in grünen Tarlatankleidern gefunden. Mit Bleifarben gefärbtes Hutfutter, mit Anilinfarben gefärbte Strümpfe und Unterkleider können zu Hautkrankheiten Anlass gegeben haben.

Die porösen Kleidungsstoffe sind ferner oft die Quelle übler Gerüche. Sie nehmen von aussen Massen von Staub auf, der dann bei Durchnässung weiter in's Innere befördert wird; von Seiten des Körpers dringen die Hautsekrete ein, und so werden die Kleider mit einer Menge organischer in Zersetzung begriffener Stoffe imprägnirt; flüchtige, riechende Bestandtheile werden reichlich absorbirt, von dicken wollenen Stoffen in höherem Grade als von Baumwolle und Leinen. Bei feuchter Kleidung können Zersetzungsprocesse eventuell noch einen Fortgang nehmen. Eine häufige gründliche Reinigung sämtlicher Kleider ist daher unerlässlich.

Eine weitere Folge der geschilderten Verunreinigung der Kleider ist das Bakterienreichthum, der um so grösser wird, je länger die Kleidung getragen ist und oft zu enormen Zahlen anwächst. Die Bakterien gelangen wesentlich mit Staubtheilchen und Hautschüppchen in die Kleidung; je rauher die Oberfläche der Stoffe, um so mehr Keime können haften. Leinene und baumwollene Stoffe mit fest gesponnenen Fasern und glatter Oberfläche enthalten die wenigsten Keime. — Auch bei der Uebertragung von Infektionserregern spielt die Kleidung eine sehr bedeutsame Rolle. Pocken, Scharlach, Masern, Tuberculose, Typhus u. s. w. werden nachweislich durch Kleidungsstücke, zuweilen durch Vermittelung der Trödler oder durch Lumpen, auf Gesunde

übertragen. Reste von phthisischem Sputum gelangen sehr häufig durch die Hände oder Taschentücher auf die Oberkleider. Die Erreger von Wundinfektionskrankheiten werden durch mangelhaft gereinigte Verbandstücke verbreitet; Cholera, Typhus, Ruhr durch verunreinigte Leib- und Bettwäsche, Beinkleider u. s. w. Nach dem Waschen pflegt die Unterkleidung selten mehr lebende Infektionserreger zu enthalten, da stets gründliches Kochen der Wäsche stattfindet. Die einer solchen Reinigung nicht zugänglichen Oberkleider können aber sehr lange Zeit als Infektionsquellen wirken.

Schädigungen des Körpers durch fehlerhaften Sitz der Kleidung sind seit lange bekannt. Auf die durch Corsets entstehende Schnürleber, auf die schädlichen Folgen enger Halsbekleidung, auf die Unzweckmässigkeit der Strumpfbänder u. s. w. ist bereits vielfach hingewiesen worden. Dass vom hygienischen Standpunkt aus eine Reform der Kleidung in vielen derartigen Punkten wünschenswerth erscheint, ist so selbstverständlich, dass es keiner näheren Begründung bedarf. Vorläufig aber ist wenig Aussicht vorhanden, dass ein Kampf der Hygiene gegen Sitte und Mode auf grössere Erfolge rechnen darf.

Besonders schwere Deformationen erleidet der Fuss durch die früher und zum Theil auch jetzt gebräuchliche Form des Schuhwerks, bei welcher die Sohle symmetrisch um die Mittellinie des Fusses gelagert ist und das Oberleder so geschnitten wird, dass es seine grösste Höhe — entsprechend der für die Sohle maassgebenden Linie — gerade in der Mitte hat und dass es nach vorn ganz flach auf die Sohle ausläuft.

Die Nachtheile, welche durch diesen fehlerhaften Schnitt entstehen, betreffen insbesondere die grosse Zehe; der äussere Rand des Nagels derselben wird über das Nagelbett herausgedrängt und es entsteht chronische Entzündung des Nagelfalzes; der innere Rand wird nach unten, der zugehörige Nagelfalz nach oben gedrängt und dadurch der „eingewachsene“ Nagel hervorgerufen; die erste Phalanx erfährt eine Abknickung gegen den Metatarsalknochen und das allmählich am inneren Fussrande prominirende Metatarsusknöpfchen ist beständigem Druck und chronischen Entzündungen ausgesetzt. — Durch die seitliche Verschiebung der grossen Zehe wird ferner der zweiten Zehe der ihr zukommende Platz verkümmert, und dieselbe muss daher verkrüppelt oder falsch gelagert werden. — Endlich führt das fehlerhafte Schuhwerk zur Plattfussbildung; dieselbe beruht auf einer Umlegung des Fussgewölbes, so dass dessen Scheitel nach innen umfällt, während die Stützpunkte nach aussen rutschen und kommt dadurch zu Stande, dass der herkömmliche Schnitt des Oberleders den Fuss zu gewaltsamer Pronation veranlasst. Die grösste Höhe des Oberleders ist in der Mittellinie (a in Fig. 94a), die grösste Höhe des Fusses an seinem Grosszehenrand; um den Fuss also in dem Oberleder unterzubringen, muss derselbe eine möglichst starke Pronationslage einnehmen. Dabei rücken die Stützpunkte des Fussgewölbes nach aussen, die Schwerlinie wird nach innen verschoben und so der Anfang für die Umlegung des Fussgewölbes gegeben.

In einem richtig gestalteten Schuh soll die grosse Zehe ihre richtige Lage annehmen, d. h. die Achse derselben soll die Fortsetzung einer Linie bilden, welche von der Mitte der Ferse nach der Mitte des ersten Metatarsusknochens *z* in Fig. 94b) gezogen ist. Der innere Rand der Sohle soll vom Metatarsophalangeal-Gelenk der grossen Zehe bis nach vorn parallel dieser Linie liegen




Fig. 94 a. Sohlen herkömmlicher Gestalt.
a Mittellinie. b Gerade Linie für beide vordere Kanten.




Fig. 94 b. Richtige Sohlen.
a Meyersche Richtungslinie. b' Vorderer Rand, unschöne Form. b Bessere Form des vorderen Randes.

und zwar in einem Abstand von reichlich der halben Breite der grossen Zehe. In eben dieser Linie soll auch das Oberleder für die ganze Länge des Fussrückens und der grossen Zehe am höchsten gehalten werden.

Eine sorgfältige Hautpflege ist schon dadurch geboten, dass die vielerlei Verunreinigungen, welche auf die Körperoberfläche gelangen, keineswegs vollständig von der Kleidung aufgenommen und mit dem Wechsel derselben entfernt werden. Vielmehr bleibt ein fettiger, schmieriger Ueberzug auf der Haut zurück, der ausserordentlich zahlreiche Spross- und Spaltpilze beherbergt. Derselbe liefert häufig belästigende Gerüche, setzt die normale Empfindlichkeit der Haut herab, bewirkt oft stärkere Reizung einzelner Hautpartien und giebt eventuell zur Einwanderung pathogener Mikroorganismen Anlass. Insbesondere wird bei manchen Gewerbe- und Industriebetrieben (Kohlenbergwerke,

Bleiweissfabriken, Baumwollspinnereien u. a. m.) die Haut der Arbeiter mit einer festhaftenden Schmutzschicht bedeckt, unter deren Einfluss Störungen des Wohlbefindens und krankhafte Hautaffektionen entstehen.

Eine häufige Reinigung des ganzen Körpers durch lauwarme Bäder sollte daher auch für die ärmere Bevölkerung zur Gewohnheit werden. In dieser Beziehung ist ein wesentlicher Fortschritt zu hoffen

1) von der Einführung der Volksbäder, in welchen ein warmes Brausebad mit Seife und Handtuch in einzelner Zelle für den Preis

von 10 Pfennig geboten wird. Derartige Bäder bestehen in Berlin, Breslau, Magdeburg u. s. w.; eine Musteranstalt nach LASSAR's Angaben von achteckigem Grundriss ist in Frankfurt a. M. eingerichtet (Fig. 95).




Fig. 95.
Volksbrausebad.

Im centralen Theil befindet sich der Dampfkessel, ringsum liegen 14 Zellen, 4 für Frauen, 10 für Männer in vom Eingang ab völlig getrennten Abtheilungen. Das in jeder Zelle an der Innenwand angebrachte, 30 Liter fassende Wassergefäß hat ein Wasserstandsrohr, das von dem centralen Betriebsraum aus beobachtet werden kann. Dies Wasser hat 40° und kann mit kaltem Wasser beliebig temperirt werden.

2) von Schulbädern, die zuerst in Göttingen, später in verschiedenen anderen Städten zur Einführung gelangt sind.

Im Souterrain jeder Volksschule werden warme Brausebäder verabreicht und zwar können je drei Kinder unter einer Brause baden. Sind drei Brausen vorhanden, so dauert das Baden einer Klasse von 50 Kindern ca. 50 Minuten. Die Kinder verlassen die Klasse in einzelnen Abtheilungen, so dass jedes Kind nur etwa 10 Minuten in der Klasse fehlt. Dieselbe Klasse hat alle 8—14 Tage Badestunde und für diese wird eine Stunde ausgewählt, in welcher Abschreibungsübungen, Wiederholungen oder cursorisches Lesen auf dem Lehrplan stehen, so dass keine wesentliche Störung des Unterrichts eintritt. — Die Kinder werden durch diese Schulbäder in wirksamer Weise zur Reinlichkeit des Körpers und der Kleidung erzogen.

3) von Arbeiterbädern. In zahlreichen industriellen Etablissements sind bereits warme Brausebäder mit bestem Erfolg eingeführt.

Weitergehende, nicht nur auf eine Reinigung des Körpers abzielende Wirkungen kommen den kalten Abwaschungen und Bädern (Schwimmbädern) zu. Dieselben sind in heissen Klimaten ein wichtiges Mittel zur Entwärmung des Körpers. Ausserdem vermögen sie bei

ematischer Anwendung die Reaktionsfähigkeit der Haut in erheblichem Grade zu steigern und die Disposition für Erkältungskrankheiten vermindern.

Litteratur: RUBNER, Handbuch der Hygiene, Wien 1888, und zahlreiche handlungen über die Eigenschaften der Kleidung im „Archiv für Hygiene“ 37—1895. — RUMPEL, Ueber den Werth der Bekleidung u. s. w., Archiv f. Hygiene, L. 9. — NOCHT, Vergleichende Untersuchungen über verschiedene zu Unterscheidern verwendete Stoffe, Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 5. — HILLER, Ueber die Rauchbarkeit porös-wasserdicht gemachter Kleiderstoffe u. s. w., Deutsche militärärztliche Zeitschr. 1888. — H. v. MEYER, Zur Schuhfrage, Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 8. — LASSAR, Ueber Volksbäder, Viertelj. f. öff. Ges., Bd. 19. — Die Culturufgabe der Volksbäder, Rede u. s. w., Berlin 1889.

Achtes Kapitel.

Die Wohnung.

(Wohnhaus- und Städteanlagen.)

Während das Wohnhaus ursprünglich vorzugsweise zum Schutze gegen schädliche Einflüsse, namentlich gegen Wind und Wetter, errichtet wurde, bezeichnet man es in neuerer Zeit vielfach als Quelle von Gesundheitsstörungen und als besonders verdächtigen Theil unserer Umgebung. In der That führt das Leben im Hause und speciell das Zusammenwohnen mit zahlreichen anderen Menschen zu einer Reihe von Gefahren, die um so beachtenswerther erscheinen, als der civilisirte Mensch den weitaus grössten Theil seines Lebens im Wohnhaus zubringt. Beim Bau und bei der Einrichtung des Hauses, bei der Versorgung desselben mit Wärme, Luft und Licht, bei der Beseitigung der Abfallstoffe kann es zur Verletzung derjenigen hygienischen Vorschriften kommen, die in den vorstehenden Kapiteln aufgestellt und begründet wurden. Solche Abweichungen von der hygienischen Norm werden dadurch befördert, dass sehr verschiedene Interessen beim Bau und der Einrichtung des Hauses concurriren. In erster Linie pflegen die Kosten der Anlage, sodann sociale und ästhetische Motive, ferner Rücksichten auf Feuergefahr in Betracht zu kommen. Es ist zweifellos schwierig, die Forderungen der Hygiene mit allen diesen berechtigten Interessen in Einklang zu bringen.

Die daraus sich ergebenden hygienischen Beziehungen des Wohnhauses sind in Folgendem in der Weise erörtert, dass die Darstellung dem Bau des Hauses gleichsam folgt. Zunächst ist der Bauplatz, die verschiedene Form des Wohnhauses, die Aufstellung des Bebauungsplanes und die Bauordnung zu besprechen; sodann die Fundamentierung, der Bau und die innere Einrichtung des Hauses; ferner die speciellen Vorrichtungen zur Regulierung der Temperatur, zur Lüftung und Beleuchtung; schliesslich die in grossen Städten besondere Berücksichtigung erheischenden Einrichtungen zur Entfernung der Abfallstoffe und zur Leichenbestattung.

I. Vorbereitungen für den Bau des Wohnhauses.

A. Wahl und Herrichtung des Bauplatzes.

Ist die Wahl des Platzes freigestellt, so sind die Seite 171 betonten Einflüsse der Oberflächengestaltung zu berücksichtigen.

Der Boden soll porös, trocken und frei von stärkeren Verunreinigungen sein. Nur bei Malaria-gefahr ist compacter Felsboden einem porösen Untergrund vorzuziehen.

Zeigt sich der im Uebrigen zweckentsprechende Baugrund zu feucht, so fragt es sich, ob und mit welchen Mitteln eine Trockenlegung desselben ausführbar ist.

Die Entscheidung wird sich in jedem Falle nach der Ursache der Bodenfeuchtigkeit richten müssen. Gehört der Bauplatz zum Ueberschwemmungsgebiete eines Flusses, so kann eventuell durch Regulierung des Flusses resp. durch starke Aufschüttung des Terrains geholfen werden. Ist diese Abhilfe nicht in völlig befriedigender Weise zu beschaffen, so ist ein solcher Platz für die Errichtung menschlicher Wohnungen völlig ungeeignet.

Oder die Ursache der Feuchtigkeit liegt in einem zeitweise zu geringen Abstände des Grundwassers von der Bodenoberfläche. Für jedes Bauteil soll der maximale Grundwasserstand durch längere Beobachtung bekannt sein, und letzterer darf die Kellersohle des Hauses, welche $1\frac{1}{2}$ —2 m unter die Bodenoberfläche herabreicht, niemals berühren.

Ist diese Forderung nicht erfüllt, so muss der Abstand zwischen Grundwasser und Bodenoberfläche künstlich vergrössert werden, und zwar dadurch, dass man entweder das Terrain aufschüttet, oder den Grundwasserspiegel senkt mittelst Drainirung des Untergrundes resp. mit Hilfe der Canalisation, welche schon aus anderen Gründen in jeder grösseren Stadt eingeführt zu werden pflegt. Bei sehr grossen Grundwasseransammlungen ist allerdings eine Tieferlegung durch Drainrohre oder Canäle nicht zu erzielen; dagegen kann bei kleineren Grundwassermassen eine sehr vollständige Besserung des Bauplatzes durch diese Massnahmen erfolgen.

Zuweilen ist schon durch Anpflanzung schnell wachsender Pflanzen Absatz zu schaffen, welche grosse Mengen von Wasser verdunsten. Dazu eignen z. B. der Wasserreis, die Sonnenblume und namentlich der blaue Gummi (*Eucalyptus globulus*).

Drittens kann eine feuchte Beschaffenheit des oberflächlichen Bodens bedingt sein, dass dichter, schwer durchlässiger (z. B. lehmiger) Boden geringer Neigung des Terrains vorliegt. Die Niederschläge werden dann vom oberflächlichen Ansammlungen lange zurückgehalten. Ist solcher mit dichtem Buschwerk besetzt, so wird die Verdunstung gehindert und somit zu anhaltender Durchfeuchtung. — In solchem Fall ist die Oberfläche zu aptiren, mit bestimmter Neigung und Abfluss zu versehen, die Büsche und Sträucher sind theilweise zu entfernen und statt dessen eventuell Rasen anzulegen. — In den Tropen ist mit Rücksicht auf die Malaria-gefahr eine Tüchtigkeit der Bodenfeuchtigkeit besonders wichtig.

Die verschiedenen Formen des Wohnhauses und ihre hygienische Bedeutung.

Der Bauplan wird naturgemäss je nach der Bestimmung des Hauses sehr verschieden sein; hier soll einstweilen nur der Fall betrachtet werden, dass es sich um ein städtisches Wohnhaus innerhalb der gemässigten Zone handelt.

Aber auch bezüglich eines solchen Wohnhauses lassen die Sitten und Gebräuche der verschiedenen civilisirten Völker der gemässigten Zone sehr grosse Differenzen erkennen.

In vielen amerikanischen und englischen, auch in einzelnen norddeutschen Städten herrscht entschieden das Bestreben vor, für eine oder meistens zwei Familien kleine 1—2stöckige Häuser zu construiren, entweder ganz freistehen, von Gärten und Höfen umgeben (Villengärten), oder höchstens mit einer Seitenwand aneinander gelagert (Doppelvillen). Derartige Familienhäuser sind mehr wie andere Bauweisen geeignet, den Sinn für Häuslichkeit und Familienleben zu heben; durch dieselben wird ausserdem einem stärkeren Zusammenleben von Menschen am wirksamsten vorbeugt, und alle hygienischen Regeln sind hier weit leichter durchführbar. Allerdings gewinnen Städte durch eine solche Bauweise beträchtlich an Ausdehnung, es ist daher nothwendig, auf bequeme und billige Beförderungsmittel Bedacht zu nehmen, damit die grossen Entfernungen nicht nachteilig einwirken.

In englischen und holländischen dicht bewohnten Städten ist man zur geschlossenen Bauweise übergegangen, bei welcher jeder grosse Abstand zwischen den Häusern in Wegfall kommt. Aber das Gleiche, eben, für die Familie ein Haus ausschliesslich zur Verfügung zu

haben, ist noch so entwickelt, dass zahlreiche sehr schmale Häuser gebaut werden, deren jedes durch alle seine Stockwerke hindurch von einer Familie bewohnt wird. Auch bei dieser Bauart sind von vornherein manche Unannehmlichkeiten und Gefahren vermieden, welche durch das Zusammenleben vieler Familien unter einem Dache entstehen.

In der weit überwiegenden Mehrzahl werden indessen in den modernen Städten jetzt nur noch grosse Miethshäuser, Miethskasernen, deren jede zahlreiche Familienwohnungen umfasst, in geschlossener Bauweise errichtet. Alsdann ist das Bestreben des Besitzers stets darauf gerichtet, den Raum des Bauplatzes möglichst auszunutzen und auf demselben möglichst viele Menschen unterzubringen. Hier kommt es dann leicht zu schweren Missständen, und in der Gegenwart haben sich diese derartig gesteigert, dass die „Wohnungsfrage“, d. h. die Frage der Abhülfe gegenüber den socialen und hygienischen Schäden, welche zahlreichsten Wohnungen anhaften, für das Volkswohl von der allergrössten Bedeutung geworden ist.

Auch bei sorgfältiger Bauart bringt die Miethskaserne gewisse sittliche Gefahren mit sich; sie giebt zu Streit der Hausgenossen und Verführung Anlass, der Gewissenhafte, Nüchterne, Reinliche leidet unter der Unsitte der Nachbarn und giebt schliesslich seine Eigenart auf; das Familienleben bietet keine Behaglichkeit und die Loslösung der Einzelnen vom Hause wird befördert; häufiger Wechsel der Wohnung untergräbt die Anhänglichkeit an das eigene Heim.

Alle socialen und hygienischen Missstände werden sich um so stärker häufen, je dichter gedrängt die Bevölkerung in der Miethskaserne lebt. Ein lehrreiches Bild der thatsächlich jetzt in Grossstädten vorliegenden Wohnverhältnisse giebt die folgende, nach der Volkszählung vom 2. December 1895 erhobene Statistik:

Von 1000 Bewohnern wohnten in Wohnungen mit heizbaren Zimmern:

	1 ohne Zubehör	1 mit Zubehör	2	3	4
Königsberg . . .	8	533	219	103	56
Breslau	327	117	301	133	50
Dresden	25	393	271	188	64
Hannover. . . .	4	347	327	148	63
Frankfurt a. M. .	22	51	263	283	147

Von 1000 bewohnten Wohnungen waren übergelktert, d. h.

	mit 1 heizbaren Zimmer ohne Zu- behör u. mit 6 u. mehr Bewohnern:	mit 1 heizbaren Zimmer mit Zu- behör u. mit 6 u. mehr Bewohnern:	mit 2 heizbaren Zimmern u. mit 11 u. mehr Be- wohnern:
önigsberg . .	1	147	3
reslau . . .	50	27	2
resden . . .	0.2	81	3
annover . . .	0.1	69	2.4
ranksfurt a. M. .	0.6	5	0.9

Namentlich in den ärmeren, weniger cultivirten östlichen Provinzen ist demnach ein sehr grosser Bruchtheil der städtischen Bevölkerung völlig unzureichenden Wohnungen.

So zweifellos die sittlichen und socialen Schäden der dicht belkterten Miethskasernen zu Tage liegen, und so zweifellos ferner das eben in übergelkterten, engen und dunklen Wohnungen die Bewohner ungünstig beeinflusst, die Freude am Dasein beeinträchtigt und die Leistungsfähigkeit herabdrückt, so ist es doch nicht ganz leicht, die hygienischen Schäden, die von solchen Wohnungen ausgehen, bestimmt zu formuliren und richtig abzuschätzen.

In populären hygienischen Schriften werden gewöhnlich die Schlagworte „Luft und Licht“ gebraucht; die Verschlechterung der Luft durch die Exspirationsprodukte der Bewohner und das Fehlen der günstigen Lichtwirkung auf den menschlichen Organismus sowie des schädigenden Lichteinflusses gegenüber Bakterien soll vorzugsweise die hygienische Minderwerthigkeit enger Wohnungen charakterisiren.

Einer strengeren Kritik halten diese Anschauungen kaum Stand. Wie oben ausgeführt wurde, geht von der sogenannten Luftverschlechterung eine irgend erheblichere Gesundheitsstörung nicht aus. Ebenso konnte der Einfluss des Lichts bisher nicht als so wichtig für den Gesamtorganismus erwiesen werden (s. S. 127), dass wir von einem gewissen Minus an Licht einen messbaren und an der Morbidität und Mortalität statistisch nachweisbaren Einfluss erwarten dürfen. Auch dieessere Abtödtung der Krankheitserreger in stärker belichteten Zimmern ist die Infektionschancen in diesen nicht etwa auf 0 herab, sondern mindert sie gegenüber dunkleren Wohnungen nur um einen kleinen Theil, da die meisten Uebertragungen durch Krankheitserreger folgen, welche in Wäsche, Kleidern, Betten u. s. w. dem Lichteinfluss entzogen sind. Die offenbare Wirkung lichter Räume und reiner Luft

auf Stimmung, Genussfähigkeit und Arbeitsfreudigkeit haben hier bar zu starken Uebertreibungen verführt.

In erster Linie fragt es sich, ob zweifellose akute Geheiteschädigungen, die zu Krankheit und Tod führen, von überfüllten Wohnungen ausgehen, und welche Einflüsse hierbei welche betheiligt sind. — Am bedeutungsvollsten sind in dieser Beziehung die Temperatureinflüsse der Wohnungen, die sich in der ersten Säuglingssterblichkeit der Grossstädte in den Hochsommermonaten kennen geben. Wie an anderer Stelle ausgeführt ist, hängt die Zahl der artigen Todesfälle geradezu von der Wohnungstemperatur im Hochsommer ab. Diese ist in überfüllten Miethskasernen schon durch die Zahl der Werke und die Häufung innerer Wärmequellen stets höher als in kleineren Familienhäusern; nur in letzteren sind ausserdem ausreichende Aufbewahrungsräume für Speisen und Milch zu beschaffen für die Verhütung der verderblichen Verdauungsstörungen des Säuglings, so wichtig sind; nur dort ist ein Aufenthalt der Kinder über Tags im Freien und eine ausgiebige Kühlung der Wohnräume durch Lüftung möglich.

Zweitens ist die Ausbreitung ansteckender Krankheiten durch die Miethskasernen-Wohnung begünstigt, weil in dicht bevölkerten Häusern die Absperrung des Kranken und das Fernhalten des Contagiums von den übrigen Bewohnern auf besondere Schwierigkeiten stösst. Unter den Kinderkrankheiten kommt hier namentlich Diphtherie in Betracht; Scharlach und insbesondere Masern und Keuchhusten werden weil diese auch in einwandfreien Wohnungen die übrigen empfindlichen Insassen nicht zu verschonen pflegen. — Von den übertragbaren Krankheiten der Erwachsenen ist die Phthise an erster Stelle zu nennen; je dichter die Bewohnung, je unvermeidlicher die Berührungen und der dauernde Aufenthalt in nächster Nähe des Kranken ist, um so leichter wird das Contagium auf andere Bewohner übergehen, während chemische Luftbeschaffenheit und Lichtverhältnisse auch hier von untergeordneter Bedeutung sind.

Besonders gefährlich sind die Miethskasernen noch, wenn man die Ausbreitung einer Krankheit in derselben Familie absieht und die Uebertragung auf andere Familien berücksichtigt. Je mehr im Miethshaus gemeinsame Räume und Einrichtungen in Benutzung sind, um so grösser wird diese Gefahr der Ausbreitung. Durch Treppen, Flur, durch Waschküche und Trockenboden, durch Closet, Wappfistelle oder Brunnen, durch den Verkehr und die Spiele der Kinder in den Höfen oder auf der Strasse wird bei dichter Bewohnung zu jeder Gelegenheit zu weiteren Uebertragungen geboten.

Fasst man diese erheblichsten hygienischen Schädigungen durch Wohnung ins Auge, so ist es klar, dass dieselben theilweise durch Massregeln bekämpft werden können, welche die schwierig durchführbare radikale Aenderung der Wohnungen und eine beträchtliche Reduktion der Bewohnerzahl zunächst ausser Betracht lassen. So kommt z. B. die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit die Lieferung früherer Kindernahrung in den Sommermonaten, die Einführung einfacherer Sterilisirapparate, event. die Anlage von geeigneten Aufbewahrungsräumen für Speisen in Betracht. Zur Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten hilft die Entlastung der Wohnung von solchen Kranken, die Ueberführung akut Kranker in Krankenhäuser, der Phthisiker in Lungenheilstätten etc. Ausserdem ist eine organisirte häusliche Krankenpflege, durch welche richtige Massnahmen in Bezug auf Isolirung und Desinfection Verbreitung finden, ferner Sorge für reichlichste Wasserversorgung und Reinlichkeit von grosser Bedeutung.

Vieles und gerade das Dringlichste kann in dieser Weise geschehen, ehe das schwierige Problem, für einen grossen Theil der Bevölkerung erheblich geräumigere Wohnungen zu beschaffen, gelöst ist; und gerade jene sofort durchführbaren Massregeln, durch welche die schwersten hygienischen Schäden gemildert werden können, sollten zunächst ins Auge gefasst werden.

Daneben ist aber selbstverständlich consequent darauf Bedacht zu nehmen, die Wohnungsverhältnisse selbst von Grund aus zu bessern; und in dieser Beziehung werden wir ebensowohl durch hygienische wie durch sociale und moralische Motive immer wieder dazu gedrängt, das System der Miethskaserne möglichst einzuschränken und den Bau kleinerer Häuser für einzelne oder für eine beschränkte Zahl von Familien zu begünstigen. Wo aber Miethskasernen unvermeidlich sind, da ist Vorsorge zu treffen, dass die Dichtigkeit der Bewohnung nicht zu grosse wird und dass gewisse, das Wohlbefinden der Bewohner erheblich beeinflussende bauliche Einrichtungen durchgeführt werden. In dieser Richtung bedeutungsvoll ist 1) die Aufstellung regelmässiger städtischer Bebauungspläne 2) der Erlass einer Bauordnung und die Einführung einer Wohnungscontrole. 3) die planmässige Errichtung zahlreicher kleinerer Wohnhäuser.

C. Städtische Bebauungspläne.

Sobald die Erweiterung einer Stadt in Aussicht steht, muss ein bestimmter Bebauungsplan aufgestellt werden. Dabei ist von vorn herein z. B. zu erwägen, ob eine Vertheilung der Bevölkerung in der

Weise möglich sein wird, dass die Grossindustrie, Fabriken und Arbeiterquartiere in einem peripheren Theil vereinigt werden, während der Gewerbtreibenden mehr die centralen Theile, und der geistig arbeitenden Bevölkerung, welche berechtigten Anspruch auf eine gewisse Ruhe der Umgebung hat, andere periphere Abschnitte überlassen werden. Falls eine solche Trennung möglich ist, können zahlreiche, unzutragliche Collisionen vermieden werden.

Ferner ist zu erwägen, ob die neuen Stadttheile besser ihre besonderen Centren (Märkte, Bahnhöfe, Vergnügungsorte u. s. w.) erhalten und ob dadurch eine Decentralisation angestrebt werden soll; oder ob die Interessen der Stadt eine gewisse Abhängigkeit vom centralen Kern wünschenswerth machen.

Schon frühzeitig sind die Hauptstrassenzüge, Plätze, Eisenbahn und Pferdebahnhöfe festzulegen, während die Details der weiteren Eintheilung erst bei Beginn der Bauhätigkeit normirt werden.

Um weiträumige Bebauung mit Familienhäusern oder kleineren Miethhäusern möglichst zu fördern, ist eine unterschiedliche Behandlung der Bauordnungen für das Innere, für die Aussenbezirke und für die Umgebung von Städten wünschenswerth. In den neuen Stadttheilen sollte wenigstens in einzelnen Bezirken weiträumige Bebauung erfolgen und die Miethskaserne verboten sein.

Die meisten grösseren Städte haben jetzt bereits eine Zonenbauordnung, d. h. eine Abstufung der Bauordnung nach zwei oder drei Bauklassen eingeführt. Klasse I umfasst vier- und fünfgeschossige Miethhäuser, die breite und zahlreiche Strassen voraussetzen; in Klasse II sind kleinere Miethhäuser, engere Strassen, Raum für Gärten und daher grössere Häuserblocks vorzusehen; Klasse III umfasst Einfamilienhäuser und Arbeiterwohnhäuser in offener oder halboffener Bauweise und in Blöcken von geringer Tiefe, um Hinterhäuser möglichst auszuschliessen.

Für die Anlage von Strassen kommen verschiedene Gesichtspunkte in Betracht. Man unterscheidet zweckmässig zunächst Verkehrs- und Wohnstrassen. Erstere laufen vorzugsweise radial vom Verkehrscentrum nach der Peripherie; sie müssen grössere Breite, gerade Linien und rechtwinklige Kreuzungen haben. Als Wohnstrassen eignen sich hauptsächlich solche, die ringförmig verlaufen. Zwischen letzteren werden hier und da zur Verbindung von Hauptknotenpunkten breitere Diagonalstrassen angelegt. — Die von den Strassen umschlossenen Häuserblocks sollen thunlichst Rechtecke bilden, sind in Uebrigen in ihrer Form von der Oertlichkeit, in ihrer Grösse wesentlich von der Art der Bebauung (s. oben) abhängig.

Als ein mehr hygienischer Gesichtspunkt kommt für die Strassen-
 richtung in Betracht, dass dieselbe wo möglich nicht rein äquatorial
 (Nord-Ost) sein soll. Es resultirt hierbei eine ausgeprägte Schatten- und
 Sonnenseite, welche enorme Differenzen im Klima ihrer Häuser
 bewirken; bei der nach Süden gerichteten Fensterfront erfolgt im
 Sommer in Folge des Hochstandes der Sonne nur ein geringer Einfall
 des Sonnenlichts, dagegen im Winter bis weit in die Zimmer hinein
 liegen hier also die günstigsten Verhältnisse vor. Um so schlechter
 ist die Nordseite bedacht. Der Mangel an Sonne kann hier nicht
 durch die Südlage der Rückseiten ausgeglichen werden, da in
 Folge der Bauart der Häuser hier gewöhnlich nur Wirthschafts-
 räume, Treppenhäuser und Schlafzimmer liegen. — Bei meridionalen,
 Strasseneinrichtungen (Nord-Süd) ist die Insolation gleich-
 mässiger auf beide Seiten vertheilt, aber sie wirkt wegen der im
 Sommer tief in die Fenster dringenden Sonne ungünstiger wie auf der
 Südseite.

Ausserdem ist hervorgehoben, dass der meridionale Verlauf durch
 die herrschende Windrichtung nachtheilig beeinflusst wird. In Nord-
 deutschland sind äquatoriale Winde häufiger, und diese bewirken eine
 unregelmässige Ventilation in den gleichgerichteten Strassen und deren
 Häusern. Daher sollen die Strassen am günstigsten liegen, welche von
 Nord-Ost nach Süd-West resp. von Nord-Ost nach Süd-Ost gerichtet sind,
 so dass sowohl Sonne wie Wind gut ausgenutzt und möglichst gleich-
 mässig vertheilt werden. — Man wird jedoch in den seltensten Fällen allen
 hygienischen Gesichtspunkten Rechnung tragen können; und da die
 hygienischen Forderungen in dieser Beziehung wenig scharf begründet
 sind, wird man meist den technischen und künstlerischen Interessen
 die Entscheidung überlassen.

Zur Pflasterung der Strassen soll ein Material benutzt werden, das
 möglichst wenig Staub liefert, also hart und schwer zerreiblich ist. Ferner ist
 ein gleichmässiges Quergefälle, je nach dem Material 15—70 pro mille, einzu-
 halten, welches schnelles Abfliessen des Wassers und leichte Reinigung ermög-
 licht. Etwaige Zwischenräume zwischen den Pflastersteinen sollen mit fest
 zusammenhängender, nicht staubender Füllung gedichtet sein. Chaussirte Fahr-
 strassen sind in Städten ganz zu verwerfen. — Zur Schonung des Pflasters ist es
 wichtig, dass nicht bei jeder Reparatur von Wasser-, Gas-, Telephonleitungen u. s. w.
 der Pflaster der Fahrstrasse aufgerissen werden muss. Um das zu erreichen,
 so man jene Leitungen entweder in besondere unterirdische Tunnel (theuer);
 oder man bringt sie unter der Decke der grösseren Abzugsanlässe an; oder
 so man verlegt sie in eine Kiesbettung unter dem Fusssteig und macht sie da-
 durch viel leichter zugänglich. — Ueber die Ausführung der Wasserversor-
 gung, der Anlagen zur Entfernung der Abfallstoffe siehe in den folgen-
 den Kapiteln.

Von grosser Bedeutung sind zahlreiche mit Bäumen, Gärten und Anlagen versehene freie Plätze (Verkehrs-, Nutz-, Architekturplätze). Nicht als ob durch die wenigen Bäume irgendwelche nennenswerthe Verbesserung der Luft bewirkt werden könnte; sondern, abgesehen von dem wohlthuenden Eindruck solcher Unterbrechungen des Häusermeeres auf Auge und Stimmung, liegt ihr Werth vorzugsweise darin, dass sie den Umwohnern Gelegenheit bieten, mit wenig Aufwand an Zeit einzeln Tagesstunden im Freien zuzubringen und namentlich im Sommer sich von der Hitze der Arbeitsräume und Wohnungen zu erholen. Für Kinder in den ersten Lebensjahren bildet eine solche Möglichkeit zum Verweilen im Freien ein wichtiges Mittel, um die Gefahr der mörderischen Krankheiten der Sommermonate zu verringern; und nicht minder kann das Herumtummeln der heranwachsenden Kinder auf freien Plätzen manchen krankhaften Störungen vorbeugen.

Mit Rücksicht auf diesen Einfluss der freien Plätze sollten dieselben in grosser Zahl und möglicher Vertheilung vorhanden sein. Wenige grössere Anlagen bieten bei weitem nicht die gleichen Vortheile, weil die entfernter Wohnenden nur selten Zeit und Gelegenheit zum Besuche derselben finden. Ferner ist bei dem Arrangement der Plätze darauf Bedacht zu nehmen, dass sie nicht als Zierrath dienen, sondern in erster Linie den Anwohnern längeren Aufenthalt ermöglichen und so hygienischen Nutzen bringen.

Bezüglich der Unterhaltung der Strassen und Plätze hat die Hygiene eine sorgfältige Reinigung und bei austrocknender Luft reichliche Besprengung mit Wasser zu fordern; erstere, um Infektionen von der Bodenoberfläche aus nach Möglichkeit einzuschränken; letztere, um die Belästigung der Athmung durch staubige Luft zu hindern.

D. Bauordnung und Wohnungscontrole.

Die Bauordnungen sollen der Einsturz- und Feuersgefahr der Gebäude Rechnung tragen, jeder Wohnung genügend Luft und Licht zu schaffen und dem übermässigen Zusammendrängen der Menschen vorzubeugen suchen. Sie enthalten vorzugsweise folgende Vorschriften:

a) Ein gewisser Bruchtheil des Grundstücks muss als Hof- und Gartenraum übrig bleiben; derselbe soll im Verhältniss stehen zu Grösse des Grundstücks und wird meist auf ein Drittel des Baulandnormirt.

b) Bezüglich der Bauflucht wird verlangt, dass die Gebäude entweder die Strassenlinie genau einhalten, oder es wird ein Zurückweichen hinter die Fluchtlinie bis zu 3 m gestattet. Im hygienischen

teresse ist ein stärkeres Zurückweichen um 10—20 m weit mehr erwünscht, da dann erst die entstehenden Vorgärten für die Bewohner des Hauses wirklich benutzbar werden.

c) Zahlreiche Bestimmungen regulieren den Abstand der Gebäude an einander.

Bezüglich des seitlichen Abstandes wird unterschieden zwischen geschlossener Bauweise, Bauten mit geringen Abständen, und offener Bauweise (Pavillonsystem). Bei der geschlossenen Bauweise müssen stets Brandmauern, d. h. massive Mauern ohne jede Öffnung die Häuser verbinden. Ist ein Abstand zwischen zwei Häusern vorhanden, so muss, falls derselbe unter 5 m beträgt, mindestens eine Mauer als Brandmauer fungieren; geht der Abstand über 5 m hinaus, so dürfen beiderseits Öffnungen angelegt werden.

Diese mit wenig Ausnahmen noch jetzt geltenden Bestimmungen, die vorzugsweise die Feuersicherheit berücksichtigen, befriedigen nicht vom hygienischen Standpunkt. Die kleinen Abstände unter 5 m sind zu verwerfen, weil auch dann, wenn beiderseits Brandmauern sie begrenzen, Winkel zu entstehen pflegen, die zur Ablagerung von allerlei Staubstoffen dienen. Beträgt aber der Abstand wenig über 5 m und haben dann die Mauern Fenster, so ist nicht daran zu denken, dass auch dieselben die dort gelegenen Zimmer genügend Luft und Licht halten. Man muss dann wenigstens verlangen, dass für diese Zimmer auch andere Licht- und Luftöffnungen existieren, oder dass die betreffenden Räume nicht zum Wohnen benutzt werden. Erst dann, wenn der seitliche Abstand ungefähr der Haushöhe gleichkommt, ist auf eine reichende Luft- und Lichtzufuhr zu rechnen. Andernfalls ist auf genügende Abstände ganz zu verzichten und die geschlossene Bauweise zu empfehlen.

Vom gegenüberliegenden Hause soll die Front mindestens um die Haushöhe entfernt sein. Man bezeichnet diese Forderung gewöhnlich durch die Formel $h = b$ (Höhe = Strassenbreite). h rechnet man zur Dachtraufe; sind die Dächer sehr steil und ihr Neigungswinkel grösser als 45° , so ist $b = h + x$ zu rechnen, wo x eine Constante, B. 6 m, bedeutet. — Bei Aufstellung dieser Formel ist offenbar nur auf Bedacht genommen, dass das diffuse Tageslicht bis zur Sohle der Vorderfläche des Hauses gelangt (s. Fig. 96). Sollen die Parterrezimmer aber auch noch bis in eine gewisse Tiefe Himmelslicht erhalten, oder wird eine gewisse Dauer der Insolation der Hausfront gefordert, so ist ein erheblich grösserer Abstand der Fronten ($b = h + \frac{h}{2}$) nothwendig unter „Beleuchtung“).

Für Hinterhäuser sollte die Regel $h = b$ gelten.

d) Die Höhe der Häuser ist zwar schon durch die Bestimmung über das Verhältniss zwischen Haushöhe und Strassenbreite in gewisser Weise limitirt. Es ist aber zweckmässig, ausserdem für den Fall, dass sehr breite Strassen existiren, eine maximale Höhe des Hauses (von etwa 20 m) festzusetzen, da mit der Höhe des Hauses die Sommertemperaturen innerhalb der Wohnungen sich steigern, da durch dieselbe ferner die Massenansammlung von Menschen begünstigt wird, und da die Statistik in bestimmter Weise einen schädlichen Einfluss der hochgelegenen Wohnungen auf Todt- und Fehlgeburten nachgewiesen hat




Fig. 96.

e) Damit der Häuser-Speculant nicht durch zahlreiche niedrige Stockwerke sich für die Beschränkung der Höhe schadlos zu halten sucht, muss die Zahl der Stockwerke auf höchstens fünf oder aber die minimale lichte Höhe der bewohnten Räume auf mindestens $2\frac{1}{2}$ —3 m festgesetzt werden.

f) Sehr wichtig sind Bestimmungen, welche die Grösse der bewohnten Räume nach der Bewohnerzahl normiren (mindestens 10 cbm Luft-raum für jeden Erwachsenen, 5 cbm für jedes Kind unter 10 Jahren), und ausreichend Licht und Luft dadurch garantiren, dass für jeden bewohnten Raum bewegliche, nach aussen führende Fenster vorgeschrieben werden, deren Fläche mindestens $= \frac{1}{12}$ der Bodenfläche beträgt.

Eine Inspektion der vorhandenen Wohnungen ist in den letzten Jahren in verschiedenen Städten und Regierungsbezirken eingerichtet, im Regierungsbezirk Münster 1891, in Posen 1892, im Regierungsbezirk Düsseldorf 1895, in Dresden 1898, Hamburg 1898, Essen 1899. den Polizei-Verordnungen werden „ungeeignete“ und „überfüllte“ Wohnungen unterschieden; für ersteres Prädikat sollen Abnormitäten: Luft- und Lichtlieferung, der Fenster, der Abortanlagen, der Wasserversorgung, sowie abnorme Feuchtigkeit massgebend sein. Die Methoden zur Prüfung auf diese Abnormitäten sind übrigens nicht genügend festgelegt. — Die Ueberfüllung wird nach dem auf den einzelnen Bewohner entfallenden Luftraum (s. oben) beurtheilt; ferner sind namentlich beschränkende Bestimmungen über Schlafleute, Kosten und Quartiergänger aufgenommen. Als Beispiel diene die im Folgenden auszugsweise wiedergegebene Verordnung für den Regierungsbezirk Düsseldorf:

§ 1. Niemand darf ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde in Wohnungen, welche sich in von 2 oder mehr Familien bewohnten Häusern befinden, selbst als Eigenthümer oder Besitzer einziehen, oder eine Familie zur Miete oder Aftermiethe aufnehmen, sobald diese Wohnung polizeilich als zum Wohnen ungeeignet (§ 2) oder als überfüllt (§ 3) bezeichnet worden ist.

§ 2. Als zum Bewohnen ungeeignet können von der Ortspolizeibehörde diejenigen Wohnungen bezeichnet werden, welche den nachstehenden Anforderungen nicht entsprechen:

1) Alle Schlafräume müssen mit einer Thür verschliessbar und mindestens einem unmittelbar in's Freie führenden aufschliessbaren Fenster versehen sein, dessen Grösse nicht geringer als der 12. Theil der Fussbodenfläche sein darf.

2) Speicherräume sind nur als Schlafräume zulässig, wenn sie verputzte Wände mit Holz verkleidete Wände haben.

3) Der Fussboden der Schlafräume muss durch gute und dauerhafte Holzbohlen oder anderweitige, zweckmässige Vorrichtung (Estrich, Plattenbelag u. s. w.) vom Erdboden getrennt sein.

4) Die Schlafräume dürfen nicht mit Abtritten in offener Verbindung mit dem Aussen sein.

5) Bei jedem Hause muss mindestens ein direkt zugänglicher, verschliessbarer, allen Bewohnern des Hauses zur Benutzung freistehender Abort vorhanden sein.

6) Eine genügende Versorgung der Wohnung mit gesundem Wasser muss gesichert sein.

§ 3. Als überfüllt können von der Ortspolizeibehörde diejenigen Wohnungen bezeichnet werden, welche nachstehenden Anforderungen nicht entsprechen:

1) Die Schlafräume einer jeden Wohnung müssen für jede zur Hausangehörige, über 10 Jahre alte Person mindestens 10 cbm Luftraum, jedes Kind unter 10 Jahren mindestens 5 cbm Luftraum enthalten.

Kinder, welche das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bleiben ausser Betracht.

2) Die Schlafräume müssen derart beschaffen sein, dass die ledigen, über 14 Jahre alten Personen nach dem Geschlecht getrennt in besonderen Räumen oder Abschlüssen schlafen können, und dass jedes Ehepaar für sich und seine noch nicht 14jährigen Kinder einen besonderen Schlafraum oder doch einen besonderen Abschlag im Schlafraum besitzt.

§ 4. Abweichungen von den in § 2 und § 3 aufgestellten Anforderungen kann die Ortspolizeibehörde in besonders gearteten Fällen gestatten.

§ 5. Jede Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung wird mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, im Unvermögensfalle mit verhältnissmässiger Haft bestraft.

Die ausführenden Organe der Wohnungsaufsicht sind in manchen Orten die Polizeiorgane; zweckmässiger erscheint es, entweder eine besondere „städtische Behörde für Wohnungspflege“ zu begründen (Hamburg), in der ein Wohnungsinspektor, einige Kreisärzte und eine Anzahl ehrenamtlich fungirender Bürger mitwirken; oder die Wohnungscontrolle wird den durch das neue Kreisarztgesetz vorgesehenen städtischen Gesundheits-Kommissionen übertragen.

Ein sofortiges Eingreifen der Wohnungspolizei ist in vielen Fällen nicht durchführbar, weil die Insassen der überfüllten und ungeeigneten Wohnungen nicht ohne grösseren Kostenaufwand zweckentsprechender untergebracht werden können, oder weil eine Reduktion der Schlafgäste und Kostgänger den Vermiethern ihren einzigen Erwerb schmälert. Meist ist daher nur bei der Aufnahme neuer Miether bezw. bei der Einrichtung neuer Schlafstellen ein Eingreifen möglich. Der allmähliche erhebliche Vortheil einer derartigen Controlle steht trotzdem ausser Frage. — In England nehmen städtische Logirhäuser Familien, die aus überfüllten Wohnungen delogirt werden, auf; eine Einrichtung, die auch bei uns Nachahmung zu finden verdient.

E. Der Bauplan für ein Wohnhaus.

Für grössere Miethhäuser variirt der Bauplan je nach dem Charakter des Stadttheils, der Strassenlage, dem Miethpreis der Wohnungen, nach deren Zahl und nach besonderen örtlichen Verhältnissen. Meist wird das Princip der möglichsten Ausnutzung des Raums befolgt, so dass es knapp an der Läsion der Bauordnung hergeht; insbesondere werden Hof und Gartenraum auf das gesetzlich niedrigste Maass beschränkt. Zahlreiche Räume pflegen ungünstig belichtet und der Luft wenig zugänglich zu sein. Unrichtigerweise werden die hellen Vorderzimmer vielfach als „Salons“ ausgestattet und die ungünstigeren Hinterzimmer als Schlaf- und Kinderzimmer. Sehr mangelhaft sind häufig die Schlafräume für die Dienstboten. Selbst in eleganten Wohnungen

es ferner an den hygienisch so wichtigen zweckmässigen Aufenthaltsräumen für Speisen. Die Aborte sind vielfach vom Haupt- des Korridors oder vom Treppenhaus zugänglich und ungenügend lirt.

Alle diese Verhältnisse werden erheblich günstiger, wenn auf n Bauterrain, welches durch den Bebauungsplan für höchstens




Fig. 97 a.

schossige Häuser mit offener Bauweise festgelegt ist, Miethhäuser tet werden, die nur eine kleine Anzahl von Familien auf- en. Der Werth der Grundstücke ist dann so viel niedriger, dass esitzer nicht in dem Maasse wie in der vorerwähnten Bauklasse




Fig. 97 b.

raum auszunutzen braucht. Dementsprechend treten die hygienischen el zurück.


Noch günstiger liegen die Verhältnisse beim Einfamilienhaus. besser situierte Familien variirt hier der Bauplan je nach der se der Familie und nach der Zahl und Ausstattung der Räume be- end. Ein gewisses Schema wird in den nordamerikanischen Vorstädten halten. Die „3000-Dollar“-Häuser (Fig. 97 a u. b.) enthalten dort im eschoss Vorraum, Wohnzimmer und Esszimmer, im oberen Geschoss Schlafräume, in einem besonderen an das Esszimmer anstossenden

Einzelnen mit separaten Eingängen die Küche und Speisekammer. Je nach Bedarf kann dieser verschiedenen praktischen Grundriss erweisen werden.

Generell gehen die Bestrebungen dahin, den Raum für Arbeiter Familienhäuser herzustellen. Der Raum kann ausserordentlich reichlicher, mindestens doppelt so hoch pro Bewohner, bemessen werden, als im städtischen Miethhaus. Für jede Familie ist eine Küche mit zweckmässigem Speiseschrank, ein Wohnzimmer und ein oder zwei Schlafzimmer als Minimum vorzusehen; ferner etwas Bodenraum, ein Abort, unter Umständen ein kleiner Stall. Ein Zuviel von Räumen verführt zu Altervermietung und Schlafburschenwesen. Zu grosse Räume erfordern zu viel Heizung und Reinigung. Besondere Ventilationsvorrichtungen sind unnötig; der Arbeiter pflegt sie stets ausser Funktion zu setzen. Der Wasserbezug und die Beseitigung der Abwässer muss nach Möglichkeit erleichtert sein.

Die Häuser sind in offener oder halboffener Bauweise auf dem Terrain so zu vertheilen, dass schematische Regelmässigkeit und uniformes Aussehen nach Möglichkeit vermieden wird, und dass zahlreiche Unterbrechungen der Häuserreihen durch Plätze und Anlagen geschaffen werden.

Nicht immer ist für jede Familie ein einzelnes Haus zu ermöglichen. Vielmehr sind auch zwei, vier und mehr Familien in einem




Grundriss eines Arbeiterhauses

Grundriss eines Arbeiterhauses, das so zu gestalten, dass die Familien vermieden werden können, die in der Nähe der Häuser stehen bleiben kann.

Grundriss eines Arbeiterhauses, das so zu gestalten, dass die Familien vermieden werden können, die in der Nähe der Häuser stehen bleiben kann. Grundriss eines Arbeiterhauses, das so zu gestalten, dass die Familien vermieden werden können, die in der Nähe der Häuser stehen bleiben kann.

nd b gezeichnete Grundriss. Das Haus hat die Eingänge einander an der Strassenfront, sondern an den entgegen-



99 a u. b. Doppelhaus.




Fig. 100. Doppelhaus (Erdgeschoss).




Fig. 101. Doppelhaus (Obergeschoss).

iten, so dass die Bewohner möglichst wenig in Berührung
ter dem Hause liegt ein kleines Gebäude für Stall und
nter Gartenland, jede
der anderen durch
chieden. Die Kosten
Doppelhauses betragen
100 Mark. — Oder der
ere Grundriss Fig. 100

er ersten Arbeiterkolo-
n die in Mülhausen im
aten Vierhäuser; bei
vier quadratische ein-
user so vereinigt sind,

grösseres Quadrat bilden. Fig. 102 zeigt einen Strassen-
solchen Häuservirecken, deren jedes von einem Garten-




Fig. 102. Arbeiterquartier in Mülhausen i. E.

viereck umgeben ist; jedes Viertel umfasst einen Flächenraum von circa 180 qm. Die Gärten (theils Zier-, theils Gemüsegarten, theils Wirthschaftshof) sind durch Zäune und lebende Hecken getrennt.




Fig. 108. Grundriss der Mühlhäuser Vierhäuser.

Der Grundriss (Fig. 103) zeigt im Erdgeschoss die Küche (durch dieselbe erfolgt der Eingang) und ein Wohnzimmer, im oberen Stock-




Fig. 104. Vierfamilienhaus.




Fig. 105. Vierfamilienhaus.




Fig. 106. Reihenhaus.

werk zwei Schlafkammern. Die Baukosten betragen etwa 2000 Mark. Ein anderes zweckmässig angeordnetes Vierfamilienhaus zeigen die Figg. 104 und 105.

Noch etwas billiger stellen sich die Reihenhäuser, welche in einer geschlossenen Reihe eine grössere Anzahl von zweigeschossigen Familienhäusern vereinigen (Fig. 106). Hof- und Gartenraum sind falls für jede Familie abgegrenzt.

Der Bau aller derartiger Arbeiterhäuser erfolgt fast nur unter Wirkung der Arbeitgeber oder gemeinnütziger Gesellschaften. Oft wird dabei beabsichtigt, den Arbeiter das Haus wo möglich als Eigenthum erwerben zu lassen; und dies kann dadurch geschehen, dass

Baudarlehen zinsfrei bzw. gegen niedrigen Zinsfuss oder Bauprämien gewährt werden, dass aber der Arbeiter dann nach gegebenen Vorschriften den Bau ausführt. Oder der Arbeitgeber baut Häuser, vermietet sie an Arbeiter, diese können aber durch allmähliche Tilgung der Baukosten das Haus als Eigenthum erwerben. Mülhausen im Elsass. z. B. kostete das Einfamilienhaus 2640 Mark zugehöriger Gartenfläche. Bei Unterzeichnung des Kaufkontrakts werden 160—240 Mark eingezahlt; die Miete betrug monatlich 40 Mark. Wurden statt dessen monatlich 20 Mark bezahlt, so war

Miether nach etwa 17 Jahren Eigenthümer des Hauses. — Der Schwerpunkt der Eigenthums-Erwerbung ist besonders von einigen staatlichen Arbeitgebern durchgeführt; der Bergfiskus hat namentlich grosse Summen als Bauprämien und unverzinsliche Darlehen an bauwillige Arbeiter aufgewendet, so dass von den Arbeitern der Staatswerke in Saarbrücken 42 Procent, in Halle 27 Procent, im Oberbergbau 27 Procent Hauseigenthümer sind. Von anderen Arbeitgebern und von gemeinnützigen Baugenossenschaften ist dies Princip seltener verfolgt, weil die als Eigenthum erworbenen Häuser unter manchen Verhältnissen leicht vom Arbeiter veräussert werden, in Spekulationshände übergehen und dadurch ihrer eigentlichen Bestimmung entzogen werden können.

Meistens werden daher die Arbeiter nur Miether des vom Arbeitgeber oder von Genossenschaften erbauten und diesen gehörigen Einfamilienhauses; indess können die Miethsverträge derart sein, dass der Miether keinen Wechsel zu gewärtigen haben und fast ganz die Vortheile des eigenen Besitzes geniessen, wenn z. B. eine Kündigung oder eine Miethssteigerung ausgeschlossen wird, so lange

der Miether seinen Verpflichtungen nachkommt (Hannoverscher Spar- und Bauverein). — Vielfach sind solche Arbeiterhäuser von staatlichen Behörden (Eisenbahnfiskus) hergestellt; von Gemeinden bisher nur in beschränktem Umfang. Sehr zahlreiche Arbeiterkolonien sind von privaten Arbeitgebern errichtet; hier sei nur auf die Firma Krupp hingewiesen, welche bereits für mehr als 12 Millionen Mark

Arbeiterwohnungen gebaut hat und das Baukapital nur mit etwa 2 Procent verzinst erhält. Ferner haben viele gemeinnützige Gesellschaften, neuerdings auch solche, die aus der Arbeiterschaft selbst gebildet sind, den Bau geeigneter Wohnungen übernommen; diese Baugenossenschaften sind oft sehr wesentlich dadurch unterstützt, dass ihnen billige Creditquellen (z. B. von den Altersversicherungsanstalten) eröffnet sind.

Die Herstellung kleinerer Familienhäuser ist indess naturgemäss nur da nützlich, wo die Preise für Grund und Boden entsprechend niedrig sind. Auf grossen Gebietstheilen in den Aussenbezirken der Städte ist in den letzten Jahren eine solche Bebauung durch die starke Preissteigerung für Grund und Boden unmöglich geworden. In dieser Beziehung muss in Zukunft vorgebeugt werden:

1) durch baupolizeiliche Bestimmungen, namentlich bezüglich der Ausnutzbarkeit der Grundstücke.

2) Durch rechtzeitige Durchführung von Fluchtlinienplänen, so dass die Zahl der am Markt befindlichen Grundstücke möglichst gesteigert wird. Wo die Zersplitterung des Grundbesitzes die Fluchtlinienpläne hindert, muss die Gemeinde das Recht haben zur Umlegung der Grundstücke (Lex ADICKES).

3) Durch Besteuerung des unbebauten Geländes, so dass die Zurückhaltung desselben aus speculativen Absichten durch die Grundsteuer unprofitabel wird.

4) Durch möglichste Erweiterung des communalen Grundbesitzes und Verwaltung desselben im Sinne einer rationellen Bauthätigkeit.

5) Durch Kreditgewährung seitens der Gemeinde an geeignete Baugenossenschaften (communale Baukasse).

Auf zahlreichen Wegen wird somit vorgegangen, um die Wohnungszustände namentlich für die arbeitende Bevölkerung zu bessern; und es ist nicht zu bezweifeln, dass auf diesem Gebiete in den nächsten Jahren mächtige Fortschritte zu verzeichnen sein werden.

Litteratur: BARNHART, Siedlerweiterungen u. s. w., Berlin 1874. — FITZ, Anlage von Ortschaften in v. FORTENLORENZ's und v. ZIMMER's Handbuch der Hygiene, Leipzig 1882. — Verhandlungen des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege 1888, 1891, 1893 und 1900. — STRASSER, Der Städtebau, im Handb. der Architektur, 1891. — STRASSER, Hygiene des Städtebaus, in WIRTH's Handbuch der Hygiene, 1896. — NUSBAUM, Das Wohnhaus, Ebenda 1896. STRASSER, ADICKES, ALBRECHT u. A. in „Neue Untersuchungen über die Wohnungszustände“, herausgeg. vom Verein für Socialpolitik, Leipzig 1901.

II. Fundamentirung und Bau des Hauses.

1) Des Fundament soll das Haus gegen den Boden wasser- und feucht abschliessen. Wasserdicht deshalb, weil sonst das Bodenvasser sowohl von unten wie von der Seite her in die porösen Bausteine eindringt, in diesen capillar in die Höhe steigen und die Keller und unteren Stockwerke feucht halten kann. Ist der Boden unrein, werden gleichzeitig die Verunreinigungen mit dem Wasser in die Höhe geführt und es kommt zur Bildung von sogenanntem Mauerlpeter.

Die Dichtung der Mauern lässt sich leicht erreichen durch Einlegen einer Asphaltschicht (A, Fig. 107 und 108) oder einer Schicht von




Fig. 107. Hausfundament.
A Asphaltschicht. L Luftraum zwischen
Hauptmauer und Vormauer.




Fig. 108. Hausfundament.
A Asphaltschicht. G Umlaufender Graben.
K Wasserablauf.

geglazierten Klinkern auf die sogenannte Abgleichungsschicht der Fundamente. Um aber auch das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit zu hindern, werden entweder die Seiten der Fundamentmauer stark mit Asphalttheer, besser mit geschmolzenem Ceresin oder Paraffin, imprägnirt, oder es wird eine 12 cm starke Vormauer aus Ziegelsteinen mit Cementmörtel in einer Entfernung von 6—7 cm vom Kellermauerwerk aufgeführt, mit sogenannten Einbindern versehen und oben abgedeckt (Fig. 107). In einigen Städten besteht die nachahmenswerthe Vorschrift, dass ein offener Graben von 1—2 Fuss Weite die Fundamente des ganzen Wohnhauses umgiebt; derselbe führt dann gleichzeitig dem Kellerraum in reichlicherem Maasse Luft und Licht zu (Fig. 108 und

macht diesen für Wohnungen benutzbar. Die ganze Kellersohle ist ausserdem wasser- und luftdicht mit Asphalt und mit einer Isolirschiicht herzustellen.

Der geschilderte dichte Abschluss schützt das Haus auch gegen etwaiges Aufsteigen von Bodenluft. Wenn letztere auch nicht, wie man früher annahm, infektiöse Keime in's Haus zu führen vermag, so kann doch leicht eine übelriechende, stark mit Kohlensäure oder gar mit giftigem Leuchtgas beladene Luft vom Boden her in das Haus eindringen, und da eine Durchlässigkeit des Materials hier keinesfalls irgendwelchen Nutzen hat, so ist das Princip der vollkommenen Dichtung so viel als möglich durchzuführen.

2) Die Seitenwände des Hauses. Bezüglich des Materials und der Construction der Seitenwände kommt in Betracht a) die Durchlässigkeit des Materials für Luft; b) seine Aufsaugungsfähigkeit für Wasser; c) die Wärmeleitung und Wärmecapacität des Materials; ferner d) die Dicke der Mauern und e) ihre Wasseraufnahme beim Bau.

a) Früher hielt man eine grössere Durchlässigkeit des Materials für hygienisch vorthellhaft in der Annahme, dass ein wesentlicher Theil der Luftzufuhr zum Wohnraum durch die Poren der Mauern erfolge, und dass dieser Luftwechsel gerade dadurch, dass er sich unmerklich vollzieht und dass die Luft dabei auf die Wandtemperatur erwärmt wird, besonders werthvoll sei.

Die Existenz einer solchen Poren-Ventilation wurde durch zwei Experimente bewiesen; erstens wurde gezeigt, dass der Luftwechsel in einem Zimmer, dessen Fugen, Ritzen und sonstige Undichtigkeiten sorgfältig verklebt werden, immer noch sehr beträchtlich ist, obwohl er sich nunmehr nur durch die Poren der Begrenzungen des Zimmers vollziehen kann. — Derselbe Versuch ist indess später vielfach mit anderem Erfolg wiederholt worden. Sorgt man für dauernd dichten Verschluss aller Ritzen und Fugen und dichtet ausserdem noch Fussboden und Decke des Zimmers, so sinkt der Luftwechsel in dem betreffenden Raum unter gewöhnlichen Verhältnissen auf 0 herab. Nur bei sehr heftigen Winden ist eine geringfügige Ventilation bemerkbar.

Das zweite Experiment bestand darin, dass eine Glasröhre auf die beiden gegenüberliegenden Seiten eines Backsteines aufge kittet und dann die übrige Fläche des Backsteines mit Paraffin oder Theer gedichtet wurde. Es gelingt dann durch Einblasen von Luft in das Glasrohr durch den Backstein hindurch z. B. ein Licht auszublasen. — Nun beträgt aber der Expirationsdruck beim Blasen leicht 10–20 cm Quecksilber = 1300–2600 kg pro 1 qm Fläche. Mässiger Wind liefert dagegen nur einen Druck von 1–5 kg, starker Wind einen Druck von 20 kg, Sturm einen solchen von 100 kg pro 1 qm, so dass also aus diesem an einem sehr kleinen Querschnitt angestellten Experiment noch keine Folgerungen für den unter dem Winddruck oder durch Temperaturdifferenzen bewirkten Luftdurchgang durch den Stein zu ziehen sind.

Später ist dann die Durchlässigkeit der Steine für Luft genauer quantitativ geprüft. Dabei stellte es sich heraus, dass je nach dem Material bei einem Druck von 1 mm Wasser oder von 1 kg pro Quadratmeter nur 5—50 Liter Luft pro Stunde und pro Quadratmeter Wandfläche passiren; dies macht für ein Zimmer mit 14 qm Aussenwand und für mittleren Wind von 3 kg Druck 2—2.0 cbm stündlicher Luftzufuhr, während der Luftbedarf für ein solches Zimmer mindestens 60 cbm pro Stunde beträgt. Ausserdem fand sich, dass die Bekleidung der inneren Wandfläche noch in wechselndem, meist aber sehr erheblichem Grade die Durchlässigkeit herabsetzt; und zwar schon ein Anstrich mit Kalk- oder Leimfarbe, noch mehr ein Tapetenüberzug und wiederum mehr ein Oelfarbenanstrich. Ferner wird die Durchlässigkeit wesentlich geändert durch Befeuchtung des Steins; je nach der Feinheit der Poren tritt hier eine Abnahme um 15—90 Procent ein.

Die Luftzufuhr durch das Baumaterial stellt sich daher für die gewöhnlich vorliegenden Verhältnisse, mässigen Wind, der nicht gerade senkrecht auf die Mauern auftritt, und geringe Temperaturdifferenzen als völlig illusorisch heraus. Nur in einem Fall vermag dieselbe eine nennenswerthe Luftmenge zu fördern, nämlich bei direct auftreffenden heftigen Winden. Dann aber vermitteln schon die zufälligen Undichtheiten der Fenster und Thüren einen mehr als erwünschten Luftwechsel, so dass wir der Poren-Ventilation und einer Durchlässigkeit des Baumaterials für Luft völlig entrathen können.

Uebrigens ergibt sich folgende Reihenfolge für die Permeabilität der Baumaterialien für Luft: am durchlässigsten ist Kalk-Tuffstein; dann folgt Fichtenholz (Querschnitt); dann Luftmörtel, schwach gebrannter Ziegel, stark gebrannter Ziegel, unglasirter Klinker, Portlandement, grüner Sandstein, Eichenholz (Querschnitt), Gyps (gegossen), glasirter Klinker.

b) Auch bezüglich der Aufsaugungsfähigkeit für Wasser hatte man früher unrichtige Vorstellungen. Man glaubte, dass die Mauer durchaus porös und im Stande sein müssten, etwaiges an den Mauer Wandungen der Wohnräume condensirtes Wasser aufzusaugen und allmählich wieder zu verdunsten; dadurch sollen die Wände trocken erhalten werden, während dieselben bei wasserdichtem Material leicht nass werden (triefen).

Eine derartige Condensation von Wasserdampf soll indess in normalen Wohnräumen nicht vorkommen. Ist durch stärkere Anwesenheit von Menschen oder durch Kochen, Waschen u. s. w. sehr viel Wasserdampf producirt, so ist derselbe zunächst durch Lüftung zu entfernen; reicht diese nicht aus, so findet eine Regulirung durch Condensation an den Fensterflächen statt. Erst wenn auch dann noch ein weiterer Ueberschuss von Wasserdampf vorhanden ist, erfolgt Conden-

sation an der kältesten Wandfläche; am erheblichsten und besonders leicht, wenn etwa eine freistehende, dünne und gut wärmeleitende, z. B. nach Norden gerichtete und stark abstrahlende Wand vorliegt. Metalle, nicht poröse Schlacksteine u. s. w. bilden wegen ihrer guten Wärmeleitung ein besonders zur Condensation disponirendes Material.

Das Feuchtwerden der Wände durch Condensation des im Wohnraum entwickelten Wasserdampfs ist aber eine bei geeigneter Vorsicht vermeidbare Erscheinung, auf welche bei der Auswahl des Baumaterials höchstens insofern Rücksicht genommen zu werden braucht, als man gut wärmeleitendes Material vermeiden muss.

Ausserdem ist aber auch die andere Seite der Mauer zu berücksichtigen. Hier ist gerade das aufsaugungsfähige Material leicht von Nachtheil, weil auftreffende Niederschläge die Wand wiederholt bis in eine gewisse Tiefe durchfeuchten. Das eingedrungene Wasser verdunstet allmählich wieder; dabei findet ein bedeutender Wärmeverbrauch statt und die unter die Norm abgekühlte Wand vermag dann wieder zu Condensation Anlass zu geben.

Demnach haben wir keinerlei Grund, ein für Wasser durchgängiges Baumaterial zu bevorzugen, vielmehr ist eine wasserdichte Oberfläche an der inneren Seite nicht von Nachtheil, an der Aussenseite von entschiedenem Vortheil.

c) Die Baumaterialien sollen schlechte Wärmeleiter sein und geringe Wärmecapacität besitzen, weil alsdann die Regulirung der Temperatur des Hauses wesentlich erleichtert wird. Das schlecht leitende Material hindert im Winter eine zu rasche Entwärmung, im Sommer eine zu schnelle Erwärmung des Hauses. Dichtes Material, Metall, massive Steine leiten die Wärme am besten, Holz am schlechtesten. Unter den Steinen sind die porösen, lufthaltigen (Tuffsteine) die schlechtesten Wärmeleiter. — Absichtlich eingelagerte besondere Luftschichten setzen die Wärmeleitung einer Mauer nach neueren Untersuchungen wenig herab, dagegen bildet sich Schwitzwasser in den Hohlräumen. Letztere sind daher besser mit Kieselguhr, Korkabfällen oder Sand zu füllen.

Bezüglich der Wärmecapacität bieten wiederum die lufthaltigen leichten Baumaterialien insofern einen gewissen Vortheil, als es dann geringerer Wärmemengen bedarf, um die Temperatur der Wände um ein bestimmtes Maass zu ändern. Sollen z. B. 80 cbm Mauerwerk (ein kleines Familienhaus) von 0° auf 15° erwärmt werden, so braucht man bei Sandsteinmauern 353 000 Wärmeeinheiten, und zu deren Entwicklung 53 kg Kohle; bei Ziegelmauerwerk 219 000 Wärmeeinheiten = 33 kg Kohle, bei Hohlziegeln nur 122 000 Wärmeeinheiten = 18 kg Kohle.

Nebenbei gewährt lufthaltiges Baumaterial, insbesondere extraporöse Ziegel, noch finanzielle Vortheile, indem die Mauern dabei leichter werden und dem ganzen Bau und namentlich den Fundamenten eine geringere Wandstärke und Festigkeit gegeben werden darf.

Lufthaltige Mauern sind daher aus den letztangeführten Gründen entschieden zu bevorzugen, nur ist es nicht nothwendig, dass sie gleichzeitig für Luft und Wasser durchgängig sind. Vielmehr werden sie, nachdem sie trocken geworden sind, am besten innen und aussen mit einer undurchlässigen Deckung versehen. Nach aussen bietet ein Belag mit Schindeln, Schiefer, Dachziegeln, oder Verputz mit Gyps und Wasserglas bezw. ein Anstrich mit Oelfarbe, oder eine Verblendschicht aus undurchlässigem Material Schutz gegen die Durchfeuchtung der Wände; an der Innenseite gewährt Oelfarbenanstrich die Möglichkeit einer leichteren Reinigung und Desinfektion der Wände.

d) Dicke der Mauern. Die Mauern werden entweder massiv oder aus Fachwerk, d. h. mit Einlage von Balken (oder in Eisenconstruction), hergestellt. Die Baugesetze schreiben vor, dass massive Mauern von 3—4stöckigen Häusern im Parterre $2\frac{1}{2}$ Stein = 62 cm stark sein sollen, im ersten und zweiten Stock 50 cm, im dritten und vierten Stock 38 cm. — Bei Fachwerk-Häusern sind die Mauern erheblich dünner; sie müssen bis zum ersten Stockwerk eine Dicke von 25 cm, im zweiten eine solche von nur $12\frac{1}{2}$ cm haben. Diese verschiedene Dicke der Mauern ist für die Temperatur-Regulirung des Hauses von grosser Bedeutung. — Bei sehr dicken Mauern ist innen eine besondere Schicht aus extraporösen Ziegeln erwünscht, auf welche nach aussen zunächst ein mit porösem Füllmaterial gefüllter Hohlraum folgt. Diese Schicht trocknet dann leichter und heizt sich schneller an. — Bei Fachwerkbauten, ferner zur Herstellung der Innenwände können Gypsdielen (Gyps mit Rohreinlage), Rabitzputz (Geflecht von verzinktem Eisendraht mit Gypsfüllung), oder feuersichere Moniertafeln (mit Eisenstäben versteiftes Geflecht von Eisendraht, das mit Cementmörtel beworfen ist) und ähnliche künstliche Präparate verwendet werden.

3) Die Zwischenböden. Die richtige Construction der Zwischenböden ist sehr beachtenswerth. Zwischen dem Fussboden der oberen und der Decke der unteren Etagen bleiben Räume frei, welche durch die zwischenlaufenden Balken abgetheilt werden. Diese Hohlräume werden mit porösem unverbrennlichen Material gefüllt, um der Schall- und Wärmeleitung entgegen zu wirken, ferner um Nässe aufzusaugen und dadurch das Balkenwerk gegen Vermoderung zu schützen. Als

Füllmaterial benutzt man Sand, häufiger jedoch Bauschutt, Kohlenstaub, Schlacke, Asche; oft wird sehr unsauberes Material verwendet. Analysen haben gezeigt, dass kein Boden, selbst in der nächsten Nähe von Abortgruben so hochgradige Verunreinigungen erkennen lässt, wie die Füllungen mancher Zwischenböden. Ausserdem wird auch das reinste Material gewöhnlich mit der Zeit stark verunreinigt. Durch die Ritzen und Fugen des Fussbodens dringt Scheuerwasser, Waschwasser u. s. w.; mit diesen Sputa, eingeschleppte Erde und dergl. ein. Die dabei in das Füllmaterial gerathenen Mikroorganismen werden dort offenbar gut conservirt, ähnlich wie in natürlichem Boden. Aus den Zwischenböden gelangen sie dann leicht wieder in das Zimmer, da bei jeder stärkeren Erschütterung Wolken trockenen Staubes die gewöhnlich vorhandenen groben Fugen des Fussbodens zu durchdringen pflegen. Es darf demnach nicht befremden, dass wiederholtes Auftreten von ansteckenden Krankheiten in denselben Wohnräumen zu verschiedenen




Fig. 109.

Malen mit Wahrscheinlichkeit auf Infektion vermittelt der Zwischenböden zurückgeführt werden konnte; und wir haben jedenfalls allen Grund, die Zwischenböden so zu construiren, dass es zu keiner Verunreinigung mit saprophytischen und pathogenen Bakterien kommen kann.

Zunächst ist von vornherein nur unverdächtiges Füllmaterial auszuwählen, z. B. reiner Sand. Auch lässt sich mit Vortheil leichteres Material, wie Kieselguhr, Schlackenwolle verwenden. Diese Materialien haben so geringes Gewicht, dass man mit denselben den Zwischenboden in höherer Schicht füllen und dadurch die Schallleitung weit besser hindern kann, während bei Verwendung von Sand u. s. w. ein grösserer Theil des Zwischenbodens frei gelassen werden muss, weil sonst die Belastung zu stark werden würde. Ausserdem ist unter den Dielen des Fussbodens jedenfalls eine undurchlässige Schicht anzubringen, um spätere Verunreinigung zu vermeiden: z. B. sind die Dielen in heissen Asphalt einzulegen, oder es ist Superatorpappe einzuschalten u. dergl. — Statt des Holzwerks, das gegen Parasiten besonders geschützt werden muss und Feuersgefahr bietet, wird neuerdings meist Eisenconstruktion

wendet. Ein Beispiel solchen Arrangements (nach NUSSBAUM) giebt g. 109. — Der Fussboden selbst ist möglichst dicht zu fugen. Vorhandene Ritzen sind mit Holzleisten und Kitt auszufüllen; die Dielen sollen mehrfach mit heissem Leinöl getränkt oder mit Oelfarbenanstrich oder Wachsüberzug versehen und dadurch ein völlig undurchlässiger und leicht zu reinigender Fussboden hergestellt werden.

4) Dach; Treppen; Fenster. Das Dach soll undurchlässig für Wasser, nicht zu schwer sein und im Sommer die Insulationswärme, im Winter die Kälte nicht leicht durchdringen lassen. Metall- und Schieferdächer sind womöglich mit Isolirschichten zu unterlegen. In jedem Falle müssen zwischen Dach und Decke des obersten Stockwerkes solche Oeffnungen vorhanden sein, durch welche während des Sommers ein starker Luftstrom streichen und die Fortleitung der Insulationswärme hindern kann. — Die Treppen sind so viel als möglich feuersicher in Stein, Eisen oder mit Ueberzug von Cementmörtel herzustellen; ferner sollen sie bequem und sicher zu begehen sein, d. h. nicht zu steil und nach höchstens 15 Stufen von einem Absatz unterbrochen. — Die Fenster sind theilweise mit Scheiben zu versehen, die für eine Lüftung des Zimmers verwendet werden können (oben unten). — Ueber alle Einzelheiten, die beim Bau und der Ausstattung des Wohnhauses sonst in Betracht kommen, siehe das unten citirte Werk von NUSSBAUM.

Litteratur: Deutsches Bauhandbuch, Handbuch der Architektur. — NUSSBAUM, Das Wohnhaus, in WEYL's Handb. der Hygiene 1896. — v. ESMARCH, Hygienisches Taschenbuch 1896.

III. Austrocknungsfrist; feuchte Wohnungen.

Feuchte Wohnungen wirken nachtheilig auf die Gesundheit hauptsächlich dadurch, dass sie leicht Störungen der Wärmeregulierung des Körpers veranlassen. Die feuchten Wände sind in Folge der fortgesetzten Verdunstung und der besseren Wärmeleitung des feuchten Materials abnorm niedrig temperirt; Kleider, Betten u. s. w. werden ebenfalls feucht und zu guten Wärmeleitern. So kommt es häufig zu unmerklicher stärkerer Wärmeentziehung vom Körper. — Ausserdem begünstigt die Feuchtigkeit die Conservirung von Krankheitserregern und die Entwicklung von saprophytischen Bakterien und mycotischen Schimmelpilzen (*Penicillium*); namentlich die letzteren bilden sich an den Wänden, auf Stiefeln und verschiedenen Ge-

bedarfsgegenständen, ferner auf Nahrungsmitteln, namentlich Brot. Durch diese Pilzwucherungen entsteht eine modrige, dumpfige Beschaffenheit der Luft, welche die Athmung beeinträchtigt. Ein Wachsthum von Krankheitserregern oder von infektiösen Schimmelpilzen findet auf feuchten Wänden u. s. w. nicht statt, schon weil die Temperatur immer zu niedrig ist. — Das Holz feuchter Wohnungen wird durch den Hausschwamm gefährdet, einen Pilz, dessen Mycelium das Holz vollständig durchwuchern und zum Zerfall bringen. Das Mycelium wuchert ausschliesslich im Dunkeln und in feuchtem Substrat und bildet allmählich grosse weisse Polster, auf denen erst später an der äusseren Seite des Holzwerks die braunen Sporenlager sich bilden (s. S. 375). Licht und bewegte, austrocknend wirkende Luft, die durch Lüftung dem Balkenwerk zugeführt wird, hindern die Wucherung des Pilzes. Imprägnirung des Holzes mit Zinkchlorid scheint dauernd, mit Kreosotöl (Carbolineum) für einige Zeit zu schützen. — Dem Hausschwamm scheint im übrigen keine spezifische hygienische Bedeutung zukommen; weder das Mycel noch die Sporen vermögen Infektion beim Warmblüthier auszulösen, vielmehr hört bei Körpertemperatur jede Weiterentwicklung des Pilzes auf. Nur der modrige Geruch der älteren Vegetationen des Pilzes beeinträchtigt wie andere üble Gerüche die Athmung. — Das gleiche gilt von der durch Polyporus vaporarius hervorgerufene sogenannte Rothstreifigkeit des Kiefern- und Tannenholzes.

Abnorme Feuchtigkeit der Wohnungen entsteht 1) durch das beim Bau eingeführte und nicht vollständig wieder verdunstete Wasser. Während des Baues werden grosse Wassermengen in die Hausmauern eingeführt, weil das Mauern meistens im nassen Zustand des Materials geschieht. Gewöhnlich wird der ganze Ziegel in Wasser getaucht; behauene Steine werden stark mit Wasser besprengt. Im Durchschnitt werden dabei 10—20 Procent des Volums der Steine mit Wasser gefüllt. Da die Wände eines mittleren Wohnhauses etwa 500 cbm Mauerwerk ausmachen, so enthalten diese also 50—100 cbm mechanisch beigemengtes Wasser. — Die Befeuchtung ist nöthig, um ein Haften der Bindemasse zu ermöglichen. Als letztere dient gewöhnlich Mörtel, der aus einem Theil gelöschten Kalk und 2—3 Theilen Sand bereitet wird. Der frische Mörtel enthält im Mittel auf 1 cbm 150 Liter Wasser, ausserdem noch Hydratwasser und zwar pro cbm etwa 100 Liter. Für je 100 cbm Mauerwerk gebraucht man theils zum Füllen der Fugen, theils zum Verputz, etwa 12 cbm Mörtel für ein Haus von 500 cbm Mauer mithin 60 cbm Mörtel. In diesem Mörtelmass sind dann 10 cbm mechanisch beigemengtes und 6 cbm

Hydratwasser enthalten; und in Summa finden sich also in einem Neubau von der bezeichneten Grösse 90—110 cbm mechanisch beimengtes und 6 cbm chemisch gebundenes (Hydrat-)Wasser.

Diese ganze kolossale Wassermasse muss wieder fortgeschafft werden, so das Haus bewohnbar ist. Es geschieht dies bei warmem trockenem Wetter genügend rasch unter dem Einfluss der freien Luft; oft muss eine künstliche Beschleunigung stattfinden durch Heizen oder Einhängen in Coalskörben bei offenen Fenstern (event. auch künstliches Einströmen erwärmter Luft). — Sehr wichtig ist, dass das Verputzen nicht früher erfolgt, als bis das Rohmauerwerk vollständig ausgetrocknet ist.

Bezüglich der Mittel zum Austrocknen der Neubauten begegnet man häufig einer irrigen, in früherer Zeit von LEBIG aufgestellten Ansicht. Nach dieser soll die Feuchtigkeit neugebauter Häuser vorzugsweise dadurch bedingt sein, dass der Aetzkalk des Mörtels allmählich eine Umwandlung in Calciumcarbonat erleidet, und dass dabei das Hydratwasser frei wird. Das sogenannte "trockenwohnen" sollte wesentlich darauf beruhen, dass die Bewohner viel Kohlensäure liefern und so die Umwandlung des Aetzkalks in Calciumcarbonat beschleunigen. Demnach würde das beste Mittel zur Austrocknung von Neubauten darin bestehen, dass Kohlensäure-Apparate und offene Kohlenbecken in den Räumen aufgestellt werden. — Aus den oben gegebenen Zahlen ist indeess ohne Weiteres ersichtlich, dass die weitaus grösste Masse des in einem Neubau steckenden Wassers mechanisch beimengt ist; das Hydratwasser macht nur etwa 5—10 Procent der ganzen Wassermasse aus und tritt an Bedeutung hinter jenem weit zurück. Dem entsprechend sind Neubauten nicht vorzugsweise durch Kohlensäure zu trocknen, sondern in erster Linie durch Verdunstung der grossen Wassermassen. Dass austrocknende Luft in der That das wirksamste Mittel zur Beseitigung der Mauerfeuchtigkeit ist, lässt sich schon aus der Erfahrung entnehmen, dass in Ländern, wo die Luft ein starkes Sättigungsdeficit zeigt (Westküste von Nordamerika, Aegypten), die neugebauten Häuser sofort beziehbar sind, obwohl denselben hier durchaus nicht mehr Kohlensäure zugeführt wird.

Der schädlichen Wirkung feuchter Neubauten hat man durch Festsetzung einer Austrocknungsfrist in den Bauordnungen vorbeugen gesucht. Nach den obigen Ausführungen ist es sehr schwierig, diese solche je nach dem Klima und nach der Jahreszeit richtig zu bemessen. In Norddeutschland schwankt sie zwischen 6—12 Wochen. Wünschenswerth ist es, in allen Zweifelsfällen die Beziehbarkeit eines Neubaus von einer Feststellung der Mauerfeuchtigkeit nach unten angegebenen Methode der Wasserbestimmung in Mörtelproben abhängig zu machen. Der Wassergehalt des Putz- und Fugenmörtels darf nicht über 2 Procent betragen. Die Proben sollen aus dem im untersten Wohngeschoss nach der Schatten- und Wetterseite gelegenen Raum entnommen sein. Werden diese Wände genügend

trocken gefunden, so darf auf das gleiche Verhalten des ganzen Hauses geschlossen werden.

2) Eine fernere im Bau belegene Ursache abnormer Feuchtigkeit von Wohnungen kann der mangelhafte Abschluss der Fundamentmauern gegen die Bodenfeuchtigkeit und das Grundwasser sein. Nachträglich ist dieser Fehler nur schwer vollständig wieder gut zu machen.

3) Hauswände, die nach der Wetterseite liegen und von Schlagregen getroffen werden, und die ausserdem Nachts frei gegen den Horizont ausstrahlen und daher abnorme Abkühlung erfahren, sind oft andauernd feucht, namentlich wenn sie an ihrer äusseren Fläche aus porösem, aufsaugungsfähigem Material hergestellt sind. — Hier kann durch Andringung der oben beschriebenen undurchlässigen und zugleich die Abkühlung hemmenden Bedeckungen oder durch Isolirschichten Abhilfe gewährt werden.

4) Kellerwohnungen, die zu tief unter die Bodenoberfläche herabreichen und in denen intensive innere Wärmequellen (Calorifera oder Dampfkessel von Centralheizungen) fehlen, zeigen regelmässig feuchte Wände, weil diese so niedrige Temperatur haben, dass aus wärmerer Aussenluft, ebenso aber aus der mit Wasserdampf erfüllten Luft des Wohnraums sich Condenswasser auf ihnen niederschlägt. — Vielfach hat man aus diesem Grunde, ferner wegen der geringen Licht- und Luftzufuhr zu Kellerräumen, diese als überhaupt ungeeignet zum Wohnen bezeichnet. Indessen sind doch Constructionen ausführbar, durch welche die Nachtheile vollkommen beseitigt werden. Sind die Fundamentmauern gut gedichtet, ist eventuell das Haus von einem Lichtgraben umzogen (S. 367), sind die Fenster hoch und der Fussboden nicht zu tief unter die Bodenoberfläche gelegt, so entstehen Wohnungen, welche keine wesentlichen hygienischen Nachtheile darbieten, dagegen gegenüber den hochgelegenen Stockwerken den grossen Vorzug niedriger Hochsommertemperaturen haben. Nachweislich ist insbesondere die Sterblichkeit der Säuglinge an Cholera infantum in den Kellerwohnungen eine auffällig geringe, auch wenn die Bewohner grossentheils dem Proletariat angehören.

Kellerräume, welche nicht in der oben beschriebenen Weise hergerichtet sind, dürfen allerdings nicht als Wohnräume zugelassen werden. In den meisten Städten bestehen bereits Verordnungen, welche Kellerwohnungen, deren Fenster nach Norden oder nach bebauten Höfen gehen, verbieten; ferner ist zu verlangen, dass der Fussboden der Wohnräume nicht mehr als 0.5 m unter der Bodenoberfläche liegt. Weitere Bestimmungen über die minimale lichte Höhe, die

isse der Fenster, die zulässige Tiefe der Räume und die Isolirung Kellersohle und der Mauern sind behufs sicheren Ausschlusses aller hygienischen Gefahren wünschenswerth.

5) Auch unabhängig von der Bauart des Hauses kann normale Feuchtigkeit der Wohnung auftreten, selbst in älteren Häusern und in früher trocken gewesenen Wohnungen. Abgesehen von Durchfeuchtungen einzelner Wandtheile durch Defekte an Wasser- und Abwasserleitungen tritt zuweilen ein Feuchtwerden der Innenwände durch Condensation des Wasserdampfes der Luft ein. Vorübergehend kann dies in jeder Wohnung erfolgen, wenn nach längerer kühler Witterung normale feuchte Aussenluft reichlich mit den kälteren Innenwänden in Berührung tritt. Besonders leicht tritt eine solche Condensation ein, wenn Wände einer Wohnung abnorm niedrig temperirt sind, wie im Kellergeschoss oder Giebelwände nach der Schattenseite.

Zu dauernder und intensiver Bildung von Schwitzwasser an den inneren Wandflächen kommt es durch reichliche Wasserdampfproduction im Wohnraum. Ist letzterer übervölkert, so genügt schon die Wasserdampfausscheidung der Menschen zur Bildung von Schwitzwasser; meistens tritt noch Wasserdampfentwicklung durch Kochen, Waschen u. s. w. hinzu. In solcher Weise ist schliesslich in jeder Wohnung Wandfeuchtigkeit zu erzielen; die Ursache derselben liegt nun nur nicht an der Wohnung, sondern in der missbräuchlichen Benutzung derselben durch die Bewohner. Oft haben frühere oder spätere Bewohner der gleichen Wohnung nicht über Feuchtigkeit zu klagen gehabt, weil sie nicht so viel Wasserdampf producirten und bei gelegentlicher stärkerer Production, namentlich dann, wenn starke Condensation an den Fensterscheiben die nahende Sättigung anzeigte, durch Lüftung oder Einschränkung der Production die Wände vor Durchfeuchtung schützten. — In der Praxis wird man bei der Beurtheilung einer feuchten Wohnung sehr mit dieser Quelle der Wandfeuchtigkeit rechnen müssen. Eine Entscheidung darüber, ob bauliche Einflüsse oder die Art der Benutzung betheiligt sind, erfolgt am besten dadurch, dass man gleichgerichtete Wohnungen in anderen Geschossen desselben Hauses zum Vergleich heranzieht.

Eine zuverlässige Bestimmung des Feuchtigkeitszustandes einer Wohnung und eines Hauses erfolgt durch Ermittlung des Wassergehalts in Mörtelproben, sowohl Putz- wie Fugenmörtel, die aus den fraglichen Mauern entnommen sind; und zwar entnimmt man mittelst stählerner Stanze mit einem Hohlmeissels etwa 4 Proben von je 10—20 g Putz- und Fugenmörtel. Die Bestimmung des Wassergehalts erfolgt durch Trocknen im Vacuum oder in einem auf 100° erwärmten von CO₂ und H₂O befreiten Luftstrom. Die Bestimmung ist in wenigen Stunden auszuführen. Mörtel aus trockenen Mauern

enthält 0.5—1.0 Procent Wasser; bei bewohnbaren Neubauten höchsten 1 Procent Wasser. — Bei stärkeren Graden von Feuchtigkeit geben schon frische Flecke und Schimmelpilzbildung an den Wänden, Schimmelwucherung auf frischem Brot auf Stiefeln, der modrige Geruch, Schwammbildung u. s. w. gewisser aber oft trügerische Anhaltspunkte.

Litteratur: LEMANN und NUSSBAUM, Feuchtigkeit von Neubauten, Arch. f. Hygiene 1892. — EMMEICH, ibid. 1892. — NUSSBAUM, HUKFFZ, Das Wohnhaus, in Weyl's Handb. d. Hygiene, 1896.

IV. Temperatur-Regulirung der Wohnräume.

Während im Freien die Entwärmung unseres Körpers verhältnissmässig leicht von Statten geht, weil namentlich durch Leitung und Wärmestrahlung viel Wärme abgegeben werden kann, fungiren diese Wärme-Verluste in Wohnräumen fast gar nicht, und es kommt bei einer Stagnation der Temperatur viel leichter zur Wärmestauung.

Indes ferner im Freien eine stärkere Wärmeentziehung statt, so können wir meist durch raschere Bewegung einer fühlbaren Entwärmung des Körpers vorbeugen. Im Zimmer sollen wir uns dagegen bei anhaltend ruhigem Aufenthalt behaglich fühlen, und dementsprechend soll wir gegen ein Absinken der Temperatur ausserordentlich viel empfindlicher. Die Wärmeschwankungen innerhalb des Wohnraumes dürfen sich daher nur in sehr engen Grenzen bewegen; bei Winterkleidung zwischen 17 und 19°, bei Sommerkleidung zwischen 19 und 23°. Um diese Temperatur das ganze Jahr hindurch herzustellen, bedarf es einer Reihe von künstlichen Vorrichtungen, die im Folgenden näher zu besprechen sind.

A. Temperatur-Regulirung im Sommer.

Für die Temperaturverhältnisse des Wohnraumes im Sommer ist es von grosser Wichtigkeit, dass die Lufttemperatur des Zimmers vollständig abhängig ist von der Wandtemperatur. Die Wände stellen ungeheure Wärmereservoirs dar, welche im Stande sind, das Vielfache der Zimmerluft auf den gleichen Temperaturgrad zu erwärmen, ohne dass sie selbst eine wesentliche Aenderung der Temperatur erfahren.

Nun werden aber die Wände und das Dach des Hauses direct durch die Sonnenstrahlen beeinflusst, und in Folge dessen erhalten wir innerhalb der Wohnung häufig Temperaturen, welche weit über die Luftwärme im Freien hinausgehen.

Die Isolationswärme einer Mauer hängt ab 1) von ihrer Dicke; je dicker dieselbe, um so höher wird die Innentemperatur und die Lufttempe-

Wohnraumes. Bei sehr dicken Wandungen kann der allmähliche der Temperatur ein so vollständiger werden, dass, ähnlich wie in Boden, die Tages- und selbst die Monatsschwankungen der Temperatur innenfläche nicht bemerkbar werden. 2) Von der Absorption der Sonnen an der äusseren Oberfläche. Dieselbe ist vorzugsweise abhängig von . Da diese aber wenig Differenzen bietet und namentlich die dunkleren im Anstrich der Häuser fast stets vermieden werden, ist dieses Moment massig wenig einflussreich. 3) Von der Dauer der Bestrahlung. z. B. von Bedeutung die Tageslänge, die nach Klima und Jahreszeit ann der Grad der Bewölkung; ferner die Himmelsrichtung der bewand. Nordwände erhalten im Sommer nur Morgens und Abends Zeit Sonnenstrahlen, Südwände 12 Stunden, von 6 Uhr früh bis 6 Uhr Ostwände von 6 Uhr früh bis Mittags, Westwände von Mittag bis Abends. 4) Von dem Winkel, in welchem die Sonnenstrahlen auffallen. Wand erwärmt sich z. B. nicht so stark, wie die Ost- und Westwand, mehr von senkrecht auffallenden Sonnenstrahlen getroffen werden. In den Tropen die Insulationswärme der Mauern nicht so bedeutend, unserem Klima, weil die Sonne dort höher steht und die Strahlen mehr den Winkel die Wandungen treffen. Allerdings wird das Dach unter dem um so intensiver bestrahlt.

der Aussenfläche der bestrahlten Mauern erreicht die Temperatur -50° . Diese Wärme wird sehr allmählich durch die Wand fort und dabei tritt ein steter Verlust von Wärme ein. Die für die Wohnraumsgebende Temperatur der Innenwände ist daher erheblich abgesetzt und tritt mit starker zeitlicher Verschiebung auf. Das schliessliche Verhalten der Wandtemperaturen lässt sich sowohl durch Rechnung als bestimmter Formeln ableiten, als auch durch in die Wand eingelassene aufwärts gebogener Skala versehene Thermometer beobachten.

Beobachtungen haben für den Sommer unseres Klimas ergeben, dass die unbestrahlte Nordwand ungefähr die mittlere Temperatur der Luft zeigt, dass dagegen schon die Südwand wesentlich wärmt wird; noch wärmer ist die Ost-, am wärmsten die West- . Der Grad der Temperaturerhöhung und die Zeit des Aufles Maximums an der Innenfläche lässt sich aus folgendem Beispiel entnehmen:

	Bei einer Wanddicke von 15 cm		Bei einer Wanddicke von 50 cm	
	Temperatur- grad	Zeit	Temperatur- grad	Zeit
1	20°	—	20°	—
.	23°	6 ^h Nachm.	21°	1 ^h früh
.	28.5°	3 ^h Nachm.	23°	9 ^h Abends
1	30°	9 ^h Abends	24°	3 ^h früh

Die Ost- und Westwände zeigen also auch bei bedeutender Wandstärke an den Innenflächen noch eine Erhöhung um 3 oder 4° über die Temperatur der unbestrahlten Wände, und die höchste Erwärmung der Innenräume durch die Ostwand findet von 7—11 Uhr Abends, durch die Westwand von 1 Uhr bis 5 Uhr früh statt.

Diese Temperaturen erfahren ferner eine erhebliche Steigerung in höheren Etagen. Hier macht sich einerseits der Einfluss des bestrahlten Daches geltend, andererseits summieren sich die Wirkungen der inneren Wärmequellen des Hauses; namentlich liefern die Kachelkamine in die oberen Stockwerke eine bedeutende Wärmemenge. In den höchsten Etagen dicht bewohnter Häuser beobachtet man daher im Hochsommer nicht selten Nachttemperaturen von 28—32° und mehr.

Die intensiven Wärmegrade pflegen sich gewöhnlich erst in der zweiten Hälfte des Juni, resp. im Juli einzustellen, weil der Wechsel der Witterung bis dahin nur selten eine Aenderung der Wandtemperaturen gestattet. Einzelne heisse Tage zeigen nur geringe und vorübergehende Effekte, erst bei länger dauernder Einwirkung einer kräftigen Insolation kommt eine immer höhere Steigerung der Wärme zu Stande.

Wohl zu beachten ist, dass zur Vermittelung der Insulationswärme freistehende fensterlose Wände weitaus am geeignetsten sind. Fenster bilden nur günstig wirkende Unterbrechungen der Wärmereservoirs; und der Sonneneinfall durch die Fenster kann verhältnissmässig leicht durch aussen angebrachte Jalousien und Vorhänge abgehalten werden.

Die Folgen dieser hohen Wohnungstemperaturen unseres Hochsommers bestehen in einer theilweisen Behinderung der Wärmeabgabe und deren Consequenzen. Bei empfindlichen Erwachsenen, Reconvalescenten u. s. w. tritt Erschlaffung, Appetitmangel, schliesslich Anämie auf. Bei kleinen Kindern, die noch nicht selbständig durch Wahl der Bedeckung, durch Bewegung u. s. w. ihre Wärmeregulirung zu unterstützen vermögen, kommt es vielleicht zu wirklich bedrohlicher Wärme-stauung. — Ferner tritt in den mit mangelhaften Einrichtungen zur Aufbewahrung der Nahrungsmittel versehenen Wohnungen rasche Zersetzung der Speisen ein. In Fleisch, Milch u. s. w. wuchern die verschiedensten Bakterien, und es häufen sich in Folge dessen die infektiösen Darmerkrankungen. Vor allem werden Bakterienansiedelungen in der Milch durch die hohe Wohnungstemperatur so wesentlich unterstützt, dass die Zahl der Todesfälle an akuten Verdauungsstörungen der Säuglinge geradezu mit diesen Temperaturen zusammengeht und sich von ihnen vollständig abhängig zeigt. Auch für die Ausbreitung

er Erkrankungen sind vereinzelte Wärmetage und Perioden des Sommers belanglos, während erst längere Wärmeperioden, welche Häuser stark durchhitzen, zahlreichste Opfer fordern.

Maassregeln zum Schutz gegen die hohe Sommertemperatur der Wohnungen. Zunächst kann ein gewisser Schutz durch Bauart der Häuser gewährt werden. In südlichen und tropischen Ländern ist letztere in viel ausgesprochenerem Maasse auf eine Fernung der Insolationswärme zugeschnitten, als bei uns. Dort wird weder das freistehende, einstöckige Haus mit seiner Längsrichtung Osten nach Westen gestellt und das Dach bis nahe zum Erdboden an die Wände hinweggeführt. Oder in südlichen Städten findet man Strassen so eng, dass die Häuserfronten der Insolation fast völlig ausgesetzt sind; oder wo dies nicht der Fall ist, liegen die Wohnräume in dem schattigen Hofe und sind von den bestrahlten Aussenseiten durch zwischenlaufende Gänge und Galerien getrennt; die engen Strassen und die Höfe werden oft zur Zeit der stärksten Sonnengluth mit Läden überspannt. Zuweilen sucht man auch Schutz durch extreme Dicke der Mauern; in Indien existiren derartige Wohngebäude, welche ihrem Innern fast das ganze Jahr hindurch die mittlere Jahres-temperatur zeigen.

Mit Rücksicht auf unseren langdauernden Winter können wir uns von diesen Bauarten acceptiren. Ein sehr zweckmässiges Schutzmittel können wir aber verwenden: eine Bedeckung der Insolationsoberfläche in einem gewissen Abstand von der Mauer, so dass in dem Zwischenraum Luft circulirt. Die Bedeckung kann entweder in einer Form bestehen, oben und unten offenen Vormauer aus Kunststein, Holz oder Eisen bestehen; oder auch aus Matten; oder aus rankenden Ge-hecken (wilder Hopfen; spanischer wilder Wein). — An einigen Orten hat man Vorrichtungen getroffen, um durch Berieseln der bestrahlten Wände mit Wasser der Insolation entgegen zu wirken; aber es scheint sich dieses Mittel nicht bewährt zu haben.

Ferner sollte unter allen Umständen das Dach des Hauses isolirt werden, so dass circulirende Luftschichten zwischen ihm und der Decke des höchsten Stockwerkes eingeschaltet sind.

Ist es nicht thunlich, bauliche Veränderungen des Hauses vorzunehmen, so kann eine vorübergehende Kühlung versucht werden durch Zufuhr kalter Luft zu den überhitzten Wohnräumen. Dabei ist es wohl zu bedenken, wie ausserordentlich gross die Wärmecapazität der Wände ist, und wie gering dagegen die der Luft. Eine vorübergehende Luftzufuhr hat daher niemals einen genügenden Effekt; so- bald die Luftzufuhr aufgehört hat, ist stets nach kurzer Zeit die frühere

Temperatur des Zimmers wieder hergestellt. Eine Unterstützung der Entwärmung unseres Körpers durch Lüftung können wir daher nur dadurch erzielen, dass wir fortdauernd während unseres Aufenthalts im Zimmer einen Luftstrom in dasselbe eintreten lassen, der ausgiebig genug ist, um eine gewisse Menge von Wärme von unserem Körper fortzuführen.

Bei öffentlichen Gebäuden ist zuweilen der Versuch gemacht, künstlich gekühlte Luft den Wohnräumen zuzuführen. Die Kühlung wird durch Eis oder Eismaschinen bewirkt, oder dadurch, dass die Luft längere Strecken in tief in die Erde gelegten Canälen zurückgelegt hat; oder dadurch, dass in solchen Canälen noch eine lebhaftere Wasserverdunstung unterhalten ist. In neuerer Zeit wird auch die Expansionskälte zugeleiteter comprimierter Luft zur Kühlung von Wohnräumen verworther. Alle diese Mittel wirken indess nur bei ausgiebiger Anwendung und sind bis jetzt noch zu kostspielig, um allgemein brauchbar zu werden.

In kleinem Maassstabe sucht man wohl einen Wohnraum dadurch zu kühlen, dass man reichliche Mengen Wasser auf den Fussboden resp. an den Wänden vertheilt und zum Verdunsten bringt. 1 Liter Wasser bindet bei seiner Verwandlung in Dampf 580 Wärmeeinheiten; soll ein irgend erheblicher Betrag von Wärme auf diesem Wege fortgeschafft werden, so sind daher selbst für kleine Räume mindestens 5—10 Liter Wasser in kurzer Zeit zu verdampfen. Dabei liegt aber eine entschiedene Gefahr für die Entwärmung des Körpers darin, dass die steigende Luftfeuchtigkeit die Wasserdampfahgabe vom Körper erschwert und damit einen der wichtigsten Wege der Wärmeabgabe verschliesst. Will man daher nicht eher eine Behinderung der Wärmeabgabe statt der erhofften Erleichterung eintreten sehen, so muss für eine stete Fortschaffung des gebildeten Wasserdampfes durch gleichzeitige reichliche Lüftung gesorgt werden.

Auch die beim Schmelzen des Eises latent werdende Wärme hat man für die Erwärmung von Wohnräumen auszunutzen gesucht. Ein Kilo Eis bindet beim Schmelzen 80 Wärmeeinheiten. Bringt man also beispielsweise 50 Kilo Eis innerhalb einiger Stunden zum Schmelzen, so werden damit 4000 Wärmeeinheiten entfernt. Auch diese Menge reicht aber noch nicht aus, um eine fühlbare Kühlung überhitzter Wohnräume zu bewirken. Ausserdem ist es schwierig, innerhalb kurzer Zeit so bedeutende Mengen Eis zum Schmelzen zu bringen, und es bedarf daher besonderer kostspieliger Apparate mit ausserordentlich grosser Oberfläche, wenn nur eine gewisse Wirkung hervorgerufen werden soll.

B. Temperatur-Regulirung im Winter.

Zur Erwärmung der Räume während des Winters benutzen wir Brennmaterialien, die in besonderen Heizvorrichtungen verbrannt werden.

Die Brennmaterialien sind Stoffe, deren Bestandtheile (vorzugsweise Kohlenstoff und Wasserstoff sich unter Wärmeentwicklung mit Sauerstoff verbinden, und welche ausserdem die Verbrennung selbstthätig weiter leiten, nachdem sie einmal an einer Stelle auf die Anzündungstemperatur erhitzt sind. Benutzt werden hauptsächlich Holz, Torf, Braunkohle, Steinkohle; ferner die durch trockene Destillation des Holzes gewonnene Holzkohle und die bei der Destillation der Steinkohle zurückbleibenden Cokes, beides Brennmaterialien, die aus

hältnissmässig reinem Kohlenstoff bestehen. Ausserdem werden gasförmige Brennmaterialien benutzt, so das bei der Destillation der Steinkohle gewonnene Leuchtgas, ferner die aus schlechter und direct nicht benutzbarer Braunkohle reiterten Generatorgase; oder das Wassergas, eine Mischung von Kohlenoxyd und Wasserstoff, dadurch gewonnen, dass ein Strom von erhitztem Wasserdampf in einem Schachtofen über glühende Kohlen geleitet ist. Endlich kommt allerdings die elektrische Heizung in Betracht, z. B. dadurch hergestellt, dass ein elektrischer Strom in eine nichtleitende Flüssigkeit geleitet wird. — Aus der folgenden Tabelle ist der kalorimetrische Effekt der Brennmaterialien, i. e. die Wärmemenge, welche die Gewichtseinheiten bei vollständiger Verbrennung liefern; zweitens der pyrometrische Effekt, i. e. die Heizkraft, der höchste erreichbare Temperaturgrad; und drittens die zur Verbrennung erforderliche Luftmenge zu entnehmen.

	Calorimetrischer Effekt	Pyrometrischer Effekt	Luftbedarf
Kilo Holz	2731 W.-E.	1860°	3.5 cbm
„ Torf	2743 „	1829°	3.4 „
„ Braunkohle	4176 „	2211°	5.0 „
„ Steinkohle	7483 „	2565°	8.2 „
„ Holzkohle	7034 „	2574°	7.8 „
„ Coks	7065 „	2593°	7.9 „
„ Leuchtgas	10118 „	2466°	10.9 „

An die Heizvorrichtungen haben wir folgende Anforderungen zu stellen:

1) Da im Wohnraum zu jeder Zeit die gleiche Temperatur von $+15$ — 20° hergestellt werden soll, da aber die Aussentemperatur während der Heizperiode in unserem Klima ausserordentlichen Schwankungen unterliegt, müssen die Heizapparate sehr gut regulirfähig sein. Wir dürfen daher in den Wohnraum keinesfalls Heizkörper von sehr grosser Wärmecapacität stellen, welche sich schwer anwärmen und schwer wieder entwärmen lassen.

2) Die Temperatur soll im ganzen Zimmer gleichmässig vertheilt sein, sowohl in der horizontalen wie in der vertikalen Richtung. Ungleiche Temperaturvertheilung kommt namentlich dann zu Stande, wenn stark erwärmte Heizkörper sich im Zimmer befinden. Es resultirt dann eine sehr rasche Abnahme der Temperatur mit der seitlichen Entfernung vom Heizapparat; ferner eine bedeutend höhere Temperatur in den oberen Luftschichten gegenüber dem Fussboden. Bei derartig ungleicher Erwärmung des Zimmers kann es vorkommen, dass die eine Seite unseres Körpers stark erwärmt wird, während die andere gegen kalte Wandflächen abstrahlt und dass der Kopf wesentlich stärker erwärmt wird als die Füsse. Gerade solche Ungleichmässigkeiten der

Erwärmung führen aber leicht zu einer Störung der Wärmeregulirung und zu Erkältungskrankheiten.

3) Wünschenswerth ist, dass die Heizung einigermassen kontinuierlich sich vollzieht und dass namentlich über Nacht nicht eine vollständige Auskühlung der Wohnräume eintritt. Im Anfang der Beheizung kommt es sonst leicht zu ungleichmässiger Entwärmung des Körpers unter dem Einfluss der erkalteten Wandflächen des Zimmers.

4) Die Heizung soll keine gasförmige Verunreinigungen in die Wohnungsluft gelangen lassen. Zu dem Zwecke müssen die Verbrennungsprodukte, die aus Kohlensäure, Stickstoff, Kohlenwasserstoffen, sowie aus dem giftigen Kohlenoxydgas bestehen, vollständig nach aussen geleitet werden.

In früherer Zeit ist es häufiger zu einem Eindringen der Rauchgase in die Wohnung gekommen in Folge frühzeitigen Schlusses der sogenannten Ofenklappen. Dieselben wurden am Uebergange des Ofens in den Schornstein angebracht und sollten nach Beendigung der Verbrennung geschlossen werden, um die Wärme des Ofens vollständiger zurückzuhalten und für das Zimmer auszunutzen. Wurden dieselben aber vor Beendigung der Verbrennung geschlossen, so drangen die Rauchgase, und unter diesen auch Kohlenoxydgas, in die Wohnungsluft ein. Jetzt sind fast überall die Ofenklappen beseitigt und die Regulirung der Feuerung ist in die Ofenthüre, also vor die Feuerung verlegt.

Indessen soll auch dann, wenn die Rauchgase in vorschriftsmässiger Weise abgeleitet werden, zuweilen Kohlenoxydgas in Luft von beheizten Räumen übergehen und zwar durch glühend gewordene gusseiserne Oefen. In der That ist experimentell nachgewiesen, dass glühendes Gusseisen für Kohlenoxydgas permeabel ist. Aber aus diesem Experiment ist nicht zu folgern, dass aus Heizanlagen grössere Mengen von Kohlenoxydgas in die Wohnungsluft übertreten können; denn so lange die Feuerung unterhalten wird, besteht fortwährend ein lebhafter Zug in den Ofen hinein, und es ist daher nicht möglich, dass ein Austritt von Gasen in umgekehrter Richtung erfolgt, so lange noch eine stärkere Entwicklung von Verbrennungsgasen und Kohlenoxydgas stattfindet. Nur wenn die Oefen etwa zu früh geschlossen werden, könnten zunächst und für eine kurze Zeit die Rauchgase unter eine gewisse Spannung gerathen und sich in die Zimmerluft verbreiten. Dieser Ueberdruck geht jedoch bald vorüber, und die geringen inzwischen ausgetretenen Rauchgasmengen sind kaum zu schädigenden Wirkungen im Stande.

Nachweislich entstehen gewisse Mengen von Kohlenoxydgas durch Verbrennung von Staub an der Aussenseite stark geheizter Oefen. Namentlich auf den Caloriferen von Luftheizungsanlagen kommt es oft zu enormen Staubansammlungen und in Folge der Verbrennung derselben zu einem merklichen Gehalt der Zimmerluft an Kohlenoxydgas und brenzlich riechenden Produkten.

5) Die Heizung soll der Wohnungsluft so wenig als möglich zuzuführen. Torf, Kohle, Coks liefern beim Beschicken der Oefen die grössten Staubmengen. Es ist daher wünschenswerth, dass bei diesen Materialien die Beschickung so selten als möglich, und wenn irgend geht, ausserhalb des Wohnraumes erfolgt. — Ausserdem wirken die warmen Heizkörper eine lebhaftere Circulation der Innenluft und eine stete Zufuhr von Aussenluft (s. unter 7). Dadurch kann Staub eingeführt und namentlich aufgewirbelter Staub lange schwebend gehalten werden. Die Schwärzung der Zimmerwände hinter den Heizkörpern rührt von den fortgesetzt durch aufsteigende Luftströme dorthin geführten Staubtheilchen her.

6) Die Luft des beheizten Wohnraumes soll einen bekömmlichen Feuchtigkeitsgehalt haben.

Die Aussenluft hat im Winter in Folge ihrer niederen Temperatur eine sehr geringe absolute Feuchtigkeit, beispielsweise bei 0° und 100 Procent Sättigung nur 4.6 mm Wasserdampf. Tritt nun diese Luft in das Zimmer und wird dort auf 20° erwärmt, ohne dass sie weiteren Wasserdampf aufnehmen kann, so entsteht ein sehr bedeutendes Sättigungsdeficit. Die Luft vermag bei 20° bis zu 17.4 mm Wasserdampf aufzunehmen; finden sich aber nur 4.6 mm, so beträgt die relative Feuchtigkeit nur 26 Procent und das Sättigungsdeficit 13 mm. Je niedriger die Aussentemperatur, je höher dagegen die Temperatur der Wohnungsluft ist, um so geringer muss die relative Feuchtigkeit sein, um so grösser das Sättigungsdeficit ausfallen.

Im Allgemeinen ist daher jede Heizluft relativ trocken, oft gar sehr trocken. Wie bereits früher (S. 112) ausgeführt wurde, wird aber bei Zimmertemperatur eine niedrige relative Feuchtigkeit resp. ein Sättigungsdeficit von 10 mm und mehr, gut ertragen. Erst dann, wenn die Luft viel Staub und eventuell noch brenzliche, durch Verbrennung des Staubes entstehende Produkte enthält, treten insofern Belästigungen hervor, als es in solcher Luft leicht zu Reizung und Schmerzempfindung auf der Kehlkopfschleimhaut, namentlich bei anhaltendem Sprechen kommt. — Dagegen sind wir, wie oben betont wurde, gegen höhere Feuchtigkeitsgrade bei der Temperatur geheizter Räume sehr empfindlich. Schon eine 60 Procent übersteigende Feuchtigkeit ruft, namentlich sobald etwas Ueberheizung vorliegt, ein Gefühl von Bangigkeit und Beklemmung hervor. Als „normal“ für die Luft beheizter Wohnräume ist daher eine Feuchtigkeit von 30–50 Procent zu bezeichnen.

Die Lufttrockenheit kann corrigirt werden entweder durch Ventilationsapparate, durch welche Wasser mechanisch fortgerissen wird (Brausen, die gegen ein Blechdach treffen; rotirende Räder, die Wasser eintauchen u. s. w.); oder durch Verdampfungsapparate.

Letztere müssen durchaus an heissen Stellen, auf den Oefen und Caloriferen selbst angebracht werden, weil sonst keine hinreichende ausgiebige Wasserverdunstung stattfindet und kalte Luft nicht zur Aufnahme grösserer Wasserdampfmengen befähigt ist.

7) An Stelle der zur Verbrennung des Brennmaterials consumirten Luft muss reine Luft in das Zimmer eingeführt werden. Bei jedem Heizbetrieb wird nicht nur diejenige Luftmenge fortgeführt, die zur Verbrennung des Brennmaterials gerade erforderlich ist, sondern der starke Auftrieb, welcher durch die Erhitzung bewirkt wird, veranlasst stets noch ein Abströmen überschüssiger Luftmengen durch den Verbrennungsraum. Ferner kommt auch durch den geschlossenen Heizkörper eine Erwärmung und Verdünnung der Luft des Wohnraums zu Stande, die ein Nachdringen kälterer Aussenluft zur Folge hat. Somit erhalten wir gleichzeitig mit der Heizung auch eine natürliche Ventilation der Wohnräume, deren quantitative Leistung von der Intensität der Beheizung abhängig ist. Für die nachströmende Luft müssen dann aber solche Wege vorgesehen werden, dass keine Verschlechterung der Luftqualität resultirt.

8) Die aus dem Schornstein entweichenden Verbrennungsgase sollen nur einen leichten, durchsichtigen Rauch bilden, da dichte Rauchmassen die Anwohner belästigen resp. durch Einathmung von Russ die Gesundheit schädigen (s. S. 163). Durch richtige Anlage und zweckmässigen Betrieb (gute Kohle, genügende Luftzufuhr, nicht zu frühen Schluss des Ofens, vor allem Vorsicht beim Nachheizen u. s. w.) lässt sich überall dichter Rauch vermeiden.

9) Der Betrieb der Heizung muss gefahrlos, einfach und billig sein.

Als preiswürdig bezeichnet man eine Heizanlage, wenn dieselbe ein möglichst hohes Güteverhältniss hat, d. h. wenn ein möglichst grosser Bruchtheil der insgesamt producirten Wärmeeinheiten der Erwärmung des Zimmers zu gute kommt. Gewöhnlich gehen durch die unvollständige Verbrennung des Materials und die mit höherer Temperatur entweichenden Rauchgase ca. 40—60 Procent der producirten Wärme verloren, so dass oft nur etwa ein Drittel für die Erwärmung des Zimmers ausgenutzt wird.

An jeder Heizvorrichtung unterscheidet man:

a) den Verbrennungsraum. In demselben findet die Verbrennung des Materials statt; durch den Rost ist er in den eigentlichen Feuerungsraum und den darunter gelegenen Aschenfall geschieden. Durch den Rost findet der Luftzutritt statt; nur bei sehr leicht brennbarem Material

n der Rost fehlen und es genügt eine Oeffnung für die in der Ofenthür.

1 Heizraum. Von diesem aus erfolgt die Wärmeabgabe an r; der Heizraum wird daher nach Möglichkeit verlängert in Gestalt der sogenannten Züge, durch welche die Rauch- hst auf- und niederströmen müssen, ehe sie in den Rauch- richen. Ausserdem wird oft die Oberfläche des Heizraumes ringung von Rippen und Verzierungen möglichst vergrössert bgabe der Wärme geeignet gemacht. Man darf indessen mit nung des Heizraumes nicht zu weit gehen. Die Rauchgase mer noch mit einer Temperatur von 120—200° in den 1 gelangen, falls ein genügender Zug unterhalten werden s darf daher keine Abkühlung der Rauchgase unter diese r erfolgen.

1 Schornstein, der gewöhnlich durch später zu besprechende or störenden Einflüssen des Windes, des Regens u. s. w. ge- rd.

ebtäuchlichen Heizeinrichtungen theilt man ein in Lokal- und Centralheizungen.

a) Lokalheizungen.

Lokalheizungen sind theils Kamine, theils Oefen.

in Kaminen existirt kein Heizraum, sondern es ist nur eine offene vorhanden, welche direct in den Schornstein übergeht (Fig. 110). Die des Zimmers erfolgt durch Strahlung vom Bei Holzfeuerung wird nur $\frac{1}{10}$ der Wärme Der Fussboden bleibt kalt, ebenso die Luft, rreichlichen Mengen dem Kamin zuströmt. gelangt ein Theil der Rauchgase in das




Fig. 110. Einfacher Kamin.

gewisse Verbesserung können die Kamine ahren, dass in denselben eine Kohlenfeuerung gebracht wird; ferner an der Vorderseite ein Regulirung des Luftzutritts. Ausserdem wird ngsöffnung des Kamins in den Schornstein acht und vor derselben eine stellbare Klappe ung der Grösse dieser Oeffnung angebracht.

itlich bessere Erwärmung liefern die GALTON'schen Kamine Bei denselben ist das die Heizgase abführende Rauchrohr von einem eben, in welchen unten Luft eintritt. Diese erwärmt sich am Rauch- itt oben in das Zimmer. Dadurch findet eine viel bessere Ausnutzung aterialen und gleichmässige Erwärmung des Zimmers statt. Immer- Kaminheizung selbst nach Anbringung aller dieser Verbesserungen ima durchaus ungenügend.

Bei den Oefen strömen die Verbrennungsgase durch einen ausgedehnten, für die Erwärmung des Zimmers möglichst nutzbar gemachten Heizraum.

Entweder verwendet man eiserne Oefen. In ihrer früheren primitiven Form sind dieselben unbedingt zu verwerfen; sie erwärmten sich nicht anhaltend, mussten sehr häufig beschickt werden und veranlassten daher starke Staubentwicklung im Zimmer. Ausserdem




Fig. 111. Gabelstee-Kamin.

hitzten sie sich zeitweise sehr intensiv und gaben dann zu höchst ungleicher Vertheilung der Temperatur im Zimmer und zur Verbrennung von Staubtheilchen Anlass; andererseits kühlten sie rasch und vollständig wieder aus, so dass nur durch fortgesetzte sorgfältigste Bedienung eine gleichmässige Regulirung der Temperatur gelang. — Eine sehr unvollkommene Besserung wird durch die Ausfütterung der eisernen Oefen mit Chamottesteinen erreicht; dieselben beseitigen die Uebelstände nur theilweise und sind wenig haltbar.

Alle Unzuträglichkeiten sind dagegen vollkommen zu beseitigen durch die Construction der Mantel-Regulir-Füllöfen. Als Füll- resp. Schüttöfen werden dieselben bezeichnet, weil sie das ganze Brennmaterial auf 6—12—24 Stunden auf einmal aufnehmen. Die meisten derselben sind ausserdem Dauerbrandöfen, d. h. sie brauchen nur einmal während der Heizperiode angeheizt zu werden, das frische Feuerungsmaterial wird immer auf die noch glimmenden Reste des früheren aufgeworfen. Die

Oefen entsprechen daher am besten der oben aufgestellten Forderung einer möglichst kontinuierlichen Heizung.

Das Brennmaterial wird entweder in einem senkrecht stehenden Cylinder eingefüllt und dann oben angezündet; die Verbrennung schreitet allmählich von unten nach oben fort. Der Luftzutritt soll dabei durch den unten gelegenen Rost erfolgen, um dies zu ermöglichen, müssen Kohlen verwandt werden, die nicht zusammenbacken, sondern auch nach dem Erhitzen für Luft durchgängig (schwammig) bleiben. Am besten eignen sich Coks oder abgesiebte ausserordentlich feine Anthracinkohle. Durch eine Thür, welche sich vor dem Rost befindet, ist die Verbrennung in sehr empfindlicher Weise regulirbar. Die Füllung des

ders kann eventuell auch ausserhalb des Wohnraumes vorgenommen werden, und der ganze gefüllte Cylinder wird dann in den Ofen eingesenkt. — Die Oefen werden mit einem seitlichen Schacht construiert (Schacht, Fig. 113), in welchen eine grössere Menge Kohlen auf einmal eintretet, nachdem an der tiefsten Stelle auf dem Rost ein Feuer angezündet ist, aus dem Schacht gleitet das zuerst aufgeworfene und das demnächst nachgefüllte Brennmaterial allmählich abwärts in den Verbrennungsraum. Der Rost ist gewöhnlich von aussen beweglich und dadurch eine Auffrischung des Korbrostes ermöglicht. — Eine besonders vollständige Verbrennung wird auch durch Korbrost mit aufrechtem Füllschacht erzielt.




Fig. 112. Meldingerofen.
Brennstoff. B Hals. C Verschleiss-
thür. D Rauchrohr. E Deckel.
Oberer durchbrochener Deckel.
K Mantel.




Fig. 113. Kämpfer's Schachtofen, Längsschnitt.
L Luftzufuhranal. S Regulirscheibe.

Zur Verhinderung der directen Strahlung sind diese Oefen ferner einem Mantel umgeben, d. h. in einem Abstände von mindestens 30 cm und höchstens 30—40 cm ist um den eigentlichen Ofen ein Cylinder gelegt, zuweilen in doppelter Lage, der unten in einem weiten Abstand vom Fussboden endet, so dass die Luft des Zimmers unter dem Mantel frei communicirt. Der Mantel wird bei hinreichendem weitem Abstand wenig mehr als handwarm; die Oefen wirken fast gar nicht durch Strahlung, sondern vorzugsweise durch die erwärmte Luft, die fortwährend unten in den Mantelraum

eintritt, oben erwärmt ausströmt und sich dann allmählich im Zimmer vertheilt (Circulationsöfen). — Der Mantelraum lässt sich aus dem sehr gut mit einem Ventilationscanal verbinden, der unter dem Fussboden nach aussen oder nach einem Corridor führt und durch welchen fortwährend frische Luft in das Zimmer geschafft wird (Ventilationsöfen s. Fig. 113 u. 114). Dieser Zufuhr canal ist gewöhnlich durch eine Klappe regulirbar, so dass je nach Bedarf bald nur Circulation der Zimmerluft durch den Mantelraum und dann starke Erwärmung des Zimmers, bald lebhafte oder gemässigte Ventilation hergestellt werden kann. — Nach diesen Principien sind z. B. construirt




Fig. 114. KEIDEL's Ofen.
F Luftcanal, von aussen kommend und in den Mantelraum mündend.




Fig. 115. KELLING'scher Mantelofen.

der MEIDINGER'sche Ofen (Fig. 112), der KEIDEL'sche Ofen (Fig. 114) und der Schachtofen von KÄUFFER & Co. (Fig. 113). Ohne Mantel aber vorzüglich regulirbar und als Dauerofen zu betreiben sind die Ofen von JUNCKER & RUH und der LÖNHOLD'sche Ofen (Fig. 116) letzterer mit sog. Sturzflammenfeuerung, d. h. die Flammen und Gas der beiden getrennten Feuerungen *dd* stürzen in eine dazwischen liegend Chamotte-Heizkammer *a*, in welcher sehr vollständige Verbrennung

steht. Ferner die CADE-Oefen, die mit sehr kleiner Anthracitkohle (—22 mm Korngrösse) beschickt werden müssen und vielfach als Miniofen arrangirt werden. — Für grössere Räume, Krankensäle u. s. w. empfiehlt sich der KELLING'sche Mantelofen (Fig. 115).

Wesentlich verschieden von den eisernen Oefen sind die Kachel- oder Massenöfen, bei welchen einmal am Tage eine grössere Menge Brennmaterial brannt und die dabei gelieferte Wärme der Steinmasse des Ofens aufgespeichert wird, so dass dieselbe von dort allmählich den Wohnraum übergeht. Zwischen den Ziegeln findet sich eine Füllung von Ziegeln und Lehm; aussen ist der ganze Ofen mit Kacheln umkleidet. Je nach dem Umfange des Ofens ist derselbe dann ein grösseres oder geringeres, im Vergleich zu den eisernen Oefen ein immer sehr bedeutendes Wärmereservoir. — Tragen die Kachelöfen einen eisernen Feuerraum, so bezeichnet man sie als gemischte Oefen.




Fig. 116. Sturzflammenfeuerung.

Die grossen Kachelöfen sind für unser Klima entschieden nicht geeignet, weil sie zu schwer regulirbar sind und sich den steten Temperaturschwankungen eines kalten Winters und Frühljahrs nicht hinreichend anpassen lassen. Herrscht am Morgen eine Aussen-temperatur von 0° und ist dementsprechend der Ofen nicht angeheizt, so kommt es vielfach vor, dass die Temperatur im Laufe des Tages auf + 10° steigt. Es giebt dann kein Mittel, um die Wärme des Ofens zu vermindern oder herabzumindern; die einmal in dem grossen Reservoir aufgespeicherte Wärme wird unter allen Umständen an den Wohnraum abgegeben und es muss erst eine Ueberhitzung zu Stande kommen. Andererseits ist es schwer, bei plötzlichem Sinken der Temperatur in wenigen Stunden eine entsprechend stärkere Erwärmung des Zimmers zu erzielen. — Die massiven Steinöfen sind daher nur für ein ausgesprochen nordisches Klima mit anhaltender Kälte geeignet. Für unser Klima müssen dieselben wenigstens von geringerem Umfange hergestellt, oder es müssen Uebergänge zwischen den Eisen- und Kachelöfen konstruirt werden, z. B. dadurch, dass ein eiserner Füllofen mit einem Mantel aus Kacheln umgeben wird.

Sehr vortheilhaft sind in vielen Fällen Gasöfen. Der Betrieb derselben und die Regulirung der Heizung ist einfacher und schneller als bei jeder anderen Heizung; in kürzester Frist kann Erwärmung und ebenso leicht völlige Auskühlung des Ofens erzielt werden. Ausserdem wird Staub und Russ am besten vermieden. Unbedingt muss für die Zufuhr der Heizgase (stets nach oben!) gesorgt sein. — Die Anschaffungs-

kosten sind gering, der Betrieb dagegen theuer; sie sind daher höchstens da zu empfehlen, wo für Heizgas billigere Preise berechnet werden, oder wo nur ausnahmsweise und als Reserve diese Heizung zur Anwendung kommen soll (Ergänzung von Warmwasserheizungen, ferner in Häusern mit Centralheizungen, wenn nach dem Erlöschen der letzteren im Frühsommer noch für kurze Zeit Heizung erforderlich ist).

In Gebrauch sind namentlich zwei Constructionen: Reflectoröfen, in Kaminform, mit einem Strahlschirm von gewelltem Messingblech, welcher die Wärmestrahlen der im oberen Theil brennenden Gasflammen ins Zimmer reflectiren soll. Ausserdem wird die Wärme der Rauchgase noch durch Blechanäle ausgenutzt (Fig. 117).

Mit besserer und gut regulirbarer Ventilation verbunden ist der Karlsruher Schulofen, ein Mantelofen, der vorzugsweise durch er-




Fig. 117. Warsteiner Refektorofen.




Fig. 118. Karlsruher Schulgasofen.
(Durchschnitt.)

wärmte Luft heizt und auf Circulation oder Ventilation gestellt werden kann (s. Fig. 118). Die Verbrennungsprodukte des Gases steigen in einem concentrischen engen „Schlitzkanal“ auf.

Zu Reserveheizungen empfohlen, aber ungeeignet und gefährlich sind die Carbonatronöfen. Unter Carbon wird eine Presskohle verkauft, welche aus gepulverter Buchenkohle präparirt ist. Dieselbe soll angeblich keine schädlichen Rauchgase liefern und man soll daher die Carbonöfen ohne oder mit unvollkommener Ableitung der Rauchgase verwenden können. Wiederholte Vergiftungen durch das Kohlenoxydgas, welches sich aus den Carbonöfen nachweislich in grosser Menge entwickelt, haben jedoch auf die Gefährlichkeit dieser Heizvorrichtung aufmerksam gemacht. Die genannten Oefen tragen gewöhnlich einen

älter, der mit einer Mischung von 1 Theil essigsaurem und 10 Theilen untervefligsaurem Natron gefüllt ist. Diese Salze schmelzen, wenn sie erwärmt werden, in ihrem Krystallwasser, vermögen dabei viel Wärme aufzunehmen und geben beim Wiederfestwerden wieder abzugeben. Derartige Behälter können ebenfalls als Fusswärmer u. s. w. gute Verwendung finden, sind aber auf jedem andern Ofen besser als auf den Carbonofen zu erwärmen.

b) Centralheizung.

Die Wärme wird von einem centralen Feuerherd aus durch Luft, Wasser oder Dampf nach den Wohnräumen hin transportirt.

Luftheizung.

Bei derselben wird Luft an einem Ofen erwärmt und dann den Räumen zugeleitet. — An einer Luftheizungsanlage unterscheidet man:

1) Den Heizapparat oder Calorifer. Gewöhnlich besteht derselbe aus einem grossen gusseisernen Schüttlofen; der Heizkörper ist kofferartig und dann mit zahlreichen Rippen versehen, oder er besteht in einem geschlängelten, oft ebenfalls mit Rippen versehenen Rohr, das oben beginnt und die Heizgase allmählich nach unten und von dort durch den Schornstein führt. Der Heizkörper muss die Wärme leicht und vollständig abzugeben im Stande sein.

2) Die Heizkammer, eine ummauerte Kammer, welche in einem gewissen Abstände den Heizkörper allseitig umgiebt. Nur an der Seite, wo sich die Feuerung befindet, fällt ihre Wand mit der des Heizapparates zusammen. In der Heizkammer münden alle Canäle für die Heizluft; ferner befinden sich dort Wasserbecken, welche zur Wasserdunstung dienen und am besten oben auf den heissesten Rippen des Calorifers angebracht werden (Fig. 119). — Die Heizkammer soll leicht betretbar sein, so dass eine regelmässige gründliche Reinigung des Calorifers und der ganzen Heizkammer vorgenommen werden kann. In unzugänglichen und selten gereinigten Heizkammern sammeln sich enorme Staubmassen, deren Verbrennung die Zimmerluft stark unzureinigen (vergl. S. 384).

Heizkammer und Heizapparat werden am tiefsten Ort des Hauses, im Souterrain, angelegt. Bei grossen Gebäuden sind mehrere Heizkammern und mehrere für sich bestehende Systeme von Luftheizung demselben Gebäude einzurichten.

3) Die Kaltluftcanäle. Die Entnahmestelle für die Aussenluft soll gegen Staub, üble Gerüche und dergleichen möglichst geschützt sein. Um ferner von Windstössen und Winddruck unabhängig zu sein, legt man am besten für jeden Calorifer an zwei entgegengesetzten

Seiten des Gebäudes Oeffnungen an. Stets lässt man die Luft zurück in eine Luftkammer, eine grössere Erweiterung des Zufuhrcanals, eintreten, welche plötzliche Windstösse abschwächt, und in welcher sich ein grobes Filter zur Abhaltung von Insecten befindet. Von da führt ein weiter Canal die Luft unten in die Heizkammer (Fig. 119).




Fig. 119 Schema einer Luftheizungsanlage.

Zuweilen werden auch feinere Filter (MOELLER'sches Filtertuch) angebracht, die zur Zurückhaltung des Staubes dienen sollen. Dieselben bewirken jedoch eine sehr starke Verengung des Querschnittes, falls die Filteröffnungen hinreichend fein sind und wirklich Staub abhalten, und sind nur anwendbar, wenn die Luftförderung durch maschinelle Kräfte unterstützt wird. — Besser sind in den Kaltluftkammern angebrachte Rahmen mit rauhem Stoff, die nicht den ganzen Querschnitt der Kammer füllen, sondern so gestellt sind, dass die Luft bald über, bald unter ihnen freien Raum findet, dabei aber immer an den rauhen Flächen vorbeistreicht. Sie müssen leicht herausnehmbar sein und gereinigt werden. — Sehr kräftig wirkt ein Wasserschleier auf die Staubeseitigung der dadurch hergestellt wird, dass in der Kaltluftkammer

Leitungsrohre mit feinen Bohrungen zahlreiche kräftige, verstäubende Strahlen aussenden. Die Betriebskosten sind aber relativ hoch. — Die Ursache für die Fernhaltung von Staub ist immer die richtige Auswahl der Behandlung der Entnahmestelle für die Luft. Hier sollte stets eine kleine Fläche mit Buschwerk vorhanden sein, die nach Bedarf befeuchtet wird.

4) Die Heizluftcanäle. Dieselben nehmen ihren Anfang in der Kammer und verlaufen von da in den Innenwänden des Hauses in den einzelnen Wohnräumen. Sie werden möglichst vertical geführt; bei langen, horizontalen Leitungen treten zu starke Reibungsverstände auf und die betreffenden Räume erhalten zu wenig Heizluft. — Die Eintrittsöffnungen dieser Canäle werden oben in der Heizkammer, die der Kaltluftcanäle unten angelegt; die zuströmende kalte Luft muss dann an dem Heizapparat aufwärts steigen, und da in dem Heizgase sich von oben nach unten bewegen, findet eine ausserordentlich vollständige Erwärmung der Luft statt.

Jeder Wohnraum bekommt seinen eigenen Heizluftcanal. Die Eintrittsöffnung im Zimmer liegt etwa 1—2 m über Kopfhöhe. Man wählt dieselbe so gross, dass die Geschwindigkeit der austretenden Luft höchstens $\frac{1}{2}$ —1 m beträgt, weil bei grösserer Geschwindigkeit heftige Zugempfindungen auftreten. Für grössere Zimmer wählt man mehrere Austrittsöffnungen; die einzelne soll nicht über 60 cm i. Quadr. sein. Wünschenswerth ist es, dass die Austrittscanäle nahe der Decke eine solche Wölbung oder aber unmittelbar vor der Oeffnung Vorhänge resp. stellbare Schirme erhalten, dass der Luftstrom immer möglichst gegen die Decke des Zimmers dirigirt wird; von da soll sich die Luft allmählich nach abwärts senken und dann in der unteren Partie des Zimmers abströmen.

5) Abfuhrcanäle. Bei allen grösseren Luftheizungsanlagen giebt es auch der Luft auch noch besondere Abfuhröffnungen. Diese führen in Canäle, welche in den Innenwandungen bis über das Dach hinausgehen, oder auf dem durch Firstaufsätze kräftig ventilirten Dachboden enden. Ihre Wirkung wird gesichert, wenn man sie mit einer Wärmequelle in Verbindung setzt, sie z. B. in den Mantelraum eines häufig benutzten Schornsteins (Fig. 119) führt oder sie mit Gashrennern oder dergleichen versieht. Die Abfuhrcanäle beginnen im Zimmer mit zwei Oeffnungen; die eine liegt nahe am Fussboden, die andere nahe der Decke. Nur die erstere soll für gewöhnlich benutzt werden. Wenn obere wird ganz ausnahmsweise dann geöffnet, wenn im Zimmer zu grosse Wärme entstanden ist und nunmehr die einströmende Luft, ohne den bewohnten Theil des Zimmers berührt zu haben, direct nach oben abströmen soll; meist ist sie ganz entbehrlich.

Alle die aufgezählten Canäle müssen mit grosser Sorgfalt hergestellt und namentlich im Innern derartig verputzt sein, dass sich keinerlei Staub ablöst. Auch müssen sie entweder zum Zweck der Reinigung besteigbar sein oder doch wenigstens mit Bürsten leicht und vollständig gereinigt werden können.

Die Regulirung der ganzen Heizanlage geht in folgender Weise vor sich. Zunächst ist die Heizluft auf die einzelnen Räume richtig zu vertheilen. Ungefähr gelingt dies schon durch eine vorläufige Berechnung der für jedes Zimmer erforderlichen Weite der Canäle und der Grösse der Ausströmungsöffnung für die Heizluft. Bei der Probeheizung zeigt sich aber gewöhnlich doch, dass das eine Zimmer zu viel, das andere zu wenig Heizluft bekommt und daher sich nicht auf dem vorgeschriebenen Temperaturgrad hält. Um dann nachträglich noch eine richtige Vertheilung zu erzielen, ist in jedem Heizluftcanal eine Drosselklappe angebracht und diese wird dann ein- für allemal so gestellt, dass der Canal den für das Zimmer richtigen Querschnitt erhält.

Je nach der Aussentemperatur wechselt dann aber der tägliche und stündliche Bedarf desselben Raumes an Heizluft, und es ist schwierig, mit der centralen Feuerung diesen Schwankungen zu folgen. Vielfach behilft man sich damit, dass anfangs reichlich geheizt wird, meist durch die sog. Circulationsheizung, bei welcher die Abfuhr- canäle geschlossen sind und die Heizluft aus den Zimmern wieder zur Heizkammer zurückströmt (Fig. 120). Ist dann im Zimmer die gewünschte Temperatur erzielt, so wird die weitere Zufuhr von Heizluft durch Schliessen von Klappen in den Zufuhrcanälen vollständig sistirt. Damit hört aber jede Zufuhr von Luft überhaupt und jede Ventilation vollkommen auf, und es wird dies bei Luftheizungen um so schwerer empfunden, als allgemein bei denselben das Verbot besteht, Fenster und Thüren zu öffnen, damit nicht durch den Einfluss derartiger willkürlicher Oeffnungen die geregelte Vertheilung der Luft in Unordnung gerathe.

Um eine Regulirung der Temperatur zu bewirken, ohne das Quantum der zuströmenden Luft zu verringern, müssen offenbar Vorrichtungen vorhanden sein, welche eine Mässigung der Temperatur der Heizluft bewirken. Es geschieht dies gewöhnlich dadurch, dass für jeden Heizluftcanal ein Mischcanal hergestellt wird, d. h. nach dem Austritt aus der Heizkammer oder innerhalb der Wand der Heizkammer vereinigt sich der Heizluftcanal (*H* in Fig. 120) mit einem nach aussen resp. nach dem untersten Theil der Heizkammer führenden Kaltluftcanal (*K*) und durch Stellung einer Klappe *m* kann entweder

oder der andere Canal abgesperrt oder es kann eine beliebige g beider Luftarten erzielt werden.

Temperaturregulirung für sämtliche Räume ist alsdann Nähe der Heizkammer verlegt und ist Sache des Heizers.

derselbe über die tur der Wohn- rientirt ist, ohne n betreten zu sind entweder

Thürfüllungen meter eingelassen, aussen abgelesen und die mit nstanten und be- Abweichung die tur im Innern imers anzeigen; sind Metallther- im Wohnraume ht, deren Stand zer durch elek- Uebertragung er- ann (MOENNICH'- ermessinduktor).

nals sollte eine ng an Heizluft- von den Be-

des Zimmers vorgenommen werden, da hierdurch der Betrieb en Anlage gestört wird.

en die Luftheizungsanlagen hat sich in neuerer Zeit eine lebhaft e erhoben. Es wird vielfach über eine Ueberhitzung der Räume und ichte Regulirfähigkeit der Anlage geklagt. Es kommt dies jedoch vor, wenn entweder die Bewohner des Zimmers sich an der Regulirung eratur betheiligen oder wenn der Heizer überbürdet und nicht aus- lich für die Controle der Heizung angestellt ist. Nicht selten e besten Anlagen dadurch völlig verdorben und funktionsunfähig ge- se man an der Anstellung eines ausschliesslichen Heizers zu sparen sucht. freistehenden und dem Winde stark exponirten Gebäuden bereitet die Luftheizung gewisse Schwierigkeiten. Es kommt dann sehr leicht nangelhaften Erwärmung auf der dem Winde exponirten und zu einer Erwärmung auf der dem Winde abgekehrten Seite des Hauses. e Klagen werden ferner darüber erhoben, dass eine schlechte Luft in Luftheizung versehenen Räumen herrsche. Der Grund dieser Klage




Fig. 120. Luftheizung. Heizkammer und Canäle.

H Heizkammer. O Ofen. S Schornstein. K Kaltluftcanal. W Warmluftcanal. M Mischcanal. V Abfuhrcanal. C Circulationscanal; ist die Klappe c in die obere Stellung gebracht, so strömt die Luft aus dem Zimmer N durch den Canal C wieder nach der Heizkammer.

liegt fast jedesmal in dem Fehlen geeigneter Mischcanäle und in dem Aufhören jeglicher Luftzufuhr, nachdem die Räume hinreichend erwärmt sind. Eine Luftheizung, die in normaler Weise mit Mischcanälen versehen ist, gewährt im Gegentheil eine reichlichere Lüfterneuerung, als mit irgend einem anderen System erzielt werden kann. — Vielfach wird auch die Luft als staubig und von eigenthümlich brenzlichem Geruch bezeichnet. Dies ist dann der Fall, wenn die Entnahmestelle für die Luft ungünstig ist, wenn die Canäle schlecht verputzt und mangelhaft gereinigt sind und wenn namentlich die Heizkammer, wie man es bei älteren Anlagen vielfach findet, überhaupt nicht zum Zwecke der Reinigung betreten werden kann, so dass es zu Staubanhäufung und Staubverbrennung auf dem Calorifer kommt.

Endlich wird der Luftheizung oft eine besonders trockene Luft vorgeworfen. Meist ist aber der Feuchtigkeitsgehalt der Luft — abgesehen von Ueberheizungen — nicht abnorm niedrig, sondern die lästigen Empfindungen sind auch hier hauptsächlich auf den Staubgehalt der Luft und die durch Staubverbrennung entstehenden brenzlichen Produkte zurückzuführen, die bei zweckmässiger Anlage und gutem Betriebe leicht vermieden werden können.

Wasserheizung.

Das Wasser ist sehr geeignet zur Wärmeübertragung wegen seiner grossen Wärmecapacität. Die Anordnung einer Wasser-Heizanlage ist so, dass im Souterrain der Feuerraum und über diesem ein Kessel sich befindet (die Heizung kann auch mit dem Küchenheerd verbunden werden [LIEBAU]). Vom Kessel geht ein Röhrensystem aus, das wieder in denselben zurückführt und inzwischen die verschiedenen zu beheizenden Räume durchläuft (s. Fig. 121). Das im Kessel erwärmte Wasser wird als specifisch leichter zunächst nach oben bis zum höchsten Punkte des Systems, dem Expansionsgefäss, gedrückt; von da fließt es allmählich unter steter Abkühlung wieder zum Kessel zurück.

Ist das Röhrensystem oben offen, so erreicht die Temperatur des Wassers im äussersten Falle 100° oder wenig darüber; für gewöhnlich ist die Temperatur erheblich niedriger. In Folge dieser niedrigen Temperatur muss die Masse des Wassers, welches den Wohnräumen zugeführt wird, relativ gross sein und die aus Schmiedeeisen, seltener aus Kupfer hergestellten Röhren weit (50—60 mm). Die Anlage ist daher relativ theuer und man findet sie mehr in Privathäusern, als in öffentlichen Gebäuden („Niederdruckwasserheizung“ oder „Warmwasserheizung“). — Oder das Röhrensystem ist oben geschlossen durch ein belastetes Ventil. Je nach der Belastung erzielt man eine Temperatur von 120 — 200° und bedarf dann geringerer Wassermengen und engerer Röhren. Eine solche Heizanlage bezeichnet man als „Hochdruckwasserheizung“ oder „Heisswasserheizung“.

Bei der Warmwasserheizung sind die Heizkörper entweder sogenannte Säulenöfen (Fig. 121); ein Mantel aus doppeltem Eisenblech, dessen Wandungen das Wasser circulirt, umschliesst einen Luftm, der mit der Zimmerluft communicirt, so dass dieselbe unten ein- oben abströmt. Gewöhnlich wird der Luftraum ausserdem mit einem verstellbaren Zufuhrkanal von aussen in Verbindung gebracht, dass (wie bei den Mantelöfen) beliebig auf Circulation oder Ventilation gestellt werden

m. — Oder es sind kastenartige Ursprünge, oder Löhrenconvolute (Löhrraster), oder Rippenheizkörper, die, wenn frei stehen und Zierrathen versehen sind, als Radiatoren bezeichnet werden, an einer Wand, unter den Fensterbrüstungen u. w. angebracht, als Heizkörper dienen. An der besten Stelle des

Heizsystems findet sich ein Expansionsgefäss, von welchem aus das ganze System mit Wasser gefüllt wird. An der tiefsten Stelle ist ein Ablasshahn angebracht.

Die Regulirung der Heizung erfolgt dadurch, dass jeder einzelne durch einen Hahn abgesperrt und von weiterer Zufuhr warmen Wassers ausgeschlossen werden kann. Soll eine schnellere Kühlung eines Zimmers erzielt werden, so kann man das Wasser des Ofens ablassen. Ausserdem sind noch die Ventilationscanäle zu einer Regulirung geeignet. — Die Beheizung wirkt sehr nachhaltig in Folge der grossen im Wasser aufgespeicherten Wärmemenge. Allerdings gelingt das Anheizen nur langsam, und bei plötzlichem Absinken der Temperatur kann eine genügende Erwärmung auf Schwierigkeiten stossen. Einige Gasöfen als Reserve sind daher empfehlenswerth.

Bei der Heisswasserheizung sind enge, sehr starke, auf 150 Atmosphären geprüfte Röhren vorhanden. Auch der Heizkessel stellt




Fig. 121. Warmwasserheizung.

A Kessel. b Steigrohr. e Expansionsgefäss. d Vertheilungsrohr. g Zuleitungsrohre zu den Öfen. o Öfen. f und h Rücklaufrohre.

nur ein spiralig aufgerolltes Rohr dar, das direct von den Flammen der Feuerung umspült wird. Die Heizkörper bestehen ebenfalls in kleineren Spiralen (s. Fig. 122). Am höchsten Punkte des Röhrensystems befindet sich ein Expansionsdruckventil, das so belastet ist,




Fig. 122. Heisswasserheizung.

A Feuerstelle. b Steigrohr. H Heizschlangen.
c Rücklaufrohr. e Expansionsgefäß.

dass es sich beispielsweise erst bei 10 oder 15 Atmosphären Druck öffnet und das überschüssige Wasser in ein Reservoir treten lässt. Durch ein Expansionsausgussventil tritt beim Erkalten das Wasser wieder in das Röhrensystem zurück. Jedes Röhrensystem hat höchstens 180 m Länge; bei einiger Ausdehnung des Hauses werden daher mehrere Systeme nebeneinander angelegt. — Die Heisswasserheizung ist billig in der Anlage und gestattet rasche Anheizung; die Heizkörper kühlen sich aber auch rasch wieder ab, ferner strahlen sie ziemlich stark aus und geben zuweilen zu üblen Gerüchen durch Verbrennung von Staub an den Röhren Anlass. In einigen Fällen haben Explosionen

stattgefunden, die allerdings immer den Kessel betrafen. Für Privathäuser, Krankenhäuser, Schulen ist directe Heisswasserheizung im Ganzen nicht geeignet.

Aus der Hochdruckwasserheizung lässt sich eine sogenannte Mitteldruckwasserheizung dadurch herstellen, dass man die Rohre weiter construiert und das Ventil so wenig belastet, dass eine maximale Temperatur von 120–130° resultirt.

Eine verbreitete Anwendung, auch für Schulen und Krankenhäuser, hat die Heisswasserheizung in Verbindung mit einer Luftheizung gefunden. Der Calorifer besteht dann aus einem längeren spiralig aufgerollten Rohr einer Heisswasserheizung; die Anordnung der Luftkammer und der Canäle ist wie bei der Feuerluftheizung. Vor dieser bietet die Heisswasserluftheizung den Vortheil, dass nicht so starke Ueberhitzung des Calorifers und der Heizluft eintreten kann.

Dampfheizung

gestattet Anlagen von unbeschränkter Ausdehnung, die sich daher namentlich für grosse Etablissements, eventuell für ganze Stadtviertel eignen. Besonders zweckmässig ist Dampfheizung für Gebäude, welche

reits zum Betriebe der Küche, der Wäsche, der Bäder u. s. w. eines äusseren Dampfkessels bedürfen.

Der Kessel befindet sich gewöhnlich ziemlich entfernt vom Hause und wird durch das Condenswasser gespeist. Vom Kessel aus wird der Dampf in einer Rohrleitung aus Schmiedeeisen oder Kupfer den Wohnräumen zugeführt. Da man dem Dampf nicht gern mehr wie $\frac{1}{2}$ Atmosphären Spannung giebt, so dass er eine Temperatur von $10-120^{\circ}$ hat, und da der Dampf eine sehr geringe Wärmecapacität besitzt, müssten eigentlich sehr grosse Dampfmengen zur Beheizung der Räume nothwendig sein. Man rechnet indess gar nicht wesentlich auf die von dem strömenden Dampfe abgegebene Wärme, sondern vielmehr auf diejenige Wärme, welche bei der Condensation des Wasserdampfs frei wird. Bei der Bildung von 1 Liter Condenswasser werden 540 Wärmeeinheiten frei und für die Erwärmung der Wohnräume verfügbar, wenn man die Condensation in den in den Zimmern aufgestellten Heizapparaten vor sich gehen lässt.

Die Röhren sind mit Compensatoren versehen, welche der Wärmeausdehnung Rechnung tragen. Das Hauptrohr führt den Dampf zunächst zu dem höchsten Punkt der Anlage und von da durch die Heizkörper abwärts. Lässt man das Condenswasser in den Dampföhren zurückfliessen, so entstehen fortgesetzt störende Geräusche; man wählt daher gewöhnlich besondere Rohre zur Ableitung des Condenswassers. Dieselben können weit engeres Lumen haben, als die Dampföhre, da der Dampf ein 1700 mal grösseres Volumen besitzt, als das entsprechende Condenswasser. Damit durch die Condenswasseröhren kein Dampf entweicht, findet der Uebertritt des Wassers in dieselben vermittelt selbstthätiger Ventile statt. — Die Heizkörper werden durch Oefen nach Art der Warmwasseröfen oder durch Register oder Röhrenconvolute gebildet.

Bei der Condensation entsteht ein Vacuum, und die Röhren und Heizapparate würden leicht durch den äusseren Luftdruck comprimirt werden, wenn man nicht dafür sorgt, dass Luft in die Röhren eintreten kann. Die eingeströmene Luft muss dann aber, um dem einströmenden Wasserdampf kein Hinderniss zu bereiten, beim Zulassen neuen Dampfes wieder entfernt werden. Das Ein- und Abströmen der Luft in das Röhrensystem geschieht entweder durch besondere Hähne oder durch selbstthätige Ventile, ist aber oft mit Geräuschen verbunden.

Vielfach legt man der Geräusche wegen die Heizkörper überhaupt nicht die Wohnräume selbst, sondern verbindet die Dampfheizungen mit einer Lüftung der Art, dass man die Luft an einem centralen Dampfheizkörper oder an mehreren, z. B. auf dem Corridor aufgestellten Heizkörpern sich erwärmen und dann in das Zimmer einströmen lässt.

Grosse Verbreitung gewinnen in neuerer Zeit die sogenannten Niederdruckdampfheizungen, die auch in kleineren Gebäuden sich mit Vortheil ausführen lassen.

Der Kessel dieser Heizung hat ein offenes Standrohr, so dass höchstens $\frac{1}{4}$, gewöhnlich nur $\frac{1}{10}$ Atmosphäre Ueberdruck vorhanden ist, und ist daher nicht concessionspflichtig. Im Kessel befindet sich ein centraler Heizkasten, der von oben beschickt wird. Der Luftzutritt zur Feuerung und damit die Intensität der Feuerung und Dampfbildung kann automatisch durch die Dampfspannung im Kessel regulirt werden (BECHER & POST); oder eine in Hg schwimmende Glocke hebt je nach ihrer Belastung durch Plattengewichte ein Ringventil, das den Luftzutritt zur Feuerung regelt (KELLING). Die Heiz-




Fig. 123. Heizkörper der Niederdruckdampfheizung.
r Zu- und Ableitungsrohr. B Isolirmantel. c verstellbare Klappe.
d Öffnung für Circulation. d₁ für Ventilation.

apparate sind Radiatoren oder Rippenregister, die vielfach mit einem „Vorsetzer“, einem Mantel aus Eisenblech, oder auch aus schlecht leitendem Material umgeben sind, so dass keine Erwärmung der Zimmer durch Strahlung stattfindet (Fig. 123). Die Beheizung geschieht dann vielmehr durch erwärmte Luft, die unten an dem Heizapparate ein- und oben austritt. Die Eintrittsöffnung ist beliebig verstellbar; vom Heizapparat geht ausserdem ein Canal nach

aussen, durch welchen frische Luft in's Zimmer eingeführt werden kann. — Die Regulirung der Wärme der Heizkörper erfolgt im übrigen dadurch, dass der für die Wärmeabgabe ausgeschaltete Theil sich mit Wasser (Körtnische Syphon-Wasservorrichtung) oder mit Luft aus der Kondensleitung füllt.

Neuerdings wird für Gebäude mit starkem Ventilationsbedarf Schulen, Krankenhäuser u. s. w., vielfach vorgezogen, zunächst durch Zufuhr von gewärmter Luft mittelst einer gesonderten Luftheizung die nöthige Ventilation zu beschaffen und zugleich damit einen Theil des Wärmebedarfs zu decken; dann aber für die Deckung des weiteren Wärmebedarfs, namentlich in den Perioden grösserer Kälte, durch Oefen oder Wasser- oder Dampfheizung zu sorgen. Die Unabhängigkeit beider Anlagen von einander ist von entschiedenem Vortheil. — Ueber die sog. Fussbodenheizung siehe im Kap. „Krankenhäuser“.

Litteratur: RIETSCHEL, Leitfaden zum Berechnen und Entwerfen von Lüftungs- und Heizungsanlagen, 3. Auflage, Berlin 1902. — FISCHER im Handbuch der

hitektur. Th. III, Bd. 4, 1891. — FANDERLIK, Elemente der Lüftung und Heizung, 1887. — SCHMIDT, Heizung und Ventilation, in WEYL's Handbuch der Hygiene, 1896. — v. ESMARCH, Hygienisches Taschenbuch, 1896.

V. Ventilation der Wohnräume.

Wie S. 158 genauer ausgeführt wurde, verändern die in einem geschlossenen Raume lebenden Menschen die Beschaffenheit der Luft in hohem Grade, indem sie erstens Wärme und Wasserdampf in grosser Menge produciren, dass schliesslich eine ausreichende Entwässerung des Körpers auf Schwierigkeiten stösst. Häufig sind an dieser Produktion die Beleuchtungskörper der Wohnräume stark betheiligt. Zweitens consumiren Menschen und Beleuchtungsmaterialien allmählich den Sauerstoff, jedoch ohne dass es je zu einer bedenklichen Verminderung des Sauerstoffgehalts der Luft kommt. Drittens sammeln sich gasförmige Verunreinigungen an, Kohlensäure, ferner giftige Gase, die durch Zersetzung der auf Haut und Schleimhäuten sammelnden Epithel- und Secretreste, oder auch durch unvollständige Verbrennung der Beleuchtungsmaterialien u. s. w. entstehen. Viertens ist die hygienische Bedeutung dieser Luftverunreinigungen (S. 158). — Viertens kommt es in bewohnten Räumen oft zu einem hohen Staubgehalt der Luft. Eingeschleppte Erde, Staub aus der Reinigung des Zwischenbodens, Fasern von der Kleidung und den Möbeln, die feinsten Theilchen der Brennmaterialien und die mit der Aussenluft in den Wohnraum gelangenden Staub- und Russpartikel bilden das Material des Wohnungsstaubes, der bei den verschiedensten Störungen und Bewegungen der Bewohner in die Luft aufgewirbelt wird. In besonders grossen Mengen wird bei manchen Gewerben Staub erzeugt (s. unten). — Fünftens gesellen sich zum Luftstaub infektiöse Organismen, wenn Infektionsquellen in den Wohnraum gebracht werden, theils in Form von ausgehusteten Tröpfchen (Influenza, Diphtherie, Pneumonie) oder ausser in Tröpfchenform auch in Gestalt trockener Schuppen (Phthirse, Masern, Pocken u. s. w.). In Krankensälen, in denen, wo derartige Kranke sich aufhalten, ist die Luft häufig überdies mit Infektionserregern beladen und kann leicht zu Infektionen Anlass geben (s. S. 169).

Die Ventilation verfolgt nun den Zweck, alle diese durch die ohne bewirkten Veränderungen der Wohnungsluft möglichst zu beseitigen und die Räume auch für längere Zeit ohne jeden Nachtheil für die Gesundheit bewohnbar zu erhalten. Sie hat daher die Aufgabe:

1) die producirt Wärme abzuführen und die Wärmeabgabe der Bewohner zu erleichtern; 2) den verbrauchten Sauerstoff zu ersetzen; 3) die gasigen Verunreinigungen der Wohnungsluft zu entfernen; 4) den Staub und 5) etwaige am Staub haftende Infektionskeime zu beseitigen. — Diese Aufgabe sucht die Ventilation zu erreichen theils durch Fortschaffung der unbrauchbar gewordenen Wohnungsluft, theils durch Zuführung frischer, reiner Aussenluft; die Grösse des Luftwechsels soll dabei dem Grade der Verunreinigung der Wohnungsluft einigermaßen angepasst werden.

Dementsprechend ist zunächst die Frage aufzuwerfen, wie sich über den quantitativen Ventilationsbedarf eine Orientirung gewinnen lässt; sodann sind die Mittel und Wege zu bezeichnen, mit Hülfe deren das geforderte Ventilationsquantum geliefert werden kann und es sind die verschiedenen Arten von Ventilationsanlagen zu schildern; und schliesslich ist zu fragen, inwieweit die praktisch ausführbaren Ventilationsanlagen den einzelnen oben aufgezählten Aufgaben gerecht werden.

A. Der quantitative Ventilationsbedarf.

Bei der Abmessung des Ventilationsbedarfs berücksichtigt man gewöhnlich nur die gasigen Verunreinigungen der Luft und als deren Indikator die CO_2 , da diese am leichtesten einer Messung zugänglich ist.

Wie oben (S. 161) näher ausgeführt wurde, empfindet man bei einem Gehalt der Luft von 1.0 pro mille Kohlensäure bereits eine gewisse Belästigung, vorausgesetzt, dass die CO_2 der menschlichen Athmung und der Beleuchtung entstammt, und dass die hygienisch differenten, die Kohlensäure begleitenden gasigen Produkte gleichzeitig und in entsprechender Menge in die Luft übergegangen sind. Demnach ist der Gehalt der Wohnungsluft an CO_2 durch die Lüftung höchstens auf 1.0 pro mille CO_2 , wo möglich darunter, zu halten.

Wie viel Luft nötig ist, um dies Ziel in jedem Einzelfall zu erreichen, das ist zu berechnen, sobald man die Menge der Kohlensäure berücksichtigt, welche Menschen und Beleuchtungsmaterialien in der Zeiteinheit (1 Stunde, 1 Tag u. s. w.) produciren.

Ein Mensch liefert im Mittel stündlich 22.6 Liter CO_2 ; ein Schulkind etwa 10 Liter, eine Stearinkerze 12 Liter, eine Petroleumlampe 60 Liter, eine Gaslampe 100 Liter. Befindet sich also z. B. ein Mensch in einem Wohnraum, und werden von demselben stündlich 22.6 Liter Kohlensäure producirt, so soll sich diese Menge Kohlensäure auf ein derartiges Luftquantum = x Liter vertheilen, dass der Gehalt an CO_2 nur 1 : 1000 beträgt. Da die zugeführte Luft bereits einen

rissen CO_2 -Gehalt mitbringt, nämlich 0.3 pro mille (also 0.0003 Liter jedem Liter Luft), so lautet die Gleichung:

$$\frac{22.6 + x \cdot 0.0003}{x} = \frac{1000}{1}$$

wir finden in dieser Weise $x = 32000$ Liter oder 32 cbm. Diese Luftmenge von 32 cbm muss also stündlich je einem Menschen zugeführt werden, falls der Kohlensäure-Gehalt im Wohnraum niemals 1 pro mille steigen soll.

Es ergibt sich hieraus weiter die erforderliche Grösse des Wohnraumes, der sogenannte Luftkubus, für einen Menschen. Man hat nämlich die Erfahrung gemacht, dass sich die Luft eines Wohnraumes

Hilfe der üblichen Ventilationsanlagen auf die Dauer im Allgemeinen nicht mehr wie zweimal pro Stunde erneuern lässt. Daraus folgt, dass der minimale Luftraum für einen Menschen auf 16 cbm, Hälfte des Ventilationsquantums, normirt werden muss.

In den meisten Fällen leistet die Ventilation weit weniger als zweimalige Erneuerung der Zimmerluft, und dementsprechend ist Luftkubus meist grösser zu bemessen.

Wohl zu beachten ist, dass die Ermittlung des Ventilationsbedarfs Grund der CO_2 -Werthe nur für einen Theil der Aufgaben der Ventilation Geltung hat. Höchstens die Produktion belästigender Gase geht häufiger dem CO_2 -Gehalt parallel zu gehen; dagegen ist ein Parallelismus mit der im Raum producirten Wärme selten und ein Parallelismus mit dem Gehalt der Luft an Staub und Infektionskeimen selten.

Da durch die Erschwerung der Wärmeabgabe im Wohnraum viel andere hygienische Nachtheile entstehen als durch belästigende Gase, hat RIETSCHEL mit Recht versucht, in den Fällen, wo ein Parallelismus zwischen CO_2 -Gehalt und Temperatur nicht zu erwarten ist, die Wärme des Wohnraums selbst als Maassstab für den Ventilationsbedarf zu benützen.

Im Beharrungszustand und bei gleichmässiger Vertheilung der Wärme im Raum ist der stündliche Luftwechsel in cbm, ausgedrückt der zulässigen Temperatur t , zu berechnen nach der Formel:

$$L = \frac{W(1 + \alpha t)}{0.306(t - t_1)},$$

t_1 die Temperatur der eingeführten kühleren Luft, W die Wärmehöhe, α den Ausdehnungskoeffizienten der Luft bedeutet.

Bei dieser Berechnung ist dann immer noch nicht die Wasserdampfsammlung berücksichtigt, welche neben CO_2 und Wärme von

Menschen und Beleuchtungsflammen geliefert wird, und welche die Wärmeabgabe stark beeinflusst, ausserdem auch spezifisches Unbehagen erzeugt. — Vollends gilt der aus dem CO_2 -Gehalt abgeleitete Luftbedarf nicht für die Beseitigung des Staubes und der Infektionserreger. — Für alle letztgenannten Aufgaben der Ventilation ist demnach eine vorgängige Bedarfsberechnung nur unvollkommen oder überhaupt nicht möglich.

B. Die Deckung des Ventilationsbedarfs.

1. Natürliche und künstliche Ventilation.

Die erforderlichen Luftmengen kann man zunächst durch die sogenannte natürliche, ohne unser Zuthun sich vollziehende Ventilation zu beschaffen suchen. Man verlässt sich alsdann auf die stets vorhandenen natürlichen Oeffnungen des Wohnzimmers, die in den Poren des Mauerwerks, des Fussbodens und der Decke, ferner in den Ritzen und Fugen der Fenster und Thüren gegeben sind.

Es ist aber experimentell nachgewiesen, dass die Porenventilation sich wesentlich in vertikaler Richtung durch die Poren der Decke und des Fussbodens vollzieht und zwar im Winter von unten nach oben; in entgegengesetzter Richtung dann, wenn das Haus kälter ist als die Aussenluft. Nach Messungen mit dem Differentialmanometer (S. 415) ist an den seitlichen Wandungen der Ueberdruck, welcher einen Luftaustausch veranlasst, wesentlich geringer; er nimmt vom Fussboden und von der Decke her allmählich ab gegen eine „neutrale Zone“, wo er = Null wird. Oberhalb dieser Zone findet im Winter Ausströmung, unterhalb derselben Einstömung statt. Diese Art von Luftaustausch führt also wesentlich zu einem Luftaustausch der verschiedenen Stockwerke, der in keinem Falle zu befürworten ist. — Ausserdem wissen wir bei dieser Ventilation nichts Genaueres über die Herkunft der einströmenden Luft. Ferner haben wir keine Regulirung dieser Lüftung in der Hand; dieselbe zeigt sich bei Windstille und schwachen Winden völlig ungenügend, während sie sich bei Sturm unter Umständen in unangenehmster Weise fühlbar macht. Aehnlich sind die Verhältnisse der Ein- und Ausströmung durch zufällige gröbere Ritzen und Fugen in den Seitenmauern; im Winter strömt im unteren Theil die kalte Luft ein, im oberen die warme aus.

Es ist somit die natürliche Ventilation von dem Ideal einer Lüftungsanlage sehr weit entfernt. Wir müssen dieselbe so viel als möglich, insbesondere durch Dichtung der zufälligen Ritzen und Fugen, ausschalten und statt dessen versuchen, besondere, künstliche Lüftungsanlagen einzurichten; bei diesen muss

1) die Entnahmestelle bekannt sein und wir müssen Garantie der Reinheit der zugeführten Luft haben; ebenso darf die fortgeschaffte reine Luft nicht mit Menschen in Berührung kommen.

2) müssen wir die Lage der Zufuhr- und der Abfuhröffnungen wählen können, dass eine möglichst vollständige Durchlüftung des bewohnten Theils des Zimmers erfolgt und dass unter keinen Umständen eine Belästigung der Bewohner durch Zugluft eintritt;

3) muss die Ventilation jeder Zeit quantitativ ausreichen, d. h. überreichend kräftige Motoren verfügen, die leicht regulirbar sind.

2. Systeme der künstlichen Lüftung.

Nach der Art der Luftentnahme unterscheidet man zwei Ventilationssysteme, die in Bezug auf die Reinheit der Luftzufuhr Ungleiches leisten; nämlich das Aspirationssystem und das Pulsionssystem. Im ersterem besorgt der Motor die Abströmung der Luft, befindet sich weils des von dem Luftstrom zu ventilirenden Raumes. Bei der Pulsion besorgt der Motor die Zuströmung und befindet sich — in der Richtung des Luftstroms — vor dem zu ventilirenden Raum.

Die Pulsion ist insofern vorzuziehen, als man bei dieser gerade die Entnahmestelle der Luft besonders in's Auge fasst und also auf das Eindringen frischer, reiner Luft in erster Linie achtet. Um die abströmende Luft kümmert man sich dabei oft nicht. — Bei der Aspiration weist man der abströmenden Luft zwar besondere Wege an, achtet aber weniger darauf, woher und auf welchen Wegen die Luft dem Wohnraum zuströmt.

Allen Anforderungen entsprechend und der Pulsion gleichrthig wird die Aspiration dadurch, dass man ausser den Abfuhröffnungen auch besondere, weite und wenig Widerstände bietende Zufuhrkanäle von einer bestimmten tadellosen Stelle aus anlegt. Wirkt man dann aspirirend, so bleiben alle engeren, zufällig vorhandenen Oeffnungen unberücksichtigt und die Zuströmung erfolgt nur auf dem gewiesenen Wege. — Andererseits ist Pulsion in vielen Fällen völlig unangebracht, wo es sich darum handelt, in grossen grösserer Gebäude einzelne Räume zu ventiliren, in denen unangenehme Gerüche, Staub, Infectionserreger in die Luft übergehen (Closets, Krankenräume). Ein Pulsionssystem würde hier die unangenehmen Gerüche u. s. w. in die übrigen Theile des Hauses verbreiten. Hier ist vielmehr lediglich Aspiration indicirt. — Nicht selten kombiniert man beide Systeme und erzielt damit die besten Wirkungen.

Ueber die Entnahmestellen der zuströmenden Luft und ihre Befreiung von Staub durch Einschaltung von Filtern u. s. w. siehe S. 395.

3. Anordnung der Ventilationsöffnungen.

Die Frage, wo die Ventilationsöffnungen im Zimmer angebracht werden sollen, ist nicht für jeden Fall in gleicher Weise zu entscheiden. — Für gewöhnlich ist das untere Drittel des Zimmers, das eigentlich bewohnt wird, zu ventiliren, und man könnte es daher wohl für das richtigste halten, in diesem unteren Drittel die Einstromungsöffnungen, und oben oder unten die Abströmungsöffnungen anzubringen. Diese




Fig. 124 a. Winterventilation.
Z Zufuhr-, A Abfuhrcanal.


Anordnung ist jedoch nur dann zulässig, wenn die Aussenluft, wie dies im Hochsommer der Fall ist, ungefähr die gleiche Temperatur hat, wie die Zimmerluft („Sommerventilation“, Fig. 124 b). Andernfalls ist stets mit dieser Anordnung eine zu lästige Zugempfindung verbunden. Während des grösseren Theils des Jahres sind daher die Zufuhröffnungen unbedingt über Kopfhöhe anzulegen und auch dann ist dem Luftstrom zunächst eine Richtung nach oben zu geben. Von da

soll sich die Luft allmählich nach abwärts senken, das bewohnte untere Drittel des Zimmers durchströmen, und ist dann unten abzuführen, und zwar durch über Dach gehende Kamine entweder mit besondere grösseren Oeffnungen im Zimmer oder mit offenen Sammelcanälen, die mit Hilfe von Holzpanelen u. dergl. am Fusse der kältesten Wände angelegt werden („Winterventilation“, Fig. 124a).

Es ist zwar darauf hingewiesen, dass die verdorbene Luft sich gewöhnlich unter der Decke am stärksten ansammelt. Dies ist aber — abgesehen von Wärmequellen im oberen Theil des Zimmers — nur dann der Fall, wenn letzteres nicht genügend ventilirt wird. Ist die Ventilation ausreichend, so kommt es zu keiner solchen Ansammlung und es wird eine ausreichend reine Luft in den unteren Theil des Zimmers geführt.

Unter Umständen kommt es allerdings vor, dass vorübergehend die Ventilation ungenügend ist (wenn ausnahmsweise zahlreiche Menschen

n Zimmer versammeln u. s. w.) und dass dann Wärme, Tabaks-
w. im oberen Theile des Zimmers sich häufen. In diesem Fall ist
r zeitweise so zu ventiliren, das seine obere, nahe der Decke
r Decke gelegene Abströmungsöffnung benutzt wird, während
ömung wie bisher (über Kopfhöhe) bleibt (Fig. 124c). Für
ist diese Anordnung jedoch nicht beizubehalten, weil dabei
Drittel des Zimmers verhältnissmässig unberücksichtigt bleibt.
andere Anordnung ist ferner dann nöthig, wenn unter der
ke Wärmequellen, z. B. Gaskronleuchter u. s. w. angebracht sind,
äftiges Aufsteigen der verdorbenen Luft bewirken. Die Ab-
ist dann oben, die Einströmung im unteren Theil des Zimmers
n, wie bei der Sommerventilation. Dementsprechend ist die



b. Sommerventilation.




Fig. 124 c. Vorübergehende Ventilation.

ngsluft sorgfältig zu temperiren oder, wenn sie kalt oder stark
inströmt, muss gleichzeitig eine energische Vertheilung der
den Luft auf viele kleine Oeffnungen (Porenventilation) vor-
erden, um lästige Empfindungen zu vermeiden.

4. Motoren.

eweilige quantitative Leistung und die Regulirfähigkeit
ationsanlage ist von der Art des angewendeten Motors ab-

lotoren stehen uns zur Verfügung: a) der Wind, b) Tempe-
enzen, c) maschineller Betrieb.

r Wind. Derselbe muss bei jeder Ventilationsanlage be-
t werden, weil er dieselbe andernfalls leicht ungünstig be-
kann. Statt dessen sucht man den Wind so viel als möglich
stützung der Anlage heranzuziehen. Sich auf den Wind als
sslichen Motor zu verlassen, ist nicht zulässig, weil Rich-

tung und Stärke des Windes zu grossen Schwankungen unterliegen. In einer gewissen Höhe über dem Boden haben wir allerdings selten völlige Windstille, aber gerade an heissen schwülen Tagen versagt diese Wirkung gänzlich, und die Differenzen der Windstärke sind so gross, dass sie eine fortgesetzte Regulirung der Anlage nöthig machen.

Die Unterstützung der Anlage durch Wind wird entweder in der Weise arrangirt, dass man denselben über Dach aspirirend auf die Luft der Abfuhrcanäle wirken lässt, und dass man Einrichtungen trifft, mittelst welcher diese Aspiration bei jeder Windrichtung ausgeübt wird. Dies wird erreicht durch die Schornsteinaufsätze oder „Saugkappen“. Die Wirkung derselben stützt sich auf 2 experimentell begründete Erfahrungen: einmal darauf, dass jeder Luftstrom in Folge der Reibung die nächstgelegenen Lufttheilchen mit sich fortreisst und hier-

durch in seiner Umgebung eine Luftverdünnung veranlasst, die zu weiterem Zuströmen der umgebenden Luft den Antrieb giebt; zweitens darauf, dass ein Luftstrom, der gegen eine Fläche oder




Fig. 125. WOLPERT's Schornsteinaufsatz.




Fig. 126 a. Aspirationsaufsatz.




Fig. 126 b. Preschlopf.

gegen einen Cylinder geblasen wird, nicht etwa reflectirt wird, sondern sich über die ganze Fläche ausbreitet und an den Rändern in derselben Richtung weiter fliesst, dabei aber an der entgegengesetzten Seite eine kräftige Luftverdünnung erzeugt. Auf das erste Princip sind z. B. die WOLPERT'schen Aufsätze (s. Fig. 125) gegründet, bei welchen der Wind bei jeder Richtung gezwungen wird, in einem schräg von unten nach oben gerichteten Strome über die Oeffnung des Abfuhrcanals hinwegzustreichen. Fortwährend wird dann Luft aus dem Canal aspirirt. Durch eine horizontale Deckelplatte gewähren diese Aufsätze ausserdem Schutz gegen Einfall von Regen. — Die nach dem zweiten Princip construirten Aufsätze sind Cylinder, die oben rechtwinklig gekrümmt sind, und dort eine trompetenartige Oeffnung haben (s. Fig. 126 a). Oberhalb der Oeffnung ist eine Windfahne angebracht, und der Cylinder ist auf dem Schlot drehbar. Der Aufsatz stellt sich dann immer so, dass die

öffnung vom Winde abgewandt ist, und dieser stets aspirirend wirkt.

Hierher gehört auch die sogenannte Firstventilation, die viel-
 ch bei Krankenbaracken, ferner bei Eisenbahnwagen u. s. w. angewendet
 ird. Ueber dem offenen Dachfirst wird in einem gewissen Abstand
 n derartiger Aufsatz angebracht (s. Kap. Krankenhäuser) und der
 wischenraum zwischen diesem und dem Dach mit stellbaren Jalousieen
 ausgefüllt. Durch entsprechende Stellung der letzteren kann es erreicht
 erden, dass der Wind in jedem Falle von unten nach oben über den
 ebenen Dachfirst wegstreicht und hier aspirirend auf die Luft des
 Innenraums wirkt.

Bei allen diesen Aspirationswirkungen des Windes muss natürlich
 vorausgesetzt werden, dass besondere Zufuhrkanäle für die Luft vor-
 handen sind, da andernfalls unreine Luft aus beliebigen anderen Räumen
 (Klosets, Küchen) in die zu ventilirenden Zimmer eingeführt wird!

Will man an den
 Fenstern des zu ventili-
 renden Raumes Oeffnungen
 herbringen, durch die der
 Wind wirken soll, so macht
 man am besten die oberen
 Fensterscheiben um eine
 horizontale Achse dreh-




Fig. 127. SHERINGHAM'sche Lüftungsklappe.

bar, so dass die Scheibe nach innen klappt. Je nach Bedarf kann
 man dann eine grössere oder kleinere Oeffnung herstellen, und der
 eindringende Luftstrom wird auf der schrägen Fensterfläche zunächst
 nach oben dirigirt. Durch Schutzbleche, die eventuell durchbrochen
 sein können, ist das seitliche Ausströmen der Luft zu verhindern
 (SHERINGHAM'sche Lüftungsklappe, Fig. 127). Lässt man diese Schutz-
 bleche fort, so entsteht ein directes Herunterströmen der kalten
 Luft, so dass die in der Nähe Sitzenden oder Liegenden stark belästigt
 und geschädigt werden. — Vielfach werden einfache Oeffnungen in
 der der Aussenwände nahe der Decke angebracht und mit irgend
 welchen Zierrathen oder auch mit rotirenden Rädchen versehen, um
 eine mögliche Vertheilung der eindringenden Luft zu bewirken. Selbst-
 verständlich ist nicht daran zu denken, dass die rotirenden Rädchen
 eine Verstärkung des Luftstroms bewirken. Sie werden im Gegentheil
 durch die in das Zimmer eindringende Luft bewegt und wirken also
 nur hemmend und schwächend auf die Ventilation.

Wohl zu bedenken ist, dass es bei jeder Fensterventilation
 nur von der zufällig vorhandenen Richtung und Stärke des Windes

abhängt, ob Pulsion oder Aspiration zu Stande kommt und in welchem Maasse. Häufiger, namentlich im Winter, erfolgt Einstrom; dann wird die Zimmerluft oft in unzulässiger Weise, z. B. von Krankenzimmern, aus in's Haus getrieben; und bei Aspiration kann unreine Luft nachströmen.

Soll in jedem Falle Einstrom durch den Wind erfolgen, so wendet man Pressköpfe an, durch welche z. B. auf Schiffen frische Luft in die unteren Räume (namentlich in den Maschinenraum) eingepresst wird; dieselben sind ebenso geformt wie die aspirirend wirkenden cylindrischen Aufsätze (Fig. 126b), nur dass die Oeffnung hier dem Wind stets entgegengerichtet wird. Mit Pressköpfen anderer Construction werden die Einstromungsöffnungen für Pulsionsanlagen versehen.

b) Temperaturdifferenzen. Sobald Luft erwärmt wird, dehnt sie sich aus und wird specifisch leichter. Da die entstehenden Gewichts-differenzen sehr bedeutend sind, so kommen starke Gleichgewichtsstörungen und bedeutende Ueberdrücke zu Stande. Diesen entsprechend findet dann eine Bewegung der Luft statt, welche sich dauernd erhält, so lange die Temperaturdifferenz vorhanden ist. Die Geschwindigkeit der Bewegung ist von der Grösse der Temperaturdifferenz $t-t'$, von der Höhe der Luftsäule h und von der Fallbeschleunigung ($g = 9.81$) abhängig und berechnet sich im Einzelfalle nach der Gleichung:

$$v = \sqrt{\frac{2hg \cdot (t-t')}{273+t}}.$$

Die Temperaturdifferenzen kommen bei Ventilationsanlagen zur Anwendung erstens durch Vermittelung der Oefen. Man vermeidet die Aspiration durch beliebige zufällige Eintrittsöffnungen, und verbindet vielmehr den Ofen mit einem bestimmten Zufuhrcanal, so dass eine Art Pulsionssystem entsteht. An der äusseren Hausseite legt man die (eventuell mit Zierrathen versehene) Einstromungsöffnung des Canals an. Dort wird ev. ein Presskopf und ein Insectenfilter angebracht. Von da aus wird dann der Canal im Zwischenboden hin- und schliesslich in den Mantelraum geführt, wenn ein Mantelregulirfülllofen vorliegt; bei gewöhnlichen Oefen ohne Mantel lässt man den Canal hinter dem Ofen etwa einen Meter über dem Boden offen enden. Der starke Auftrieb leitet dann die Luft zunächst gegen die Decke hin, und von da senkt sie sich allmählich nach abwärts. Ein Schieber dient zur Regulirung des Querschnittes des Canals. Die eingeströmte Luft kann man entweder durch beliebige Oeffnungen den Austritt suchen lassen, oder man richtet besondere Abfuhrcanäle (Oeffnungen nahe dem Fussboden) her, die über Dach mit Aspirationsaufsätzen versehen werden.

Ein ähnliches, einfaches Arrangement lässt sich auch bei Kachelöfen in der Weise treffen, dass der Zwischenraum zwischen Ofen und Wand an den beiden Seiten mit einer einfachen Mauer geschlossen wird, nachdem vorher die Zimmerwand in ihrem unteren Theile eine Oeffnung nach aussen erhalten ist. Die durch diese Oeffnungen eintretende Luft strömt dann hinter dem Ofen nach aufwärts und über den Ofen weg in's Zimmer. Die Anlage ist jedoch nicht so gut regulirbar und nicht so leicht zu reinigen wie die zuerst beschriebene. — Ueber die Ventilation mittelst Luftheizung, Dampfheizung u. s. w. s. unter „Heizung“.

Selbstverständlich funktionieren die auf der Ofenwärme basirenden Lüftungslagen (auch die Luftheizungen) nur so lange die Oefen geheizt werden. Sommer hört die als Motor dienende Temperaturdifferenz und damit jede Abbewegung auf. Es kann dann höchstens der Wind durch die saugende Wirkung an den Aspirationsschlotten, oder aber mit Hülfe geöffneter Fenster wirken. Das ist jedoch eine unzuverlässige, oft versagende und namentlich für die mässig warme Uebergangszeit lästige Art der Ventilation.




Fig. 128. Sonnenbrenner.

Abfuhr der Verbrennungsgase. F Aeusserer Canal. E Schieber, durch welchen der Querschnitt von D regulirbar ist.

Besser ist es daher, auch für den Sommer einen besonderen Motor zu schaffen. Man erhält denselben z. B. durch einen eigens zu diesem Zwecke heizten Kamin, dessen Rauchrohr man neben den Ventilationsschornstein legt, wie nur getrennt durch eine gusseiserne Platte; oder man führt den eisernen Nebkamin in der Mitte eines grösseren gemauerten Schornsteins in die Höhe und lässt in dem stets warmen Zwischenraum zwischen beiden die Abfuhrungen münden (vergl. Fig. 119, Luftheizungsschema).

Sind keine Feuerungen für die Ventilation benutzbar, so können sie leicht durch Gasflammen die nöthigen Temperaturdifferenzen hergestellt werden. Man lässt dieselben in dem Abfuhr canal brennen und wählt kräftig hitzende Flammen, am besten Bunsenbrenner. Dieselben fördern stündlich 120—150 cbm Luft bei einem Verbrauch von 1 Liter Gas und für den Preis von 3—4 Pf.

Bei grösseren Anlagen construirt man ganze Kränze von Bunsenbrennern oder wählt sogenannte Sonnenbrenner (s. Fig. 128) zur Beleuchtung. Bei letzteren ist ein Rohr, welches die Verbrennungsgase abführt und durch dasselben stark erwärmt wird, von einem weiteren unten offenen Rohr umgeben, in welches die Zimmerluft kräftig aspirirt wird.

Alle die vorbeschriebenen Anlagen beruhen auf Aspiration. Sie sind daher nur zulässig, wenn gleichzeitig bestimmte weite Zufuhrwege gegeben sind, z. B. herabklappbare Fensterscheiben oder Fensterjalousien oder aber besonders angelegte zum Ofen resp. zum Calorifer führende Canäle. Stets sind Klappen oder Schieber zur Regulirung anzubringen.

c) Maschinenbetrieb. Derselbe bietet besondere Vortheile, weil die Maschinen die empfindlichste Regulirung gestatten. Dieselben sind jetzt in jeder Grösse und schon zu den billigsten Preisen zu haben. — Für die einfachsten Anlagen benutzt man am besten Wasserbetrieb.

Entweder wählt man Turbinenrad-Ventilatoren: in denselben bewegt der Wasserstrahl ein Flügelrad; auf der gleichen Welle sitzt ein zweites grösseres Turbinenrad, das sich in einem Luftcanal befindet und bei seinen Umdrehungen die Luft vordrückt. Je nachdem man das Wasser von rechts oder von links einströmen lässt, bekommt man an der gleichen Oeffnung Pulsion oder Aspiration (Kosmosventilatoren, Centrifugalventilatoren u. a. m.). — Oder man benutzt sogenannte Wasserstrahl-Ventilatoren (Victoria-Ventilator), bei welchen ein kräftiger Wasserstrahl, der durch ein feines Sieb hindurchgeht und sich dann in einem engen Cylinder ausbreitet, grosse Mengen von Luft mitreisst. Im Durchschnitt fördern diese Ventilatoren mit einem Wasserverbrauch von 100 Liter pro Stunde (also für den Preis von 1—2 Pf.) 30—40 cbm Luft. Manche derselben arbeiten nicht ohne Geräusch; doch giebt es auch Constructionen, bei welchen Geräusche kaum wahrnehmbar sind, namentlich wenn für gute Oelung der Zapfenlager gesorgt wird.

Ferner lassen sich Gasmotoren oder Dampfmaschinen verwenden, um grössere Flügel- oder Schrauben-Ventilatoren zu bewegen.

Die Flügelventilatoren bestehen aus einem geschlossenen Gehäuse, in welchem eine Welle mit Flügeln liegt. Die Luft im Gehäuse wird durch Wirkung der Centrifugalkraft an der Peripherie verdichtet, im Centrum ausgedehnt; an der Peripherie liegt die Ausblasöffnung, in der Nähe der Welle die Einströmungsöffnung. — Schraubenventilatoren bestehen aus einem offenen eisernen Cylinder, in dessen Achse eine Welle liegt, welche senkrecht mehrere schraubenförmig gewundene Flügel trägt. Durch Drehung der Welle wird eine Verdichtung der Luft hinter derselben, eine Ausdehnung vor der Welle bewirkt und dadurch eine Bewegung eingeleitet.

Auch Dampfstrahlventilatoren werden neuerdings benutzt, bei welchen der Dampf aus einer engeren in eine weitere Düse eintritt und dadurch in letzterer eine Luftverdünnung erzeugt, durch welche Luft angesaugt und fortgerissen wird. Aehnlich wirkt ein Strom comprimierter Luft, der durch starke mit Luft betriebene Luftcompressionspumpen erzeugt wird. Die letztgenannten Anlagen sind jedoch mit starkem Geräusch verbunden und daher nur für Arbeitsräume in Fabriken u. s. w. verwendbar.

Ueber die Zufuhr gekühlter Luft siehe S. 382.

C. Prüfung der Ventilationsanlagen.

Für eine genauere Beurtheilung der quantitativen Leistungsfähigkeit einer Anlage ist es erforderlich, die zu- oder abgeführte Luftmenge zu ermitteln und die mögliche Steigerung der Luftzufuhr oder Abfuhr festzustellen.

Erfolgt die Ventilation durch eigene Luftcanäle, so benutzt man zur Messung folgende Methoden, auf welche sich der Untersucher besonders einüben muss und die daher hier nur angedeutet werden:

1) Differentialmanometer. Dieselben messen direct den Ueberdruck Aussen- resp. Innenluft. Da es sich um sehr kleine Ueberdrücke handelt, der eine Schenkel des Manometers kein vertikal aufsteigendes Rohr, sondern selbst liegt nahezu horizontal, mit ganz geringer Steigung; ferner wird zur Messung Petroleum benutzt, das specifisch leicht ist und sich ohne Widerstand in feinen Gläseröhren bewegt. Führt man ein besonders construirtes Ansatzrohr in den zu untersuchenden Luftstrom, so lässt sich aus den Angaben des Manometers die Ventilationsgrösse mittelst einfacher Formeln berechnen.

2) Anemometer, s. S. 120. Nach genauer Aichung der Instrumente werden bei Aspirationsanlagen in der Abströmungsöffnung, bei Pulsionsanlagen in der Zuströmungsöffnung zahlreiche Messungen vorgenommen, jede von mindestens 2—3 Minuten Dauer, und aus ihnen das Mittel gezogen. Eine Reihe Bestimmungen ist in der Mitte, eine zweite in der äussersten Peripherie und eine dritte zwischen Mitte und Peripherie der Oeffnung zu machen. Die gemittelte mittlere Geschwindigkeit des Luftstroms in der betreffenden Oeffnung multiplicirt mit dem Querschnitt derselben ergibt das geförderte Luftquantum.

Erfolgt die Ventilation theilweise oder ausschliesslich durch natürliche Oeffnungen (Ritzen, Poren), so lässt sich die Grösse des Luftwechsels durch die Kohlensäure-Bestimmung ermitteln.

Man lässt durch Brennen von Kerzen oder durch die Athmung zahlreicher Menschen (Schulkinder) in dem zu untersuchenden Raum einen hohen CO_2 -Gehalt herstellen, sodann sistirt man die weitere CO_2 -Produktion, indem man die Lichter auslöscht oder die Menschen hinausgehen lässt, bestimmt den CO_2 -Gehalt der Zimmerluft und überlässt nunmehr eine Stunde lang das Zimmer sich selbst; dann wiederholt man die CO_2 -Bestimmung, findet jetzt eine gewisse Abnahme des Gehalts und berechnet aus der Intensität der Abnahme die Luftmenge, welche inzwischen von aussen in das Zimmer eingetreten ist.

Ausser der quantitativen Gesamtleistung ist noch die Verteilung und Richtung des Luftstroms festzustellen. Ferner ist die Zugluft zu prüfen.

Letztere ermittelt man entweder durch das Gefühl am entblösten Kopf oder Hals bei ruhigem längerem Sitzen an der zu prüfenden Stelle. Bei kalter Zimmerluft erweckt bei den meisten Menschen ein Strom von 5 cm Geschwindigkeit pro Sec., bei Luft von 15° ein solcher von 10 cm deutliche Zugempfindung in der Nähe des Auges. — Oder man kann kleinste Paraffinkerzen (Nachtlichter) mit möglichst dünnem Docht zur Prüfung benutzen, die

noch eine Ablenkung der Flamme ungefähr bei der angegebenen Grenzgeschwindigkeit erkennen lassen; die gewöhnlichen Anemometer sind für diese Messungen zu unempfindlich.

D. Leistung der Ventilationsanlagen.

Die Eingangs aufgezählten Aufgaben der Ventilation werden durch die beschriebenen Einrichtungen in sehr verschiedenem Grade erfüllt.

1) Für die Entwärmung, von welcher — wie oben bereits hervorgehoben — in erster Linie das Befinden und Behagen der im geschlossenen Raum befindlichen Menschen abhängt, vermag die Ventilation Erhebliches zu leisten; einströmende bewegte kühlere Luft vermag die Wärmeabgabe durch Leitung zu befördern und die Ansammlung von Wasserdampf in der nächsten Umgebung der Menschen zu verhüten. Ein kräftiger Ventilationsstrom „erfrischt“ daher ausserordentlich. Durch Circulation der im Raume befindlichen Luft ohne Luftzufuhr von aussen kann nach neueren Untersuchungen gleichfalls eine sehr erhebliche Erleichterung der Wärmeabgabe erreicht werden, zumal man der circulirenden Luft grössere Geschwindigkeit geben kann, ohne Störungen hervorzurufen. Auf die ungünstigere chemische Beschaffenheit der Innenluft kommt dabei nur wenig an. — Relativ machtlos ist die Ventilation gegenüber starken Wärmequellen, z. B. gegenüber den im Sommer durch Insolation stark erwärmten Hauswänden und den dadurch bedingten hohen Wohnungstemperaturen. Es bedarf alsdann ausserordentlich grosser Mengen event. künstlich gekühlter Luft, die höchstens durch Maschinenventilation oder durch dauernde Oeffnung ganzer Fensterdächer beschafft werden kann (vgl. S. 381).

2) Die Restitution des Sauerstoffs erfolgt selbst bei im übrigen ungenügender Ventilation in ausreichender Weise.

3) Eine Entfernung der gasigen übelriechenden und belästigenden Beimengungen der Luft ist durch ein entsprechendes Luftquantum und zweckmässige Richtung und Vertheilung des Luftstroms relativ leicht zu erreichen.

Indessen wird eine abnorm reichliche Produktion gasiger Verunreinigungen durch eine innerhalb der üblichen Grenzen gehaltene Ventilation nicht mehr zu beseitigen sein. In solchen Fällen kann man versuchen, die Ventilation ausnahmsweise zu verstärken und durch stärkere Motoren sogar eine 4—5 malige Erneuerung der Luft zu erzielen, was bei geschickter Vertheilung der Oeffnungen in der That ohne lästige Empfindung für die Bewohner gelingt, freilich immer nur mit relativ bedeutenden Kosten.

Richtiger ist es aber, die Produktion der Verunreinigungen sprechend einzuschränken. Befinden sich faulende Stoffe oder stige übelriechende Massen in einem Wohnraum, so soll nicht vent werden, die Luft trotzdem durch Ventilation rein zu halten, sondern Quellen der Luftverderbnis sind zu entfernen. — Es ist dies eine gel, welche aus finanziellen Gründen für alle Fälle, nicht nur für extremen, Gültigkeit beansprucht. So viel als möglich sollte stets Produktion der Luftverunreinigung verhindert und erst unvermeidlich bleibende Rest durch Lüftung beseitigt den. Dementsprechend hat man mit Fug und Recht in neuerer ; mehrfach den Versuch gemacht, die schlechte Luft in Schulstuben, ernen u. s. w. in erster Linie dadurch zu bessern, dass die Kinder). Soldaten in regelmässigen Zwischenräumen Bäder erhalten, dass chzeitig auf möglichste Reinlichkeit der Kleidung gesehen wird, und ; die Mäntel ausserhalb des Wohnraums zurückbleiben. Die Er- rung hat gelehrt, dass bei Einhaltung dieser Vorschriften eine tiv geringe Ventilation genügt, um eine nicht belästigende Luft rustellen, nachdem vorher die kostspieligsten Ventilationsanlagen fficient waren. In solcher Luft darf auch die übliche Grenze des -Gehalts anstandslos überschritten werden, weil dann eben der öhnliche Parallelismus zwischen riechenden Gasen und CO_2 ge- t ist.

4) Zur Entfernung des Staubes aus der Luft eines Wohnraumes urf es eines Ventilationsstromes von bedeutender Stärke. Während den Tnrasport feinsten Staubpartikel allerdings schon Luftströme von mm ausreichen, wird die aus gröberen Theilen bestehende Haupt- se des Luftstaubes erst durch Luftströme von mehr als 0.2 m Ge- windigkeit fortgeführt; mineralischer Staub erfordert noch stärkere me. Nun beträgt aber die Geschwindigkeit der Ventilationsluft an Ein- und Austrittsöffnungen zwar $\frac{1}{2}$ —1 m pro Sekunde, im Innern Zimmers dagegen $\frac{1}{1000}$ m und weniger. Es können also lediglich aus nächsten Umgebung der Abströmungsöffnungen gröbere Staubtheilchen geführt werden, während im grössten Theil des Zimmers höchstens ein eres Schwebenbleiben und langsames Absetzen derselben erfolgt.

Ist daher z. B. in Fabrikräumen eine Entfernung des in Massen producirten bes erforderlich, so kann dies nur dadurch geschehen, dass die Abströmungs- ng in unmittelbarste Nähe der Staubquelle gebracht wird. Sobald der b erst im Zimmer vertheilt ist, sind zur Beseitigung Ventilationsströme von er Intensität erforderlich, dass sie erhebliche Belästigung für die Bewohner eventuell Gesundheitsstörungen mit sich bringen würden.

Handelt es sich um einen momentan nicht bewohnten Raum, iest sich die Luft durch starken Zug und bei grossen Oeffnungen

und Gegenöffnungen von Staub ziemlich vollständig befreien. In den Ecken des Zimmers, unter und hinter den Möbeln bleiben jedoch stets grössere Mengen Staub zurück und bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass auch die dem Zuge exponirte Fläche des Fussbodens, der Möbel u. s. w. nicht vom Staub befreit sind. Von diesen Stellen aus findet dann auch immer wieder ein erneuter Übergang von Staub in die Luft statt.

5) Die in der Luft eines Wohnraumes oder Krankenzimmers schwebenden Infektionskeime zeigen gegenüber den Ventilationsanlagen ungefähr das gleiche Verhalten, wie die Tröpfchen und Staubpartikelchen, an denen sie haften. Es finden sich darunter sehr feine, die durch die üblichen Ventilationsströme bereits fortgeschafft werden können. Ein einwandfreies Fortschaffen gelingt aber keineswegs durch jede Art von Ventilation, z. B. Oeffnen beliebiger Fenster, sondern man muss sicher sein, dass die Keime in einen Aspirationsstrom gelangen, der sie aus dem Bereich der Menschen herausbringt. — Ein grosser Theil jener Keime befindet sich aber stets in Form von gröberen Tröpfchen und Stäubchen. Directe Versuche mit solchem Staub haben ergeben, dass selbst eine Ventilation, bei welcher der Luftraum des Zimmers viermal pro Stunde erneuert wird, noch nicht im Stande ist, eine wesentlich schnellere Verminderung der in der Luft suspendirten Keime herbeizuführen, als beim Fehlen jeder Ventilation. In ruhiger Zimmerluft setzen sich die Keime allmählich innerhalb 1—2 Stunden zu Boden; bei Ventilation von der üblichen Stärke wird ein sehr kleiner Theil eventuell fortgeführt, dafür wird das Niedersinken anderer Keime verzögert, so dass der Gehalt der Luft ungefähr ebenso ist wie bei völlig ruhiger Luft. Werden fortdauernd Keime durch Bewegungen und Hantirungen abgelöst und in die Luft übergeführt, wie dies im Krankenzimmer immer geschieht, so wird durch die Ventilation, die dauernd höchstens $1\text{—}1\frac{1}{2}$ malige Erneuerung der Zimmerluft pro Stunde zu leisten pflegt, keine nennenswerthe Verminderung der Luftkeime erzielt.

Lässt man auf einen unbewohnten Raum kräftigen Zug wirken, so wird die Luft bald keimfrei. Dagegen vermögen nachweislich selbst die stärksten Ströme (30malige Erneuerung der Zimmerluft pro Stunde und mehr) nicht einen grösseren Theil der auf den Begrenzungen des Raumes, Möbeln, Kleidern u. s. w. in Tröpfchen- und Stäubchenform abgesetzten Keime fortzuführen. Auch heftiger Wind im Freien ist bekanntlich nicht im Stande, den auf Kleidern abgelagerten Staub wieder zu entfernen. Erst wenn kräftige mechanische Erschütte-

hinzukommen, führen starke Luftströme die Keime von den Oberflächen fort, auf welchen sie haften.

Die Desinfektion von Wohnräumen, Kleidern oder sonstigen Gegenständen durch Lüftung ist daher durchaus unzuverlässig; selbst die Freisetzung der Luft eines inficirten Zimmers von Keimen ist in den meisten Fällen bedeutungslos, weil sehr bald wieder durch Hantirungen der Keime, weil der an den Flächen haftengebliebenen Keime in die Luft freigesetzt. — Wollte man schliesslich Kleider und Möbel dadurch desinficiren, dass man sie in einem Luftstrom klopft und bürstet, würde damit allerdings eine wesentliche Verringerung der haftenden Keime erzielt werden, aber fast niemals eine völlige Beseitigung; allem würde man die betreffenden Arbeiter der Infektion exponiren, in einer städtischen Wohnung würde es nicht leicht sein, einen Ort zu finden, wo diese Procedur ohne Gefahr für die Umgebung auszuführen werden könnte.

Die vielfach herrschende Ansicht, dass unsere jetzigen Ventilationsanlagen im Stande und dazu bestimmt seien, die Luft der Wohnräume von Infektionserregern frei zu halten, ist demnach nicht als richtig anzuerkennen. Vielmehr besteht die bis jetzt lösbare Aufgabe der Ventilation fast ausschliesslich in der Reinhaltung der Luft von Verunreinigungen und in der Beseitigung übermässiger Wärme, auf diesen wichtigen Gebieten vermag sie Bedeutendes zu leisten.

Literatur: RIETSCHEL, Lüftungs- und Heizungsanlagen, 3. Aufl., Berlin 1886. — RECKNAGEL, Sitzungsber. der Akad. d. Wiss. 1879. — Viert. f. öff. Ges. 1884. — FANDERLIK, SCHMIDT, s. „Heizung“. — WOLPERT, Theorie und Praxis der Ventilation und Heizung. — STERN, Ueber den Einfluss der Ventilation auf in der Luft vorhandene Mikroorganismen. Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 7, S. 44. — FLÜGGE, ebenda,

VI. Beleuchtung.

Die Beleuchtung des Wohnraums erfolgt entweder durch Tageslicht oder durch künstliche Beleuchtung.

A. Tageslicht.

Der Einfluss des Tageslichts auf das Wohlbefinden und die Stimmung des Menschen, sowie die Wirkung des Lichts gegenüber den Bakterien, dasselbe zu einem der kräftigsten Desinficienten macht, sind oben (S. 128 u. 351) erörtert. Hier interessirt uns ausserdem noch

der im Freien nicht in Betracht kommende Fall, dass das Sehorgan durch eine zu geringe Lichtmenge beeinträchtigt wird. In den Wohnräumen werden daher in Folge von Lichtmangel verschiedene hygienische Interessen verletzt. Schädigungen des Sehorgans kommen besonders häufig zu Stande und erfordern im Folgenden vorzugsweise Berücksichtigung.

Viele Proben haben ergeben, dass für Lesen, Schreiben und zahlreiche andere Beschäftigungen eine Belichtung des Arbeitsplatzes mit direktem Himmelslicht nicht entbehrt werden kann. Eine solche ist aber in schützenden Wohngebäuden vielfach gar nicht oder in ganz ungenügender Weise vorhanden. Bei engen Strassen und hohen Häusern insbesondere die Parterreräume gar kein directes Himmelslicht, sondern nur das von den gegenüberliegenden Hauswänden reflectirte Licht. Auch wenn der Forderung $b = h$ (s. S. 358) genügt, so werden nur die nahe am Fenster befindlichen Plätze von directem Himmelslicht getroffen und der grösste Theil der Zimmers bleibt im Schatten (vergl. Fig. 129). Die Grenze des belichteten und des unbelichteten Bezirks pflegt sich auf dem Fussboden resp. an den Wänden abzeichnen (c in Fig. 129). — Günstiger gestalten sich die Verhältnisse mit der grösseren Höhenlage der Etagen, am schlechtesten in Hof- und Kellerwohnungen.

Unter diesen Umständen ist eine genauere Prüfung von Arbeitsplätzen, die für Lesen, Schreiben u. s. w. bestimmt sind, auf die ihnen zugeführte Lichtmenge und eine Feststellung der hierfür unbedingt nothigen Lichtmenge von grosser Bedeutung.

Die für diesen Zweck anwendbaren Untersuchungsmethoden lassen sich in zwei Kategorien theilen: 1) in Methoden, welche ermitteln, in wie weit und in welchem Grade die Verhältnisse eines Platzes dessen Belichtung durch directes Himmelslicht gestatten. Dahin gehört die FORSTER'sche Methode und die Messung mit WEBER's Raumwinkelmesser. 2) in solche Methoden, durch welche die momentan auf einem Platze vorhandene Helligkeit gemessen wird; hierfür kommen in Betracht WEBER's Photometer, COHN's Lichtprüfer und die WINGER'sche Methode.

1) Die FORSTER'sche Bestimmung des Oeffnungs- und Einfallswinkels. Die Tageslichtstärke auf einem bestimmten Platze ist offenbar abhängig 1) von der Grösse des Stücks freien Himmelsgewölbes, von welchem aus Strahlen auf den Platz fallen. Die Ausdehnung dieses Stücks lässt sich bemessen nach dem Oeffnungswinkel, d. h. dem Winkel, der begrenzt wird einmal durch einen unteren, von dem Platz nach der Oberkante des gegenüberliegenden Hauses gezogenen Randstrahl und zweitens durch einen oberen, von dem Platze nach der oberen

terkante gezogenen und über diese verlängerten Randstrahl. In 129 ist für den in der Mitte des Zimmers gelegenen Platz *e* der Winkel *feg* der Oeffnungswinkel. Im Parterre fehlt für diesen Platz Oeffnungswinkel ganz; im ersten Stock ist er sehr spitz; in den oberen Stockwerken wird er erheblich grösser.

Für die Lichtstärke ist ferner maassgebend der Einfallswinkel des Lichts, d. h. der Winkel, unter welchem die Strahlen auf die zu beleuchtende Fläche auffallen. Je grösser die Entfernung des beleuchteten Punktes vom Fenster ist, um so schräger fallen die Strahlen auf, auf um so grössere Fläche vertheilt ein Strahlenbündel sein Licht, und




Fig. 129. Tageslichtmessung nach FÖRSTER.

so geringer ist die Helligkeit. Die Abnahme der Helligkeit ist sogar sehr rasche; sie erfolgt im Quadrat der Entfernung, so dass in Entfernung 16fach weniger Licht vorhanden ist als in 1 m Entfernung. — In Bezug auf den Einfallswinkel sind offenbar die Parterre weit günstiger gelegen, als die oberen Etagen. Ferner ist ersichtlich, dass der obere Theil der Fenster der weitaus wichtigste für Beleuchtung ist und dass man zweckmässig mit der Oberkante der Fenster so nahe wie möglich an die Decke des Zimmers geht. — Der Einfallswinkel ist natürlich für die verschiedenen ein und denselben Punkt beleuchtenden Strahlen nicht der gleiche; und man wird, um in einem bestimmten Maass zu gelangen, den mittleren Einfallswinkel bestimmen müssen; d. h. den Winkel, der von der Halbierung des Oeffnungswinkels und der horizontalen Tischfläche (bezw. der horizontalen) begrenzt wird.

Durch den Oeffnungs- und mittleren Einfallswinkel ist die Lichtmenge eines Platzes annähernd bestimmt. Es ist daher zulässig, eine Norm für genügend belichtete Plätze, d. h. solche, auf denen Seheproben in der vorgeschriebenen Entfernung rasch und fehlerfrei ohne Anstrengung des Auges gelesen werden können, durch die Minimalgrösse beider Winkel festzulegen. Nach vorläufigen Untersuchungen scheint für den Oeffnungswinkel die Grösse von 5° , für den Einfallswinkel eine solche von 28° das zulässige Minimum zu repräsentieren.

Von besonderer Bedeutung ist die FÖRSTER'sche Bestimmung der Lichtmenge dadurch, dass sie sich auf die verschiedenen Plätze eines noch nicht gebauten Hauses (Schulhauses) auf Grund einer genauen Profilskizze anwenden lässt, so dass schon vor dem Bau ein etwaiges Deficit erkannt und durch geeignete Mittel ausgeglichen werden kann. Wie eine Besserung der Lichtverhältnisse für einen ungenügend belichteten Platz erzielt werden kann, das ergibt sich unmittelbar aus der Figur 129. Die einflussreichste Besserung liegt offenbar in einem Hinaufrücken der oberen Fensterkante; dadurch wird Oeffnungs- und Einfallswinkel gebessert; Erweiterung des Fensters nach unten verschlechtert dagegen den Einfallswinkel. Ferner schaltet eine Verringerung der Zimmertiefe und eine Verkürzung der Bänke die schlechten Plätze aus.

Die Bestimmung der Winkel erfolgt entweder durch genaue Winkelmesser; oder trigonometrisch, indem man zuerst die Linie CB und die Linie




Fig. 130.

AB (Fig. 130) auf der Skizze misst, und die Zahl für CB durch die für AB gefundene dividirt; für den so erhaltenen Werth von $\text{Tang. } CAB$ sucht man die Grösse des Winkels CAB auf. In derselben Weise ermittelt man den Winkel DAB . Die Differenz beider Winkel ist = dem Oeffnungswinkel; die Hälfte dieses plus Winkel DAB ist der mittlere Einfallswinkel.

Im fertigen Wohnhaus lassen sich die beiden Winkel mittelst eines kleinen Spiegelapparats bestimmen. Rechts und links von einem Stativ ist je ein kleiner, um eine horizontale Achse drehbarer Metallspiegel angebracht; die

Richtung der Achse ist auf den Spiegeln durch einen Strich markirt. An dem zu untersuchenden Platze stellt man mit Hülfe eines Visirs den einen Spiegel so, dass die obere Fensterkante, den anderen so, dass die Horizontallinien mit der markirten Achse zusammenfallen. An den Spiegeln befinden sich Zeiger, deren Stand auf einem Gradbogen abzulesen ist. Sind beide Spiegel eingestellt, so ist die Differenz zwischen beiden Zeigern gleich dem halben Oeffnungs-

winkel; und der mittlere Einfallswinkel ist gleich der Differenz zwischen den Graden, die von dem einen Zeiger bis 0° und von dem anderen bis 90° abgelesen werden. Um auch den Einfluss der Breite des Fensters mit zu berücksichtigen, ist diese zu messen und mit den gefundenen Winkelgrößen in eine gemeinsame Formel aufzunehmen. (GOTSCHLICH).

2) Die Messung des sichtbaren Theils des Himmelsgewölbes mit dem Raumwinkelmesser (L. WEBER). Die Grösse des sichtbaren Himmels ist durch den Oeffnungswinkel dann unsicher zu bestimmen, wenn der Horizont durch Bäume, Dachvorsprünge u. dgl. sehr unregelmässig begrenzt wird. Man misst in solchem Falle besser die gesammte von dem zu untersuchenden Platze des fertigen Gebäudes aus sichtbare Fläche des Himmelsgewölbes.

Denkt man sich das Himmelsgewölbe in gleiche Quadrate getheilt und sieht man dann durch eine begrenzte Oeffnung nach dem Himmel, so erhält man einen Kegel oder eine Pyramide, deren Spitze im Auge liegt, deren Seiten durch die vom Auge nach den Rändern der Oeffnung und darüber hinaus ver-




Fig. 131. WEBER's Raumwinkelmesser.

Magerten Linien gebildet werden und deren Basis ein bestimmter Theil der quadrirten Himmelsfläche ist, messbar durch die Zahl der Quadrate. Tritt man weiter von der Oeffnung zurück, so wird die Pyramide spitzer und die Zahl der Quadrate kleiner. Diesen von den Seiten der Pyramide eingeschlossenen, durch die Zahl der Quadrate messbaren Winkel bezeichnet man als Raumwinkel.

Die Messung desselben geschieht in einfacher Weise durch ein fein quadrirtes Papier, vor welchem eine Linse verschiebbar angebracht ist (WEBER's Raumwinkelmesser). Die Linse wird auf dem zu untersuchenden Platz in die richtige Brennweite vom Papier gestellt, und man erhält alsdann auf diesem die leuchtende Himmelsfläche in verkleinertem Bilde. Je ausgedehnter dieselbe ist, um so grösser wird das Bild; je mehr Quadrate die betreffende Himmelsfläche umfasst, um so mehr von den kleinen Quadraten der Papierfläche werden beleuchtet. Die Zahl der hellen kleinen Quadrate giebt also den Raumwinkel für den betreffenden Platz.

Um ausserdem den Einfallswinkel der Strahlen zu berücksichtigen, ist die Papierplatte drehbar eingerichtet und man neigt dieselbe so lange, bis das helle Bild des Himmelsgewölbes gleichmässig um den Mittelpunkt vertheilt ist. Dann liest man an einem seitlich angebrachten Gradmesser den mehr oder weniger eingestellten mittleren Neigungswinkel ab. Mit dem Sinus dieses Winkels (α) ist bei vergleichenden Messungen die Zahl der Quadratgrade zu multipliciren.

Durch eine Reihe von Bestimmungen ist ermittelt, dass die für Lesen und Schreiben erforderliche Helligkeit eines Platzes ungenügend wird, wenn der abgelesene Raumwinkel (w) bei senkrecht auffallenden Strahlen weniger als 50 Quadratgrade, bei anderem Einfallswinkel $\frac{50}{\sin \alpha}$ umfasst ($w \cdot \sin \alpha = 50$; $w = \frac{50}{\sin \alpha}$).

3) Die Messung der auf dem Arbeitsplatz zur Zeit vorhandenen Helligkeit (inclusive des unter Umständen nicht unbeträchtlichen von Wänden u. s. w. reflectirten Lichts) erfolgt am genauesten durch WEBER's Photometer, das vor anderen Photometern den wesentlichen Vorzug besitzt, dass es für jede Art der Beleuchtung und speciell auch bei Tageslicht verwendbar ist.

Den Ausgangspunkt dieses Photometers bildet eine bestimmte Helligkeits-Einheit. Als solche bezeichnet man diejenige Helligkeit, welche durch eine Normalkerze auf einer 1 Meter entfernten weissen Fläche hervorgerufen wird = 1 Meterkerze (M.-K.). Unter Normalkerze versteht man eine Stearin- oder Paraffinkerze von 22 mm Durchmesser und 50 mm Flammhöhe. Neuerdings wird dieselbe ersetzt durch eine Benzin- oder Amylacetatflamme von 22 mm Höhe.

Eine derartige Normalflamme brennt in dem einen Arm des WEBER'schen Photometers (Fig. 132). Die Flamme wirft ihr Licht auf eine Milchglasplatte und diese erlangt auf der abgewandten Seite einen bestimmten Grad von Helligkeit, der zum Vergleich benutzt wird.

Die Milchglasplatte ist gegen die Flamme durch eine Schraube r verschiebbar und die Entfernung beider = r kann an einer aussen befindlichen Skala abgelesen werden. Bei gleichbleibender Flamme hängt die Helligkeit der Milchglasplatte von der Distanz zwischen Platte und Flamme ab. In einer gewissen Entfernung beträgt dieselbe 1 M.-K., bei geringerer Entfernung mehr, bei grösserer weniger und zwar im Quadrat der Entfernung ansteigend resp. abnehmend.

Mit dieser beliebig abstufbaren bekannten Helligkeit vergleicht man nun die zu untersuchende Fläche, also z. B. ein Blatt Schreibpapier, das auf den Tisch gelegt ist. Auf dieses richtet man das andere Rohr des Photometers und sieht in letzteres hinein. Durch Anbringung eines LUMMER'schen Prismas (Fig. 133) fällt in den mittleren Theil des Gesichtsfeldes das Licht nur von der beobachteten weissen Fläche, in den peripheren Theil nur von der leuchtenden Milchglasplatte, so dass zwei concentrische Kreise entstehen (Fig. 134), die sehr scharf verglichen werden können. Man muss dann die Milchglasplatte so weit verschieben, bis völlig gleiche Helligkeit im ganzen Gesichtsfeld hergestellt ist. — Die Helligkeitsvergleiche gelingt allerdings nur bei

er Farbe des Lichts; und da Tageslicht und Benzinlicht von sehr verschiedener Farbe sind, muss die Vergleichung unter Einschaltung eines farbigen rothen bzw. grünen) Glases vorgenommen werden. Die für eine des Tageslichts gefundene Helligkeit muss dann mit einem experimentell erhaltenen Faktor multiplicirt werden, um der Helligkeit des gesammten Tageslichts zu entsprechen.

Durch zahlreiche Untersuchungen mit diesem Photometer ist festgestellt, dass als unterste Grenze für einen zum Lesen und Schreiben geeigneten Platz eine Helligkeit von etwa 10 Meterkerzen, gemessen in der rothen Quote des Tageslichts, d. h. von etwa 25 Meterkerzen des Tageslichts, verlangt werden muss¹.




Fig. 132.




Fig. 133.



Fig. 134.

4) COHN's Lichtprüfer. COHN nennt seine Methode die „okuläre“ Lichtprüfung. Er bestimmt, wieviel Ziffern einer beigegebenen in 40 cm Entfernung von einem gesunden Auge an einem Platze in Sekunden gelesen werden, je nachdem ein, zwei oder drei graue Gläser, deren Lichtabsorption bestimmt ist, vor das Auge gebracht werden. Liest man durch alle drei Gläser, welche ca. 99% Tageslicht absorbiren, ebensoviel Ziffern in 30 Sekunden ab, als ohne die Gläser, dann kann der Platz als „vorzüglich“ beleuchtet bezeichnet werden. Ist dies nur durch ein graues Glas möglich, die 95% Licht absorbiren, so ist der Platz „gut“. Gelingt das fließende Lesen nur mit einem grauen Glase, welches 80% Licht absorbirt, so ist der Platz noch „brauchbar“. Gelingt auch dies nicht, so ist

¹ Ein neuer „Helligkeitsprüfer“ von WINGEN gestattet, mit einem einfachen und billigeren Apparat wenigstens in den Grenzen von 10–50 M.-K. die Helligkeit nach ähnlichem Princip zu bestimmen.

er „unbrauchbar“. Für künstliches Licht gilt Folgendes: Liest jemand mit normaler Sehschärfe in 40 cm Entfernung und in 30 Sekunden ebensoviel Ziffern bei künstlichem Licht, als in derselben Zeit am hellen Fenster, so ist der Platz von künstlichem Licht genügend beleuchtet; ist dies nicht der Fall, so ist der Platz zur Arbeit unbrauchbar. — Fehlerquellen der Methode liegen darin, dass die Schnelligkeit im Lesen individuell verschieden ist, ferner in dem Einfluss der Ermüdung.

5) Die WINGEN'sche Methode. WINGEN nennt seine Methode die „photochemische“ Lichtprüfung. Er benutzt zur Feststellung der Beleuchtungsintensität eines Platzes die Schwärzung photographischen Papiers durch Licht. Zu diesem Zweck legt er an den verschiedenen Plätzen eines Zimmers kleine Stückchen lichtempfindlichen Papiers (sog. Aristopapiers) aus: Nach Verlauf einer Stunde werden dieselben eingesammelt, um dann wie alle photographischen Positivbilder nachbehandelt zu werden (Fixierung, Tonung u. s. w.). Bei guter Beleuchtung (entsprechend 50 Meterkerzen in Roth) soll eine gewisse Dunkelgefärbung des Papiers eintreten, so dass ein nicht genügend dunkel gefärbtes Papier ein Zeichen für unzureichende Beleuchtung des betreffenden Platzes wäre. — Alle Papiere, die im Laufe einer Stunde dunkler geworden sind, als die den 50 Meterkerzen entsprechende Probe, zeigen gute Plätze, alle, welche blasser geblieben sind, zeigen schlechte Plätze an. — Nachprüfungen haben ergeben, dass die Methode verschiedene Fehlerquellen enthält. Das Papier ist kaum genügend empfindlich selbst bei dem an sich viel zu hohen Grenzwert von 50 Meterkerzen in Roth, = 125 Meterkerzen Tageslicht.

Beide Kategorien von Methoden zur Beurtheilung der Belichtung eines Platzes haben ihre Vortheile und Nachtheile. — Die FOERSTER'sche Methode und die Prüfung mit dem Raumwinkelmesser sind insofern den anderen überlegen, als sie unabhängig von der zufällig vorhandenen Helligkeit des Himmels die konstanten Belichtungsverhältnisse des Platzes untersuchen und durch eine einmalige Prüfung zu einer Entscheidung gelangen. Hier ist nur der Einwand zu erheben, dass die Helligkeit eines Platzes nicht lediglich von der Grösse des sichtbaren Stückes Himmelsgewölbe abhängt. Zunächst ist die Helligkeit nicht in jedem Theil des Himmelsgewölbes die gleiche; nur an stark und gleichmässig bewölkten Tagen trifft dies zu, im Uebrigen sind z. B. zwischen der nördlichen und südlichen Hälfte gewisse Differenzen vorhanden, die noch genauer zu bestimmen sind, sich aber gelegentlich wohl auf 100 Procent steigern können. Zweitens trägt auch das durch die ganze Fensterfläche in den Raum einfallende und von der Gesamtgrösse des Fensters wesentlich abhängige Licht zur Erhellung bei. Bei hellen gegenüberliegenden Häusern kann diese Lichtmenge beträcht-

1, und wenn die Wände des Raumes hell gestrichen sind, kann
 2sser Theil dieses Lichts reflectirt werden und zur Erhellung
 3beitsplatzes dienen. So hat man bei Plätzen, die gar kein directes
 4licht bekamen, bis 25 Meterkerzen Helligkeit beobachtet. In-
 5st das reflektirte Licht immer als ein Nothbehelf zu betrachten,
 6dunkeln Tagen und Tagesstunden so gut wie ganz versagt.
 7 Methoden der zweiten Kategorie leiden unter dem sehr
 8wereren Fehler, dass sie nur für die Beobachtungsstunde die
 9it angeben, dass aber diese Helligkeit je nach dem Bewölkungs-
 10der Luftbeschaffenheit, dem Stande der Sonne u. s. w. enorm
 11chwankt; an ein- und demselben Platze um das 40—60fache.
 12 Brauchbarkeit eines Platzes festzustellen, müsste man mit
 13ethoden gerade an dem trübsten Tag und zur trübsten Stunde
 14man wird aber nie sicher sein können, dass nicht während der
 15diese Verhältnisse sich total geändert haben. Erst oft wieder-
 16rungen können hier das Resultat einigermaassen sichern. —
 17 direkten Helligkeitsbestimmungen kommt ferner in Betracht,
 18jeweilige, sehr starken Schwankungen unterworfen, reflectirte
 19it gemessen und oft überschätzt wird.
 20lt man daran fest, dass nur eine gewisse Menge directes
 21licht unter allen Umständen und auch an trüben Tagen einem
 22die nöthige Helligkeit garantirt, so wird meistens die Ver-
 23g der FORSTER'schen Methode und des Raumwinkelmessers
 24die Praxis brauchbareren Resultate ergeben.
 25ber die sonstige Anordnung der Fenster, über Vorhänge sowie
 26 Folgen mangelhafter Beleuchtung s. im Kap. „Schulen“.

B. Künstliche Beleuchtung.

1r künstlichen Beleuchtung sind — einstweilen abgesehen von der
 2hen Beleuchtung — nur Körper geeignet, welche angezündet
 3brennen; welche zweitens gasförmig sind oder in Gasform über-
 4so dass eine Flamme entstehen kann; und in deren Flamme
 5feste Körper oder dichte Dämpfe ausgeschieden und glühend
 6werden. Nur auf diesen glühenden Theilchen beruht die
 7raft einer Flamme.
 8 Leuchtgase, die entweder präformirt sind oder aus dem Leucht-
 9, z. B. Oelen, Stearin, Paraffin, unter der Einwirkung der Hitze
 10n, sind wesentlich Kohlenwasserstoffe verschiedenster Art,
 11n, Acetylen u. a. m.
 12 sogenannten schweren Kohlenwasserstoffe scheiden leicht
 13stoff ab; derselbe ist aber nicht der wesentlich leuchtende Be-

standtheil der Flamme, sondern es kommen hierfür hauptsächlich dicke Dämpfe höherer Kohlenwasserstoffe in Betracht.

Werden einer Flamme mehr Kohlenwasserstoffe zugeführt als in der innersten Zone verbrennen können, oder wird die Luftzufuhr und die Verbrennung beschränkt, so entweichen Kohlenwasserstoffe und es entsteht Russen der Flamme. So beobachtet man Russen, wenn bei Bewegungen der Flammen (durch Wind u. v.) zeitweise zu viel Material erhitzt wird, oder wenn dasselbe zu leicht schmilzt und in zu grosser Masse dem Docht zugeführt wird. Russende Flammen entstehen auch trotz ruhigen Brennens bei solchem Material, welches auf 6 Theile Kohlenstoff weniger wie 1 Theil Wasserstoff enthält. Kohlenstoffreichere Oele kann man erst dadurch mit nicht russender Flamme verbrennen, dass man Glasylinder aufsetzt und eine verstärkte Luftzufuhr herstellt. — Bei zu starker Luftzufuhr hört das Leuchten der Flamme völlig auf.

Benutzt werden:

1) Talglichter. Das Material wird sehr leicht flüssig. Die Dochtlänge wechselt sehr, die Flamme ist daher in steter zuckender Bewegung und fast immer russend; in Folge der unvollkommenen Verbrennung werden Kohlenwasserstoffe, Kohlenoxydgas, Fettsäuren und Acrolein der Zimmerluft beigemischt.

2) Stearinlichter, aus reiner Stearinsäure hergestellt. Die Döchte sind mit Borsäure oder Phosphorsäure getränkt; dadurch entsteht eine Krümmung des beschwerten Endes des Dochts, welches dann in Schleier der Flamme völlig verbrennt und als Asche abfällt. Die Verbrennung ist hier viel vollständiger, das Russen seltener.

3) Paraffinkerzen, aus Destillationsprodukten der Braunkohle und des Torfs gewonnen. Das Paraffin schmilzt leichter als das Stearin; daher müssen dünnere Döchte gewählt werden.

4) Fette Oele, die unter Druck in den Docht eingetrieben werden. Zur vollständigen Verbrennung bedürfen sie grosser Luftzufuhr, also des Aufsetzens von Cylindern. Sie werden kaum mehr zu Beleuchtungszwecken gebraucht und sind fast völlig durch die folgenden Materialien verdrängt.

5) Petroleum kommt in gewissen Erdschichten, in welchen es durch Zersetzung von Pflanzen- und Thierresten entstanden ist, in grossen Massen vor: namentlich in Nordamerika, am Kaspischen Meere u. s. w.

Das rohe Petroleum wird durch Destillation gereinigt, weil nur einige unter den zahlreichen Kohlenwasserstoffen des Petroleums zur Beleuchtung geeignet sind. Die geeignetsten Oele destilliren bei 150—250°. Sie haben das specifische Gewicht 0.8 und kommen unter dem Namen „raffiniertes Petroleum“ in den Handel. Vielfach werden sie nochmals gereinigt und namentlich von den gefährlichen, niedrig siedenden Kohlenwasserstoffen Naphta und Gasolin getrennt.

st vollständig befreit. Die letzteren verdampfen schon bei gewöhnlicher Temperatur und ihre Dämpfe bilden mit Luft explosive Gemenge.

Gut gereinigtes Petroleum soll selbst an heißen Orten und auch beim Brennen stets etwas erwärmten Behälter der Lampe nicht in dem Maasse verdampfen, dass explosive Gasgemenge entstehen können.

Bei der Verbrennung des Petroleums ist gute Luftzufuhr nöthig; er müssen eingeschnürte Cylinder verwandt werden, die eine innige Führung der Luft mit der Flamme bewirken. Häufig richtet man auch im Innern der Flamme eine Luftzufuhr her, so dass die innere Flamme von beiden Seiten eine ausgedehnte Berührung mit der äusseren erfährt.

6) Leuchtgas. Aus allen möglichen organischen Stoffen herstellen, welche Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten und beim Erhitzen mit der Luftabschluss Kohlenwasserstoffe liefern; am besten geeignet sind die besten Sorten Steinkohle. In jedem Falle ist das entstehende Gemenge von Kohlenwasserstoffen von vielen der Beleuchtung hinderlichen Verunreinigungen zu reinigen.

Das Rohmaterial wird in eisernen oder gemauerten Retorten geglüht; die Gase gelangen zunächst in eine Vorlage, wo die schwerflüchtigen Bestandtheile, Theer und Wasser, schon grösstentheils zurückbleiben; dann in einen weiteren Kühlapparat, in welchem sich wiederum Theerprodukte abscheiden. Das Condenswasser enthält Ammoniumcarbonat, Ammoniumsulfid, Ammoniumnitrid und Ammoniumcyanid; der condensirte Theer enthält flüssige Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol, feste wie Naphtalin, Paraffin, Hydroxylderivate Carbol, Kreosol, Kreosot; ferner Anilin, Pyridinbasen u. s. w.

Die in den Kühlapparaten nicht verdichteten Gase bilden das unreine Leuchtgas, welches folgende nothwendige Gase enthält: Aethylen, Acetylen, Gase von Benzol und Naphtalin als leuchtende Bestandtheile; Methan, Kohlendioxid und Wasserstoff als nicht leuchtende, aber brennbare und verdünnende Bestandtheile. Ausserdem sind als störende resp. giftige Verunreinigungen zu nennen: Stickstoff, Kohlensäure, Ammoniak, Cyan und verschiedene Schwefelverbindungen, z. B. Cyansulfid, Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlenstoff.

Um die Verunreinigungen zu beseitigen, kommt das Gas in den sogenannten Reinigungsapparaten, wo es auf einer grossen mit Cokes und Steinkohlenstücken hergestellten Oberfläche mit Wasser gewaschen wird. Ferner werden durch Aetzkalk oder durch LAMING'sche Masse (gelöschter Kalk, Eisenvitriol, Sägespäne, an der Luft Eisenoxydhydrat, Calciumhydrat und Calciumsulfat verwandelt) namentlich Schwefelbestandtheile resp. das Ammoniumcarbonat fortgenommen.

Schliesslich bleibt ein Gemenge übrig, das etwa 5 Procent schwere Kohlenwasserstoffe enthält, die für die Beleuchtung am wichtigsten sind; der Rest besteht aus 30 Procent Methan und 50 Procent Wasserstoff, die z. B. für die Heizung mit Leuchtgas wesentlich in Betracht kommen; ferner noch 15 Procent Kohlenoxydgas. Der charakteristische Geruch des Leuchtgases rührt von kleinen Mengen Schwefelkohlenstoff und Naphtalin her. — Methan und Wasserstoff sind explosiv, wenn sie im bestimmten

Verhältniss mit Luft gemengt sind. Die Explosion erfolgt, wenn ein Volumen Leuchtgas mit dem 4—20 fachen Volumen Luft gemischt wird; ist weniger oder mehr Luft vorhanden, so findet keine Explosion statt.

Auch bei der Gasbeleuchtung kommt alles auf die richtige Menge der den Flammen zugeführten Luft an. Bei zu viel Luft findet volle Verbrennung statt und die Flamme leuchtet gar nicht, bei zu wenig Luft entstehen russende Flammen. Im Gebrauch sind entweder Schnittbrenner, welche breite, dünne Flammen von der Form einer Fledermaus geben; oder Zweilochbrenner, bei welchen zwei gegeneinander geneigte feine Oeffnungen einen abgeplatteten Strahl erzeugen, so dass wiederum eine flache Flamme von der Gestalt eines Fischeschwanzes entsteht; oder cylindrische Brenner mit schmalem Schlitz oder einer Reihe kleinen Oeffnungen versehen, und mit Luftzufuhr von innen und von aussen zu beiden Seiten des Flammencylinders (Argandbrenner). Ein Fischeschwanzbrenner verbraucht pro Stunde circa 108 Liter Gas, ein Schnittbrenner 120—150 Liter, ein Argandbrenner 150—220 Liter.

Besonders reines, namentlich von Ammoniak, Schwefel und Kohlenoxyd freies Gas wird durch Destillation von Petroleum, Naphta und Paraffinöl gewonnen (Paraffinölgas der Eisenbahnwagen). — Vielfach sucht man durch Einleiten von Dämpfen von Lignoïn, Benzin, Naphtalin in das Leuchtgas diesem stärkere Leuchtkraft zu verleihen. — Ferner wird neuerdings auch Wassergas (vgl. S. 383) dadurch zum Leuchten nutzbar gemacht, dass kammerförmig angeordnete Nadeln von Magnesia darin zum Glühen gebracht werden (FAHNEHELM's Glühlicht). Man mengt dem kohlenoxydhaltigen, stark giftigen Wassergas riechende Bestandtheile absichtlich bei, um etwaige Ausströmungen bemerkbar zu machen.

7) Grosse Bedeutung hat in den letzten Jahren das Gasglühlicht erlangt. Bei demselben wird ein mit seltenen Erden getränktes Gewebe, der Glühstrumpf, in die Flamme des Leuchtgases oder anderer brennender Gase eingehängt und hier in's Glühen gebracht (AUER von WEISBACH). Für das Tränken des Glühgewebes kommen die Nitrate von Thor und von Cer besonders in Betracht; ersteres wiegt der Menge nach erheblich vor (98 Procent), ist aber relativ indifferent und nur der Träger für das Ceroxyd, das nicht mehr als 1—2 Procent der Masse ausmacht, aber ganz wesentlich betheiligt ist, weil es in Folge specifischer Eigenschaften leicht in vollste Weissgluth von einer 2000° erheblich überschreitenden Temperatur übergeht. Die Leuchtkraft der Glühstrümpfe ist daher eine sehr bedeutende; sie leisten die gleiche Lichtstärke mit einem 50 Procent geringeren Gasverbrauch.

Die Glühstrümpfe sind auch in der Form des Spiritusglühlichts verwendbar. In den Lampen wird durch eine kleine Heizflamme, die zunächst anzuzünden ist, Vergasung des Spiritus erzielt; nach dem Anzünden muss man etwa drei Minuten warten, bis hinreichend Gas gebildet ist, und dann die den Glühstrumpf durchströmenden Gase

ünden. Der denaturirte Spiritus brennt geruchlos, abgesehen von Zeit zwischen Anzünden der Heizflamme und dem der Leuchtflamme.

8) Acetylengas. Das Acetylengas, das eine dem Leuchtgas weit übergeliegende Leuchtkraft besitzt, wird in grösserem Umfang zur Beleuchtung benutzt, seit das Carbid, CaC_2 , durch Zusammenschmelzen von Kalk und Kohle bei sehr hoher, im elektrischen Ofen zu erreichender Temperatur fabrikmässig hergestellt werden kann. Carbid giebt bei Berührung mit Wasser Acetylen nach der Gleichung: $\text{CaC}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{C}_2\text{H}_2$. — Zur Gewinnung von Acetylen zur Beleuchtung wird z. B. Carbid durch eine Streuvorrichtung in Wasser eingebracht. Das Gas wird nur für kleine Anlagen unter geringem Druck verwendet; stärkerem Druck ist die Gefahr, dass das Gas (ohne Berührung mit Luft) explodirt, zu sehr gesteigert.

9) Elektrisches Licht. Entweder wird sogenanntes Bogenlicht erzeugt, welches aus glühenden Kohlenpartikelchen bestehenden Funkenbogen erzeugt, welcher zwischen zwei aus harter Retortenkohle bestehenden, etwa 4 mm von einander entfernten Elektroden übergeht. Dieses Bogenlicht ist stark violett. Oder man benutzt Glühlicht; dünner Kohlenfaden wird durch den elektrischen Strom bis zur Rothgluth erhitzt, und um das Verbrennen der Kohle zu hindern, wird eine luftleer gemachte Glashülle eingeschlossen. Es entsteht so ein rein gelbröthliches Licht.

Eine schöne weisse Farbe hat das Bogenlicht nur dann, wenn in der Betriebsleitung keine zu hohe Spannung herrscht. Ist letzteres der Fall, so wird das Licht fahl. Ferner wird nur dann ein ruhiges Licht geliefert, wenn die Spannung in der Betriebsleitung sich constant hält, und wenn ebenso Spannung und Stromstärke durch gleichen Abstand der Kohlenspitzen, also gleich langen Funkenbogen, constant erhalten werden. Um Schaden durch die herabfallenden Funkenenden Kohlenstückchen zu vermeiden und das Ausblasen durch Wind zu verhindern, wird der untere Theil der Bogenlampe mit runden Glaskugeln umgeben, wobei allerdings 15–40 Procent Licht verloren gehen. — Das Glühlicht ist theurer, gestattet aber im Gegensatz zum Bogenlicht, bei welchem nur wenig mehrere Lampen in demselben Stromkreis anzubringen sind, eine theilweise Theilung und eine Anpassung an die Grösse des Raumes. Bei der Glühlampe von Edison werden verkohlte und U-förmig gebogene Bambusröhren benutzt; bei den Swan-Lampen Baumwollfasern. Gewöhnlich sind Lampen zu 8, 16 und 32 Normalkerzen Lichtstärke im Gebrauch. Die Brenndauer beträgt 1000 Brennstunden und mehr. Bei der Hälfte Stromverbrauch erzielt die gleiche Helligkeit die neue NERNST-Lampe, bei welcher, ähnlich wie bei Gasglühlicht, unverbrennliche Substanzen (Stäbchen aus Magnesiumoxyd oder Yttriumoxyd) zur Weissgluth erhitzt werden. — Damit die Stäbchen gute Leiter werden, müssen sie allerdings vorher erwärmt werden; dies geschieht durch eine das Stäbchen umgebende Platinspirale, welche durch den elektrischen Strom zunächst zur Rothgluth erhitzt wird.

Vergleichen wir vom hygienischen Standpunkt aus die verschiedenen Beleuchtungsarten, so haben wir zunächst folgende Anforderungen an eine normale künstliche Beleuchtung zu stellen: 1) Die Beleuchtung soll die oben näher präcisirte erforderliche Helligkeit liefern, und zwar gleichmässig ohne zu starke Intensitätsschwankungen (Zucken der Flamme). 2) Die Qualität des Lichtes soll dem Auge zusagen. 3) Die Lichtquellen sollen das Auge nicht durch zu starken Glanz schädigen. 4) Die strahlende Wärme der Lichtflamme soll die Bewohner nicht belästigen, und die Wärmeabgabe der Menschen im Wohnraum soll nicht in zu hohem Grade behindert werden. 5) Die Leuchtmaterialien sollen keine gesundheitsschädlichen Verunreinigungen in die Wohnungsluft übergehen lassen. 6) Die Beleuchtung soll keine Explosionsgefahr herbeiführen. 7) Sie soll möglichst billig sein.

1) Die Lichtstärke. Die Lichtintensität der Kerzen ist ausserordentlich unbedeutend und keiner Steigerung fähig. Sie liefern uns jedoch die Vergleichseinheit = Normalkerzen (vergl. S. 424). Oellampen lieferten früher, und zum Theil auch jetzt noch, in England und Frankreich, die Vergleichseinheit; eine Carcellampe ist = 9.8 Normalkerzen. Petroleumlampen sind an Lichtstärke den Oellampen weit überlegen, namentlich wenn gut raffiniertes Petroleum benutzt wird. Gewöhnliche Lampen geben eine Lichtstärke bis zu 50 oder 60 Normalkerzen. Besondere Constructionen (wie z. B. die von SCHUSTER & BAER in Berlin) geben bis 110 Normalkerzen Lichtstärke. Bei letzteren Lampen geht ein Luftzufuhrrohr mitten durch den Oelbehälter und die dadurch vorgewärmte zutretende Luft wird durch einen sternartigen Einsatz passend vertheilt. Gasflammen liefern ein Licht von 10—30 Normalkerzen Stärke, grössere Argandbrenner, Gasglühlicht und Acetylenlicht bis 150 Normalkerzen. Elektrisches Glühlicht liefert 8—32 Normalkerzen; Bogenlicht bei einem Motor von einer Pferdekraft je nach der Grösse des dynamoelektrischen Apparates 400—1000 Normalkerzen.

Die Gasbeleuchtung lässt sich steigern durch die Zufuhr vorgewärmter Luft und durch Vorwärmung des Gases. Dies geschieht z. B. bei dem SIEMENS'schen Regenerativbrenner. Die Vorwärmung wird dadurch erzeugt, dass die Luft resp. das Gas in den durch die Flamme erwärmten Theilen der Lampe sich eine Strecke weit fortbewegen muss, um zur Flamme zu gelangen. Diese Lampen haben ausserdem gewöhnlich einen sogenannten invertirten Brenner, d. h. aus einem unten an der Lampe befindlichen Ringe strömt das Gas von oben nach unten aus, so dass ein Kranz von Flammen unter diesem Ringe entsteht. Die Lampen werfen daher keinen Schatten und sind

zur Oberlichtbeleuchtung vorzüglich geeignet (erwärmen aber die unter der Lampe gelegenen Plätze stark).

Für die ausnutzbare Lichtstärke sind die Lampenglocken sehr wesentlich. Dieselben sollen theils die horizontal in das Auge fallenden Strahlen abhalten, welche uns stark blenden und die Erkennung eines beleuchteten Gegenstandes erschweren, theils sollen dieselben das Licht auf den Arbeitsplatz reflectiren und concentriren. Die Lichtstärke auf dem Arbeitsplatz ist das eigentlich Wichtige für uns, und daher sollte vorzugsweise diese mit Hülfe des WEBER'schen Photometers bestimmt werden. Legt man als Norm eine Helligkeit von 10 Meterkerzen zu Grunde, so wird eine solche von den gewöhnlichen Petroleumlampen bis zu 0.5 Meter seitlichen Abstand, von der SCHUSTER & BAER'schen Lampe bis 0.75 m Abstand geleistet. — Gasflammen, welche 0.75 m über dem Tisch hängen, gewähren noch bei 0.5 m seitlicher Distanz mit Milchglasglocken von flacher Trichterform genügendes Licht. Eine Ausnahme machen nur lackirte Schirme und die sogenannten Pariser Lampenglocken, die auch unten mit einer Milchglaschale versehen sind.

Ausser auf die Lichtstärke ist noch auf die Gleichmässigkeit des Brennens Werth zu legen; zuckendes oder in der Lichtstärke erheblich schwankendes Licht wirkt äusserst belästigend und reizend auf's Auge (z. B. schlechte Bogenlichtanlagen). In dieser Beziehung ist das Auerlicht (Gasglühlicht, Spiritusglühlicht) den Beleuchtungsarten, die frei brennende Flammen benutzen, erheblich überlegen.

2) Lichtqualität. Im Tageslicht finden sich 50 Procent blaue, 18 Procent gelbe, 32 Procent rothe Strahlen; alle künstlichen Lichtquellen liefern mehr gelbe und rothe Strahlen, und das violette Spectrum ist schwach vertreten; doch ist dies Verhältniss bei den neueren kräftigeren Lichtquellen viel weniger verschoben. Beim elektrischen Bogenlicht ist ein übergrosser Bruchtheil violetter und ultravioletter Strahlen vorhanden. Unser Auge ist bei gewissen Helligkeitsgraden für den gelben Theil des Spectrums am empfindlichsten; andererseits sollen ultraviolette Strahlen die Netzhaut stark reizen. Bei intensiver Beleuchtung ist dem Auge ein Vorwiegen der rothen und gelben Strahlen jedenfalls angenehmer als das übermässig blauviolette Licht, z. B. des elektrischen Bogenlichts.

3) Unter Glanz einer Lichtquelle versteht man die von der Flächeneinheit (1 qmm) ausgehende Helligkeit. Vergleicht man kleine Schnittbrenner, Kerzen und Gasglühlicht, so verhält sich deren Glanz etwa wie 4:6:10. Elektrisches Glühlicht zeigt noch 7—10fach höheren

Glanz, noch weit mehr elektrisches Bogenlicht. — Stark glänzen Lichtquellen dürfen nicht direct das Auge treffen; sie blenden und reizen das Auge, setzen die Wahrnehmbarkeit anderer Gegenstände herab, können Thränen der Augen und Schmerzempfindung hervorrufen. Glänzende Lichtquellen im Bereich des Auges müssen daher mit dämpfenden Hüllen aus Milchglas und dergl. umgeben werden, die dann aber die Lichtstärke erheblich herabsetzen.

4) Wärmeproduction. Zunächst kommt die Wärmeausstrahlung der Lichtquellen gegenüber der in der Nähe befindlichen Gesichtshaut der Bewohner in Betracht. Gerade beim künstlichen Licht sind viel reichlicher Wärmestrahlen vorhanden (80—90 Procent) als bei Sonnenlicht (50 Procent). Die Intensität der Wärmestrahlung darf natürlich nur bei gleicher Lichtstärke verglichen werden. Am günstigsten stellt sich unter den gewöhnlichen Beleuchtungsmitteln das Gasglühlicht; dann folgt elektrisches Glühlicht. Gewöhnliche Gasbrenner geben 5mal, Kerzen 8mal und Petroleumlampen 10mal mehr strahlende Wärme als Gasglühlicht.

Abhülfe gegen die Wärmestrahlung ist nur bei den Lichtquellen erforderlich, die in dieser Beziehung sich ungünstig verhalten, namentlich bei Petroleumlampen. Hier sind die Flammen mit doppeltem Cylinder von Glas oder besser von Glas und Glimmer zu umgeben, so dass die zwischen beiden circulirende Luft zur Kühlung des äusseren Cylinders beiträgt.

Die Gesamtwärme, welche von den Lichtquellen geliefert wird, ist häufig so erheblich, dass die Entwärmung der Bewohner dadurch beeinträchtigt wird. In Betracht kommt dabei nicht nur die Temperatur, sondern auch die Wasserdampfmenge, die den Feuchtigkeitsgehalt der Luft und damit die Wasserverdunstung von der Haut beeinflusst. Auch hier ist ein Vergleich verschiedener Lichtquellen unzulässig bei gleicher Lichtstärke. Nach RUBNER ergaben sich folgende Werthe:

Bei 100 Kerzen Helligkeit liefern pro Stunde:

Elektrisches Bogenlicht . . .	57	Calorien	und	0	Kilogr. Wasser
Elektrisches Glühlicht . . .	200	"	"	0	" "
Gasglühlicht	1000	"	"	0,1	" "
Leuchtgas, Argandbrenner . .	4200	"	"	0,7	" "
Petroleum, grosser Rundbrenner	2070	"	"	0,3	" "
Petroleum, kleiner "	6200	"	"	0,8	" "
Stearinkerze	7880	"	"	0,9	" "

Kerzen verhalten sich also am ungünstigsten. Freilich erreicht man mit diesen thatsächlich nie bedeutende Wärmeeffekte, weil man stets an dem entsprechenden Lichteffect fehlen lässt. Gute Petroleumlampen zeigen sich günstiger als die übliche Gasbeleuchtung, weitaus am besten aber ist das elektrische Licht und das Gasglühlicht.

Allerdings kann gerade bei Gaslicht die producirte Wärme zweckmässig zur Ventilation des Raumes ausgenutzt und zum Theil fortgeführt werden, so dass keine stärkere Belästigung durch die Temperaturerhöhung eintritt (s. S. 413); bei elektrischem Licht muss dagegen ein besonderer Motor für die Ventilation geschaffen werden, falls nicht andere Wärmequellen vorhanden sind.

5) Verunreinigung der Luft. Bei Gasbeleuchtungsanlagen kann schon ohne Benutzung derselben in Folge von Undichtigkeiten der Leitung die Luft in gefährlicher Weise mit Kohlenoxydgas verunreinigt werden. Undichtigkeiten der Leitung sind stets vorhanden. Hauptsächlich findet die Ausströmung von Leuchtgas im Boden statt, und durch das allmähliche Einwirken von Feuchtigkeit, Schwefelammonium (Jauche), mechanische Erschütterungen u. s. w., leicht Defekte entstehen. Vom Boden kann das ausgeströmte Gas eventuell in die Wohnung gelangen, allerdings nur dann, wenn Undichtigkeiten den Fundamenten des Hauses vorliegen (vergl. S. 368). Durch starke Heizung wird das Eindringen des Gases in die Wohnung begünstigt; mehreren Fällen von Leuchtgasvergiftungen bewohnten die Erkrankten gerade die am stärksten beheizten Zimmer. — Auch innerhalb der Wohnung entweichen oft kleine Mengen Gas, die durch genaue Beobachtung der Gasuhr, in noch empfindlicherer Weise durch den Cow'schen Regulator, entdeckt werden können. Stärkere Ausströmungen werden leicht durch den Geruch erkannt; selbst wenn das Gas nur zu 2 Procent der Luft beigemischt ist, ist der Geruch von jedem, auch wenig empfindlichen Menschen wahrzunehmen. Zuweilen können allerdings die riechenden Stoffe absorbirt und dadurch unmerklich werden. Ausserdem soll sich ausgeströmtes Gas an staubförmigen Körpern (Mehlstaub) condensiren und zu den sogenannten Staubexplosionen Anlass geben können. — Mit Rücksicht auf diese Ausströmungsgefahr sind in den Wohnzimmern immer nur möglichst kurze, in Schlafzimmern gar keine Gasleitungen anzulegen. Unbenutzte Leitungen sollten in Wohnungen nicht geduldet werden.

Alle Beleuchtungsmaterialien mit Ausnahme des elektrischen Glühlichts verunreinigen ferner die Luft durch die Verbrennungsprodukte, welche bei ihrer Verwendung zur Beleuchtung entstehen. Vor Allem werden Kohlensäure und Wasserdampf gebildet. Eine helle Petroleumlampe liefert die circa zwölfwache Menge Kohlensäure wie ein Mensch,

dazu etwa die achtfache Menge von Wärme und Wasserdampf. Wie aus untenstehender Tabelle hervorgeht, verhält sich elektrisches Glühlicht und Gasglühlicht am günstigsten. Petroleum und Gas stehen sich ziemlich gleich. Kerzen sind wiederum am ungünstigsten. Allerdings ist auch bei dieser Vergleichung die Ventilation, die namentlich bei Gasbeleuchtung energischer zu sein pflegt, nicht unberücksichtigt zu lassen.

Bei 100 Kerzen Helligkeit liefert Kohlensäure pro Stunde:

Elektrisches Bogenlicht	Spur
Elektrisches Glühlicht	0
Gasglühlicht	0,12 Kilogr.
Leuchtgas, Argandbrenner	0,88 „
Petroleum, grosser Rundbrenner	0,62 „
Petroleum, kleiner „	1,88 „
Stearinkerze	2,44 „

Nicht selten kommen dazu noch Produkte der unvollständigen Verbrennung; kleine Mengen von Kohlenoxydgas lassen sich fast stets in künstlich erleuchteten Räumen nachweisen. Eine starke Steigerung tritt bei schlechtem, rasselndem Brennen der Flamme ein, wobei sich namentlich viel Kohlenoxydgas und Acrolein entwickelt. Bei Gasbeleuchtung entsteht weit mehr schwerflüchtige Säure und Schwefelsäure als bei den übrigen Beleuchtungsmitteln; bei Gasbeleuchtung, besonders aber bei Kerzenbeleuchtung treten messbare Mengen von salpetriger Säure auf, gegen die manche Menschen besonders empfindlich zu sein scheinen.

6) Explosions- und Feuersgefahr. Bei Kerzen, Oelen, elektrischem Licht ist keinerlei Explosionsgefahr vorhanden. Bei Petroleum kann sie durch die Controle des „Entflammungspunkts“ vermindert werden, d. h. derjenigen Temperatur, bei welcher sich flammfähige Gase entwickeln. Nach deutschem Gesetz soll dieser Punkt nicht unter 21° in Oesterreich 30° liegen, während die Anzündung und ein Verbrennen der Masse erst bei 43,3° eintreten soll. Diese Controle geschieht mittelst des Asklischen Petroleumprüfers. — Nur bei schlechter Lampenconstruction, z. B. bei metallenen Behältern, die sich auf über 30° erhitzen, oder z. B. dann, wenn eine Hängelampe von einer herunter abgeworfenen Tischlampe erhitzt wird, kann es jetzt noch eventuell zur Explosion kommen. Ferner beim Auslöschen, wenn im Gefäß sehr wenig flüssiges Petroleum mehr vorhanden, aber viel Dampf angesammelt ist. Seit eine regelmäßige Petroleumprüfung eingeführt ist, geschehen Explosionen fast nur bei massenhaftlicher Anwendung derselben, z. B. beim Übergossen in Feuer u. s. w.

1 Leuchtgas entsteht Explosionsgefahr, sobald in Folge von
 teiten der Leitung, in Folge falscher Stellung der Hähne
 schender Flammen Gas ausgeströmt ist und das Gemenge von
 Gas mit einer Flamme in Berührung kommt. Im Ganzen
 lerdings der charakteristische Geruch des Gases einigermaassen
 . 2 Procent Beimengung bereits durch den Geruch sicher er-
 l, aber erst ein Gehalt von über 4 Procent Leuchtgas explosiv
 achten ist daher nur, dass Zimmer, in welchen über Nacht
 : Gas ausströmen konnte, am Morgen nicht mit Licht betreten
 Bei Gasgeruch sind sofort die Fenster zu öffnen, um eine
 he Verdünnung herzustellen. Wichtig ist es ferner, dass
 rere Flammen in einem Zimmer über Nacht brennen bleiben,
 1 die eine verlöschen, die andere aber zur Anzündung des
 Gasgemisches dienen könnte.

gens lassen sich an Gasbrennern Sicherheitsvorrichtungen anbringen,
 12 einem mit dem Hahn verbundenen langen und schweren Hebelarm
 elcher bei brennender Flamme auf einer Unterlage ruht, dem aber
 hen der Flamme und beim Erkalten des Metalls die Unterlage ent-
 so dass der Arm herabfällt und den Hahn schliesst.

reis. Die Preisverhältnisse ergeben sich aus folgender Tabelle
 ISCHER), in welcher die Preise auf einheitlichen Consum und
 e Leuchtkraft bezogen sind. Wie ersichtlich, ist Kerzenlicht
 n theuersten. — Ueber den Preis der elektrischen Beleuch-
 /ergleich mit der Gasbeleuchtung wird noch vielfach debattirt

	Für die stündliche Erzeugung von 100 Normalkerzen sind erforderlich	
	Menge	Preis
1 Bogenlicht . . .	0.09 bis 0.25 Pferdekr.	6 bis 12 Pfennige
Glühlicht . . .	0.46 „ 0.85 „	15 „ 30 „
Siemenslampe . . .	0.35 bis 0.56 cbm	8 „ 10 „
Argandbrenner . .	0.8 „ 2.0 „	14 „ 86 „
größter Rundbrenner	0.2 kg	4 „
kleiner Flachbrenner	0.6 „	12 „
cellampe	0.43 „	41 „
sen	0.77 „	139 „
.	1.0 „	160 „
an	0.92 „	166 „
in	0.77 „	308 „

anzen erscheint vom hygienischen Standpunkt aus die elek-
 Beleuchtung entschieden als die günstigste; und zwar

für die Wohnung Glühlicht, das mit matten Gläsern ausreichend abgeblendet ist; bedenklich ist nur vorläufig das leichte Eintreten von Betriebsstörungen, weshalb auf eine Reserve von Gas nicht verzichtet werden darf; demnächst Gasglühlicht. — Ueber die sog. „indirekte Beleuchtung“ s. in Kap. „Schulen“.

Litteratur: WAGNER-FISCHER, Handbuch der chemischen Technologie, 18. Aufl., 1889, S. 92—164. — FORSTER, Vierteljahrsschr. f. öff. Ges. 1884. — H. COHN, Lehrb. der Hygiene des Auges. Wien 1892. — Derselbe, Ueber den Beleuchtungswerth der Lampenglocken, Wiesbaden. 1885. — SCHMIDT und HAENSCH (Optische Werkstätten Berlin S.), Beschreibung und Anleitung zum Gebrauch von L. WEBER's Photometer. — WEBER, Beschreibung eines Raumwinkelmessers, Zeitschr. f. Instrumentenkunde, October 1884. — H. COHN, Ber. der Naturf. Vers. in München 1899. — Allg. med. Centralz., 1901, No. 39—41. — WINGEN, Das Schulhaus, 3. Jahrgang, No. 1. — RUMER, Lehrb. d. Hyg., 6. Aufl., 1900. — WEBER, ROSENBOOM und KALLMANN, Beleuchtung in WHIT's Handb. der Hygiene, 1895.

VII. Entfernung der Abfallstoffe.

Während bei nomadisirenden Völkern und bei einer zerstreut wohnenden, Ackerbau treibenden Bevölkerung die Abfallstoffe leicht zu beseitigen sind und wenig oder gar nicht belästigen, treten in den Städten, in welchen grössere Menschenmassen sich zusammendrängen und die Abfallstoffe sich stark anhäufen, vielfache Uebelstände hervor. Schon von Alters her sehen wir daher in den grossen Städten besondere Einrichtungen zur Entfernung der Abfallstoffe (Babylon, Rom). Je mehr und schneller in der Neuzeit die Städte anwachsen, um so allgemeiner wird das Bedürfniss nach solchen Maassregeln, und im Laufe der letzten Jahrzehnte ist die Frage der Städtereinigung vielfach in den Vordergrund der communalen Interessen getreten.

Ogleich somit bezüglich der Nothwendigkeit irgendwelcher besonderer Maassregeln völlige Einigkeit herrscht, gehen die Meinungen über die zweckmässigste Art und Weise der Entfernung der Abfallstoffe weit auseinander. Diese Divergenz der Ansichten ist um so begründlicher, als sehr verschiedene Interessen und Gesichtspunkte bei der betreffenden Frage concurriren: theils das ästhetische Bedürfniss und das angeborene resp. anerzogene Ekelgefühl gegen die übelriechenden Abgänge; theils sanitäre Momente; theils die Kosten für die Fortschaffung; theils aber auch landwirthschaftliche und nationalökonomische Interessen. Die erstgenannten Gesichtspunkte führen zu einer möglichen

n Entfernung der Abfallstoffe auf irgend einem Wege, während an die Landwirthe die Abfallstoffe vorzugsweise als werthvollen r betrachten, der unter allen Umständen unseren Feldern zum der Erzielung neuer Ernten erhalten werden muss.

Die Forderung der Landwirthe darf indess für die Hygiene um niger maassgebend sein, als der Landwirthschaft in der Neuzeit liese, bald jene neuen reichen Quellen erschlossen werden, die in schender Weise einen Ersatz für die dem Boden entzogenen toffe bieten, so z. B. der Guano, ferner die letzthin bei der Rei-; des Eisens als Nebenprodukt gewonnene Thomasschlacke u. a. m. Ihr werden wir daran festhalten müssen, die sanitären Gesichts- in erste Linie zu stellen; sodann haben wir dem ästheti-

Bedürfniss Rechnung zu tragen, drittens sind die Kosten zu sichtigen und es ist womöglich eine zu starke Belastung der unen zu vermeiden; und erst in letzter Instanz wird zu erwägen b ohne Schädigung der vorgenannten Interessen der Landwirth-Concessionen gemacht werden können.

Vollen wir in diesem Sinne die Frage der Entfernung der Abfall-erörtern, so haben wir uns zunächst über die Beschaffenheit der stoffe, ferner über die Art und Weise, wie dieselben Schädigungen undheit veranlassen können, zu orientiren, und sodann werden die iedenen Methoden zur Entfernung der Abfallstoffe zu beschreiben aarauf zu prüfen sein, ob und in wie weit sie den hygienischen lerungen entsprechen.

A. Die Beschaffenheit der Abfallstoffe.

u den Abfallstoffen rechnet man a) die menschlichen Excremente; Excremente der Hausthiere; c) das Hauswasser, bestehend aus bwasser der Küche, dem zur Reinigung des Hauses, der Wäsche s Körpers verwendeten Wasser; d) Abwässer aus Schlachthäusern, en und industriellen Etablissements; e) den Hauskehricht, i. e. ten Abgänge aus Küche und Haushalt, den Stubenkehricht, die u. s. w.; f) das von Dächern, Strassen, Höfen sich sammelnde wasser; g) den Strassenkehricht; h) die Thiercadaver.

ro Mensch und Jahr sind ungefähr 34 kg Koth, 400 kg Harn, ; feste Küchenabfälle und Kehrlicht, 36 000 kg Küchen- und wasser in Ansatz zu bringen.

Ile diese Abfallstoffe enthalten:

) Mineralische Stoffe, Kochsalz, Kaliumphosphat, Erdsalze. oes haben einen Gehalt von 3.5 Procent an Phosphaten, der

Harn 0.5 Procent. — Manche gewerbliche Abwässer führen mineralische Gifte, wie Blei, Arsen.

2) Organische, zum Theil stickstoffhaltige Substanzen. Speciell in den Fäces finden sich 2.2 Procent Stickstoff, im Harn 1.4 Procent N. Grosse Mengen organischer Stoffe führen auch die Küchenabwässer, ferner die Abwässer aus Schlachthäusern, Gerbereien, Stärke- und Zuckerfabriken, Wollwäschereien u. s. w.

3) Saprophytische Bakterien. Viele derselben finden in den organischen und anorganischen Stoffen der Abwässer ein ausgezeichnetes Nährmittel, vermehren sich massenhaft und bewirken lebhaftes Zersetzung der organischen Stoffe, d. h. Gährungs- und Fäulnisvorgänge. Besonders disponirt zu intensiver Fäulnis sind Mischungen von Harn und Fäces, die Küchenwässer und die an organischem Material reichen gewerblichen Abwässer. Die Produkte, die dabei auftreten, sind im Allgemeinen die Seite 44 aufgezählten; ihre Art und Menge wechselt je nach den vorherrschenden Bakterien und nach den für diese vorhandenen Lebens- und Ernährungsbedingungen.

Aus Mischungen von Harn und Fäces pflegt schon bei relativ niederer Temperatur nach zwei Monaten die Hälfte des Stickstoffs in Ammoniumcarbonat übergeführt und verflüchtigt zu sein. — Nur in trockenem Material, eingetrockneten Fäces u. s. w. finden keine Fäulnisvorgänge mehr statt.

4) Pathogene Bakterien. Eiterkokken, die Erreger des malignen Oedems und des Tetanus, sind in den Abfallstoffen äusserst verbreitet; gelegentlich kommen auch Tuberkelbacillen, Pneumonie-, Diphtherie-, Typhus-, Cholera- und Ruhrkeime u. a. m. vor. Selten, und dann wohl nur an schwimmenden Partikelchen fester Substanz, tritt eine nachträgliche Vermehrung dieser Bakterien ein. Schon die Art der Nährstoffe und die relativ niedrige Temperatur pflegt ihrer Entwicklung nicht günstig zu sein; vor Allem aber wirken die ungeheuren Massen von stets vorhandenen Saprophyten theils durch Nährstoffentziehung, theils durch giftige Stoffwechselprodukte hemmend auf die Entwicklung der Krankheitserreger. Resistenterer Arten (Milzbrand-, Tuberkel-, Typhusbacillen, Staphylokokken), können jedoch längere Zeit, Wochen und Monate, in den Abfallstoffen conservirt werden. Ferner sind auch weniger resistente Arten im Stande, sich länger zu halten oder gar zu vermehren, wenn sie in relativ grosser Einsaat unter Abfallstoffe gerathen. Auch in trockenen Massen werden die meisten Infektionserreger längere Zeit conservirt.

Vielfach kommt in den Abfallwässern eine ausserordentlich starke Verdünnung etwaiger Infektionsquellen zu Stande. Je hochgradiger

Verdünnung ist und je rascher sie erfolgt, um so unschädlicher sind die betreffenden Abwässer sein.

In welcher Kategorie von Abfallstoffen sind nun vorzugsweise pathogene Bakterien enthalten?

Irthümlicher Weise nimmt man bisher vielfach an, dass die menschlichen Excremente in dieser Beziehung weit gefährlicher sind als die übrigen Abfallstoffe.

In den Fäces finden sich eventuell Cholera-, Typhus-, Ruhrkeime und die Erreger anderer infektiöser Darmkrankheiten (Cholera nostras, Dysenterie u. s. w.); im Harn kommen Eiterkokken, Milzbrandbacillen, Tubercelbacillen u. s. w. vor. Im Ganzen ist die Mannigfaltigkeit und auch die Zahl der in den Excrementen abgeschiedenen Infektionserreger verhältnissmässig gering.

Die Hauswässer pflegen dieselben eben aufgezählten Bakterien zu enthalten, da der Inhalt gerade der von den Kranken benutzten Abwässer entweder ganz in die Ausgüsse für das Küchenwasser gelangt oder wenigstens theilweise bei der Reinigung der Geschirre. Daneben kommen in das Hauswasser beim Reinigen der Spucknapfe, der Klosetts, der Krankenzimmer u. s. w. noch Tuberkel-, Pneumonie-, Diphtheriebacillen, Eiterkokken, die Erreger der Exantheme u. s. w. — ziemlich alles, was es von Infektionserregern giebt.

Weiter können die Abwässer aus Schlächtereien, sowie aus solchen Fleischbebetrieben, welche Lumpen, Felle, Haare oder thierische Abfälle verarbeiten, infektiöse Bakterien aufnehmen.

Eine nicht geringe Menge der letzteren gelangt auch in den Kehrtrichter; namentlich Tuberkelbacillen, Staphylokokken, die Erreger der akuten Exantheme, werden mit dem Staub der Krankenwässer in den Kehrtrichter gebracht. Viele dieser Keime werden allerdings durch das Austrocknen geschwächt; nur die widerstandsfähigsten derselben können von diesem verstäubenden Material aus Infektionen hervorgehen.

Die Regenwässer und der Strassenkehrtrichter werden niemals auch annähernd so zahlreiche Infektionserreger enthalten, wie die vorerwähnten Abfallflüssigkeiten. Nur dann werden dieselben unter Umständen Berücksichtigung erheischen, wenn von engen Höfen und von aufgehäuften Massen von Abfallstoffen aus einer der vorerwähnten Kategorien abgekehrt oder abgeschwemmt werden.

B. Gesundheitsschädigungen durch die Abfallstoffe.

Die Gefahren der Abfallstoffe bestehen

1) darin, dass sie in Folge der in ihnen ablaufenden Fäulnisvorgänge gasförmige Verunreinigungen in die Luft liefern.

Vor Allem kommt es leicht zur Verunreinigung der Wohnungsluft. 1 cbm Abtrittsjauche vermag in 24 Stunden etwa 18 cbm Gas zu liefern; darunter 10 cbm flüchtige Fettsäuren und Kohlenwasserstoffe, 5—6 cbm Kohlensäure, 2—3 cbm Ammoniak, 20 Liter Schwefelwasserstoff. Bei unzweckmässigen Abort- und Canalanlagen findet namentlich in der Heizperiode ein lebhaftes Einströmen von Luft aus den Jauchegruben in's Wohnhaus statt; directe Bestimmungen ergaben in 24 Stunden eine Förderung von 200—1200 cbm Luft, die reichliche Mengen Jauchegas enthielt.

Im Freien wird die Luft durch offene Canäle, Fäcaldepots, Kissen oder Bodenflächen, welche zur Aufnahme der Abfallstoffe dienen, oft in hohem Grade verunreinigt.

Die Bedeutung dieser Luftverunreinigung ist S. 156 ff. dargelegt. Eine toxische Wirkung der Jauchegase wird nur beim Grubenräumen, in nicht ventilirten Canälen oder bei völlig vernachlässigten Abortanlagen beobachtet, wenn die Luft durch die Gase zu einem erheblichen Theil verdrängt ist. Für gewöhnlich ist die Concentration der giftigen Jauchegase auch in der Wohnungsluft viel zu gering, um Vergiftungserscheinungen hervorrufen zu können.

Noch viel weniger sind die gasförmigen Produkte der Abfallstoffe im Stande, Infektionen hervorzurufen. Fälschlicherweise wird allerdings gerade in diesen Emanationen vielfach noch die eigentliche Gefahr der Abfallstoffe gesehen. Riechende Abort- oder Canalgase werden von manchen Aerzten und Laien, namentlich in England, in völlig kritikloser Weise und unter Ignorirung der neuen Forschungsergebnisse als Ursache von Typhus, Diphtherie, Erysipel, Puerperalfieber u. s. w. angeschuldigt. Es ist bereits oben die Unhaltbarkeit derartiger Anschauungen ausführlicher erörtert worden.

Dagegen rufen die von den Abfallstoffen herrührenden übelriechenden Gase in ausgesprochenster Weise die S. 158 geschilderten Erscheinungen — Ekelgefühl, Behinderung in der Aufnahme der Luft u. s. w.

hervor, und sind ausserdem nicht selten das Zeichen einer mangelhaften Reinlichkeit und insofern Symptom einer gewissen Infektionsgefahr.

2) Die Abfallstoffe liefern eine grosse Menge organischer, fäulsfähiger Stoffe, und eventuell mineralische Gifte in den Boden und das Grundwasser resp. in die Flüsse.

Wird das Grundwasser oder Flusswasser als Trink- oder Brauchwasser benutzt, so können die hineingelangten organischen Abfallstoffe die Benutzbarkeit desselben hindern, weil es alsdann nicht mehr den in S. 202 aufgestellten Anforderungen bezüglich der Appetitlichkeit, Reinheit, Geruchlosigkeit u. s. w. entspricht.

Ferner kann ein Boden so stark mit Abfallstoffen imprägnirt werden, dass er zu üblen Gerüchen Anlass giebt und dass wiederum in seiner Tiefe befindliche Grundwasser stark verunreinigt wird. — Uebrigens ist die Bedeutung der Verunreinigung des Wassers und des Bodens durch organische Stoffe früher weit überschätzt. Es ist oben bemerkt worden, dass ein reichlicher Gehalt des Wassers und Bodens an organischer Substanz an und für sich für die Frequenz infektiöser Krankheiten belanglos ist.

3) Die Abfallstoffe vermitteln die Verbreitung von Infektionskrankheiten. Die Ausbreitung kann namentlich erfolgen, wenn innerhalb der Wohnung resp. in der Nähe derselben sich offene Lager für Abfallstoffen vorfinden (verschmutzte Höfe, offene Rinnsteine u. s. w.). Uebertragung kann dann in der verschiedensten Weise, durch Menschen (namentlich spielende Kinder), Insecten, Luftströmungen, Thierställe, Hausthiere u. s. w. geschehen. — Oder die Ausbreitung erfolgt von der weiteren Umgebung der Wohnung aus vermittelt: von der Bodenoberfläche (Garten und Gemüseland) aus; durch Abwässer, in gegrabene, benutzte Brunnen gelangen, namentlich bei Ueberführungen; oder durch offene Strassenrinnsteine, oder durch Bäche und Flüsse, welche einerseits Abfallstoffe aufnehmen, andererseits zum Trinken, Waschen, Spülen oder Baden dienen; selten durch verstaubten und verschleppten Kehrreicht.

Bestehen Einrichtungen, um alle Abfallstoffe möglichst schnell von der Wohnung und dem Bereich der Menschen fortzuschaffen, werden so die Infektionsquellen in den Abwässern ausserordentlich stark vermindert, und gelangen diese dann in tiefere Bodenschichten oder in nicht benutzte Flüsse oder werden sie mit bakterientödtenden bzw. bakterienabscheidenden Mitteln behandelt, so sinkt die Möglichkeit einer Infektion durch Abfallstoffe auf das geringste Maass.

Für manche Krankheiten, namentlich für Typhus, Cholera, Ruhr u. s. w., wird durch solche Einrichtungen zur Entfernung der Abfallstoffe ein grosser Theil aller überhaupt in Betracht kommender Infektionsquellen beseitigt und die Verbreitung sehr wesentlich gehindert.

werden. Für viele andere Krankheiten, z. B. die akuten Exantheme, stellt die Verbreitung der Erreger durch die Abfallstoffe einen relativ selten betretenen Weg dar, und hier werden daher Infektionen nicht in gleichem Masse seltener werden, trotz bester Anlagen zur sogenannten Städtereinigung.

Man darf sich auch bezüglich der erstgenannten Kategorie von Infektionskrankheiten keine übertriebenen Vorstellungen von der Wirksamkeit der Massengewinn zur Entfernung der Abfallstoffe machen. Wo ein zahlreiches Proletariat wohnt, wo die Bevölkerung in engen Wohnungen lebt und an ungesunder Nahrung und Nahrung gewöhnt ist, da werden auch trotz Canalisation zahlreiche Übertragungen von Diphtherie, Tuberkulose u. s. w. und auch gelegentlich schwere Contact-Epidemien von Typhus und Cholera vorkommen. Vollends wo die Wasserversorgung mangelhaft ist, können diese Seuchen unbekümmert um vorzügliche Einrichtungen zur Entfernung der Abfallstoffe in heftigster Form auftreten (Hamburger Choleraepidemie 1892). So gross der hygienische Nutzen der Vorkehrungen zur Entfernung der Abfallstoffe zweifellos veranschlagt werden muss, so muss man sich doch vor Ueberschätzung hüten und der Vorzug unter allen Umständen eine vollständige „Assanierung“ von Städten aussprechen (vgl. Kap. XI).

Aus Grund vorstehender Erörterungen wird ein zweckentsprechendes System zur Entfernung der Abfallstoffe Folgendes leisten müssen:

1) In erster Linie ist es erforderlich, dass die Abfallstoffe so schnell und vollständig wie möglich aus den menschlichen Wohnungen und der nächsten Umgebung derselben entfernt werden, bezw. dass ihnen durch Abtödtung der Bakterien die Infektionsgefahr genommen und durch besondere Vorkehrungen die Verbreitung übler Gerüche unmöglich gemacht wird.

2) Nachdem dieser unbedingt wichtigsten hygienischen Forderung genügt ist, muss darauf geachtet werden, dass die Abfallstoffe ausserhalb der Wohnstätten nicht unverändert in Flüsse oder auf Bodenflächen u. dgl. gelangen, von denen aus Kommunikationen mit zahlreichen Menschen bestehen, sondern erst nach solcher Vorbehandlung, dass keine Infektionsgefahr und keine Geruchsbelästigung mehr durch sie verursacht wird. Ausserdem ist beim Einlass in Wasserläufe zu berücksichtigen, ob auch die Fischzucht nicht durch die Abwässer Schaden leidet.

3) Sollen unästhetische Eindrücke thunlichst vermieden werden.

4) Unter den Systemen, welche vorstehende Bedingungen erfüllen, ist das billigste am empfehlenswerthesten.

5) Bei sonstiger Gleichwerthigkeit ist einem Verfahren, welches eine landwirthschaftliche Verwerthung der Abfallstoffe gestattet, der Vorzug zu geben.

C. Die einzelnen Systeme zur Entfernung der Abfallstoffe.

Man unterscheidet 1) solche Systeme, welche mit lokalen Sammel- n ohne unterirdische, communicirende Canäle arbeiten und vor- reise die Fäkalien beseitigen, sogenannte Abfuhrsysteme; dahin t das Grubensystem, das Tonnensystem und die Abfuhr mit ration der Fäkalien.

2) Solche Einrichtungen, bei welchen die Fäkalien oder auch die tlichen Abwässer durch ein unterirdisches Canalnetz gemein- für grössere Complexe von Häusern fortgeschafft werden, Canal- me; zu letzteren gehört die Schwemmcanalisation und die annten Separations- oder Trennungssysteme. — Kehricht hircadaver werden bei allen Systemen gesondert behandelt.

1. Abfuhrsysteme.

Das Grubensystem.

Die Fäkalien werden in einer nahe am Hause gelegenen Grube melt und von dort zeitweise abgefahren. — An den meisten bestehen besondere Vorschriften für die Anlage und Construction ruben.

Dieselben sollen nicht zu gross sein, höchstens 2–5 cbm Inhalt haben, in einem Abstand von mindestens 15 m vom Brunnen angelegt werden urch eine besondere Mauer und Lehmschicht von der Fundamentmauer uses getrennt sein. — Sind die Gruben durchlässig, so erfolgt leicht eine üttigung des Bodens mit Abfallstoffen, die zur Entwicklung fauliger Ge- führt. Eine völlige Dichtung der Grube ist indess schwer herzustellen. dem Einfluss des Ammoniumcarbonats der Jauche wird selbst Cement- allmählich angegriffen und die anfangs dichte Grube wird insufficient. sten ist es, die Gruben zwischen zwei Steinlagen mit einer dicken Thon- ehmschicht zu umgeben. Man verhindert dadurch wenigstens eine Ueber- ng des Bodens, verhindert aber nicht, dass bei dichter Bebauung das wasser allmählich verunreinigt und unappetitlich wird.

Die Gruben sollen ferner wasser- und luftdicht gedeckt sein; am besten ner Eisenplatte, oder mit Bretterlage und darüber mit einer starken chicht. — Das Fallrohr soll aus einem innen sehr glatten, undurch- n Material, z. B. aus glasirtem Thon oder emaillirtem Eisen bestehen. en Abzweigungen vor, so sollen Seiten- und Hauptrohr höchstens einen l von 25–28° bilden. — Der Querschnitt soll eiförmig, die Hinterwand trichters vertikal und etwas zurückweichend, die Vorderseite stark ge- und keinesfalls bauchig sein.

n jedem Falle ist eine Ventilation der Grube erforderlich, die Gruben- und Abtrittsgase nicht in's Haus eindringen. Wenn ube undicht gedeckt oder mit sogenanntem Dunstrohr versehen

ist, pflegen sich regelmässig starke Strömungen in das Haus hinein herzustellen. Es muss versucht werden, die Gase über Dach zu leiten, und als Motor die Küchenkamine zu benutzen, die auch im Sommer warm bleiben, oder aber durch besondere Feuerungen oder Gasflammen einen Motor herzustellen. Völlig unzulässig ist es, die Gase direct in einen Kamin einzuleiten; es findet dann unter Umständen (namentlich im Sommer und Herbst) eine Umkehr des Stroms und massenhaftes Eindringen der verunreinigten Luft in die Zimmer statt.

Am meisten empfiehlt sich das PETTENKOFER'sche Ventilationsverfahren. Das Fallrohr wird, ohne den Querschnitt zu verengern, bis über das Dach hinaufgeführt und erhält dort einen Aspirationsaufsatz. So viel als möglich wird es während seines ganzen Verlaufs an einen Küchenkamin angelegt, von welchem es durch eine eiserne Platte geschieden ist; oder es werden in der oberen Verlängerung des Rohres Gasflammen angebracht. Die Sitzöffnung soll für gewöhnlich bedeckt sein. Es stellt sich dann geradezu eine Art Vacuum her, so dass die Luft kräftig in den Sitz hinein- und zum Dache herausströmt, sobald der Deckel abgenommen wird.

Nach d'ARCEY soll ein besonderes Ventilationsrohr von der Grube aus über Dach geführt und an einen Küchenschornstein angelehnt resp. durch Feuerung oder Gas erwärmt werden. Die Sitze sollen dann beständig offen bleiben und ein fortwährender Luftstrom soll durch letztere hinab in die Grube und von da durch das Ventilationsrohr zum Dache hinaus unterhalten werden. Sind wirklich kräftige Feuerungen vorhanden und ist der Verschluss der Grube völlig dicht, so leistet diese Ventilation sehr Gutes (so in manchen öffentlichen Anstalten). Sobald aber der Motor nachlässt oder Nebenöffnungen am Grubenschluss entstehen, kann es eventuell zu einer Umkehr der Stromrichtung, resp. zu einer Ausschaltung des Fallrohrs kommen. Die vorgenannte Methode ist daher im Allgemeinen vorzuziehen. — Versuche, den Raum, in welchem sich der Abort befindet, nicht aber Sitz und Fallrohr selbst zu ventiliren, sind beim Grubensystem stets ungenügend ausgefallen.

Von Zeit zu Zeit müssen die Gruben geräumt werden. Damit hierbei nicht hygienische Nachtheile oder eine Belästigung durch Gerüche eintritt, sind in neuerer Zeit Apparate in Aufnahme gekommen, mittelst welcher der Grubeninhalt in einen luftleer gemachten Kessel aspirirt und dann abgefahren wird. Die Grubengase werden verbrannt, und es ist in dieser Weise eine fast völlige Geruchlosigkeit zu erzielen. Die Räumung soll nur am Tage geschehen, damit um so leichter eine Controle ausgeübt werden kann.

Besondere Vorsicht ist auf das Vermeiden jeglichen Verspritzens des Grubeninhalts zu verwenden. — Zuweilen bleibt ein fester Absatz in den Gruben, der dann nach vorhergegangener Imprägnirung mit Eisenvitriol oder dgl. mittelst Schaufeln zu entfernen ist.

Die Häufigkeit der Grubenentleerung schwankt bedeutend; in einzelnen Städten erfolgt sie nur einmal jährlich, in anderen alle vier Wochen. Die

den der Unterhaltung ohne Reparatur, ohne Motor zur Ventilation und ohne Desodorisierungsmittel betragen mindestens 1.80 Mark pro Kopf und Jahr.

Das Urtheil über den hygienischen Werth des Grubensystems setzt sich offenbar ganz nach der Art der Ausführung desselben.

Erfolgt die Construction der Grube, die Ventilation des Fallrohrs, Desodorisirung und die Räumung nach den oben gegebenen Vorschriften und wird das Grundwasser nicht zur Wasserversorgung benutzt, so ist vom hygienischen Standpunkt kaum ein Einwand gegen Grubensystem zu erheben.

Vor allem ist die durch dieses System gebotene Infektionsgefahr gering. Gelangen infektiöse Dejectionen in den Abort, so ist eine Gelegenheit zur Verbreitung der Infektionserreger gegeben; insbesondere ist die Luft nicht zu einem Transport derselben geeignet, der Inhalt der Grube und des Fallrohrs keine staubtrockene Befestigung annimmt und weil bei guter geordneter Ventilation die Luftströmung niemals in's Haus gerichtet ist. — Höchstens bei der Räumung könnten Krankheitserreger verschleppt werden; aber auch ist bei geschultem Personal und bei völlig dichten Abfuhrwagen dies zu vermeiden.

Uebel Gerüche lassen sich bei vorschriftsmässiger Anlage ganz vermeiden. Wo gar durch eine Wasserleitung Wasser von ausserhalb in die Grube führt, ist von der unvermeidlichen mässigen Bodenverunreinigung nichts zu fürchten, und ein Grubensystem ist unter solchen Verhältnissen entschieden hygienisch zulässig; dabei ist es relativ billig, trägt den Forderungen der Landwirthe Rechnung und entspricht unserem ästhetischen Bedürfniss nicht so gut wie einige andere Systeme.

Allerdings muss das Grubensystem vollständig verworfen werden, wenn die oben begründeten Vorschriften für die Constructionen und den Betrieb der Gruben nicht eingehalten werden. Das ist namentlich in kleinen Städten oft genug der Fall. Die Gruben sind dort stark durchlässig, so dass sie den Boden in kolossalem Grade verunreinigen; sie sind ungenügend gedeckt und führen massenhaft Gerüche ins Haus; die Fallrohre haben schlechte Neigung, sind aus schlechtem Material. Die Räumung geschieht Nachts durch Ausschöpfen der furchtbarer Verpestung der Luft und in durchlässigen Wagen, so dass der Inhalt auf der umgebenden Bodenoberfläche sowie auf dem öffentlichen Transportwege verbreitet wird.

Weitere Verwendung des Grubeninhalts. Die abgefahrene Massen werden entweder in der nächsten Umgegend direct als Dünger verwendet oder auf weitere Strecken versandt oder zu Poudrette verarbeitet. Ein Eisenbahntransport rentirt sich nur in grossen, etwa 3 cbm fassenden Behältern, in welche die kleineren Behälter umgefüllt werden müssen. — Bei grösseren Städten kann häufig nicht die ganze Abfuhr sofort untergebracht werden, und es werden daher Depots, d. h. Sammelgruben von circa 100 cbm Inhalt, ausserhalb der Stadt angelegt, von wo der Dünger in kleineren Quantitäten durch Landwirthe abgeholt wird. — In Eduardsfelde bei Posen ist der Grubeninhalt durch Besprengen von Ackerflächen nutzbar gemacht. Von der Sammelgrube aus befördert eine Druckluftleitung die Massen auf die Felder; an ihrem Ende befindet sich eine oberirdische tragbare Vertheilungsleitung und ein langer Schlauch mit Mundstück. Das Besprengen wird auch nach dem Aufgang der Saat fortgesetzt (Kopfdüngung). — Gewisse Bedenken bezüglich der Verbreitung von Krankheitserregern durch dieses System lassen sich nicht unterdrücken.

Bei der Poudrettefabrikation ist vor Allem das Wasser der gesammelten Fäkalien zu entfernen. Das früher versuchte Abdunstenlassen in grossen Teichen führte zu enormer Verunreinigung der Luft. Anwendung künstlicher Wärme wurde zuerst in England versucht. Die mit Asche versetzten Fäkalien werden unter Zusatz von SO_4H_2 unter Rühren erhitzt, das braune Condenswasser wird in den Fluss geleitet, die Gase verbrannt; die restirende Poudrette als Dünger verkauft. — Neuerdings sind von BUHL & KELLER resp. von POZOWSKI Modifikationen des Verfahrens empfohlen; aber keins derselben hat sich bisher in der Praxis als rentabel erwiesen.

Das Tonnensystem.


Statt der Aufsammlung der Fäkalien in Gruben hat man es für empfehlenswerther erklärt, oberirdisch kleine, leicht transportable Behälter aufzustellen und diese häufig (an jedem dritten bis achten Tage) zu wechseln, d. h. den vollen Behälter nach einem Depot fortzuschaffen und dort zu entleeren und statt dessen einen anderen einzustellen.

Die Tonnen stehen am besten zu ebener Erde, in kleinen, gut gemauerten und mit wasserdichtem Fussboden (Cement, Asphalt) versehenen Kammern, die durch eine Thür von aussen zugänglich sind; bei alten Gebäuden auch wohl in den alten Gruben, doch ist dann der Transport der Fässer schwierig.

Die Behälter, sogenannte „Heidelberger Tonnen“, waren früher von Holz, innen verkohlt und getheert (Petroleumfässer); jetzt benutzt man gewöhnlich stehende Cylinder aus verzinnem Eisenblech. Der Inhalt

für Privathäuser 105—110 Liter, selten bis 300 Liter. — Die sollen möglichst dicht in die Tonnen eingefügt sein; dazu doppelter gusseiserner Ring, zwischen welche das Ende des passt. — An den Seiten befinden sich Henkel, unter die dem Tragen oder zweirädrige Karren untergeschoben lassen. tilation der Kübel erfolgt am Besten dadurch, dass das über Dach verlängert und dort mit Aspirationsaufsatz versehen (s. 135).

ßerdem ist bei den Heidelberger Tonnen ein Syphon angebracht, ein Eisenrohr, das sich mit frischen Fäkalien füllt, aber den Aufstieg



Profil eines Hauses mit Tonnenabfuhr.




Fig. 136. Heidelberger Tonne, mit Fallrohr, Syphon und Ueberlaufelimer.

aus der Tonne hindert. Damit der Syphon sich nicht verstopft, ist eine Zunge vorgesehen, die von aussen durch Kurbel bewegt werden kann.

Ferner ist unter dem Syphon Platz für eine Lampe, um eventuellen Hindernissen zu begegnen, wozu übrigens auch Umwickeln der Rohre genügt u. s. w. ausreicht. — Jede Tonne hat einen Ueberlauf, der in einen Eimer führt (s. Fig. 136).

In kleineren Städten und im Sommer können die Tonnen sofort abgesetzt, namentlich im Winter. Daher müssen Fäkalien sofort abgesetzt, namentlich im Winter. Daher müssen Fäkalien sofort abgesetzt oder der Inhalt muss zu Poudrette verarbeitet werden. Die Tonnen bei ausgedehnten Abfuhranlagen zu erheblicher Belästigung der Luft Anlass. Zuweilen hat man, um nur die Massen los zu werden, den Inhalt resp. den Depotinhalt in Flüsse schütten müssen.

Die Kosten betragen für Anschaffung von zwei Kübeln mit Syphon in 200 Mark; für jede Abfuhr 12—20 Pfennige. Für den Kübelinhalt werden 1 zu 20 Pfennige pro Liter gezahlt, jedoch nur, wenn keine Verdünnung mit Wasser stattgefunden hat und Bedarf vorhanden ist.

Das Tonnensystem wird vielfach als hygienisch dem Grubensystem überlegen hingestellt, weil den frischen Fäkalien nur ein kurzer Aufenthalt im Hause gestattet wird und von diesen keine Infektionsgefahr ausgehen soll; namentlich aber deshalb, weil beim Tonnensystem der Boden ganz frei von organischer Substanz gehalten und damit angeblich ungeeignet für die Ausbreitung von Epidemien gemacht wird. Diese Anschauungen sind indess jetzt als in jeder Beziehung unrichtig erwiesen. Gerade die frischen Fäkalien sind besonders infektiös verdächtig und verlangen vorsichtigste Behandlung; und die Verunreinigung der tieferen Bodenschichten hat nach unseren heutigen Anschauungen keinen Einfluss auf die Entstehung und Ausbreitung von Epidemien.

Vergleicht man ein gut ausgeführtes Gruben- und ein gleichfalls vorschriftsmässig betriebenes Tonnensystem, so zeigt letzteres nur geringe Vortheile. Die Gefahr einer Verbreitung von Infektionskeimen ist um so grösser, je häufiger der Wechsel und die Entleerung der Tonnen erfolgt. Bei dem steten Transport zahlreicher Kübel ist eine Beschmutzung der Bodenoberfläche sehr leicht; wird der frische, infektiöse Inhalt auf benachbarte Felder und Müsländereien entleert, so kann eine lange Conservirung der Infektionserre stattfinden und zur Weiterverbreitung ist die reichlichste Gelegenheit geboten. Eine entschiedene Gefahr liegt auch darin, dass ein Haus nicht stets denselben Kübel benutzt, sondern dass diese von Haus zu Haus gewechselt werden. Die Kübel sollten daher nach der Entleerung nicht nur gereinigt, sondern auch desinficirt werden, was z. B. in Greifswald durch ein Gemisch von warmem Wasser und gespanntem Dampf geschieht.

Bei schlechtem Betrieb ist das Tonnensystem bedenklicher als ein mangelhaftes Grubensystem. Namentlich kommt es oft zum Ueberlaufen der Tonnen in solchem Maasse, dass auch die vorgestellten Eimer nicht ausreichen, sondern der Boden des betreffenden Raumes mit Jauche bedeckt wird. Eine derartige Verunreinigung findet man bei Revisionen um so häufiger, als die Dimensionen der Tonne auf das Fernhalten aller Flüssigkeiten zugeschnitten werden, da der Kübelinhalt hinreichend concentrirt sei und den Transport lohne. Vielfache Uebertretungen des Verbots, Flüssigkeiten einzugiessen, sind aber sehr verständlich. Dadurch kommt es dann zu üblen Gerüchen und eventuell Infektionsquellen innerhalb des Hauses.

Für ausgedehnteren Betrieb in grösseren Städten ist daher das Tonnensystem nicht geeignet. Verwendbar ist es für kleine Städte mit leichtem Absatz der abgefahrenen Fäkalien; ferner für einzelne Theile schwer zu canalisirende Theile einer grossen Stadt. Stets ist eine strenge Controle durch zahlreiche Aufsichtsbeamte erforderlich. —

leinere Familienhäuser, für kleinere Häusergruppen, wo keine Einrichtungen für pneumatische Entleerung der Gruben bestehen, und in einzelne öffentliche Anstalten mit gutem Aufsichtspersonal ist das Grubensystem besonders indicirt und dem Grubensystem vorzuziehen.

Abfuhr mit Präparation der Fäkalien.

Häufig wird eine Desinfektion oder eine Desodorisirung des Gruben- und Tonneninhalts versucht. Beide Procedures sind nicht zu wechseln. Mit der Desinfektion streben wir eine Tödtung der Infektionskeime an; eine solche lässt sich in einfachster und billigster Weise erreichen durch bestimmte Mengen Aetzkalk, Chlorkalk oder Mineralsäuren. Ueber die Ausführung dieser Desinfektion, die nur anzuwenden ist, wenn Verdacht auf das Vorhandensein infektiöser Abgänge besteht, s. Kap. X.

Desodorisirung ist dagegen vielfach regelmässig in Gebrauch. Man sucht dabei entweder die gebildeten übelriechenden Gase zu beseitigen bezw. am Entweichen zu hindern, oder im faulenden Substrat Zersetzungserreger abzutödten; oder das Fäulnissmaterial für weitere Zersetzung ungeeignet zu machen. Meist kommen kombinierte Wirkungen vor.

Angewendet werden von Chemikalien namentlich Eisenvitriol und rohes Manganchlorür, welche die riechenden Gase binden und zugleich die Entwicklung der Fäulnissbakterien hemmen.

Beide binden Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium, ferner durch die vorhandene freie Säure Ammoniak. Der Säureüberschuss wirkt ausserdem stark bakterienhemmend. In Fällen, wo flüchtige Fettsäuren prävaliren (z. B. Rübenschnitzel-Gruben) würde statt dieser sauren Chemikalien Aetzkalk zur Desodorisirung zu verwenden sein. — Stagnirender Pferdeharn, der hauptsächlich Ammoniumcarbonat entwickelt, ist am besten durch Gypspulver zu desodorisiren. — Auch rohes Kaliumpermanganat ist als Desodorans geeignet. Dasselbe wirkt energisch auf die Bakterien, oxydirt Schwefelwasserstoff und andere übelriechende Stoffe, und das entstehende Manganoxyd bindet ausserdem Schwefelammonium. Die Kosten der drei genannten Substanzen sind sehr gering; ein Kilo Eisenvitriol kostet etwa 5 Pfennige, Manganchlorür 20 Pf., Kaliumpermanganat 50 Pf.

Besonders hervorgehoben sei noch, dass die Carbonsäure zur Desodorisirung gänzlich ungeeignet ist, sie ist nicht im Stande, die riechenden Gase zu binden oder zu beseitigen und vermag eine Entwicklungshemmung der Bakterien erst bei so hoher Concentration zu veranlassen, wie sie gegen die Abfallstoffe niemals zur Verwendung gelangt. Sie ist vielmehr nur im Stande, andere üble Gerüche durch den eigenen unangenehmen Geruch zu decken, und es wäre daher sehr zu wünschen, dass die völlig irrationelle Verwendung der Carbonsäure in öffentlichen Aborten, z. B. der Eisenbahnhofs-Aborte u. s. w., durch ein zweckentsprechendes Mittel ersetzt würde.

Die Chemikalien sind neuerdings mehr und mehr verdrängt durch poröse, feinpulverige Substanzen, welche durch Flächenattraktion die riechenden Gase binden, ausserdem rasch Feuchtigkeit absorbiren und Oxydation veranlassen. Dahin gehören z. B. gepulverte Holzkohle, trockene Erde, Asche, Torfstreu.

Das sogenannte Erdcloset ist am längsten bekannt und ist namentlich in England und Indien viel angewendet. Lehmige oder thonige Gartenerde wird in völlig trockenem Zustand mit den Fäkalien gemengt; für eine Defäkation von 120 g Fäces und 300 g Harn sind $\frac{3}{4}$ —1 kg Erde erforderlich. Das Wasser wird sofort aufgesogen, die Gase werden absorbiert und dann beginnt in dem porösen Boden Verwesung und Mineralisirung der organischen Stoffe unter Beihülfe zahlreichster Bakterien. Nach beendeter Mineralisirung ist die Erde aufs Neue brauchbar. — Zum Aschencloset wird Asche benutzt, die von den Kohlenrückständen abgesiebt ist, und der etwas gepulverte Kohle beigemengt wird. Die Wirkung ist ähnlich, aber die Mineralisirung nicht so vollständig wie bei den Erdclosets.

Beide vorgenannte Methoden sind jetzt verdrängt durch die Torfstreuclosets, weil von der Torfstreu weniger Masse zur vollständigen Desodorisirung nöthig ist und weil dieselbe sehr leicht und in kompakter Form transportabel ist. Der sog. „Torfmull“ vermag circa das Achtfache seines Gewichts an Wasser aufzusaugen. Für 150 g Fäces und 1200 ccm Harn, d. h. pro Mensch und Tag, sind 155 g Torfmull nöthig; für eine Entleerung von 150 g Fäces + 30 g Harn = 50 g, also 20 mal weniger dem Gewicht nach als von Erde erforderlich ist. — Dabei kosten 100 kg nur 3—4 Mark. — Entweder wird die Torfstreu jedes Mal eingeschüttet, oder es sind Closets mit automatischem Betrieb eingeführt (BISCHLEB & KLEUCKER's, POPPE's Closet).

Der Torfmull übt vermöge seiner sauren Reaktion auch eine gewisse bakterientödtende Wirkung aus. Dieselbe ist aber selbst Cholera-bacillen gegenüber langsam und unvollkommen; Typhusbacillen bleiben im Torfmull lange lebensfähig. Wohl aber lässt sich der Torfmull durch Zusatz von Säuren (Schwefelsäure) oder sauren Salzen (Kainit) in ein Desinficiens verwandeln, das Cholera- und Typhusbacillen in kurzer Zeit abtödtet; die desodorisirende Wirkung bleibt dabei ungeschwächt (FRÄNKEL). — Zu widerraten ist ein Zusatz von Carbol, dem man häufig in dem käuflichen Torfmull begegnet; derselbe hat erst bei viel stärkerer Concentration desinficirende Wirkung und bewirkt nur unangenehmen Geruch.

Das Tonnensystem mit Torfstreu ist für kleinere Häuser und manche öffentliche Anstalten besonders empfehlenswerth.

Eine mechanische Absperrung gegen Gertiche hat man anzuwenden versucht z. B. dadurch, dass eine Art von Wasserverschluss (richtiger Jauschverschluss) das Entweichen grösserer Gasmengen aus dem Fallrohr hindert (Verfahren von GOLDNER, MOURAS). Bei dem PAGLIANI'schen System kann ausserdem nach Bedarf ein Theil des Grubeninhalts entleert werden und dabei noch eine mit Torf gefüllte Grube passiren. —

Bei Pissoiranlagen lässt sich durch einen Oelverschluss die Geruchswicklung vermeiden. Wände und Boden werden mit Mineralölmischung abgeleitet; unter den Becken befinden sich glockenförmige Syphons, in denen eine Oelschicht an der Oberfläche schwimmt.

Einige Modifikationen der vorbeschriebenen Systeme sind aus dem Streben hervorgegangen, einen gewissen Wasserverbrauch zur Füll- und Reinhaltung der Closets zu gestatten, trotzdem aber Abfuhr rentabel zu machen. Man hat dies 1) durch Trennung der flüssigen und festen Theile, 2) durch Zusatz gewisser Chemikalien und Einschaltung von Klärgruben zu erreichen gesucht. Durch die Chemikalien sucht man vielfach nebenbei noch eine desodorisirende und desinficirende Wirkung zu erzielen.

Die am meisten gebrauchten Mittel sind Aetzkalk oder Magnesia, oder sauer reagirende Eisensalze bzw. Aluminiumsulfat (Mangan-, Eisen-, Kupfersalze). Ihre Wirkung besteht darin, dass voluminöse Niederschläge in der Jauche entstehen, welche einen grossen Theil der organisch-wirthschaftlich verwertbaren Bestandtheile enthalten.

Im Harn findet sich saures Calciumphosphat und Calciumbicarbonat; durch Zusatz von Aetzkalk entsteht unlöslicher basisch phosphorsaurer Kalk und Calciumcarbonat; Magnesiazusatz führt zur Bildung von Tripelphosphat. Treffen Natrium- oder Aluminiumsulfat mit alkalischen Substanzen (Ammoniumcarbonat) zusammen, so entstehen sehr voluminöse Fällungen von Eisenhydrat und Thonhydrat. Eisensulfat bindet ausserdem Schwefelammonium. — Mit geringen Abweichungen sind diese Chemikalien bei allen Präparationsverfahren verwendbar. Zuweilen werden noch weitere Niederschläge bewirkt, z. B. durch Zusatz von sauren Phosphaten oder von Kieselsäurehydrat u. s. w., vgl. S. 478.

Trennung von Harn und Fäces. Der Koth wird z. B. durch eine vertikal stehende durchlöchernte Scheidewand im Closet zurückgehalten. Das schwedische Luftcloset ist eine besondere Rinne für den Harn und ein anderer Behälter für die Fäces bestimmt. — In grösserem Umfang sind alle diese Closets nicht verwendbar; sie entsprechen zu wenig den hygienischen und ökonomischen Anforderungen und genügen auch den Ansprüchen des Landwirths nicht, weil der für die Düngung werthvollere Theil der Excremente, der Harn, unberücksichtigt bleibt. — Auch eine Trennung von Harn und Fäces in der Grube dadurch, dass am Boden derselben Siebe oder poröse Steine eingebracht werden, durch welche die flüssigen Theile abfliessen, hat sich bisher nicht bewährt.

Klärgruben. Die Fäkalien werden auf den Boden einer grösseren Grube geleitet. In dieselbe Grube werden die chemischen Zusätze gegeben; es bilden sich starke Niederschläge und setzen sich am Boden ab. Die geklärte Flüssigkeit fliesst oben mittelst eines Ueberlaufs in eine zweite kleinere Grube; und von dieser in Rinnsalen, oberflächlichen Rohrkanälen u. s. w. in einen Flusslauf. — Viele Systeme, z. B.:

SÖVERN's Verfahren. 100 Theile Kalk werden mit 300 Theilen Wasser gelöscht, dem heissen Brei werden 8 Theile Theer und 33 Theile Magnesiumchlorid zugesetzt, dann auf 1000 aufgefüllt. Mit dieser Masse werden die Fäkalien in Gruben versetzt; nach dem Absetzen des Niederschlags lässt man die Flüssigkeit oberflächlich ablaufen, der Niederschlag wird abgefahren. Ohne reichlichen Kalküberschuss ist der Ablauf des Klärwassers nicht zu gestatten.

A.-B.-C.-Process, in England (s. B. Leeds) eingeführt. Mischung von Alaun, Blut, Kohle, Magnesia resp. Dolomit (Alum, Blood, Clay). Behandlung der Fäkalien ähnlich wie beim SÖVERN'schen Verfahren.

FRIEDRICH's Verfahren. Ein Gemenge von Thonerdehydrat, Eisenoxyhydrat, Kalkhydrat und Carbölsäure befindet sich in einem Kasten, durch welchen das Wasser zum Closet strömt. Eine besondere Einrichtung bewirkt, dass bei jedem Durchströmen ein Aufwallen und Ausspülen von Desinfektionsmasse erfolgt. Die mit Desinfektionswasser gemischten Fäkalien werden in eine cementirte Grube geleitet, setzen sich dort ab, und die gereinigte klare oberflüssigkeit kann in Canäle, Rinnsteine oder in den Boden durch Stauventile periodisch abgelassen werden. Die Schlammmasse wird abgefahren. — Die Wasser sollen alkalisch durch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ reagiren; dies wird durch mit BaCl_2 getränktes Curcumapapier festgestellt. — In verschiedenen Städten und Krankenhäusern eingeführt. Kosten gering, 40—90 Pf. pro Kopf und Jahr für das Desinfektionsmittel, aber sorgfältige Controle ist unbedingt nöthig; das Verfahren ist daher nicht für ganze Städte, wohl aber für einzelne Anstalten, ländliche Anlagen, Badeorte u. s. w. brauchbar.

WILHELMY's Verfahren. Dem vorigen ähnlich, nur findet die Mischung mit der Desinfektionsmasse in einer kleinen Vorgrube statt, in welche die Fäkalien zuerst gelangen, und von wo sie erst nach gewissem Aufenthalt (zweimal wöchentlich) in die grössere Grube übergelassen werden. — Die Desinfektion ist unsicher; Controle und Revision nöthig.

PETRI's Verfahren. Desinfektionspulver aus Torf, Steinkohlengrus und Gastheer; dieses wird noch mit Kohlenabfällen und Kehrreicht gemengt und kommt in einen Trog unter dem Abtrittssitz; durch eine Rührschnecke wird dort die Masse einmal pro Tag umgerührt. Nach der Abfuhr in das Depot wird dort noch mehr Torf- und Kohlengrus zugemischt, und schliesslich werden Ziegel gepresst (sogenannte Fäkalsteine). Diese sollen als Brennmaterial benutzt und erst die Asche als Dung verworthen werden.

Auch verschiedene der unten aufgeführten, vorzugsweise für die Reinigung von Canalwässern und Fabrikabwässern benutzten Reinigungsverfahren sind für einzelne Klärgruben verwendbar.

Alle die aufgezählten Abfuhrverfahren genügen den hygienischen und ästhetischen Anforderungen für eine grössere städtische Bevölkerung nicht. Selbst die Systeme mit Klärgruben und theilweiser Desinfektion versagen bei Anwendung in grösserem Maassstabe; die Desinfektion ist unzuverlässig, die Annahme, dass eine ausreichende Desinfektion vorhanden sei, führt zu rücksichtsloserem Umgehen mit dem

beninhalt; die Beseitigung des Geruchs gelingt nur einigermaassen gutem Betrieb und steter Controle. — Am schwerwiegendsten ein Einwand, der gegen das Grubensystem ebensowohl wie gegen Tonnensystem zu erheben ist: die Hauswässer bleiben unberücksichtigt und pflegen beim Tonnensystem vollständig, beim Grubensystem zum Theil, in oberflächlichen Rinnsalen abgeführt zu werden. Wie oben gezeigt wurde, sind gerade diese Hauswässer hygienisch besonders bedenklich und verlangen durchaus eine unterirdische Führung. Wird aber eine solche angelegt, dann ist es irrationell, Fäkalien abzutrennen, sondern die Trennung muss in anderer Weise bezogen werden, nämlich so, dass Fäkalien und Abwässer einerseits, Meteorwasser andererseits die Theile bilden, welche in verschiedener abgeleitet werden (s. unter „Trennsysteme“).

Nur in denjenigen Städten, wo bereits ein Canalsystem besteht, für die Entfernung der Hauswässer brauchbar ist, aber eine stärkere Beanspruchung nicht verträgt; oder wo eine Anlage unterirdischer Canäle nicht durchführbar ist (z. B. wegen zu hohen Grundwasserstandes, felsigen Terrains u. s. w.), ist eines der Abfuhrsysteme angezeigt. Hier kommen letztere in Betracht bei zerstreut liegenden Häusern, in grosser oder nur zeitweise stärkerer Bewohnung (Sommerquartiere), bei öffentlichen Anstalten (Krankenhäuser, Asyle), in denen es eine gute Beaufsichtigung der Anlagen durchzuführen ist. Je nachdem es wünschenswerth erscheint, einen Theil der Abwässer mitzunehmen oder gar Wasserspülung der Closets anzubringen oder sich ausschliesslich auf die Fäkalien zu beschränken; ferner je nach den lokalen Gelegenheiten zur Abfuhr und zum Absatz der Abfallstoffe ist bald dem Tonnensystem, bald dem Grubensystem, letzterem eventuell mit Einschaltung von Klärvorrichtungen, der Vorzug zu geben.

2. Schwemmcanalisation.

Fast die gesammten Abfallstoffe, alle Fäkalien, das Haus- und Regenwasser und das Meteorwasser werden bei der Schwemmcanalisation in unterirdischen Canälen gesammelt, und die entstehende dünnflüssige, eventuell durch Wasserzusatz noch weiter verdünnte Masse wird durch natürliches Gefälle rasch aus dem Bereich der Wohnungen geführt. Schliesslich gelangt der Canalinhalt entweder direct in einen Fluss, oder es wird vorher eine Reinigung des Canalwassers eingehalten. Zunächst ist dementsprechend die Anlage der Canäle, sowie die Beseitigung des gesammelten Canalwassers zu besprechen.

a) Anlage und Betrieb der Canäle.

Der Untergrund der Stadt wird von einem Netz von Canälen angedichtet, innen glatten Wandungen durchzogen, welche sich mit natürlichem Gefälle nach einem grossen Sammelcanal hinziehen. Die Anfänge des Netzes liegen in den Ausgussöffnungen in Küchen und Waschküchen, in den Closets u. s. w.; ferner in den Abführungen für das Strassenwasser und in den Regenrohren. Von da confluire die kleinen Anfangscanäle in grössere Strassencanäle, die sich schliesslich zu mehreren Hauptcanälen vereinigen.

Es muss durchaus darauf gerechnet werden, dass eine rasche und vollständige Entfernung der Abfallstoffe stattfindet. Daher ist gutes Gefälle nöthig und möglichst reichlicher Wassergehalt der Canäle, so dass sie sehr dünnflüssig ist und sich rasch fortbewegen kann. In Städten ohne Wasserleitung sind die Abwässer fast immer zu concentrirt und fliessen zu langsam. Gewöhnlich werden daher Canalisation und Wasserleitung neben einander projectirt und angelegt. Sie bedingen sich gegenseitig; ohne Canalisation keine Wasserleitung und ohne Wasserleitung keine gute Schwemmcanalisation. — Ausserdem ist die Verdünnung durch Meteorwasser nur erwünscht und muss bei regenarmer Zeit durch künstliche Wasserspülung ersetzt werden.

Zunächst sind eine Reihe von Vorarbeiten auszuführen. Es muss ein Nivellement der Bodenoberfläche und der einzelnen Bodenschichten aufgenommen werden; die Grundwasserverhältnisse müssen studirt, die Bodentemperaturen kennen gelernt werden. Ueber die Regenmengen, den Abfluss und die Verdunstung des Regens, dann über die Dichtigkeit der Bewohnung, den Verbrauch an Hauswasser, die wahrscheinliche Zunahme der Bevölkerung u. s. w. müssen Erhebungen veranstaltet werden. Schon diese Vorarbeiten gewähren durch das Sammeln wichtigen Materials hygienischen Vortheil.

Die Disposition der ganzen Anlage wird verschieden behandelt. In früherer Zeit und in englischen Städten kannte man nur eine centrale Disposition. An einer Stelle der Peripherie kommt dann der Sammelcanal heraus; die Anfänge des Systems liegen in den anderen Theilen der Peripherie und die Canäle wachsen allmählich, je mehr sie bebaute Theile durchsetzen. — Daraus resultiren aber Nachtheile; erstens sehr lange Canäle, bei denen dann oft nicht das genügende Gefälle gegeben werden kann, wenn man nicht die Enden zu tief legen will. Nur bei kleineren Städten, oder solchen mit starker Neigung des Terrains fällt dies Bedenken fort. — Zweitens sind die Anfangscanäle schwer richtig zu bemessen. In der Peripherie findet gerade das Wachstum der Stadt, unberechenbar in welchem Umfange, statt. Dabei aber darf man auch wieder von Anfang an keine zu grossen Canäle projectiren, weil diese eine schlechte Fortbewegung des Inhalts veranlassen und kostspielig sind. — Daher ist es bei centraler Anordnung unausbleiblich, dass oft Umbauten, Erweiterung zu eng gewordener Canäle u. s. w. erfolgen.

Besser ist Decentralisation der Anlage. Entweder kann man verschiedene Radialsysteme einrichten (wie in Berlin). Die Anfänge der Canäle

gen dann im Centrum der Stadt, in der Peripherie dagegen sind grosse Kanäle, die leicht einer Erweiterung der Stadt sich anpassen. Jedes Radialsystem kann bis zu Ende getrennt behandelt werden; oder es werden mehrere Kanäle in einen Hauptstrang vereinigt.

Oder, wenn einzelne Theile der Stadt sehr verschiedene Höhenlagen haben, werden diese Theile dementsprechend getrennt behandelt (Parallelsystem, z. B. in Stuttgart, München, Wien).

Material der Canäle. Bei den engeren (unter 0.5 m Durchmesser) benutzt man hartgebrannte, innen glasierte Thonröhren. Eisenerien werden zu leicht angegriffen. Je zwei Rohre werden durch Bolzen mit Schraubengängen verbunden; die Dichtung erfolgt mit getriebenen Hanfstricken oder mit Thon. Die grösseren Canäle sind aus Kalkstein und Cement gemauert. Die Seitentheile kommen nur bei starken Regengüssen mit der Canaljauche in Berührung, die Haupttheile ist daher das Sohlenstück. Dasselbe ist absolut undurchlässig aus Steingut oder Beton hergestellt, oder man verwendet sogenannte Klinkers, d. h. Mauerkörper aus Ziegeln und Cement. Das Sohlstück ist gewöhnlich durchzogen von kleinen Kanälen (*a* in Fig. 137), die am Ende der Leitung offen enden und zur Drainage des Grundwassers dienen. Neben den Canälen wird eine Kiesschüttung angebracht, welche ebenfalls drainirend wirkt; häufig setzt man in die Kiesschicht noch besondere Drainröhren (*b*, Fig. 137).

Völlig dicht sind die Canäle selten. Das Durchsickern von Grundwasser oder das Durchsickern von Jauche kommt gewöhnlich vor. Aber nachweislich kommt es nicht zu stärkerer Bodenunreinigung. — Die Tiefe der Canäle schwankt im allgemeinen zwischen 1.5 und 6.5 m; in Städten, wo auch das Abwasser aus allen Kellerwohnungen aufgenommen werden soll, bis zu 10 m. Oft liegt der grössere Theil im Grundwasser. Damit kommt dann vielfach eine dauernde Senkung des Grundwasserspiegels und eine geringere Feuchtigkeit der oberen Bodenschichten zu Stande; eine starke Grundwasseransammlung ist aber kein solcher Effekt zu erwarten (Berlin).

Die Weite der Canäle richtet sich nach den zu bewältigenden Abwassermassen. Die bedeutendsten werden zweifellos durch die Nieder-




Fig. 137. Canalprofil.
a Offene Canäle des Sohlenstücks. b Drainröhren in der Kiesschüttung.

schläge geliefert. Soll aber jeder Regen, auch der stärkste Platzregen, vollständig Aufnahme in den Canälen finden, so resultiren solche Dimensionen für die Canäle, dass dieselben sehr theuer werden und ausserdem für gewöhnlich eine schlechte Fortbewegung des relativ geringfügigen Inhalts leisten. — Richtiger ist es daher, wenn man die Canäle nur auf Abführung der mittleren Regenmengen und des Hauswassers abschneidet. Man berechnet zu dem Zweck die Bevölkerungsdichte pro Hektar und schlägt den Wasserconsum, und also auch die Menge des Abwassers, zu 150 Liter pro Kopf an; im Mittel macht dies pro Hektar 1—1.5 Liter pro Sekunde. Dazu kommen dann durchschnittlich circa 3 Liter pro Sekunde abzuführendes Regenwasser.

Was soll aber alsdann mit den grösseren Regenmengen geschehen? Oft fällt das 20fache der hier veranschlagten Menge, von der allerdings höchstens $\frac{1}{3}$ in die Canäle gelangt, für die aber doch zweifellos die Capacität der Canäle nicht ausreicht. — Für diesen Fall treten sogenannte Nothauslässe (Regenauslässe) in Funktion, d. h. breite, flache Canäle, welche aus dem obersten Theil der Strassencanäle mit gutem Gefäll direct zum nächsten Wasserlauf führen, und die das Canalwasser erst aufnehmen und ableiten, nachdem es bis zu jenem abnormen Niveau, in welchem die Anfänge der Nothauslässe liegen, gestiegen ist. Man nimmt an, dass dies Arrangement keinen Bedenken unterliegt, weil unter solchen Verhältnissen der Canalinhalt immer sehr verdünnt und zu gleicher Zeit die Wassermenge des Flusses gross ist.

Gewöhnlich beginnen die Canäle mit 0.23 m Weite und steigen durch 5—6 verschiedene Abstufungen bis 1.7 m. Selten findet man grössere Dimensionen (in London 3.5, in Paris sogar bis 5.6 m).

Das Profil der Canäle ist bei den kleineren rund, bei den grösseren eiförmig (Fig. 137). In grossen runden Canälen kommt es leicht zu einer trüben Fortbewegung und zu einer Durchsetzung des ganzen Rinnsals mit hemmenden Schlamm. Bei der Eiform lagern sich die Schlammtheilchen an der tiefsten Stelle der Rinne ab und darüber kommt ein reger Fluss der Canalanzeige zu Stande.

Das Gefälle soll bei Hausleitungen 1:50, bei kleinen Canälen 1:300 bis 300, bei grösseren 1:400—500, bei den grössten 1:1500 betragen. — Die Geschwindigkeit des Stromes ist dann 0.75 m pro Sekunde oder 2.5 km pro Stunde. Dabei sollen auch alle festen Theile, die naturgemäss in die Canäle gelangen, mit fortbewegt werden.

Stossen die Canäle auf einen Strom, so wird ein sogenannter Düker eingerichtet, eine Art Syphon aus eisernem Rohr, der im Flussbett liegt. In demselben kommt es zuweilen zu Stauungen, die aber durch kräftige Spülung beseitigen sind.

Eine Spülung der Strassencanäle ist erforderlich, wenn die Dimensionen etwas zu gross gewählt werden mussten, wenn längere Zei-

erschläge gefehlt haben und wenn stellenweise schlammwässer aus Fabriken u. s. w. in die Canäle gelangen. Die schiebt z. B. dadurch, dass in einzelnen Canälen eiserne (genannte Spülthüren) geschlossen und nach genügendem Canalwassers plötzlich wieder geöffnet werden; oder das Flüssen, Teichen oder aus den Hydranten der Wasserleitung pülung verwandt. Auch automatisch wirkende Spülungen einrichten.

Canäle führen von der Strasse aus die Strassenwassernd die Einsteigschachte; von den Häusern aus die Fall-Closets, die Rohre für die Hauswässer und die Regen-

nläufe für das Strassenwasser liegen meist in den Rinnen Trottoir, ausserdem auf Höfen u. s. w.; sie sind durch einen Eisenstäben bedeckt. Da das Strassenwasser viel Sand und mitführt, so wird unter dem Einlauf ein Schlammkasten

ie an-
n etwa
lt. Un-
ober-
Bodens
befin-
er Ab-
yphon-
oben
ist, da-
nalluft
h den
f die
reichen
ssanten




Fig. 138. Profil einer canalisirten Strasse.

a Einlauf für das Strassenwasser. b Gullie mit heraushebbarer Schlammkasten. c Ueberlauf in den Strassencanal. d Strassencanal. e Sohlenstück. f Einsteigschacht. g Durchlochter Deckel.

kann.
zu Zeit
Gullies

erden, da deren Ablauf sich verstopft, wenn der Schlamm ansteigt.

Einsteigschachte (Mannlöcher) gehen vom Fahrweg vertikal abwärts, sind so weit, dass ein Mann hindurchkriechen kann, die Wänden mit Steigeisen versehen. Sie sind in 60—200 m von einander angebracht, hauptsächlich an den Strassendienen 1) zur Revision und Reinigung. Auch die nicht

besteigbaren Canäle müssen sich von einem Mannloch bis zum andern mit Lampen und eventuell mit Hilfe von Winkelspiegeln übersehen lassen. Von dort aus findet auch die Spülung mittelst der Hydranten statt. 2) Zur Aufnahme und Beseitigung der Sinkstoffe. Der Boden der Einsteigschachte wird häufig tiefer gelegt als die Sohle der Canäle; der unterste Theil des Schachts bildet dann ein kleines Bassin, in welchem Sinkstoffe sich ablagern. Von dort werden dieselben mittelst Eimern herausgeschafft. 3) Zur Ventilation der Canäle; die Deckel sind durchlöchert und gestatten der Canalluft den Austritt in's Freie. Einhängen von Kohlenfiltern, das hier und da zur Desodorisation der Canalluft versucht ist, scheint ohne nennenswerthe Wirkung zu sein.

Die von den Häusern kommenden Canäle münden in spitzen Winkel oder in flachem Kreisbogen in die Strassencanäle; ihr Gefälle beträgt 1:50 oder weniger; sie bestehen aus glasirten Steingutrohren oder aus innen und aussen asphaltirtem Eisenrohr. Ihr Durchmesser beträgt ca. 15 cm.

Ein Theil dieser Rohre beginnt in den Wasserclosets. Am Ende des Sitztrichters befinden sich entweder bewegliche Klappen oder Pfannen;




Fig. 139.




Fig. 140.

unter den Klappen ist ein Sammelgefäß eingeschaltet und an dieses schliesst sich ein Syphon (ein ∞ förmig gebogenes Stück, s. Fig. 139) des Fallrohrs an. Oder bei den neueren und besseren Einrichtungen ist das zu üblen Gerüchen Anlass gebende Sammelgefäß fortgelassen, und die Sitztrichter gehen direct in einen Syphon über (Syphoncloset, Fig. 139). Oder die Sitztrichter haben beckenartige Form und es ist die Einrichtung getroffen, dass immer ein Rest des Spülwassers im Becken stehen bleibt (Wash-out-Closet, Fig. 140); die Anordnung des Wasserzuflusses muss dann so sein, dass namentlich der Beckenboden kräftig ausgewaschen wird. — Zu beanstanden sind die in Schulen hier und da eingeführten Trogclosets, bei denen mehrere Closets in einen gemeinsamen, nur gelegentlich gespülten Trog führen. — Meist erfolgt die Spülung nicht direct aus der Leitung, sondern unter Einschaltung eines Spülbehälters, der sich automatisch wieder füllt. Die

ie der im Syphon als Verschluss dienenden Wassersäule darf nicht
r 2.5 cm betragen. — Das Fallrohr hat 10—14 cm Durchmesser,
eht aus asphaltirtem Eisen und soll nach oben bis über das Dach
us verlängert sein (s. S. 446).

Der Wasserzufluss zum Closet kann auch automatisch geregelt werden
h das Oeffnen der Thür, das Niederdrücken des Sitzes u. s. w.). Jedenfalls
eine reichliche Wassermenge zum Spülen gewährt werden, mindestens
0 Liter pro Tag und Kopf (pro Jahr kostet dieser Wasserconsum etwa 25
50 Pfennige). Gegen die übel angebrachte Sparsamkeit der Hauswirthe,
he die Zuflussröhren zum Closet oft mit ganz engen Oeffnungen versehen
n, ist mit Nachdruck einzuschreiten. — Eine zeitweise auszulösende kräftige
silation des Closetraums ist wünschenswerth, um während der Benutzung
che zu verhindern; ausserhalb der Benutzung ist von gut angelegten
er closets keinerlei Geruch zu merken. Die Ventilation muss selbstver-
ndlich eine Aspirationsanlage sein, am besten mittelst Wasserventilators
Mestern, Berlin). Entweder wird ein besonderer Behälter mit 10 Liter
er benutzt, der sich nach kurzem Druck auf einen Hebel allmählich ent-
und etwa 4 C.M. Luft nach aussen befördert; oder der Behälter ist so
eschaltet, dass das ablaufende Wasser gleichzeitig das Closet spült.

Die Ausgüsse in den Küchen tragen ein unabnehmbares Gitter,
hes größeren Verstopfungen vorbeugen soll; dann folgt ein Syphon,
ein Fallrohr von 5—8 cm Durchmesser. Letzteres wird nach
über Dach geführt, nach unten gewöhnlich in den Hof geleitet
da das Küchenwasser viel zum Reinigen benutzten Sand, ferner
rn von Tüchern u. s. w. mit sich führt, lässt man es dort gewöhn-
in einem Gullie enden.

Die Regenrohre, welche das Meteorwasser von den Dächern
meln, gehen am besten von der Hinter- und Vorderfront des Hauses
en oberen Theil der Strassencanäle.

Von mancher Seite ist viel Werth gelegt auf die Fernhaltung
r Canalluft von den Häusern, weil man annimmt, dass die
algase infectiöse Krankheiten hervorrufen können. Die Unrichtig-
dieser Annahme ist bereits oben (S. 442) betont. Eine infectiöse
kung der Canalgase kann um so weniger angenommen werden, als
elben bei wiederholter Untersuchung meistens nahezu frei von
men gefunden wurden; die stets feuchten Wandungen der Canäle
Fallrohre machen eine Ablösung von Keimen unmöglich, und nur
h das Verspritzen an der Einmündung der Hausrohre u. s. w.
en Tröpfchen entstehen, die in offenen Canalrohren weit fort-
hrt werden. Auch hier werden dann aber nur die verbreitetsten
ophyten mit einiger Wahrscheinlichkeit in Frage kommen; in der
t gehörten die Keime, welche man in geringer Zahl häufig, selten

Die Wohnung.

größerer Zahl in der Canalluft gefunden hat, niemals specielleren Arten an, sondern den in der freien Luft stets beobachteten. deren Gegenwart schon deshalb selbstverständlich ist, und die mit der freien Luft ausgiebig zu communiciren pflegt. Man kommt durch die Canalgase eine Belästigung und eine Trächtigung in der Aufnahme der Luft zu Stande; und dies genügt, um Vorkautionen gegen ein Eindringen der Canalgase in die Wohnung zu machen.



Fig. 111. Schema der Ausgüsse und Syphons eines Hauses.

Eine Fernhaltung der Canalgase vom Hause gelingt einmal durch Isolation der Canäle. Communication der Canäle mit der freien Luft: a) durch die Einsteigschächte; b) durch über Dach reichenden Closet-Fallrohre; die Regenrohre. Namentlich die letzteren bieten zahlreiche Auswege für die Canalgase, während die kleinen Oeffnungen der Einsteigschächte weniger in Betracht kommen. Nach Windrichtung, Windstärke und Temperaturverhältnissen ist die Luftströmung in die Canäle hinein, bald aus denselben heraus gerichtet; die Geschwindigkeit der Strömung kann 0.5 m pro Sekunde mehr betragen. Die angeführten Communicationen genügen aber vollkommen, um das Einströmen der Canalluft in die Wohnung zu verhindern. — Zuweilen hat man besondere Ventilationsthürme mit Kohlenfeuerungen zur Aspiration der Canalluft herangezogen, aber im Allgemeinen ist ein solcher Vortheil.

Zweitens ist der Eintritt von Canalluft in's Haus durch die nahe der Mündung des Fallrohre angebrachten, mit Wasser gefüllten Krümmungen der Rohre, die sogenannten Syphons oder Wasserverschlüsse, so gut wie ausgeschlossen, da die letzteren sich nur sehr wenig in Wasser lösen, und die geringfügigen gelösten Mengen klein durchschliessende Wasser oft erneuert wird.

Allerdings kann bei schlechter Construction des Sy-

schluss gebrochen werden. Durch Eingiessen grösserer Mengen in den Syphon *A* (Fig. 141), die das Fallrohr voll- und beim Abstürzen hinter sich eine Wassersäule erzeugen, kann entweder der Syphon *A* entzogen werden; oder es wird eventuell an dasselbe Fallrohr angeschlossener Syphon *C* entleert. Oft kommt es nur zu einer teilweisen Entleerung (*B* in Fig. 142); diese Wassersäule ist dann aber zu einem mässigen Ueberdruck von Gasen im Syphon fähig. Nicht selten bleibt sogar so viel Wasser zurück, dass eine ungehinderte Durchströmung der Luft durch den Syphon bewirkt wird (Fig. 142).

Ein solches Leerziehen von Syphons tritt je- doch nur dann ein, wenn das Fallrohr abnorm eng ist, oder wenn bei *E*) geschlossen ist, und es kann leicht dadurch vermieden werden, dass man das Fallrohr weiter, die Einguss-öffnung des Syphons enger gemacht wird; ferner dadurch, dass das Fallrohr offen über Dach endet, oder man ein offenes Rohr (*d* in Fig. 143), an der Spitze des Syphons in ein über Dach geführtes Ventilationsrohr führt, wird, um zu verhindern, dass gegen dieses Absaugen des Ver-

schlusses. Eine andere Art der Entstehung von Insuffizienz der Syphons ist die, dass die herabfallende Wassermasse vor sich die Luft mitnimmt, dadurch den Wasserverschluss im Syphon (C und D in Fig. 143) bricht und dieselben dabei so weit öffnet, dass kein ausreichender Abschluss mehr vorhanden ist. Es kann dies aber nur dann eintreten, wenn das Entweichen der Luft aus dem Syphon gehindert ist, z. B. durch fälschlicherweise noch einmalige Syphons vor dem Abfluss in die Strassencanäle; ausserdem nur durch das Eingiessen völlig gefüllten Syphons. Eine Erleichterung des Abflusses in die Strassencanäle durch die in Fig. 143 gezeigten Fallrohre oder auch die in Fig. 144 gezeigten, am Scheitel der Syphons angebrachten Luft-entziehungen auch diese Insuffizienz.



Fig. 142. Verschiedene Füllungen der Syphons. *A* Normaler, gefüllter Syphon. *B* Geschwächter Syphon. *C* Leer gezogener Syphon.




Fig. 143. Schutzvorrichtung an Syphons. *f* Fallrohr. *v* Ventilationsrohr. *d* Verbindungsrohr.

b) Beseitigung des Canalinhalts.

Die Zusammensetzung des Canalwassers ist im Mittel folgende:

	Milligramm in 1 Liter
Gelöste Stoffe	700
Suspendirte Stoffe	500
Darunter organische	400
	1200

Werden die Fäkalien abgefahren, so macht das nach den zahlreichen, namentlich in England gesammelten Zahlen sehr wenig Unterschied; das Canalwasser enthält dann:

Gelöste Stoffe . . .	820 mg in 1 Liter
Suspendirte Stoffe . .	360 „ „ „ „

Dadurch, dass das reichliche Spülwasser der Closets fehlt, wird also der Gehalt der fäkalienfreien Canaljauche an gelösten Substanzen sogar etwas erhöht, und nur die suspendirten Stoffe werden durch das Fehlen der Fäces um ein Geringes vermindert.

Abwässer aus Fabriken können eine wesentlich abweichende Zusammensetzung des Canalinhalts bewirken. Die aus Färbereien, Wollmanufakturen, Gerbereien, Papierfabriken u. s. w. stammenden Abwässer zeigen meist einen 5 bis 10 mal höheren Gehalt an festen Bestandtheilen, als der durchschnittliche Canalinhalt (s. Kap. IX).

Der Canalinhalt ist somit für gewöhnlich viel zu dünn, um etwa transportirt und als Dünger benutzt zu werden, und von jeher hat man dementsprechend zunächst daran gedacht, denselben ohne weitere Verwertung los zu werden durch

Einlauf in die Flüsse.

Daraus entsteht häufig eine nicht unbedenkliche Verunreinigung der Flüsse. Man hat in dieser Beziehung zahlreiche schlechte Erfahrungen gemacht; in London war die Themse, in Paris die Seine derart durch Canalwasser getrübt und gab zu solchen Gerüchen Anlass, dass die Anwohner weit hinaus aufs Aeusserste belästigt wurden; die Fische starben ab, irgend welche Benutzung des Wassers zum Waschen, Baden u. s. w. war unmöglich. Gleiche Beobachtungen wurden in Frankfurt a. M. gemacht. Die kolossalsten Grade von Verunreinigungen sind in den Industriebezirken Englands vorgekommen. Uebrigens waren hier — wie überhaupt bei der Flussverunreinigung — die Fabrikabwässer weitaus am stärksten betheiligt.

In erster Linie sind es die suspendirten, sog. Sinkstoffe, die das Wasser schon äusserlich verändern; sie führen zu Schlammablagerungen, in denen die Fäulniss immer weiter um sich greift, und die sich schliess-

so ansammeln, dass eine häufige Entfernung durch Baggern nöthig ist. — Ausser den Sinkstoffen führen die schwimmenden Stoffe (Müll, Papier, Ballen von Fäces u. s. w.) zu Belästigungen, indem sie sich an Schiffen oder am Strauchwerk der Ufer ansetzen, namentlich wenn letztere flach sind und der Fluss einen gewundenen Lauf hat.

Die sanitären Bedenken einer solchen Flussverunreinigung liegen hauptsächlich in der fortgesetzten Entwicklung von Fäulnissgasen, die sich aus Schlammmassen entwickeln; theils in den Giften (Arsenik, Blei), welche in den Abfallstoffen der Fabriken und Hütten enthalten sein können; theils und hauptsächlich in den Infektionserregern, Typhusbacillen etc., die zu Zeiten mit den Abfallstoffen in das Flusswasser gelangen. Dieselben können zahlreiche Infektionen veranlassen, wenn das verunreinigte Flusswasser als Trink- oder Wirthschaftswasser, zum Baden oder zur Wäsche benutzt wird.

Die Verdünnung, in welcher sich die Infektionserreger im Flusswasser befinden und welche eigentlich die Infektionschancen ausserordentlich herabmindern sollte, wird durch eine vielfache Benutzung von Tausende von Menschen wieder ausgeglichen. Ausserdem sind Cholera- und Typhusbacillen unter geeigneten Bedingungen im Flusswasser wahrscheinlich vermehrungsfähig. Am ausgeprägtesten ist die schädliche Rolle verunreinigter Flüsse in aussereuropäischen Ländern zu beobachten, z. B. beim Ganges, dessen stark beschmutztes und doch für allen möglichen Zwecken benutztes Wasser zur Verbreitung der Cholera zweifellos viel beiträgt. Aber auch in Europa sind bis in die neueste Zeit Cholera- und Typhusepidemien vorgekommen, welche den Genuss verunreinigten Flusswassers zurückzuführen waren.

Liegen allerdings längere Strecken hindurch keine Ortschaften am Fluss oder wird wenigstens das Wasser des Flusses von den Anwohnern nur wenig benutzt, so ist geringe oder gar keine Gelegenheit zur Infektion gegeben, und in solchen Fällen hat sich auch ein gesundheitsschädlicher Einfluss der Flussverunreinigungen nicht nachweisen lassen.

Auch volkswirtschaftliche Bedenken, namentlich die Beeinträchtigung der Fischzucht, lassen ein Einleiten des Canalinhalts in Flüsse bedenklich erscheinen.

Es würde unrichtig sein, wollte man die Einleitung der Canaljauche in Flüsse principiell für alle Fälle verbieten; die Entscheidung ist vielmehr abhängig zu machen: 1) von der Menge und Concentration der gelieferten Canaljauche, 2) von der Wassermenge des Flusses, 3) von dessen Stromgeschwindigkeit, 4) von der Ufergestaltung, dem Verlauf des Flusses und seiner Neigung, Ueberfluthungen zu veranlassen und dabei die Unrathstoffe auf dem Lande zu deponiren, 5) insbesondere von der Bewohnung der stromab gelegenen Ufer.

bezw. der Menge der Schiffer und von der Intensität der Benutzung des Flusswassers. Bezüglich des wichtigsten Punktes, der Benutzung des Wassers, ist der richtige hygienische Standpunkt jedenfalls der, dass aus den verschiedenen oben angeführten Gründen und namentlich deshalb, weil auch ohne Einleitung städtischer Abwässer die Flüsse verdächtige Zuflüsse in Menge durch Niederschläge erhalten (z. B. solche, welche gedüngte Aecker, Gräben u. s. w. abspülen), die Benutzung von Flusswasser überhaupt möglichst beschränkt werden sollte. Von diesem Standpunkt aus ist eine stärkere Inanspruchnahme der Flüsse für die Beseitigung von Abfallstoffen entschieden zulässig, und eine solche ist auch vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus wünschenswerth. Nur übertriebene, zu grobsinnlicher Belästigung führender Verunreinigung der Flüsse braucht dann entgegengetreten zu werden. — Das Verhältniss zwischen der Menge der Jauche und der Wassermenge kann geradezu verschwindend klein werden; in Paris ist dasselbe 1:13, in Frankfurt 1:900, in Biebrich-Wiesbaden 1:8000. In Paris würde demnach eine Einleitung der Canaljauche kaum statthaft sein, in Wiesbaden dagegen ist eine solche zulässig, wenn keine zum Absatz disponirenden Ufer im weiteren Verlauf auftreten. gutes Stromgefälle vorhanden ist und das Wasser auf der zunächst stromabwärts gelegenen Strecke nicht von Anwohnern oder Schiffen benutzt wird. Sicher ist eine unschädliche Verdünnung selbst eines infektiösen Canalinhalts erreichbar, derart, dass keinerlei Chancen mehr für Infektionen bestehen und dass schon längst keine stinkenden Gase mehr auftreten können. Es ist wichtig, diese Grenzen der unschädlichen Verdünnung genauer, als wir sie bis jetzt kennen, festzulegen. — Zu beachten ist übrigens noch, dass die Mischung der Jauche mit dem Flusswasser sehr langsam und zunächst immer nur mit einem Theil der letzteren erfolgt. Der Einlass von Abwässern ist daher immer möglichst in der Strommitte zu bewirken.

Allmählich tritt im Verlauf des Flusses eine Selbstreinigung ein, die bereits S. 201 näher charakterisirt wurde. Dazu kommt die Aufnahme von reinem Grundwasser und reineren Nebenflüssen, so dass nach längeren Strecken das Flusswasser in seinem chemischen Verhalten und in Bezug auf den Gehalt an saprophytischen Bakterien ungefähr wieder seine frühere Beschaffenheit zeigen kann; ob zu dieser Zeit auch die Infektionserreger verschwunden sind, resp. wie weit dieselben unter Umständen transportirt werden können, darüber ist noch nichts Sicheres bekannt.

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle wird es den hygienischen und volkswirtschaftlichen Grundsätzen besser entsprechen, wenn eine gewisse Reinigung des Canalwassers vor dem Einfluss in die Flussläufe versucht wird.

Die Reinigung muss namentlich die suspendirten Stoffe und Schwimmstoffe organisirter Natur und die Infektionserreger betreffen, und zwar sind diese möglichst vollständig zu entfernen resp. zu tödten. Ferner sind auch die gelösten fäulnissfähigen Stoffe so weit zu beseitigen, dass nach dem Einlassen in den Fluss keine stärkere Geruchsentwicklung, Verfärbung oder Trübung (Verpflanzung) mehr zu erwarten ist.

Eine derartige Reinigung ist ausführbar 1) durch Bodenfiltration

esung; 2) durch das sog. Oxydationsverfahren; 3) durch
 sche oder chemische Klärung bezw. Combination von
 ent. verbunden mit Desinfektion.

Bodenfiltration und Berieselung.

Boden ist nach den Seite 177 gegebenen Ausführungen zur
 der Canaljauche vorzüglich geeignet. Feinporiger Boden
 uspendirten Stoffe, Gase, fermentartige und eiweissartige Stoffe
 zurück; dann entwickelt sich, sobald seine Poren stets oder
 mit Wasser und Luft gefüllt sind, ein reges Bakterienleben
 vollständige Mineralisirung des Stickstoffs und Kohlenstoffs.
 gute Reinigung der Canalwässer erfolgt mittelst intermittirender
 n. 1 cbm Boden vermag etwa 40 Liter Canalwasser zu
 also sind bei einer 2 m tiefen Schicht des Bodens für
 fenschen nur etwa 20 ha Boden in Arbeit zu nehmen. Die
 erleidet jedoch öftere Unterbrechungen und Störungen, und
 alb, weil schliesslich die obere Bodenschicht zu schwer durch-
 d; sie verschlammt und muss von Zeit zu Zeit künstlich
 werden. Mindestens muss daher eine gute mechanische
 (s. unten) das Canalwasser für die Bodenfiltration vorbereiten.
 dem bleibt der Boden allmählich anhaltend feucht, es fehlt
 tigen Poren, und die Nitrate häufen sich an; diese Umstände
 tigen aber die fernere Mineralisirung. Derart übersättigter
 ert dann grosse Mengen stinkender Gase und ist für längere
 ionsunfähig.

Nachtheile werden vermieden, wenn man auf dem zur
 benutzten Boden Pflanzungen anlegt. Die Pflanzen con-
 ie Nitrate, sie lockern mit ihren Wurzeln die oberen Boden-
 und bringen ausserordentlich viel Wasser zur Verdunstung.
 nachen sie ein Feld immer wieder geeignet zur Aufnahme
 gung neuer Jauche. Zugleich kann in dieser Weise leicht
 irthschaftliche Verwerthung des Stickstoffs und der Phosphor-
 Jauche stattfinden. — Von diesen Gesichtspunkten hat man
 er sogenannten Berieselung leiten lassen.

ngland sind Rieselfelder schon seit langer Zeit verbreitet;
 t sie dort bereits in etwa 200 Städten. In Deutschland sind
 serem Maassstabe in Danzig, Breslau, Berlin ausgeführt, für
 e sind sie projectirt.

eder besteht die Berieselung nur in einer Art Bewässerung,
 Jauche oberflächlich über das Land wegläuft (vergl. das
 der Verfahren, S. 448); besser aber ist es, die Jauche in

den Boden eindringen zu lassen und sie erst in gewisser Tiefe abzuführen. Alsdann ist eine Drainage des Bodens unerlässlich. Drainröhren sammeln das durchgeflossene Wasser in Gräben und führen es schliesslich einem Wasserlauf zu. Unterlässt man die Drainage, so steigt das Grundwasser bald mächtig an und das Terrain versumpft — Lehm- und humushaltiger Boden ist am geeignetsten. Bei starkem Lehmgehalt entstehen leicht Sprünge und Risse, die zu kommener Reinigung führen.

Die Berieselung entspricht durchaus den an ein vollständiges Reinigungsverfahren zu stellenden Anforderungen. Die suspendirten Stoffe und die Bakterien werden vollständig zurückgehalten. Die löslichen organischen Stoffe werden um 60—80 Procent, die anorganischen um 20—60 Procent vermindert. Ammoniak und Phosphorsäure bleiben beinahe ganz, Schwefelsäure wenig, Chlor fast gar nicht im Boden zurück. — Natürlich kann auch bei der Berieselung Uebersättigung des Bodens eintreten; es muss daher ein geordneter Betrieb eingehalten werden, zu welchem sehr viel disponibles Land gehört. Erfahrungsgemäss hat man für je 4—500 Menschen mindestens 1 ha zu rechnen. — Die Felder werden des Preises und der immerhin möglichen Düngung wegen fern von der Stadt gewählt, jedoch nicht zu weit, weil sonst die Druckrohre zu lang und die Kosten für die Beförderung der Jauche zu hoch werden.

Die im Hauptcanal gesammelte Canaljauche wird zunächst in einen Sandfang geleitet. Dort sollen die Sinkstoffe sich ablagern; ausserdem ein Gitter zur Zurückhaltung schwimmender Stoffe angebracht. Die Sinkstoffe werden durch einen Lokomobilbagger fortwährend herausgebaggert und am nächsten abgefahren. Die so von den schwebenden Bestandtheilen gereinigte Canaljauche kommt dann in die Pumpstation und wird von dort mit starker Dampfmaschinen in ein eisernes Druckrohr gehoben bis zu einem Punkt, von wo die Jauche mit natürlichem Gefälle auf die Rieselfelder geleitet werden kann.

Gewöhnlich übernimmt von der Ausmündung des Druckrohres an offener oder gedeckter Canal die Weiterleitung der Jauche. Der Canal verläuft auf einem Damm, der die Rieselfelder um einige Meter überragt. Alle 400 m sind in dem Canal Stauschützen angebracht, welche mittelst einer Schraubenvorrichtung auf- und niedergezogen werden können. Von diesem Hauptcanal aus gehen dann seitlich Canäle ab auf die einzelnen Felder, und diese Abzweigungen können durch Stauschützen verschlossen werden.

Die Felder sind sorgfältig abgetheilt, sie sind gewöhnlich 80—90 m breit und 200—500 m lang, also Flächen von $1\frac{1}{2}$ —4 ha. Sie zeigen eine doppelte Neigung: einmal der Länge nach mit einem Gefälle von 1:1000, zweitens von der Mitte verlaufend in der Längsachse nach den Seitenrändern zu mit einem Gefälle von 1:500. In der Längsachse liegt ein Graben, der wiederum 50 zu 50 m mit Stauwehren versehen ist. Soll nun ein bestimmtes Feld

elt werden, so werden zunächst im Hauptzufuhrgraben die Schützen bis zu einer Stelle gezogen, hinter der Stelle geschlossen; die bis dahin vorhandenen örtlichen Abfuhrcanäle werden ebenfalls geschlossen, so dass die ganze Wassermasse sich nur in den einen Seitencanal ergiesst, der nach dem betreffenden Felde führt. In dem Graben dieses Feldes wird dann zunächst die erste Schütze geschlossen; der Graben füllt sich bald, läuft an den Seiten über und in Folge der geschilderten Neigung des Terrains werden die beiden Seiten des vorderen Abschnitts des Feldes gleichmässig überfluthet. Dann wird die erste Schütze gezogen und die folgende niedergelassen; dass Wasser dringt nun um so viel weiter im Graben vor und überfluthet den nächsten Theil des Feldes, und so fort, bis das ganze Feld berieselt ist. Am Ende befindet sich gewöhnlich ein sogenanntes Auslassfeld, das tiefer liegt, als die Sohle des Grabens und schliesslich den Inhalt des Grabens aufnimmt.

Alle Felder sind durch Drainröhren drainirt, die in Abständen von 12 bis 25 m und am oberen Ende 1.3 m unter dem Niveau liegen. Sie münden in die Verzweigungen eines Entwässerungsgrabens, der schliesslich das gesammte gereinigte Canalwasser aufnimmt und dem Flusse mit natürlichem Gefälle zuführt.

Im Winter kann die Berieselung fortgesetzt werden, wenn das Canalwasser in einem geschlossenen Canal befördert wird, wo es hinreichend hohe Temperatur behält; andernfalls müssen grosse Staubassins angelegt werden, deren Boden nach der Entleerung bepflanzt wird.

Der Betrieb der Rieselfelder ist gewöhnlich in Händen eines Pächters. Bekannt werden theils Gras und Weiden, die im Frühjahr und Sommer berieselt werden müssen und ein dünnes Canalwasser verlangen, ferner Gemüse, Rüben, Tabak, auch Raps und Getreide, deren Felder im Herbst und Winter mit concentrirter Jauche berieselt werden.

Die Rieselfelder haben bisher überall, wo sie einigermaassen rationell betrieben wurden, gute Resultate ergeben. Nur da wo die Drainage unterlassen oder mangelhaft angelegt war, stellte sich eine Vermumpfung, übler Geruch und auch wohl eine Disposition des Bodens zu Malaria her. Wo indess die Drainage vorschriftsmässig ausgeführt und keine übermässige Berieselung vorgenommen wurde, ist die Belästigung durch Gerüche unerheblich und beschränkt sich auf den nächsten Umkreis der Rieselfelder.

Besondere Aufmerksamkeit hat man der Frage der Verbreitung von Infektionskrankheiten durch die Rieselfelder zugewendet.

Da in der Canaljauche eine gewisse Anzahl von Infektionskeimen stets enthalten ist und da keine baldige Vernichtung derselben im Boden erfolgt, so müsste man eigentlich erwarten, dass die Rieselfeldarbeiter, die doch in vielfache Berührung mit der frisch imprägnirten Erde kommen, Infektionen sehr ausgesetzt sind. Aber offenbar ist die Canaljauche auch schon ehe sie auf die Rieselfelder kommt, nicht so gefährlich, als vielfach angenommen wird. Die Canalarbeiter beschmutzen sich täglich mit Resten der Jauche oder der Sinkstoffe; die Arbeiter

am Sandfang sind fortgesetzt den Berührungen mit Sinkstoffen exponirt; und doch wird auch unter dieser Kategorie von Arbeiten durchaus kein häufigeres Auftreten von Infektionskrankheiten beobachtet. Diese relative Unschädlichkeit des Canalinhalts ist einmal auf die starke Durchmischung und Verdünnung des Inhalts zurückzuführen. Die einzelnen, concentrirten Infektionsquellen sind in dem Chaos von harmlosen Bakterien und anderen körperlichen Elementen vertheilt. Zweitens beruht die Ungefährlichkeit darauf, dass Berührungen der Schleimhäute nur in geringem Umfang und mit minimalen Bruchtheilen des Canalinhalts stattfinden. Selbstverständlich bestehen keinerlei Chancen dafür, dass in solchen kleinsten Partikelchen Infektionserreger enthalten sind. Dass hier und da Infektionen vorkommen, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber dieselben repräsentiren Curiosa, die sich nicht gegen die hygienische Zulässigkeit der ganzen segensreich wirkenden Anlage in's Feld führen lassen. — Etwas anderes ist es, wenn ganze Bevölkerungen z. B. von einem mit der Canaljauche hochgradig verunreinigten Wasser vielseitigen Gebrauch machen, wenn Arbeiter das Drainwasser trinken u. s. w. Dadurch wird dann eine so ausgiebige Berührung mit der Canaljauche hergestellt, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit auch Infektionserreger aufgenommen werden.

Gegen die Rieselfelder wird neuerdings eingewendet, dass der Boden trotz aller Vorsicht bald verschlammt und den erwarteten Effect nicht mehr leistet; daher ist der Ankauf immer neuer Terrains erforderlich. — Es weisen diese Erfahrungen aber nur darauf hin, dass auch bei der Benutzung von Rieselfeldern eine bessere vorgängige Entfernung der suspendirten und schwimmenden Stoffe als bisher versucht werden muss. Wird dieselbe unter Zuhülfenahme guter mechanischer Klärvorrichtungen bewirkt, so sind zur Befreiung des Canalwassers von den gelösten Stoffen und von den Resten der suspendirten Theile viel geringere Bodenflächen ausreichend; ja es kann, je sorgfältiger die Vorklärung geschieht, die Berieselung um so mehr der weit billigeren Form der Bodenfiltration genähert werden.

Viele Orte verfügen über kein geeignetes Terrain für Rieselfelder oder Bodenfiltration in der Nähe und sind aus diesem Grunde durchaus auf eines der folgenden Verfahren angewiesen.

Das Oxydationsverfahren (Biologisches Verfahren).

Das Oxydationsverfahren leitet sich her von den Erfahrungen bei der intermittirenden Bodenfiltration, welche in wechselsweiser Füllung der Bodenporen mit Abwasser und mit Luft besteht, und durch welche FRANKLAND eine weitgehende Reinigung des Abwassers auch bezüglich

: gelösten Stoffe erzielt hat. Es lag der Gedanke nahe, den Process auf noch kleineren Raum zu concentriren und hier intensivere Wirkung zu beschaffen, dadurch dass Filter aus sehr grobporigem Material aufgebaut und nun intermittirend mit den Abwässern beschickt wurden, so zwar, dass nach Beendigung jeder Einstauperiode die Poren des Filters sich wieder mit Luft füllen.

Uebergänge zu den jetzt im grossen Maassstabe bewährten Verfahren bildeten z. B. Versuche, Filter aus Torf zu benutzen; oder aus einem in England eine Zeit lang verbreiteten Präparat Polarite, einer hauptsächlich aus Eisenoxyd bestehenden schwarzen, porösen Masse in erbsengrossen Stücken. Die Abwässer wurden ehe man sie auf das Filter liess, einer Klärung in einem Klärbecken unter Zusatz von Ferrozone (vorzugsweise Thonerdesulfat) unterworfen. — Aehnlich ist das sogenannte „Blaustein“-Verfahren. Alle diese Methoden sind durch die neueren Oxydationsverfahren überholt.

Als das beste Material für den Filteraufbau hat sich Coks herausgestellt, in Stücken von etwa 7 mm Grösse. In Hamburg hat sich die zerkleinerte Schlacke des Müllverbrennungsofens in Stücken von —7 mm bewährt; auch zerschlagene Ziegel sind benutzbar. Wenig geeignet ist Kies. Die Höhe der Filter beträgt 1—1.5 m.

Fast stets erfolgt die Beschickung der Filter intermittirend; das eingestaute Abwasser bleibt 1—2 Stunden im Filter; dann wird das Abwasser abgelassen und die Poren des Filters werden dabei mit Luft abgesogen. Nach einigen Stunden kann wiederholte Beschickung folgen; doch leidet die Aufnahmefähigkeit des Filters durch zu rasche Abfolge. — Wichtig ist eine gewisse Einarbeitung jedes Filters für seine Leistung. Im Anfang ist der qualitative Reinigungseffekt immer gering; bessert sich stetig, bis es schliesslich quantitativ im Stich lässt. Die Filterporen zeigen sich gegen Ende mit einem feinen Schamm erfüllt, in dem das Filter durch Reinigung befreit werden muss.

Statt der intermittirenden Beschickung ist namentlich in England auch wohl continuirliches Aufbringen von Abwasser versucht; dies muss aber dann in Regenform geschehen und in solcher Weise, dass die Poren des Filters immer theilweise lufthaltig bleiben; oder es muss Frischluft in die Filterporen eingetrieben werden.

Die Wirkung der Filter, der sog. „Oxydationskörper“, beruht in erster Linie auf Flächenabsorption gegenüber den gelösten organischen Stoffen einerseits und dem Sauerstoff andererseits. Je grösser die Oberfläche der Filterelemente im gleichen Volum ist, um so besser ist die Wirkung; in sofern würde feinkörniges Material den Vorzug verdienen, doch sind hierin durch die nothwendige Rücksichtnahme auf die quantitativen Leistungen Grenzen gezogen. Der günstigere Effekt des

„eingearbeiteten“ Filters beruht auf der Anhäufung organischer Stoffe von hohem Absorptionsvermögen. Die absorbierten fäulnissfähigen Stoffe verfallen dann Verwesungsprocessen, die um so energischer ausfallen, je mehr bakterienhaltige zersetzungsfähige Substanzen angehäuft werden und je leichter Sauerstoff Zutritt (DUNBAR).

Die modernen Oxydationsverfahren theilen sich in zwei Kategorien, je nachdem die Abwässer frisch (DIBDIN) oder nach vorherigem Passiren eines Faulraums (CAMERON-SCHWEDEB) auf die Filter gebracht werden.

Beim DIBDIN'schen Verfahren ist eine sorgfältige Befreiung von Schwimm- und Schwebestoffen nöthig, die sonst die Poren des Oxydationskörpers bald verstopfen würden. Aehnlich wie vor der Berieselung oder Bodenfiltration, nur noch sorgfältiger sind daher auch hier Schlammfänge und andere Einrichtungen zur mechanischen, eventuell auch chemischen Vorklärung anzubringen. Die Reinigung im Oxydationsfilter geht um so besser von statten, eine je gleichmässiger und homogenere Flüssigkeit die aufgebrachten Abwässer darstellen.

Beim SCHWEDEB'schen Verfahren soll in einer Art Schlammfang ausser dem mechanischen Absetzen der Schlammmassen noch durch bakterielle




Fig. 144. SCHWEDEB'sches Verfahren.

Einwirkung eine theilweise Lösung der suspendirten organischen Stoffe vor sich gehen, und das weniger fäulnissfähige Material soll in diesem Faulraum so vorbereitet werden, dass es der Verwesung im Oxydationskörper leichter unterliegt. — Früher hat man für den Faulraum völligen Luftabschluss, also günstigste Bedingungen für Anaerobiose herzustellen versucht; dies ist kaum erforderlich, da in den tieferen Flüssigkeitsschichten ohne Weiteres anaerobe Gärungen begünstigt werden. Auch hat man wohl versucht, rein cultivirte, besonders geeignete Bakterienarten absichtlich zuzusetzen; aber bisher ohne deutlichen

folg. Ein Theil des Schlammes scheint in der That durch diese **hrungen** verzehrt bzw. löslich zu werden; auch die sonstige biologische **rbereitung** des Materials im Faulraum erscheint zweckmässig; nur **ommen** die Abwässer in viel stärker riechendem Zustand auf die **ter**, so dass hier eventuell Schutzmaassregeln angewendet werden **essen**. — Zwischen Faulraum und Oxydationsfilter wurde früher noch „**Lüftungsraum**“ eingeschaltet, der nach neueren Erfahrungen indess **ht** unbedingt nöthig ist.

Theilweise ist das Princip des biologischen Verfahrens auch in andere **inigungsmethoden**, namentlich solche für industrielle Abwässer, hinein-**ommen**, so in das PROSKOWITZ'sche Verfahren (s. Seite 550).

Die Urtheile über die Resultate des Oxydationsverfahrens lauten **Jahr zu Jahr** günstiger. Die Beseitigung der gelösten fäulniss-**igen** Substanzen gelingt so vollständig, dass das ablaufende Wasser **keinen** Belästigungen mehr Anlass geben kann. — Als Nachtheil **Systems** gegenüber der Berieselung ist anzuführen, dass die Bakterien **l** etwaigen Krankheitserreger nicht beseitigt oder abgetödtet werden. **mer** ist die Ansammlung des Schlammes durch das Vorklären be-**tender** als bei den Rieselfeldern, weil die Klärung sorgfältiger **andhabet** werden muss. In sofern ist die theilweise Vergärung **Schlammes** durch den SCHWEDER'schen Faulraum ein zweifelloser **winn**.

Mechanische und chemische Klärung.

Mechanische Klärung ist, wie im Vorstehenden mehrfach betont **als** vorbereitende Maassregel bei allen Reinigungsmethoden erforder-
2. Je nach dem beab-
htigten Effekt werden
ei sehr verschiedene
stufungen eingehalten.
Das Mindestmaass einer
chanischen Vorklärung
sten die Seite 468 be-
triebenen Sand- oder
hlammfänge für die
pendirten Stoffe und
ache Eintauchplatten
die schwimmenden
ße. — Bessere Aus-
te erzielt man einerseits
ch Gitter und Rechen,




Fig. 145. RIEMANN's selbstthätige Rechen.

andererseits durch Klärbecken. Von RIENSCH sind Rechen (Fig. 145) angegeben, deren Zwischenräume verschieden breit sind (3—30 mm) und mit denen je nach Bedarf die gröbsten, mittleren oder feinsten Schlammtheile continuirlich abgefangen werden können (b); durch Bänke und Kämme wird automatisch der Schlamm von den Rechen auf ein sog. Transportband (d) und durch dieses auf Wagen verladen. — Eine andere Anlage von RIENSCH besteht in Klärbrunnen mit einer oder mehreren Säulen von Klärschirmen, die in Abstand von ca. 7 cm übereinander angebracht sind.

Sehr erfolgreich ist das Einleiten der Abwässer in Klärbecken, in denen durch Erweiterung des Querschnitts starke Verlangsamung der Strömung und dadurch ein Ausfallen der suspendirten Theile zu Stande kommt; die Geschwindigkeit soll bis auf etwa 6 mm pro Sekunde absinken.

In Kassel (s. Fig. 146 a u. b.) sind unter Fortlassung aller Abfangeinrichtungen mehrere Klärbecken von 40 m Länge, 4 m Breite und 3.5 m Tiefe eingerichtet; nach der Füllung wird jedes Becken einige Stunden abgesperrt und in Ruhe belassen; der oberste Theil des Wassers wird dann in den Fluss geleitet, die nächste Schicht kommt in einen Rücklauf und muss nochmals ein Becken passieren; die unterste Schlammmasse wird durch eine Rechenvorrichtung auf der schrägen Sohle des Beckens an der Vorderwand aufgehäuft und von da mittelst Vacuumapparats nach dem Schlammager geführt. — Die Resultate scheinen sehr günstig zu sein.

Mit einer derartigen mechanischen Klärung kann man namentlich da ausreichen, wo die Verhältnisse des aufnehmenden Flusses günstig liegen (relativ grosse Wassermenge, gute Vorfluth, geringe Benutzung). Ist vollständigere Reinigung und auch Beseitigung der gelösten fäulnissfähigen Stoffe erforderlich, dann muss Bodenfiltration oder Oxydationsverfahren der mechanischen Klärung folgen.

Zur chemischen Klärung benutzt man die auch für kleinen Abwässermengen benutzten, S. 453 bereits aufgeführten Präparate; besonders Aetzkalk, Thonerde- und Eisensalze. Stets verbindet man mit der chemischen Klärung bis zu einem gewissen Grade die mechanische; entweder werden Klärbecken angelegt, in denen das Canalwasser zu sehr langsamer Strömung oder zur Stagnation gezwungen wird, nachdem es vorher mit geeigneten, Niederschläge hervorrufenden Chemikalien versetzt ist. Oder man richtet aufsteigende Filtration ein; das mit Chemikalien versetzte Wasser lässt man zu dem Zweck am Boden von Gruben oder stehenden Cylindern eintreten und dann oben abfließen, so dass das aufsteigende Wasser die herabsinkenden Schlamm- und Niederschlagmassen passieren und gerade dadurch einer vollständigeren Klärung unterliegen muss. — Die schwimmenden Massen,




Fig. 146 a.




Fig. 146 b. Kasseler Kläranlage.

Papier u. s. w. und ebenso die gröberen Sinkstoffe, Sand u. s. w. müssen vorher durch Sandfänge abgeschieden werden.

Als Beispiel der ersten Methode sei die Anlage in Frankfurt a. M. angeführt. Der Hauptcanal mündet zunächst in einen runden Sandfang; darauf folgt eine Mischkammer, in welcher die Wässer mit den Chemikalien, und zwar mit Kalk und Thonerdesulfat, durch Rührwerke gemischt werden. Von hier gelangen dieselben in die sogenannte Zuleitungsgalerie, die erheblich weiter ist, als der Canal, so dass die Strömung etwa um das Zehnfache verlangsamt wird, und von dieser Galerie aus wird das Wasser in die eigentlichen Klärbecken geleitet. Die Sohle derselben ist so geneigt, dass die Wassertiefe allmählich von 2 bis zu 3 m steigt; dadurch kommt eine allmähliche Verlangsamung des Stromes zu Stande. Der Eintritt des Wassers in die Klärbecken erfolgt 5 cm unter dem Wasserspiegel durch breite, niedrige Schüttöffnungen. Nach dem Durchfliessen der Klärbecken tritt das allmählich von allen Sinkstoffen befreite Wasser in etwa 3 cm starkem Strahl über das Auslasswehr in die sogenannte Ableitungsgalerie und von dieser in den Main. — Die Klärbecken sind überfüllt, haben aber Licht- und mehrere Schachtöffnungen.

Die Entleerung der mit Schlamm gefüllten Klärbecken geschieht so, dass zunächst die Zufuhr zu dem einzelnen Klärbecken abgesperrt wird. Dann lässt man den wässerigen Inhalt schichtenweise in einen besonderen Entleerungscanal absaugen, darauf wird der dünnflüssige, am geneigten Ende angesammelte Schlamm abgepumpt und mittelst eines Dampfkrahns der feste Schlamm in Kübeln zu den Schachtöffnungen herausgewunden. Auf grossen Schlammablagerungsplätzen, die drainirt sind, lässt man den Schlamm dann so weit eintrocknen, bis er stechbar geworden ist. Ferner sind im Maschinenhaus Filterpressen vorgesehen, um die letzten Reste Wasser auszupressen und den Schlamm transportfähig zu machen.

Eine sehr übersichtliche Anlage, in welcher Klärbecken und aufsteigende Filtration combinirt sind, besteht in Wiesbaden (s. Fig. 147, 148). Dort ist ein System von vier Vorkammern eingerichtet, Gruben, in welchen aufsteigende Filtration stattfindet; gleichzeitig erfolgt dort eine innige Mischung mit den Chemikalien und ein allmähliches Absinken der Schlammtheile. Durch einen breiten, schmalen Ueberlauf tritt das so schon theilweise gereinigte Wasser in 3 Klärbecken, in welchen nunmehr völlige Klärung durch Absetzen stattfindet. Der Zusatz besteht nur in Kalk; die Mischung geschieht in zweckmässiger Weise durch ein Luftgebläse.

Als ein Beispiel ausschliesslich aufsteigender Filtration sei das System von RÖCKNER-ROTHE erwähnt. Dasselbe hat eine specifisch sinnreiche Einrichtung darin, dass ein selbstthätiger Heber eingeführt ist. Ein 7—8 m hoher Cylinder (ROTHE'scher Thurm) oben geschlossen, unten offen, taucht in ein Bassin mit dem zu reinigenden Wasser (Fig. 149). Dieser Cylinder repräsentirt den einen Heberschenkel, der andere besteht in einem oben am Cylinder abzweigenden Rohre, das in ein etwas tiefer liegendes Bassin führt und dort unter Wasser endet. Oben auf dem Cylinder ist ein Verlängerungsrohr (G—H) angebracht, von welchem ein Rohr zu einer Luftpumpe geht. Durch die letztere wird die Luft im Cylinder beim Inbetriebsetzen so lange verdünnt, bis das Wasser über der Mündung des Ablaufrohres steht. Damit beginnt dann die Heberwirkung, welche anhält, so lange die Luftverdünnung dauert und so lange das Niveau im Abflussbassin tiefer steht als im Zuflussbassin (A).

Um das mit Chemikalien versetzte Canalwasser gleichmässig in dem Cyder zu vertheilen, lässt man dasselbe einen Stromvertheiler passieren, der durch den ganzen Querschnitt des Bassins sich erstreckt. Derselbe ist dadurch hergestellt, dass von dem Einströmungsrohr Lattenstäbe in einem Winkel von ca. 80° nach abwärts gehen und jalousieartig mit queren Holzstäbchen versehen sind. Der niedersinkende Schlamm fällt auf diesen Jalousientrichter,




Fig. 147. Situationsplan der Klärbeckenanlage in Wiesbaden.

steigende Wasser muss durch denselben hindurchtreten. Bei dieser Bewegung kommt dann eine sehr gründliche Reinigung zu Stande.

Noch zahlreiche andere Klärverfahren sind angegeben, die entweder durch den Umfang und die Art der mechanischen Klärung, die Reihenfolge der Procedures oder durch die Chemikalien, die zugesetzt werden, von den beschriebenen Methoden abweichen.

Beispielsweise sei genannt: Das Verfahren von MÜLLER-NAHNSEN, bei dem als Chemikalien Kalk, Aluminiumsulfat und lösliche Kieselsäure (so dass

sich unlösliches Kalk-Aluminiumsilikat bildet) zugesetzt werden. Die Menge des Zusatzes wird der Menge des Abwassers automatisch angepasst. Das mischte Wasser läuft durch enge Mauerschlitze zwei tiefe Klärbrunnen, von deren spitz zulaufend Grund der Schlamm fortwährend abgesogen wird, im Maschinenhaus getrocknet und in Schlammkud verwandelt zu werden. Die seit vielen Jahren einen Theil der Stadt Halle a/S. in Betrieb befindliche Anlage hat sich dauernd bewährt. — Bei Hirtz'schen Verfahren besteht der Zusatz aus Eisen Thonerde, Kalk und Magnesia nebst Zellfaser.)

Fig. 141. Prinzip der Hirtz'schen Kläranlage, wie der Plan der geschlossenen Anlage in Fig. 142.





Fig. 142. Plan der geschlossenen Anlage.

berschuss vor Aetzkalk soll eventuell durch nachträgliches Einleiten von Sauerstoff beseitigt werden. — MATRICH behandelt die mechanisch vorklärten Abwässer mit Pressluft, um die suspendirten Stoffe zu zertrümmern und ein homogenes Wasser zu erhalten, das durch Zusatz von Kalk und Eisenchlorid in Klärbrunnen völlig gereinigt wird. Nach der Reinigung erfolgt nochmalige Luftbehandlung. Der Schlamm wird von den Landwirthen abgenommen.

Besondere Beachtung verdienen zwei neuere Verfahren: die in Leipzig geführte Eisenchloridbehandlung und das DEGENER-ROTHER'sche Verfahren. — In Leipzig werden pro Cubikmeter Canalwasser 10 g Eisenchlorid und Eisensulfat zugesetzt, dass 50 g Eisenoxydhydrat enthält; diese Menge kostet knapp 1 Pf. Durch das kohlensaure Ammoniak des Canalwassers entsteht ein feinflockiger Niederschlag von Eisenoxydhydrat, der Eiweisskörper, Phosphate, Spaltpilze fast vollständig, daher nicht nur die Schwebestoffe, sondern auch einen grossen Theil der gelösten Stoffe beseitigt und ein nicht mehr fäulnissfähiges, keimfreies Wasser liefert. Allerdings entstehen sehr grosse Schlammmassen, die aber wenig riechen, und nicht Bakterien, sondern nur Schimmelpilzen zur Wucherung dienen. In Leipzig hat man damit einen „Schlammberg“ hergestellt, von dem der hinaufgepumpte Schlamm langsam herabfliesst und dabei austrocknet.

Das DEGENER-ROTHER'sche Verfahren geht ebenfalls darauf hinaus, auch die fäulnissfähigen gelösten Stoffe zu beseitigen. Zu diesem Zweck werden kräftig absorbirende Humussubstanzen in Form von feiner Braunkohle zugesetzt. Nachdem die Absorption erfolgt ist, werden Eisenoxysalze zugesetzt, welche mit den Humusstoffen unlösliche grossflockige Niederschläge geben, die alle feinen Schwebetheile in eine Jauche umhüllen. Die Trennung des gesammten Niederschlags von der klaren Flüssigkeit erfolgt dann ausserordentlich vollständig im Klotz'schen Thurm (s. S. 476). Der Kohlezusatz beträgt ungefähr 1 Kilo Kohlenbrei auf 1 cbm Abwasser. Im Sedimentirthurm verweilt die Flüssigkeit etwa 2 Stunden. Der Schlamm kommt in Vacuum-Entwässerungsapparate und wird dort stichbar (60% Wasser). Beim Lagern tritt kein Geruch mehr auf. — Die Reinigung ist eine äusserst vollständige, das abfliessende Wasser giebt zu keinen Fäulnissprocessen Anlass. Bakterien sind jedoch reichlich vorhanden; sollen auch diese beseitigt werden, so ist nachträgliche Desinfektion des geklärten Abwassers erforderlich.

Die Leistungen der mechanischen und chemischen Klärung lassen sich dahin zusammenfassen, dass bei guten Wasser- und Verhältnisse schon die mechanische Filtration, besonders in Form geeigneter Klärbecken, ausreichendes leistet. Die meisten che-

mischen Methoden bewirken nur wenig vollständigere Klärung gute Einrichtungen zur mechanischen Klärung kommt es jedoch mehr an als auf die Wahl des chemischen Zusatzes.

Unter den chemischen Fällungsmitteln hat früher der Aetzkalk die hervorragende Rolle gespielt. Abgesehen von seinen empfindlichen Eigenschaften hat man auch viel von seiner bakteriziden Wirkung erhofft. 1 pro Mille Aetzkalk (oder Magnesia) tötet Typhus- und Cholerabacillen in ca. 1 $\frac{1}{2}$ Stunde ab. Aber sehr schwierig, diese Concentration zu erreichen, weil ein Theil des Aetzkalks rasch ausgefällt wird; und andererseits nicht leicht zu überschreiten, was der Kosten wegen, und wegen der Möglichkeit kleiner gelöster Kalkmengen für Fische vermieden werden. Ausserdem ist der Schlamm der mit Kalk arbeitenden Anlagen besonders ungünstig; er entwickelt üble Gerüche, sobald die Aetzreste in Calciumcarbonat verwandelt sind, trocknet schwer und wird von den Landwirthen als ungeeignet verworfen, weil er das Ammoniak frei macht und dessen Abdunstung befördert.

Mit Recht bevorzugt man daher neuerdings Thonerde- und Eisensalze u. s. w., bei denen die aufgezählten Mängel in geringerem Grade hervortreten.

Sehr wichtig ist die Erfahrung, dass die mechanisch und chemisch geklärten Abwässer bei ungünstigen Wasser- und Vorfluthverhältnissen noch zu Fäulnisprocessen Anlass geben können, weil die giftigen Stoffe nicht beseitigt sind, vielmehr bei Verwendung von Aetzkalk noch eine Zunahme zeigen. In dieser Beziehung scheint ein reichlicher Zusatz von Eisenoxydsalzen, wie er in Leipzig wird, und das DEGENER-ROTHER'sche Kohlebreiverfahren Genüge zu leisten, so dass sich deren Effekte mit den Wirkungen der Filtration und des Oxydationsverfahrens auf eine Stufe stellen lassen.

Die Beseitigung der Bakterien und eventuellen Krankheitserreger erfolgt durch keines der beschriebenen Systeme hinreichend vollständig. Ist eine solche erforderlich, so muss dauernd oder wenigstens zeitweise eine gesonderte Desinfektion der Abwässer erfolgen. Zwar ist diese bei den bereits geklärten Abwässern zu empfehlen, da in denselben die Krankheitserreger mit viel geringeren Mengen Desinficientien abgetötet werden, als in der ungeklärten Jauchedesinfektion. Soll ferner nicht einer Sterilisierung gleich kommen, so müssen alle Sporen von Saprophyten vernichtet; sondern es genügt, wenn der Desinfektion Repräsentanten der Coligruppe nicht mehr leben können. In vielen Fällen wird es ausserdem genügen, wenn nur zu Epidemiezeiten und bei Abwässern bestimmter Gebäude, z. B. K

uern, eine Desinfektion der Abwässer verlangt wird. — Als bestes und billigstes Desinficiens ist Chlorkalk ermittelt; 0,1 pro Mille bei Minuten langer Einwirkung scheinen für gut geklärte Jauche völlig genügen; nur muss mit Rücksicht auf die Fische, die gegen Chlor empfindlich sind, unter Umständen eine Neutralisirung mit Eisensulfat der Desinfektion folgen. Der Preis für beide Chemikalien beträgt 1 cbm etwa 2,3 Pf.

Eine erhebliche Schwierigkeit verursachen bei den mechanisch-mechanischen Klärungen oft die Schlammmassen, die etwa 3 pro Mille der Abwassermenge ausmachen und im Laufe der Zeit sich enorm anheben. Die offenen Schlamm lager belastigen stark durch Gerüche; das Trocknen geht zu langsam von statten; eine landwirthschaftliche Verwerthung ist nicht überall durchzusetzen. Maschinelle Filterpressen eignen sich bei kleineren Anlagen bewährt. Auch die Vermischung mit Hausmüll (Marburg) oder Strassenkehricht (Kassel) scheint gute Resultate zu geben. Beim DEGENER'schen Verfahren ist der Schlamm beim Trocknen mit oder ohne solche Zusätze besonders gut als Düngematerial verwerthbar.

Auch ein Zusatz von Schwefelsäure (zur Bindung des Ammoniaks), Erhitzen auf 60°, dann Pressen in der Filterpresse und Extraktion von Fett soll landwirthschaftlich gut benutzbares Präparat geben (Roubaix).

Neuerdings werden Versuche gemacht, die Abwässerauf elektrolytischem Wege zu reinigen; auch diese Methoden kommen im Grunde auf chemische Reinigung hinaus. Nach dem WEBSTER'schen Verfahren soll die Jauche einmal durchfliessen, in den Elektroden aus Kohle und aus Eisenplatten eingetaucht sind. Letztere werden unter Zuhilfenahme des Chlors der Abwässer in Eisenoxydchlorid verwandelt, das mit organischen Substanzen unter Abgabe von Wasserstoff und Chlor, und unter Bildung von Eisenoxydhydrat zerfällt. Dieses wirkt stark präcipitirend. — HERMITE setzt dem Abwasser Meerwasser zu, in welchem es durch Elektrolyse freies Chlor entstanden war. Hierdurch soll wesentlich Desodorisirung und Sterilisirung erzielt werden.

Die aufgeführten Klärmethoden wirken oft vollkommener gegen stark concentrirteren Abwässern, wie sie namentlich bei den Separationssystemen und bei industriellen Etablissements vorliegen.

3. Die Separationssysteme.

Neuerdings wird statt der summarischen Canalisation vielfach eine Separation der einzelnen Abfallstoffe, eine getrennte Behandlung von Fäkalien, des Hauswassers und des Meteorwassers empfohlen. Die Abseparirung des Meteorwassers hat entschiedene Berechtigung. Die Dimensionen der Schwemmcanaäle sind wesentlich auf die Regenwasserabfuhr zugeschnitten; die Canäle würden sehr viel kleiner und billiger ausfallen.

angelegt werden können, wenn sie nicht eben die wechselnden Mengen Niederschläge aufzunehmen hätten.

Nun hat freilich das Meteorwasser bei den Schwemmcanälen eine äusserst wichtige Funktion: nämlich den Canalinhalt gelegentlich zu verdünnen und einen raschen Fluss der Canaljauche und ein Fortschwemmen schwererer Sinkstoffe zu veranlassen. — Aber diese Funktion leistet das Meteorwasser weder in idealer Weise, da es dieselbe in unregelmässigen Zwischenräumen ausübt, noch ist es dabei als unentbehrlich anzusehen.

Ein Ersatz kann einmal dadurch erreicht werden, dass von einem Fluss oder Teich oder von der Wasserleitung aus eine regelmässige willkürlich regulirbare Spülung des nur für Fäkalien und Abwasser bestimmten Canalsystems eingerichtet wird. Die Canäle können schon einen wesentlich geringeren Querschnitt erhalten. — Oder die Fäkalien und Hauswässer werden in engen Canälen mit mechanischer Unterstützung fortbewegt, welche die Spülung überflüssig machen.

Dann ist auch die definitive Beseitigung des nur aus Fäkalien und Hauswasser bestehenden Canalinhalts leichter. Für Berlin ist die Masse allerdings zu concentrirt; der Einleitung des Canals in die Flüsse stehen entschieden Bedenken entgegen. Dagegen die Verarbeitung zu Poudrette versucht werden, wenn es sich nur um Fäkalien handelt; werden die Hauswässer mit aufgenommen, so ist eine mechanische und chemische Klärung, biologisches Verfahren und Infektion viel leichter durchführbar, weil die Masse der Abwässer viel geringer und ihre Zusammensetzung viel gleichmässiger ist.

Das Regenwasser wird ober- und unterirdisch in möglicher direkter Weise und ohne vorherige Sammlung in den nächsten Wasserlauf geführt. Das erscheint fast überall unbedenklich, sobald man das Wasser von verdächtigen Höfen u. dergl. den Canälen zuführt; auch die Niederschläge gelangt zwar der ganze Strassenschmutz in den Fluss, aber das geschieht bei der Schwemmcanalisation periodisch bloss bei jedem starken Regens durch Vermittelung der Nothabläufe auch, und zwar dann noch begleitet von wechselnden Antheilen Jauche.

Für die hygienische Beurtheilung kommt viel darauf an, an welcher Stelle die Trennung der Abfallstoffe vollzogen wird. Wie schon bei der Besprechung der Abfuhrsysteme hervorgehoben wurde, ist es hygienisch unrichtig, die Fäkalien gesondert zu behandeln und die Hauswässer mit dem Meteorwasser zusammen oberflächlich abzuführen.

Richtig ist es, Fäkalien, Hauswässer, Meteorwässer von verdächtigen Höfen und Strassentheilen und differente Industrieabwässer einerseits zusammenzufassen und unterirdisch abzu-

reits das Meteorwasser von Strassen, Plätzen, Dächern und
erente Industrie-Abwässer zu vereinigen und in einfachster
fortzuführen.

In grossen Städten wird man gleichwohl ein rationelles Trenn-
n nicht zur Anwendung bringen können, weil hier Ueberfluthungen
trassen durch stärkere Niederschläge durchaus möglichst vermieden
n müssen. Dagegen ist für kleinere Städte, ferner Theile einer
ren Stadt, in denen die Terrainverhältnisse für eine Entfernung
eteorwassers günstig liegen, das Trennsystem entschieden zu em-
n.

In Gebrauch sind zur Zeit namentlich folgende:

1) **WARING's System.** In Memphis (Amerika), Oxford u. s. w. ein-
rt. Die Canäle nehmen kein Regenwasser (oder höchstens einen
z. B. das in den Höfen sich sammelnde) auf. Dafür sind am
1 Ende jedes Rohrstranges Spülbassins angebracht, von wo 1 bis
täglich gespült wird; Spülwasser rechnet man 1 ccm pro Kopf
fahr. Die Hausanschlüsse haben keine Syphons. Bei der Con-
tion des Canalinhalts erscheint dies nicht unbedenklich. Für die
on der Canäle muss gesorgt sein.

2) **SHONE's Druckluft- (Ejektor-) System.** Entweder Sammlung
äkalien in Kübeln, die an Sammelstellen entleert werden; der
t wird in eisernen Rohren von 55 cm Weite mittelst compri-
r Luft nach der Poudrettefabrik geschafft (**WARINGTON**). — Oder
so ausgeführt, dass enge Canalrohre (18—30 cm weit) mit gutem
le aus je einem Bezirk der Stadt die dickflüssige, aus Fäkalien
Hauswasser bestehende Masse zu einem tiefliegenden Behälter,
Ejektor (*B* in Fig. 150), leiten. Die im Ejektor sich ansammelnde
gkeitsmasse löst bei einer gewissen Füllung durch Hebung des
mmers *C* bis nach *D* automatisch den Zutritt von Druckluft
welche den Inhalt heraus- und in die Abflussleitung drückt.

Andere Trennsysteme sind von **MERTEN**, **ROTHE**, **MAIRICH** u. A.
geführt und mit den oben geschilderten besonderen Klärverfahren
nden. Die Erfolge scheinen günstig zu sein, soweit die Kürze
estehens der Anlagen ein Urtheil gestattet.

3) **Das LIERNUR'sche pneumatische System.** Ist in Stadttheilen
rag, Hanau, Amsterdam, Leyden, Dordrecht u. s. w. zur Ausführung ge-
allerdings in sehr verschiedener Weise, da das System im Laufe der
Jahre mannigfache Modifikationen erfahren hat. Dementsprechend ist
récise Definition des **LIERNUR'schen** Systems zur Zeit kaum zu geben.

Die Entfernung der gesammten Abfallstoffe soll durch eine Reihe von
ystemen geschehen. Das Bodenwasser soll durch poröse Drainageröhren

abgeleitet werden, das Meteorwasser durch oberflächliche Rinnale, nur in bewohnten Stadttheilen soll es in den Hauswassercanälen Aufnahme finden. Das eigentlich Charakteristische des Systems ist ein ausser den v




Fig. 150. MEXTER-SHOWE's Druckluftsystem.

nannten Anlagen hergestelltes eisernes Rohrnetz, das unterirdisch die durchzieht, und durch welches alle Fäkalien nach einem Centralbassin (P in F)




Fig. 151. LIERNUR'sches System.

von Zeit zu Zeit angesogen werden, um demnächst als Dünger verkauft, Poudrette verarbeitet zu werden.

Der Anfang dieses Rohrnetzes liegt in den einzelnen Aborten. D besteht aus einem Thontrichter, welcher nach unten in ein eisernes Rohr geht. Darzwischen ist ein Syphon mit einer zungenartigen Verlängerung

lateren Trichterwand angebracht, so dass derselbe auch bei geringer Füllung noch einen vollständigen Verschluss gewährt. Ein zweiter Syphon findet sich vor dem Anschluss an die Hauptleitung. Der Wasserverbrauch in den Closets ist beschränkt; es darf gewöhnlich höchstens 1 Liter pro Tag und Kopf zur Reinigung und zum Nachspülen verwandt werden. Gerüche sollen dadurch verhindert werden, dass ein vom Sitztrichter ausgehendes, an einen Schornstein angelehntes und bis über das Dach reichendes Ventilationsrohr die Gase abführt.

Die Haus- und Strassenrohre vereinigen sich mit sogenannten Gefällbrüchen, h. Kniestücken, die ein zu rasches Aspiriren des Inhalts aus einzelnen wenig gefüllten Rohren hindern sollen, zu einem an Strassenkreuzungen unter dem Pflaster gelegenen eisernen Reservoir. An dieses führt täglich einmal eine lokale mobile Luftpumpe; dann werden die Hähne der Strassenrohre geschlossen, das Reservoir dreiviertel luftleer gemacht, darauf die Hähne geöffnet und der Inhalt der Röhren aspirirt. Schliesslich wird der Reservoirinhalt in einen fahrbaren Tender umgefüllt (aspirirt) und dieser fährt nach dem Depot, um die Fäkalien als Dünger abzugeben oder sie zu Poudrette zu verarbeiten.

Die lokale mobile Luftpumpe soll übrigens nach LIERNUR's Plänen später durch eine ausserhalb der Stadt gelegene Centralstation ersetzt werden, von welcher aus feststehende Maschinen die Evacuierung besorgen. Mittelst der letzteren soll dann auch zugleich das Eindampfen der Fäkalien zu Poudrette erfolgen.

Das LIERNUR'sche System scheint sich in solchen Städten für die Beseitigung der Fäkalien bewährt zu haben. Aus ästhetischen Gründen wird das Verbot des Wassereinsatzes bemängelt; ferner stösst auch hier die mangelnde Verwerthung der Fäkalien oft auf Schwierigkeiten. Die besonderen Hauswassercanäle scheinen meist nicht ausgeführt zu werden. Dann aber ist das System vom hygienischen Standpunkt aus zu verwerfen. Und wenn andererseits Hauswassercanäle vorhanden sind, dann stellt die gesonderte Fäkalienentfernung eine unnütze und theure Complication dar.




Fig. 152. Stadttheil mit LIERNUR'schen Canälen.

Ueber die Kosten der verschiedenen Systeme zur Entfernung lässt sich sehr schwer eine Vergleichung aufstellen. Anlagekosten, Betriebskosten, incl. Kosten der Schlammabfuhr, der Platzbedarf für die Reinigungsanlagen, die Regelung der Vorfluth kommen dabei in Betracht. Oft liefert die Rechnung die ersten Betriebsjahre günstige Ergebnisse und erst später ergeben sich Schwierigkeiten, deren Beseitigung viel Unkosten verursacht. Städte an grossen Verläufen und guten Vorfluthverhältnissen sind von vornherein günstiger daran; in anderen Städten auch die gelösten Stoffe beseitigt werden, so entstehen daraus neue Kosten. Nach KRUSE darf man in Ansatz bringen pro Kopf der Bevölkerung und Jahr für:

Berieselung	1,8 bis 2,5 Mk.		
Oxydationsverfahren	0,8 „	2,0 „	(ohne Faulraum)
Chemische Klärung	0,5 „	1,8 „	(ohne Schlammabseitung)
Mechanische Klärung	0,8 „	0,45 „	(„ „ „)
Schlammabseitung	0,1 „	0,7 „	
Desinfektion	0,1 „	0,8 „	

4. Der Kehrriecht und die Thiercadaver.

Dem trockenen Kehrriecht wird bis jetzt selbst in den Städten, welche im Uebrigen ausgezeichnete Einrichtungen zur Entfernung der Abfallstoffe besitzen, sehr wenig Beachtung geschenkt und derselbe wird in primitiver und rücksichtslosester Weise beseitigt. Da aber der Kehrriecht immerhin noch infektiöse Mikroorganismen beherbergen kann, so ist eine nicht zu sorglose Behandlung desselben entschieden indicirt; namentlich ist auf gedeckte Behälter und vorsichtiges Entleeren (event. unter Anfeuchtung) zu halten. Die schliessliche Zerstörung erfolgt am radikalsten durch Verbrennung, die in England vielfach eingeführt ist, event. nach Vermischen mit dem Schlamm der Kläranlagen (s. oben). Die unverbrennbaren Theile sind in praktischer Weise in Leipzig zur Anlage von „Scherbenbergen“ verwendet.

Thiercadaver und nicht verwendbare Theile von Schlachthieren werden nach der Abdeckerei geschafft.

Das Material der Abdeckereien bilden: 1) Die ganzen Cadaver der an Milzbrand, Rotz, Rinderpest, Rauschbrand, Pyämie und Schweinerothlauf gestorbenen Thiere. Diese dürfen nach veterinärpolizeilicher Vorschrift nicht abgehütet sein. 2) Die von Haut und Klauen befreiten Cadaver von Thieren, die an Lungenseuche und Tuberkulose erkrankt waren, oder in denen Finnen und Trichinen gefunden sind. 3) Kranke Organe von sonst noch verwertbaren Schlachthieren, z. B. Lebern mit Echinokokken, perlstüchtige Lungen, Carcinome, Actinomycesgeschwülste u. s. w. 4) Alles confiscirte faule und verdorbene Fleisch verschiedenster Herkunft. 5) Schlachtabfälle von gesunden und kranken Thieren.

In Berlin gelangen jährlich circa 2000 Pferde, 300 Rinder, 2000 Schweine, 500 Schafe auf die Abdeckerei.

Somit sammelt sich in den Abdeckereien offenbar eine Masse äusserst gefährlichen Materials. Von den dorthin geschafften Infektionsquellen aus können sehr leicht Infektionsstoffe wieder zum Menschen gelangen dadurch, dass Theile der Cadaver nachträglich verwertet werden. Namentlich sucht der Abdecker die Häute und Haare zu verkaufen, und es sind hierdurch schon viele Gerber, Wollarbeiter, ferner Roscharbeiter, Tapezierer, Bürstenfabrikanten u. s. w. an Milzbrand und Rotz erkrankt. — Ferner findet eine Verbreitung von Keimen durch die Utensilien und Geräthschaften des Abdeckers, und bei ungenügender

Verwahrung der Cadaver durch Insekten (Fliegen und Bremsen) statt.

Die Abdeckereien belästigen ausserdem die Anwohner oft auf sehr grosse Entfernungen hin durch üblen Geruch, der namentlich dann auftritt, wenn grössere Mengen von Knochen und Häuten langsam an der Luft getrocknet werden.

Da, wo kein öffentliches Schlachthaus und kein Schlachtzwang besteht, giebt es viele heimliche, sogenannte Winkelabdeckereien, die unter dem Namen der Pferdeschlächtereie oder Wurstschlächtereie gehaltenes Vieh aller Art schlachten und verarbeiten. Zuweilen verbergen sich solche Abdeckereien auch unter der Firma einer Leimsiederei, Dünger- oder Seifenfabrik.

Eine Regelung des Abdeckereiwesens und eine völlige und rasche Vernichtung oder sichere Beseitigung der nach der Abdeckerei geschafften Cadaver muss unbedingt verlangt werden. Dies kann geschehen 1) durch tiefes Vergraben an gesicherten Plätzen in mindestens 3 m Tiefe unter reichlichem Zusatz von Aetzkalk namentlich zu den etwa beschmutzten oberflächlichen Bodenschichten; 2) durch Verbrennen in besonders construirten Oefen (z. B. KORR's Verbrennungsofen). Bei beiden Verfahren findet aber keinerlei Verwerthung der Cadaver statt; diese ist bis zu einem gewissen Grade möglich, wenn 3) das Material einer trockenen Destillation mit Auffangen der Produkte unterworfen wird; und noch vollkommener, wenn 4) die Cadaver in besonderen Apparaten mit heissem Wasserdampf behandelt werden. Das geschieht in sogenannten Digestoren, grossen PAPIN'schen Töpfen, in welchen die Cadaver ca. 10 Stunden lang Dampf von mehreren Atmosphären Spannung ausgesetzt werden. Nach beendetem Kochen werden Fett und Leimwasser abgelassen; der Rückstand wurde früher herausgenommen, an der Luft getrocknet und schliesslich zu Düngepulver verarbeitet. Da hierbei starke Gerüche auftraten, wird in den neueren Constructionen (Kafill-Desinfektor von RIETSCHEL & HENNEL und PODEWILS' Apparat) der Rückstand gleich im Digestor in trockenes Pulver verwandelt, indem der Dampf dann nur in einen den inneren Cylinder umgebenden Mantelraum eingelassen wird und der Cylinder von aussen erhitzt, während innen Luft Zutritt. Die Apparate finden am besten im Schlachthof ihre Aufstellung; der weitaus grösste Theil des zu vernichtenden Materials kann dann an Ort und Stelle bleiben.

Ist ein Transport der Cadaver nöthig, so müssen die Karren dicht sein und jedes Durchsickern von Blut u. s. w. muss verhindert werden. Zu empfehlen ist ein Einhüllen der Cadaver in Tücher, welche mit Carbolsäure oder Sublimatlösung angefeuchtet sind.

Litteratur. KÖNIG, Die Verunreinigung der Gewässer, 2. Auflage, 1899. — BLASIUS und BÜSING, Die Städtereinigung in WEYL's Handb. d. Hygiene, 1894. — GERSON, WEYL, VOGEL, Rieselfelder u. landwirthschaftliche Verwerthung der Abfallstoffe, *ibid.* — WEHMER, Abdeckereiwesen, *ibid.* — DUNBAR u. RÖNGLING, Verh. d. Ver. f. öff. Ges., 1898. — GÄRTNER u. HERBERG, *ibid.* 1897. — SCHMIDTMANN, Viertelj. f. ger. Med. u. öff. San., Supplementhefte 1898 u. 1900. — DUNBAR, ZERN, PROSKAUER u. A. in Viertelj. f. ger. Med. u. öff. San., letzte Jahrgänge.

VIII. Leichenbestattung.

Die Leichenbestattung erfolgt bei den heutigen Culturvölkern fast ausschliesslich durch Begraben.

In der beerdigten Leiche tritt zunächst Fäulniss durch Fäulnisbakterien (hauptsächlich Anaëroben) ein, die namentlich vom Darm her einwandern. Demnächst betheiligen sich thierische Organismen und zwar Larven verschiedener Fliegenarten und Nematoden (Pelodera). Namentlich ist eine kleine 2—3 mm lange Fliegenlarve betheiligt, deren leere gelbbraune Puppenhüllen sich oft zu Milliarden in den Särgen finden. Dieselben tragen sehr energisch zur vollständigen Zerstörung und Oxydation der organischen Stoffe bei; durch die lebende thierische Zelle kommt es zu einer der Verwesung gleichen Zerstörung organischer Substanz. — Die thierischen Organismen bedürfen einer gewissen Feuchtigkeit, reichlichen Luftzutritts und einer relativ hohen Temperatur; wo diese fehlen, betheiligen sie sich nicht an der Verwesung.

Die stinkende Fäulniss dauert etwa 3 Monate, selten länger; durch die Kleidung wird sie zuweilen beträchtlich verzögert, nicht dagegen durch den Sarg, der im Gegentheil die Meteorwasser abhält, die dichte Umlagerung der Leiche mit feuchten Bodenschichten hindert und stattdessen einen gewissen der weiteren Zersetzung förderlichen Luftraum garantiert.

Im Wasser und ebenso in einem nassen, Grundwasser führenden Boden tritt zunächst raschere Fäulniss ein, bei welcher fast ausschliesslich Anaëroben betheiligt sind. Eine zweiwöchentliche Wasserleiche ist in der Zersetzung etwa so weit vorgeschritten, wie eine achtwöchentliche begrabene Leiche. Später kommt es aber unter solchen Verhältnissen zu einem Stillstand der Zersetzung und oft zur Leichenwachsbildung.

In einem mässig trockenen, grobporigen Boden von nicht zu hoher Schicht findet die reichlichste Betheiligung der thierischen Organismen und damit möglichst schnelle und vollständige Verwesung der Leiche statt. In Kies- und Sandboden sind Kinderleichen etwa nach 4 Jahren, die Leichen Erwachsener nach 7 Jahren; im Lehm Boden nach 5 resp. 9 Jahren bis auf Knochen und amorphe Humussubstanzen zerstört.

Unter Umständen nimmt die Zersetzung der Leichen im Boden einen abnormen Verlauf; besonders dann, wenn durch irgend welche Einflüsse die Beteiligung der erwähnten thierischen Organismen ausgeschlossen ist. Es kommt entweder zur Mumifikation. Die Leichen sind dann in eine trockene, schwammige, strukturlose Masse verwandelt, die leicht zu Staub zerfällt. Oft sind die Formen scheinbar vorzüglich erhalten.

Mumifikation tritt ein nach Phosphor-, Alkohol-, namentlich aber nach Arsenik- und Sublimat-Vergiftung; ferner in Folge gewisser lokaler Verhältnisse des Friedhofs, nämlich grosser Trockenheit, starker Durchlüftung oder einer niedriger Temperatur des Bodens, so dass sich die thierischen Organismen nicht und die Fäulnisorganismen nur bis zu einem gewissen Grade an der Verwesung betheiligen. Man findet die Mumifikation z. B. im Wüstensand, oder im Kirchhof des St. Bernhard-Hospizes und in tiefen Klostergrüften, dort in Folge der Trockenheit, hier in Folge der Kälte.

Oder es kommt zur Adipocire-(Leichenwachs-)Bildung. Die Leichen werden, nachdem eine kurze Zeit Fäulnis bestanden und die meisten Eingeweide zerstört hat, ganz oder theilweise in eine grauweisse, homogene, leicht zerbröckelnde Masse verwandelt, die auf der Schnittfläche Fettglanz zeigt, sich fettig anfühlt, in der Hitze schmilzt und fast geruchlos ist. Oft ist dieselbe so fest, dass sie beim Anstossen tönt. Die äussere Körperform ist oft wunderbar erhalten, in Haut, Muskeln und Knochen lassen sich mikroskopisch noch Reste der Textur erkennen. Ferner ahmt die Fettsubstanz oft geradezu die Form der betreffenden Texturelemente nach. Chemisch scheinen theils Cholesterin, theils Ammoniak und Kalkseifen, theils freie Fettsäuren vorzuliegen.

Woher das Leichenwachs stammt, ist noch nicht klargestellt; einige Forscher behaupten, es erleide das Fett der Leiche eine eigenthümliche Umwandlung, während die Eiweisssubstanzen verschwinden. Andere folgern aus den mikroskopischen Untersuchungen, dass wirklich eine Fett- und Seifenbildung aus Eiweiss bei der Leichenwachsbildung betheiligt ist.

Auch die Adipocirebildung scheint nur dann einzutreten, wenn die normale Weise wirksamen Organismen, besonders die thierischen, in ihrer Funktion gehemmt sind, und zwar namentlich, wenn dies in Folge von Luftmangel geschieht. Daher findet man die Leichenwachsbildung bei Wasserleichen, in nassem Thonboden, in Cementgruben, in hermetisch schliessenden Särgen, ferner in alten, stark benutzten und offenbar undurchlässig gewordenen Begräbnisplätzen.

Uebt nun ein Kirchhof, in welchem die Verwesung der Leichen in der geschilderten Weise vor sich geht, irgend welchen gesundheitsnachtheiligen Einfluss auf die Anwohner aus? Früher hatte man in dieser Beziehung übertrieben schlimme Vorstellungen. Eine Leiche von Krankheiten sollte von den Kirchhöfen aus übertragen werden und die Leichengase sollten eine starke Belästigung und Gesundheitsgefahr für die Anwohner bedingen. Dementsprechend sind früher sehr strenge Vorschriften über den Abstand der Wohnungen von Kirchhöfen erlassen worden; noch heute wird in Frankreich und in der Rheinprovinz ein Abstand von 100 m gefordert.

Es handelt sich indess bei der Leichenzersetzung um eine einfache Fäulniss und Verwesung organischer Substanz, und zwar ist der Umfang dieses Processes bei geregelter Kirchhofsbetrieb ein relativ geringer und die Zersetzung verläuft so allmählich, dass unmöglich Schädigungen oder Belästigungen daraus resultiren können. Irgend welche specifische giftige, sogenannte Leichengase werden nicht gebildet. Ein übler Geruch macht sich nur in Massengrüften geltend, wie sie in London, Paris, Neapel früher vorkamen, in welche in kurzen Zwischenräumen grosse Mengen von Leichen eingelagert wurden.

Sobald jedoch die Bestattung in einigermaassen geordneter Weise vorgenommen wird, können riechende Zersetzungsgase nicht bemerkbar werden, zumal die Hauptmasse derselben durch den Boden absorbtirt wird. Diese Absorption ist eine so vollständige, dass selbst beim Ausgraben der Leichen fast niemals ein Geruch wahrzunehmen ist.

Infektionen kommen von den begrabenen Leichen aus nicht leicht zu Stande. Die meisten Infektionserreger bleiben, wie experimentell nachgewiesen ist, in der Leiche nicht lange lebensfähig, sondern gehen unter dem Einfluss der wuchernden Saprophyten binnen wenigen Tagen oder Wochen zu Grunde. Einige Infektionserreger können sich freilich länger am Leben halten; so können virulente Tuberkelbacillen noch nach Monaten, vielleicht sogar nach Jahren, in begrabenen Leichen nachgewiesen werden; auch Typhusbacillen sind ziemlich resistent. Für alle diese Erreger ist aber, wie oben (S. 195) ausgeführt wurde, ein Herausgelangen aus der Tiefe des Grabes an die Bodenoberfläche nicht möglich, es sei denn in seltensten Fällen durch Vermittelung von Thieren wie Ratten, Maulwürfen u. dergl. — Damit stimmt überein, dass in der That keinerlei gut beglaubigte statistische Belege für eine höhere Morbidität oder für eine gesteigerte Frequenz infektiöser Erkrankungen unter den nahe an Kirchhöfen wohnenden Menschen vorliegen.

Zuweilen kann durch die Verwesungsprodukte eine Verunreinigung des Grundwassers erfolgen. Bei zahlreichen Untersuchungen zeigten indess die Kirchhofsbrunnen weniger Verunreinigungen, als die sonstigen städtischen Brunnen. Ausserdem ist eine Verschleppung von Infektionserregern auf längere Strecken bei dichtem Boden ganz ausgeschlossen, bei lockerem Geröllboden sehr erschwert. Immerhin wird man ein Grundwasser zum Wasserbezug vermeiden, welches in einer gewissen nahen Berührung mit Begräbnissplätzen steht. Auch ist zu beachten, dass Sandadern in einem Leimboden geradezu drainirend wirken und die Verwesungsprodukte, die in einem solchen Boden ge-

t sind, in relativ grosser Menge den in der Richtung des Gefälles einen Brunnen zuführen können.

Es lassen sich somit alle Gesundheitsschädigungen und Störungen durch Begräbnisplätze leicht vermeiden, wenn sie nach folgenden Vorschriften angelegt und betrieben werden: Das Terrain soll möglichst frei liegen, plateauartig sein. Sand-, der eventuell mit etwas Lehm gemengt ist, bietet die günstigsten Bedingungen. Das Grundwasser soll wenigstens 3 m mittleren Abstand der Bodenoberfläche haben und der maximale Grundwasserstand genau bekannt sein. Wohnhäuser sollen mindestens 10 m Abstand von Begräbnisplätzen haben, Brunnen mindestens 50 m, wenn das Niveau des Grundwassers nach dem Brunnen hin gerichtet ist.

Als richtige Grösse der Gräber wählt man eine Länge von 2 m, eine Breite von 100 cm; 60 cm entfallen auf die Zwischenräume, im Ganzen also 4 qm für das Grab eines Erwachsenen und 2 Kindergräber. — Die Tiefe des Grabes sei 6 Fuss; an manchen Orten hat man 4 Fuss als vollkommen ausreichend gefunden. Die Gräber sollen nicht zu dicht sein, eventuell durchbohrte Wände haben. Es ist wohl vorgeschlagen, Kochsalz und Weinsäure in den Sarg zu legen, um die Bakterien und die Fäulnis möglichst zu hemmen und Schimmelpilze zu begünstigen; letztere sind aber für die Verwesung einflusslos, und es ist daher dieses Verfahren zu widerrathen.

Als Begräbnissturnus ist für die Erwachsenen eine Frist von 10 Jahren, für Kindergräber eine Frist von 5 Jahren einzuhalten; die Frist ist der Turnus zweckmässig im Einzelfalle je nach den lokalen Verhältnissen zu bestimmen. Eine Bebauung alter Kirchhöfe darf in der Regel erst 40 Jahre nach dem Schluss der Bestattungen erfolgen; kürzere Frist, von etwa 20 Jahren, würde jedenfalls ausreichend sein. Auf dem Kirchhof ist eine Leichenhalle anzulegen. In den Wohnungen der Armen ist eine Aufbewahrung der Leichen bis zum Begräbnis schlechterdings unmöglich, wenigstens nicht ohne grosse Störung der Umwohner, ausserdem auch nicht ohne Gefahr, da Reinigung und Desinfektion der Wohnung nicht eher zu erfolgen kann, als bis die Leiche fortgeschafft ist. Contagiöse Leichen sind in der Regel, die mit Carbollösung oder Sublimatlösung befeuchtet sind, zu vernichten (vergl. Kap. X.). Um den Geruch, der sich bei rascher Zersetzung entwickelt, zu hindern, wird der Sarg zweckmässig mit Holzspänen oder Holzkohlenkleie gefüllt.

Die Leichenhalle, zu deren Benutzung der Arzt nach Möglichkeit herangezogen werden soll, muss ein gefälliges Gebäude mit würdiger dekorativer Ausstattung darstellen. Dort lassen sich auch elektrische Klingeln mit

den Leichen in Berührung bringen, deren Kontakte bei der geringsten Bewegung ausgelöst werden und welche somit gegen das (im grossen Publikum hartnäckig, obwohl grundlos, gefürchtete) Lebendig-Begrabenwerden Schutz gewähren.

Ferner ist sehr empfehlenswerth eine Bepflanzung des Kirchhofes; wo möglich sollen parkartige Anlagen geschaffen werden. Die Kirchhöfe können dann beliebte Spaziergänge werden und befriedigen gleichzeitig das Bedürfniss nach in der Stadt gelegenen öffentlichen Gärten. Jedenfalls sollten alte, nicht mehr benutzte Friedhöfe in dieser Weise Verwendung finden.




Fig. 153. SIEMENS'scher Leichenverbrennungssofen.

a Canal für das Gaserzeuggas, b Canal für Luft, A Vorwärmkammer, Z Ziegelmaterial, B Verbrennungskammer, t Thür, r Thonrost, s Gefäss für die Asche, C Versenkung.

Neuerdings wird vielfach die Frage angeregt, ob es nicht besser sei, die Leichen zu verbrennen.

Wir haben hierfür das Beispiel der meisten alten Völker, namentlich der Inder, die seit Jahrtausenden ihre Leichen verbrennen. Allerdings wurde früher immer eine sehr unvollständige Verbrennung erzielt, die für unsere jetzigen Verhältnisse unannehmbar sein würde. Die ganze Frage ist neuerdings erst discutirbar geworden, seit geeignete Verbrennungsöfen construirt sind. Dieselben beruhen gewöhnlich auf der SIEMENS'schen Regenerativ-Feuerung, bei welcher hoch erhitze Luft den Verbrennungsgasen zugeleitet wird. Es entsteht dabei eine ausserordentlich intensive Hitze und sehr rasches Austrocknen der Leichentheile, und nach einer Zeitdauer von etwa 2 Stunden (abgesehen von 3-4stündigem Vorwärmen) hinterbleibt nur Asche mit relativ wenig Kohle gemengt. Die Asche der verbrannten Leichen soll eventuell in Urnen in eigenen Hallen aufgestellt oder auf Urnenfeldern begraben werden.

Fig. 153 illustriert den Vorgang der Verbrennung in einem SIEMENS'schen Ofen genauer. Aus dem Gaserzeuger (Generator) wird durch den Canal a das

is zugeleitet, durch den Canal *b* Luft; die an der Vereinigungsstelle entstehende Flamme erhitzt das in der Kammer *A* gitterartig aufgeschichtete Ziegelmateriel *Z* zur Weissgluth, und dringt dann in die Kammer *B*, die bis zur schwachen Rothgluth vorgewärmt wird. In *B* wird die eingeschobene Leiche zuletzt vorgewärmt und ausgetrocknet. Dann wird die Gaszufuhr geschlossen, und nur Luft, die beim Durchstreichen durch das Ziegelmateriel bis nahe zur Weissgluth erhitzt ist, zugeleitet. Diese bewirkt dann schnellste Verbrennung.

Vielfach wird behauptet, die Leichenverbrennung sei vom sanitären Standpunkt aus zu befürworten. Dies ist entsprechend den vorstehend gegebenen Ausführungen nicht richtig; wenn vielmehr etwas zur Annahme einer fakultativen Leichenverbrennung führt, so ist es einmal die genauere Erkenntniss der Zersetzungs Vorgänge der begrabenen Leichen, die wohl im Stande ist, eine Neigung gegen diese Art der Bestattung zu erzeugen; vor Allem aber die Schwierigkeit, in der Nähe grosser Städte ohne übertriebenen Kostenaufwand ein nöthiges Areal für Begräbnissplätze zu finden. Bei der Ausdehnung der grossen Städte werden die Kirchhöfe immer weiter hinausgedrängt; schliesslich aus, wie dies jetzt schon in London und Paris geschieht, die Beförderung der Leichen mittelst Eisenbahn erfolgen und selbst die Begleitung der Leichen, schweige denn der häufigere Besuche der Gräber, ist für viele Angehörige zu kostspielig. Grosse Städte haben aus diesem Grunde entschieden Interesse an der Zulassung der fakultativen Leichenverbrennung. — Von juristischer Seite wird gegen letztere wohl eingewendet, dass eine spätere Untersuchung der Leichen auf Gifte u. s. w. alsdann unmöglich sei, und dass dadurch den Verurtheilten Vorschub geleistet werden würde. Diesem Einwand kann dadurch begegnet werden, dass die Erlaubniss zur Verbrennung von einer möglichst vollständigen Leichenschau und einem Fehlen aller Verdachtsmomente abhängig gemacht wird.

Litteratur: SCHUSTER, Beerdigungswesen, in v. PETTENKOPF'S u. v. ZIEMSSER'S Handb. d. Hygiene, 1882. — HOFMANN und SIEGEL, Die hygienischen Anforderungen an Friedhöfe, Verhandl. des Deutsch. Ver. f. öff. Ges. 1881, Viertelj. öff. Ges., Bd. 14, Heft 1. — PETRI, Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamt, Bd. 7. — GRÖNFELD und GRANDHOMME, Viert. f. ger. Med. 1891. Suppl. — WERNICH, Leichenwesen, WEYL'S Handb. d. Hygiene, 1895.

IX. Besondere bauliche Anlagen.

Ganz besondere Beachtung erfordert die richtige Anwendung der in den vorstehenden Kapiteln begründeten hygienischen Principien in den Fällen, wo eine grössere Anzahl von Menschen in gemeinsamen Verhältnissen untergebracht und hier der Fürsorge Anderer anvertraut werden, z. B. in Schulen, Waisenhäusern, Kasernen, Gefangenanstalten, Krankenhäusern, Irrenanstalten, Armenhäusern u. s. w. — Hier seien speciell nur Schulen und Krankenhäuser hervorgehoben, mit deren hygienischen Einrichtungen jeder Arzt einigermaassen vertraut sein

muss. Betreffs der übrigen Anstalten, die nur in speciellen Fällen das Interesse des Arztes in Anspruch nehmen, muss auf die untercitirte Litteratur verwiesen werden.

I. Schulen.

Da der Staat von den Eltern verlangt, dass sie ihre Kinder der Schule anvertrauen, so darf man erwarten, dass die Kinder in der Schule von keinen Gesundheitsstörungen bedroht werden. Es ist daher zu fordern, dass die Schulhäuser so gebaut sind, dass sie jedem Kinde genügend Licht, normale Temperatur und normale Luftbeschaffenheit gewähren; dass ferner das Mobiliar und die Utensilien der Schulzimmer ohne Beeinträchtigung der Gesundheit benutzbar sind; dass der Betrieb der Schule die körperliche und geistige Entwicklung der Schüler nicht schädigt; und dass in der Schule keine Verbreitung von contagiosen Krankheiten stattfindet.

Nicht immer entsprechen die Schulen diesen Forderungen; vielmehr sind zahlreiche Gesundheitsstörungen bei Schülern beobachtet, die durch den Schulbesuch hervorgerufen oder doch wesentlich unterstützt werden. Zu diesen gehört:

1) Die habituelle Skoliose. Im Ganzen ist dieselbe nicht so häufig, als man früher angenommen hat; auch entwickelt sich die Krankheit nur bei einer gewissen individuellen Disposition, und wird namentlich bei Mädchen durch Handarbeiten ausserhalb der Schule wesentlich unterstützt. Ein gewisser Einfluss der Schule ist aber oft unverkennbar. Fast stets handelt es sich um eine solche Verbiegung der Wirbelsäule, dass deren Convexität nach rechts gerichtet ist, und diese entspricht gerade der bei schlechten Subsellien zu Stande kommenden Körperhaltung. Bei einem weiten Abstand des Sitzes vom Tisch, bei zu grosser Höhe des Sitzes und unrichtiger vertikaler Entfernung der Tischplatte vom Sitz ist ein Schreiben in gerader Haltung des Körpers völlig unmöglich, zumal wenn eine rechtsschiefe Schrift gelehrt wird und die Beleuchtung mangelhaft ist. Der Oberkörper muss sich dann vielmehr nach vorn und links neigen, die rechte Schulter wird gehoben, die linke gesenkt und vorgeschoben; die Muskeln müssen angestrengt werden, um den Körper in dieser Lage zu halten, und durch Aufstützen der Brust oder des linken Armes auf die Tischplatte sucht das Kind sehr bald die ermüdenden Muskeln zu entlasten. Dabei kommt dann eine solche Verschiebung der Einzelschwerpunkte der oberen Körpertheile zu Stande, dass eine entsprechende Verbiegung der Wirbelsäule die Folge ist.

2) Die Myopie. Nachweislich treten die Kinder mit hyperopischen oder emmetropischen Augen in die Schule ein. Es ist statistisch festgestellt, dass die Myopie mit der Dauer des Schulbesuches zunimmt, den Gymnasien am häufigsten und hochgradigsten wird, in den Volksschulen viel seltener und geringfügiger auftritt (H. COHN). Zu hochgradiger Myopie kann sich später geradezu eine Abnahme des Sehvermögens gesellen.

Zur Entstehung der Myopie der Schulkinder disponirt vielleicht zu einem geringen Theil Rassendisposition und der Knochenbau des Gesichtsschädels (niedere Augenhöhlen), zu einem weit grösseren Theil erbliche Veranlagung. Zur Ausbildung kommt die Myopie aber hauptsächlich durch ungelungene Beleuchtung und die oben geschilderte schlechte Körperhaltung beim Lesen und Schreiben. Der Kopf des in Folge unzureichender Subsellien vorn über gebeugten Oberkörpers muss sich bei ungenügender Beleuchtung tief senken und das Auge der Tischplatte zu nahe nähern; das Auge muss daher fortdauernd forcirt für die Nähe accommodiren, die Sehaxen convergiren übermässig, die Blutcirculation im Bulbus wird gestört, und diese Momente scheinen dahin zusammenzuwirken, dass Dehnungszustände in der Nähe des hinteren Pols entstehen und eine Verlängerung der sagittalen Bulbusaxe eintritt.

Zweifellos können auch schlechte Beleuchtung und unzureichendes Licht im Hause, ferner feine Handarbeiten u. s. w. die Ausbildung der Myopie unterstützen. Es kommt aber darauf an, dass die Schule keinesfalls an einer solchen Gesundheitsstörung ursächlich theilnimmt, und dass vorsichtige Eltern, die für ihr Kind im Hause auf's Geissenhafteste sorgen, nicht in der Schule Gefahren für dasselbe entdecken müssen.

3) Stauung des Blutabflusses aus Kopf und Hals, in Folge dessen häufiges Nasenbluten und vielleicht auch der zuweilen beobachtete Schulkopf werden als eine weitere Consequenz der oben geschilderten Körperhaltung aufgefasst.

4) Erkältungskrankheiten treten namentlich bei schlechten Heizrichtungen, bei stark strahlenden Heizkörpern, in überhitzten oder ungenügend erwärmten Schulzimmern und bei unzureichenden Lüftungsrichtungen auf.

5) Ernährungsstörungen und nervöse Ueberreizung kommen bei Schulkindern zur Beobachtung, wenn dieselben zu anhaltendem Lernen und zu einer im Verhältniss zu ihren Anlagen übermässigen geistigen Anstrengung gezwungen sind. Es lässt dann der Appetit nach, die Ernährung wird unzureichend, und im kindlichen Alter treten

daraufhin ausserordentlich schnell anämische Erscheinungen und abnorme Reizbarkeit hervor.

6) Contagiöse Krankheiten, namentlich die akuten Exantheme, Diphtherie, Keuchhusten u. s. w. werden nachweislich häufig in der Schule acquirirt. Das ist leicht verständlich, wenn man bedenkt, dass die Kinder oft noch mehrere Tage die Schule besuchen, nachdem sie bereits an einer contagiösen Krankheit erkrankt sind, dass sie ferner noch häufiger mit Krankheitserregern auf den Schleimhäuten und mit gar nicht oder ungenügend desinficirten Kleidern in die Schule zurückkommen, nachdem sie eine contagiöse Krankheit überstanden haben. Die Ansteckung erfolgt bei den Kindern um so eher, als unter ihnen fortwährende Berührungen stattfinden. Ausserdem lösen sich bei den lebhaften Bewegungen der Kinder leicht die eingeschleppten Keime von den Kleidern ab und verbreiten sich in der Luft, die stets grosse Mengen solchen Kleiderstaubes zu enthalten pflegt.

Angesichts dieser zahlreichen, von der Schule begünstigten Gesundheitsstörungen werden mit Recht eine Reihe von hygienischen Maassregeln zum Schutze der Schulkinder verlangt. Dieselben betreffen theils die baulichen Einrichtungen des Schulhauses, theils das Mobiliar und die Utensilien, theils den Betrieb der Schule.

A. Bauliche Einrichtungen.

Das Schulgebäude soll wo möglich nicht in zu grossen Dimensionen angelegt werden, am besten nur aus zwei Stockwerken bestehen. Der Bauplan ist im Allgemeinen an das Corridorsystem gebunden; es ist aber dahin zu streben, dass der Corridor an der einen Längsseite des Gebäudes angelegt wird, an der anderen Seite die Klassenräume; ein Corridor zwischen zwei Reihen Zimmern ist in Bezug auf Licht- und Luftzufuhr erheblich ungünstiger, wird aber der Billigkeit wegen häufig projectirt und ausgeführt. — Mit Bezug auf die Himmelsrichtung ist eine Lage der Fenster nach Osten zu vermeiden wegen des zur Zeit der Schulstunden weit in's Zimmer einfallenden Sonnenlichts, das die verschiedenen Plätze sehr ungleich mit Licht und Wärme versorgt und theilweise blendend wirkt. Die Richtung gegen Süden ist weniger ungünstig, weil die Sonnenstrahlen namentlich im Sommer nicht so tief in's Zimmer einfallen. Die Lage nach Westen oder Nordwesten ist zulässig, wenn am späteren Nachmittag kein Unterricht gehalten wird. Das angenehmste Licht liefert die Lage gegen Norden, aber ausreichend nur dann, wenn die Lage des Gebäudes eine freie ist.

Die einzelnen Schulzimmer sollen höchstens 9—10 m lang sein, weil bei grösserer Länge das Sehen der Tafel und die Ueberwachung der Schüler auf Schwierigkeiten stösst. Die Tiefe der Zimmer wird gewöhnlich auf höchstens 7 m normirt; doch ist dieses Maass ganz abhängig zu machen von photometrischen Bestimmungen. Die Höhe soll $3\frac{1}{2}$ bis höchstens $4\frac{1}{2}$ m betragen; bei grösserer Höhe wird über eine starke Resonanz geklagt. Der maximale Cubikraum eines normalen Schulzimmers berechnet sich demnach auf 250—300 cbm. — Es ergibt sich aus dieser Maximalziffer zugleich die höchste Zahl an Schülern, welche ohne Nachtheile in einem Schulzimmer überhaupt untergebracht werden können. Nach den im Kapitel „Ventilation“ gegebenen Berechnungen muss man für jüngere Schüler 4—5, für ältere 6—7 cbm Luftraum oder 1 qm, resp. 1.5 qm Bodenfläche annehmen. Demnach darf ein Normalzimmer von maximalen Dimensionen nicht mehr als 50 Kinder im Durchschnitt aufnehmen.

Die Wände des Zimmers sind mit hellgrauer Oel- oder Leimfarbe zu streichen; wo möglich soll wenigstens ihr unteres Drittel abwaschbar sein. — Der Fussboden soll aus hartem Holz, das mehrfach mit einem Leinöl getränkt ist, möglichst gut gefugt sein und Oel- oder Lackanstrich erhalten, oder mit einem der neuerdings empfohlenen, gegen Staubentwicklung schützenden Oelpräparate „Dustless“, „Staubstopp“, „Sternolit“ imprägnirt sein; ungestrichener Fussboden muss wenigstens so beschaffen sein, dass er sich leicht mit feuchten Lappen oder feuchten Sägespänen reinigen und staubfrei machen lässt.

Lichtöffnungen. Keinesfalls darf seitliches Licht von der rechten Seite der Schüler her einfallen, da sonst der Schatten der schreibenden Hand auf das Papier fällt und eine zu starke Annäherung des Auges nöthig ist, um noch den Contrast zwischen den Buchstaben und dem relativ dunklen Papier wahrzunehmen. — Ebenso wenig soll das Licht von hinten her einfallen; es wirft dann der Kopf einen Schatten auf das Papier, und ausserdem wird der Lehrer durch eine solche Beleuchtung geblendet und an der Ueberwachung der Schüler gehindert. Nur bei sehr hohen Fenstern und kurzen Klassen ist Beleuchtung von oben zulässig, weil dieselbe dann mehr den Charakter des Oberlichts bekommt. — Beleuchtung von vorn ist ebenfalls unstatthaft, weil sie die Schüler geblendet und z. B. an dem Lesen der Tafel gehindert werden. — Auch bilaterales Licht ist unrichtig, sobald nicht das rechte seitige Fenster sehr stark zurücktreten; denn es kommt dann immer zu einem deutlichen Schatten der Hand auf dem Papier, und zwar bei den am weitesten rechts sitzenden Schülern am stärksten.

künstliche Beleuchtung der natürlichen mit Tageslicht dadurch ähnlicher machen, dass man mittelst unter den Lampen angebrachter Reflektoren ein Licht in diffuses verwandelte, indem man es zwang, zunächst an die obgewiesene Decke des Raums und von da in die unteren Partien des Raums ausstrahlen (indirecte Beleuchtung). Bei den ersten Einrichtungen dieser Art ging viel Licht verloren; vortheilhafter ist der Oberlichtreflektor von LABOWSKI (SIEMENS & HALSKE), bei welchem das Licht nicht gegen die Zimmerdecke, sondern auf einen grossen mattweissen Reflektor geworfen wird und von da in den Raum gelangt.

Die Heizung. Bezüglich der Heizung ist zu verlangen, dass die Temperatur während der ganzen Schulzeit und auf allen Plätzen des Schulzimmers nur zwischen 17 und 20° schwankt. Diese Forderung findet man jedoch sehr selten erfüllt; niemals bei den gewöhnlichen Anlagen, die stets eine ausserordentlich verschiedene Vertheilung der Wärme verursachen, ferner auch nicht bei schlecht betriebener Luftheizung. Für kleinere Schulen erweist sich als am besten geeignet eine Lokalheizung (gl. S. 390), event. mit Gasöfen (S. 392). Grössere Schulen sind regelmässig mit combinirter Centralheizung, und zwar Luftheizung und Wasserheizung oder Niederdruckdampfheizung zu versehen; bei der Anlage und dem Betrieb der Luftheizung sind alle oben (S. 397) angeführten Vorsichtsmaassregeln genau zu berücksichtigen.

Ventilation. Eine gute Ventilation der Schulräume ist besonders nöthig, weil sie die Entwärmung und die Wasserdampfabgabe für Kinder ausserordentlich erleichtert, dadurch Wärmestauung verhindert und die Kinder frisch erhält. Ausserdem gelangen bei starker Umluft der Schulklassen relativ grosse Mengen gasförmiger Verunreinigungen in die Luft, so dass beim Betreten des Zimmers Betäubung und Ekelgefühl entsteht. — So viel als möglich ist die Reduktion von übermässiger Wärme und von Verunreinigungen in der Luft zu hindern; es ist dafür zu sorgen, dass die Mäntel der Kinder ausserhalb des Schulzimmers bleiben, insbesondere bei nassem Wetter; ferner sind die Schulbäder in möglichster Verbreitung einzuführen. Die Heizvorrichtungen müssen gut regulirt werden und sind derart zu behandeln, dass kein Staub und keine üblen Gerüche durch sie geliefert werden. Luftheizungsanlagen, deren Heizkammern und Kaloriferen nicht regelmässig gereinigt werden können, sind durch sie zu verwerfen.

Im Uebrigen sind die Ventilationseinrichtungen im Winter mit der Heizung zu verbinden in der S. 412 geschilderten Weise. Für den Winter sind herabklappbare obere Fensterscheiben, jedoch nur mit solchen Schutzblechen zu benutzen, oder Aspirationskammine, in welchen gewöhnlich durch den Wind, an windstillen Tagen aber durch

Lockfeuer (Gasflammen) resp. Wasserventilatoren der nöthige Antrieb erzeugt wird. Sehr wichtig ist zur Beseitigung der producirtten Wärme und Luftverunreinigung gründliche Lüftung des Schulzimmers durch Oeffnen von Fenster und Thür in jeder Pause zwischen zwei Unterrichtsstunden. Wo diese Vorschrift aufmerksam befolgt wird, ist eine Ventilation während der Stunden kaum mehr erforderlich.

Ueber Abortanlagen siehe S. 460.

B. Mobiliar und Utensilien.

Subsellien. Schulbänke, welche Lesen und Schreiben bei gerader Haltung des Oberkörpers gestatten, müssen:

1) Richtige Distanz haben, d. h. richtige horizontale Entfernung des vorderen Bankrandes vom inneren Tischrand. Ist diese Distanz




Fig. 154. Schulbank.

b Minusdistanz. a Nulldistanz. c Plusdistanz. a—d Differenz.

positiv, wie bei den alten Schulbänken, so ist ein Vorbeugen des Oberkörpers unausbleiblich. Die Distanz soll vielmehr gleich Null, oder schwach negativ, z. B. — 2,5 cm, sein (in Fig. 154 ist Nulldistanz vorhanden, wenn der vordere Bankrand bis a vorragt; Plusdistanz, wenn derselbe nur bis c reicht; Minusdistanz, wenn er bis b vorgeschoben ist). Nulldistanz findet man bei der von FAHRNER construi-

ten Schulbank, Minusdistanz bei allen neueren Constructionen von BUCHNER, COHN, KUNTZE, KAISER u. s. w.

Die Minusdistanz bringt den Nachtheil mit sich, dass die Schüler nur schwer in die Bank hinein und aus derselben heraus kommen und dass sie auf ihrem Platz nicht aufstehen können. Um dies zu ermöglichen, macht man die Bänke nur zweisitzig, so dass die Kinder, wenn sie aufgerufen werden, neben die Bank treten können. Da dieses Arrangement aber in vielen Fällen unausführbar ist, weil es zu viel Platz erfordert, so wird

entweder die Tischplatte zurückklappbar hergestellt und zwar der Länge nach getheilt, so dass das untere Drittel aufgeklappt und event. auch als Lesepult verwendet werden kann (FAHRNER, COHN); die Charniere werden jedoch leicht verdorben;

oder die Tischplatte ist verschiebbar; wird sie eingeschoben, ist eine Plusdistanz von 10 cm vorhanden, so dass ein Aufstehen bequem möglich wird. Im ausgezogenen Zustande dagegen resultirt eine Minusdistanz bis 5 cm (KUNTZE, Olmützer, Wiener Bank). Es entstehen leicht Betriebsstörungen ein, namentlich ist sehr gut getrocknetes Holz zur Anfertigung erforderlich.

Oder besser werden die Sitze beweglich eingerichtet. Früher construirte man die Sitze aufklappbar; jetzt werden dieselben entweder drehbar hergestellt, oder nach dem Muster der KAISER'schen und der WPAUF'schen Bank, wo eine Leiste nahe dem Boden den Drehpunkt für eine Vor- und Rückwärtsbewegung der Einzelsitze resp. des Sitzes bildet. Beim Aufstehen erhält der Sitz einen Stoss, der ihn nach hinten bewegt, beim Niedersitzen ist der Sitz vorzudrücken.

2) Richtige Differenz, d. h. richtiger vertikaler Abstand des oberen Tischrandes von der Bank (Fig. 154 *a—d*). Der zum Schreiben mit dem Ellbogen gebeugte und etwas nach vorn geschobene Vorderarm soll ohne Hebung oder Senkung der Schulter auf die Tischplatte zu liegen kommen; also muss die Differenz gleich sein der bei frei herabhängendem Arm gemessenen Entfernung von der Bank bis zum Ellbogen mit einem Maass, das der Höherlage desselben beim Vorschieben zum Schreiben entspricht; dieses Maass ist zu 2 cm bestimmt. Im Ganzen beträgt die Differenz bei Knaben etwa 15 Procent, bei Mädchen 16 Procent der Körperlänge (bei letzteren etwas mehr wegen der dickeren Unterlage von Kleidung), z. B. für eine Körperlänge von 110—120 cm = 17 cm, von 121—131 cm = 18.5 cm, von 132—142 cm = 20 cm, von 143—153 cm = 21.5 cm.

3) Richtige Höhe des Sitzes. Ist der Sitz zu hoch, so setzt sich das Kind auf die vordere Kante der Bank und lehnt sich nach hinten, um mit den Füßen den Boden zu erreichen. Es soll jedoch in gerader Haltung des Oberkörpers der Fuss mit ganzer Sohle auf dem Boden oder dem Fussbrett ruhen; daher muss die Sitzhöhe der Länge des Unterschenkels vom Hacken bis zur Kniebeuge entsprechen. Diese beträgt etwa $\frac{2}{3}$ der Körperlänge, aber mit einer kleinen Progression fortschreitend, für 110—120 cm Körperlänge = 33 cm, für 121—131 cm = 36.5 cm, für 132—142 cm = 40 cm, für 143—153 cm = 44 cm. Das Sitzbrett wird entweder geschweift oder erhält besser eine schwache Neigung nach hinten, so dass es dort einen Centimeter höher steht als vorn.

4) Richtige Lehne. Die beste Stütze des Oberkörpers wird erreicht durch eine Kreuzlehne, d. h. ein schmales Brett, welches sich

nur in der Höhe des Kreuzes hinzieht; oder aber durch eine geschweifte, im Kreuz vorspringende und oben zurückweichende Rückenlehne. Bei einer geraden Rückenlehne schwebt gerade der untere Theil der Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäule frei zwischen Stütze und Bank. Neuerdings werden auch Schulbänke construirt (SCHENK, LORENZ u. A.) mit stark zurückweichender Rückenlehne und lehnsesselartigem Sitz, so dass der ganze Oberkörper in allen Theilen gestützt wird. Es scheint bei dieser Stellung eine noch geringere Muskelanstrengung erforderlich zu sein, als bei Anwendung einer Kreuzlehne.

5) Die Tischplatte soll einen horizontalen Theil enthalten, der die Tintenfässer aufnimmt und 10 cm breit gerechnet wird. Der vordere Theil soll geneigt (und zwar 1:5 bis 1:4) und 35—40 cm breit sein. Für den Platz eines Kindes sind nicht unter 50 cm, bei grösseren Kindern nicht unter 60 cm Banklänge zu rechnen.

Da die Differenz und die Sitzhöhe der Subsellien nach der Grösse der Kinder bemessen werden muss, da aber in derselben Klasse gewöhnlich Kinder von sehr verschiedener Körpergrösse sitzen, so ist vom hygienischen Standpunkt aus unbedingt erforderlich, dass die Kinder einigermassen nach ihrer Körpergrösse gesetzt werden, und dass sie den Platz auf der für sie passenden Bank einmal behalten. Das Setzen nach dem Ausfall der Censuren oder gar das Certiren ist mit diesen Forderungen der Hygiene nicht in Einklang zu bringen.

Schulutensilien. Als Wandtafeln sollen weisse Tafeln mit schwarzer Schrift benutzt werden; oder wenigstens mattschwarze, event. mit Schieferüberzug versehene Tafeln, auf welchen mit weicher weisser Kreide geschrieben wird. Bei einem Schulzimmer von 9 m Länge sollen die an der Tafel geschriebenen Buchstaben eine Höhe von mindestens 40 mm haben. — Schulbücher sollen ein rein weisses oder höchstens schwach gelbliches, von Holzstoff möglichst freies Papier haben von mindestens 0.075 mm Dicke. Die Grösse der Buchstaben ist so zu bemessen, dass das *n* nicht unter 1.5 mm hoch und dessen Grundstrich mindestens 0.3 mm breit ist; die Approche soll derart sein, dass 5—6 Buchstaben auf einen Centimeter kommen, der Durchschuss (Raum zwischen zwei Zeilen) soll 2.5—3.2 mm betragen. Nach H. COHN prüft man, ob ein Schulbuch den hygienischen Anforderungen bezüglich des Drucks entspricht, am einfachsten dadurch, dass man ein Stück Papier mit einer 1 qcm grossen Oeffnung auf die Zeilen legt; es dürfen dann nicht mehr als 2 Zeilen sichtbar sein. — Die Schiefertafeln der Kinder sollen sobald als möglich durch Papier und Tinte

ersetzt werden, da allgemein brauchbare weisse Tafeln und dunkle Stifte noch nicht existiren. Tintenbuchstaben gleicher Grösse verhalten sich in Bezug auf ihre Wahrnehmbarkeit zu den auf der Schiefertafel geschriebenen Buchstaben wie 4:3, mit Bleistift geschriebene Buchstaben zu den letzteren wie 8:7.

Ein Nachtheil liegt in der jetzt noch fast überall gelehrtten rechts-schiefen Currentschrift und in der schiefen Rechtslage des Schreibheftes. Bei ganz gerader Körperhaltung erscheint eine gerade mediane Lage des Heftes (vor der Mitte des Körpers) und eine Schrift von links oben nach rechts unten, oder wenigstens eine gerade Rechtslage des Heftes und eine fast senkrechte Schrift als die natürlichste. Rechts-schiefe Schrift ist bei medianer Lage des Heftes nur mit ermüdender Biegung des Handgelenks möglich; bei gerader Rechtslage des Heftes und noch mehr bei schiefer Rechtslage nur unter Verdrehung des Kopfes und des Oberkörpers oder der Augen derart, dass die Verbindungslinie der Drehpunkte beider Augen schliesslich parallel zur Zeilenrichtung verläuft.

Ferner ist ein möglichst ausgedehnter Gebrauch der deutlicher wahrnehmbaren lateinischen Lettern wünschenswerth.

Neuere Behauptungen über den Gehalt der Schultinte an pathogenen Bakterien beruhen durchaus auf Irrthümern. Die gebräuchlichen Tinten enthalten keine oder nur unverdächtige Keime.

C. Betrieb der Schulen.

Für die äussere Instandhaltung der Schule muss ein genügendes und sachverständiges Personal vorhanden sein. In sehr vielen Schulen ist dieser Forderung nicht genügt. Ein einziger Schuldiener soll oft in einem grossen Gebäude die Reinigung, Heizung und Ventilation besorgen, Pfortnerdienste verrichten und für Botengänge u. s. w. zur Disposition sein. Die schönsten Bauten und die kostspieligsten Heizanlagen werden durch eine solche falsche Sparsamkeit unbrauchbar gemacht und aller hygienischen Vortheile beraubt, die sie andernfalls gewähren könnten.

Für die Heizung grösserer Schulen, insbesondere für den Betrieb der Centralheizung, ist durchaus ein besonderer Heizer erforderlich (§ 397). — Von grosser Bedeutung ist auch ein ausreichendes Personal für die Reinigung der Schulzimmer, Corridore und Treppen. Dieselbe ist nicht nur vom ästhetischen Standpunkte aus wünschenswerth, sondern entschieden aus hygienischen Rücksichten. Wie oben betont, enthält der Staub der Schulzimmer häufig Contagien und ist stets infektiös-

verdächtig. Es muss daher versucht werden, diesen Staub zu entfernen und stärkere Ansammlungen davon zu vermeiden. Da erfahrungsgemäss durch trockenes Auskehren nur ein sehr kleiner Theil des Staubes wirklich beseitigt, der Rest nur aufgewirbelt wird, sollten alle Räume mit abwaschbarem Fussboden womöglich täglich unter gelinder Anfeuchtung (mit feuchten Sägespänen) gereinigt, und wöchentlich einem gründlichen Abwaschen unterzogen werden. Letzteres muss sich auch auf das Mobiliar und den unteren Theil der Seitenwände erstrecken. Fussbodenanstriche, welche den Staub fixiren (s. S. 497), und bei denen trockenes Abkehren genügt, gewähren eine erhebliche Erleichterung der Reinigung. — Ferner ist dafür zu sorgen, dass die Kinder mit gut gereinigtem Schuhzeug die Schulzimmer betreten. Abtreter und Matten können nicht gross und häufig genug sein.

Auch der sonstige Betrieb der Schule bietet viele Angriffspunkte für die Hygiene, jedoch befinden sich manche der einschlägigen Fragen, z. B. über die zulässige Zahl von Schulstunden, über das richtige Mass der häuslichen Aufgaben u. s. w., noch im Stadium der Discussion. Betont sei die Nothwendigkeit von Zwischenpausen nach jeder Schulstunde; und zwar sind dieselben schon deshalb zu fordern, damit in den Pausen eine gründliche Durchlüftung der Schulzimmer erfolgen kann.

Für die bei Schulkindern auftretenden Ernährungsstörungen sind — neben einer gewissen Entlastung von Schularbeiten — körperliche Uebungen das beste Korrektiv. Turnen, Schwimmen, Spaziergänge oder Spiele im Freien, sei es im Anschluss an die Schule oder in Folge der in der Schule gegebenen Anregung sind am ehesten im Stande, den Appetit wieder zu heben und den Ernährungszustand zu bessern. Wohl zu beachten ist, dass nach neueren sorgfältigen Beobachtungen die körperlichen Uebungen nicht eine Erholung, sondern stärkere Ermüdung des Centralnervensystems bewirken, und dass daher die Einschaltung von Turnstunden zwischen die anderen Unterrichtsstunden durchaus nicht einer geistigen Erholung gleich zu rechnen ist.

Für die Durchführung von Reformen ist eine Prüfung der progressiven geistigen Ermüdung bezw. Uebermüdung wichtig, welche die Schüler während der Schulstunden erfahren. Diese Prüfung kann geschehen: 1) durch das Aesthesiometer (GRIESSBACH). Dasselbe ermittelt, in welchem Abstand zwei Zirkelspitzen auf bestimmten Hautstellen eben noch als getrennt empfunden werden. Bei geistiger Ermüdung wächst dieser Abstand um das 2- bis 4fache und mehr. Die Methode leidet jedoch an zahlreichen Fehlerquellen. 2) Durch Mosso's Ergograph; ein Gewicht, das an einer über eine Rolle gehenden Schnur hängt, wird in gleichmässigem Tempo durch Krümmung des

teifingers, um den die Schnur gelegt ist, gehoben, bis die Hebung nicht mehr gelingt. Nach geistiger Anstrengung ist das Gehirn nicht mehr im Stande, so energisch und anhaltend Willensimpulse zu senden; die Zahl der Hübe verringert sich daher. 3) Die Schüler erhalten am Ende jeder Schulstunde einfache Rechenexempel; es wird beobachtet, wie viel Exempel in 5 Minuten gerechnet werden und wie viel Fehlern. — Bei dieser Messung wird jedoch mit festen Associationen operirt, die noch geläufig sein können trotz erheblicher geistiger Ermüdung. 4) Den Schülern werden 6—10stellige Zahlen zusammen vorgelesen; nach Beendigung des Vorlesens müssen sie auf gegebenes Zeichen die Zahl aus dem Gedächtniss niederschreiben. Die Zahl der Auslassungen und Fehler soll ein Maass der Ermüdung sein. Es wird hierbei jedoch nur die Merkfähigkeit gemessen, die trotz geistiger Ermüdung erhalten sein kann. 5) Prüfung der Combinationsfähigkeit durch sog. Ergänzungsaufgaben (EBBINGHAUS). Schüler erhalten am Ende jeder Schulstunde ein Blatt, auf welchem ein Abschnitt aus einer für das Verständniss des Kindes passenden Erzählung oder Beschreibung abgedruckt ist, jedoch so, dass ganze Worte und zahlreiche Silben nicht ausgedruckt, sondern nur durch gestrichelte Striche (für jede Silbe ein Strich) angedeutet sind. Die Schüler müssen innerhalb 5 Minuten so viel als möglich von diesen Lücken füllen und so richtig als möglich ergänzen. — Die Ermüdung scheint bei Applikation dieser Methode am Besten zum Ausdruck zu kommen. Die gesunde Mehrzahl der Schulkinder lässt nach den bisherigen unzureichenden Beobachtungen eine wesentliche Verringerung der geistigen Leistungsfähigkeit mit der Dauer des Unterrichts nicht erkennen. Wahrscheinlich betrifft die Uebermüdung nur schwächliche, nervöse Kinder, so dass durch eine mehr individualisirende Behandlung dieser eine Beseitigung der Schäden und Klagen erreicht werden könnte. — Die Einrichtung von Hülsschulen oder Hülssklassen für minderwerthige Kinder, wie sie in einzelnen Städten bereits getroffen erscheint, daher sehr empfehlenswerth.

Um die Ausbreitung ansteckender Krankheiten in der Schule zu hindern, haben 1) Kinder und Lehrer, bei welchen sich Verdachtsmomente für den bevorstehenden Ausbruch einer contagiösen Krankheit zeigen (Kopfschmerz, Schwindel, Frösteln, Fieber, Halsschmerzen u. s. w.), den Besuch der Schule zu unterlassen. 2) Sofort nach Ausbruch einer ansteckenden Krankheit ist der Polizeibehörde Anzeige zu erstatten. Die erkrankten Kinder und Lehrer sind für längere Zeit (bei Scharlach 7 Wochen, bei Masern und Diphtherie 4 Wochen, bei Keuchhusten lange krampfartige Hustenanfälle bestehen) vom Schulbesuch auszu-

schliessen, 3) sind auch diejenigen Angehörigen der Erkrankten, welche mit ihnen zusammenwohnen und leicht Infektionskeime verschleppen könnten, für dieselbe Zeitdauer auszuschliessen; 4) ist zu verlangen, dass die Genesenen, resp. deren Angehörige die Schule nicht eher wieder betreten, als bis nachweislich eine vorschriftsmässige Desinfektion der Wohnung und Kleidung durch geschulte Desinfektoren stattgefunden hat; 5) bei stärkerer Ausbreitung contagiöser Krankheiten unter den Kindern einer Klasse ist die ganze Klasse resp. die Schule für einige Zeit zu schliessen und demnächst zu desinficiren; 6) in manchen Fällen wird es von Nutzen sein, wenn die Kinder, welche Diphtherie überstanden haben, während der ersten Tage des Schulbesuchs gleich nach dem Betreten der Schule angehalten werden, dort unter geeigneter Aufsicht eine Desinfektion der Hände mit 3 proc. Carbol, sowie eine Mundausspülung mit Sublimat 1:10 000 vorzunehmen. Die Maassregel erfordert nur 2—3 Minuten Zeit und beseitigt einen wesentlichen Theil der Infektionsgefahr. — Auch die vorläufige Separation solcher Kinder auf einer „Reconvalescenten-Bank“ würde von Vortheil sein. 7) Bezüglich der phthisischen Lehrer und Kinder s. Kap. X.

Mehrere dieser Maassregeln, insbesondere die Ausschlussbestimmungen, sind zum Theil insufficient, zum Theil übertrieben. Bei Diphtherie und Masern dauert die Lebensfähigkeit der Keime länger als die oben angegebene Ausschlussfrist; die Desinfektion in den Häusern der Erkrankten ist oft mangelhaft und entzieht sich der Controle; bei Keuchhusten dagegen scheint gerade im Stadium der krampfartigen Anfälle keine Ansteckung mehr stattzufinden. Gegen eine erhebliche Verschärfung der Maassregeln spricht indess einmal die dadurch hervorgerufene bedeutende Störung des Schulbetriebes, ferner die Erwägung, dass die Schule doch immer nur einen Bruchtheil der Infektionen, und vielleicht sogar einen relativ unbedeutenden vermittelt. Fehlt es doch nicht an Beobachtungen, die darauf hinweisen, dass gerade der Schluss einer Klasse zuweilen befördernd auf die Verbreitung einer contagiösen Krankheit wirkt, weil die Kinder alsdann mehr Zeit und Gelegenheit haben, sich bei den Besuchen in den Wohnungen zu inficiren. — Ferner ist zu erwägen, dass bei den meisten der genannten Krankheiten beim ersten kaum merkbaren Beginn der Krankheitsercheinungen die Ansteckung besonders leicht erfolgt. — Trotzdem wird zweifellos daran festzuhalten sein, dass die Schule ihrerseits so viel als irgend möglich, und so weit es mit den wesentlichsten Zwecken der Schule vereinbar ist, der Verbreitung von Contagien unter den Schülern entgegenwirken muss. Finden auch viele Kinder in Folge eines gewissen Mangels an Versuch und Beaufsichtigung ausserhalb der Schule Gelegenheit zur Infektion und wird auch wirklich der Procentsatz der Erkrankten bei strengen Maassregeln in der Schule kein wesentlich geringerer, so sind diese Maassregeln doch schon aus diesem Grunde anzuhalten, weil diejenigen Eltern, welche ausserhalb der Schule ihre Kinder gewissenhaft behüten, einen entschiedenen Ansporn dazu haben, dass ihre Kinder in der Schule nicht von einer leicht vermeintlichen Infektionsgefahr bedroht werden.

Schulärzte. Von grosser hygienischer Bedeutung ist die mehr und mehr sich ausbreitende Anstellung von Schulärzten. Ursprünglich sollten dieselben die Ueberwachung der hygienischen Einrichtungen der Schule und der prophylaktischen Maassnahmen bei Infektionskrankheiten übernehmen, wozu sie allerdings über eine gründliche hygienische Durchbildung verfügen müssten. Neuerdings ist aber besonders Schulärzten vor allem eine Controle des Gesundheitszustandes der Schüler anzuvertrauen, die für die individuelle Hygiene der Schulkinder und für die zeitige Bekämpfung von Krankheiten von entschiedenem Nutzen ist.

Im Folgenden sei auszugsweise die Instruction mitgeteilt, welche Wiesbaden, der Stadt, welche zuerst eine solche Einrichtung traf, die Schulärzte erlassen ist:

1) Die Schulärzte haben die Aufgabe: den Gesundheitszustand der ihnen angewiesenen Schüler zu überwachen und bei der ärztlichen Revision der Schule gehörenden Räumlichkeiten und Einrichtungen mitzuwirken, und sind demgemäss verpflichtet, alle in diese Aufgabe fallenden Aufträge des Magistrats auszuführen. Insbesondere gelten hierbei die nachfolgenden Vorschriften:

Die Schulärzte haben die neueintretenden Schüler genau auf ihre Körperbeschaffenheit und ihren Gesundheitszustand zu untersuchen¹, um festzustellen, ob sie einer dauernden ärztlichen Ueberwachung oder besonderen Berücksichtigungen beim Schulunterricht (z. B. Ausschluss vom Unterricht in einzelnen Fächern, wie Turnen und Gesang, oder Beschränkung in der Theilnahme am Unterricht, Anweisung eines besonderen Sitzplatzes wegen Gesicht- oder Gehörfehlern u. s. w.) bedürfen.

Ueber jedes untersuchte Kind ist ein, dasselbe während seiner ganzen Schulzeit begleitender „Gesundheitschein“ auszufüllen. Erscheint ein Kind der ständigen ärztlichen Ueberwachung bedürftig, so ist der Vermerk „ärztliche Controle“ auf der ersten Seite oben rechts zu machen. Die Spalte betr. „Allgemeine Constitution“ ist bei der Aufnahmeuntersuchung für jedes Kind auszufüllen, und zwar nach den Kategorien „gut, mittel und schlecht.“

Die Bezeichnung „gut“ ist nur bei vollkommen tadellosem Gesundheitszustand, und „schlecht“ nur bei ausgesprochenen Krankheitsanlagen oder chronischen Erkrankungen zu wählen. Die anderen Rubriken werden nur im Nothfalle ausgefüllt, und zwar bei der Aufnahmeuntersuchung, oder auch im Laufe der späteren Schuljahre bemerkbar werdenden Erkrankungen.

Die Wägungen und Messungen werden von den betr. Klassenlehrern genommen und sind in jedem Halbjahre in die betr. Spalte einzutragen. Rundung auf $\frac{1}{2}$ cm und $\frac{1}{4}$ kg). Brustumfang wird vom Arzte gemessen, doch nur bei Kindern, die einer Lungenerkrankung verdächtig sind.

¹ Die Untersuchung hat sich zu erstrecken auf: Grösse, Gewicht, Ernährungszustand, Reinlichkeit (Ungeziefer), Verkrümmung der Wirbelsäule, Brustumfang, Unterleibsbruch (bei Knaben), Ohr und Gehör, Auge und Sehigkeit, Sprache (Stotternde), Nase und Nasenrachenraum, Mundhöhle und Rachen; ferner auf Symptome von chronischen Krankheiten wie Anämie, Leukämie, Phthise, Tuberculose, Herzfehler, Epilepsie.

2) Alle 14 Tage — wenn ansteckende Krankheiten auftreten, auch häufiger — hält der Schularzt an einem mit dem Schulleiter vorher verabredeten Tage in der Schule Sprechstunden ab. Hierzu ist, wenn irgend möglich, dem Arzte ein eigenes Zimmer zur Verfügung zu stellen. Wünscht der Arzt an einem anderen als dem verabredeten Tage die Schule zu besuchen, so hat er dies mindestens 3 Tage früher dem Schulleiter mitzuteilen.

Bei unvorhergesehenen Behinderungen gilt der nächstfolgende Wochentag als Besuchstag.

Die erste Hälfte der Sprechstunde dient zu einem je 10—15 Minuten Besuche von 2—5 Klassen während des Unterrichts. Jede Klasse soll, wenn möglich, zweimal während eines Halbjahres besucht werden. Bei diesen Besuchen werden sämtliche Kinder einer äusseren Revision unterzogen; bei besonderen, zu sofortiger Besprechung geeigneten Beobachtungen wird von dem Lehrer Auskunft gefordert und ihm solche auf Verlangen erteilt.

Erscheinen hierbei einzelne Kinder einer genaueren Untersuchung bedürftig, so ist diese nachher in dem ärztlichen Sprechzimmer vorzunehmen.

Gleichzeitig dienen diese Besuche auch einer Revision der Schullocalitäten und deren Einrichtung, sowie der Ventilation, Heizung, körperlichen Haltung der Schulkinder u. s. w.

In der zweiten Hälfte der Sprechstunde sind etwa erforderliche genauere Untersuchungen vorzunehmen.

Die ärztliche Behandlung erkrankter Schulkinder ist nicht Sache des Schularztes. Solche Kinder sind vielmehr an ihren Hausarzt oder den zuständigen Armenarzt resp. an einen Spezialarzt event. die Poliklinik zu verweisen.

3) Die Gesundheitsscheine sind in den betr. Klassen in einem dasehaften Umschlage aufzubewahren, und bleiben, so lange sie nicht von dem Schulinspector eingefordert werden, in der Schule.

Die Scheine mit dem Vermerk „Ärztliche Controle“ sind dem Arzte bei jedem Besuche in der Klasse vorzulegen.

Tritt ein Kind in eine andere Klasse über, so ist sein Gesundheitsschein dahin durch den Schulleiter zu übersenden.

4) Die Schulärzte haben auf Antrag des Schulleiters einzelne Kinder in ihrer Wohnung zu untersuchen, um, falls die Eltern kein anderweites genügendes ärztliches Zeugnis beibringen, festzustellen, ob Schulversäumnis gerechtfertigt ist.

5) Die Schulärzte haben mindestens einmal im Sommer, einmal im Winter die Schullocalitäten und deren Einrichtungen zu revidiren. Die hierbei, wie bei den sonstigen Besuchen gelegentlich gemachten Beobachtungen über die Beschaffenheit der zu überwachenden Gegenstände, sowie über Handhabung der Reinigung, Lüftung, Heizung und Beleuchtung und die etwa an diese Beobachtungen sich anschliessenden Vorschläge sind von den Schulärzten in das für diesen Zweck bei dem Schulleiter aufliegende Buch einzutragen.

II. Krankenhäuser.

Beim Bau eines Hospitals müssen folgende Gebäude resp. Räume vorgesehen werden: 1. Die zur Aufnahme der Kranken dienenden Säle und Zimmer, 2. Zimmer für die Verwaltung (Bureaux), die Wohnungen

Verwaltungsbeamten, 3) Räume für den Wirthschaftsbetrieb (Küche, Wasche u. s. w.), die gewöhnlich in einem besonderen Oekonomiegebäude einigt werden; in dessen Nähe ist der Eiskeller anzulegen, 4) Zimmer für Aerzte, Wärter und Wärterinnen, 5) eine Desinfektionsanstalt, ein Leichenhaus und 7) eine Pförtnerwohnung.

Der Bauplatz ist nach den S. 348 aufgeführten Principien auszuwählen und zu aptiren. Die Lage soll möglichst frei, fernab von beschwollenen Strassen und jedenfalls nur an einer Seite durch Anlagen, Bäume oder Gebäude begrenzt sein.

Die Grösse des Baus berechnet sich in der Weise, dass für jeden Kranken etwa 160 qm Baufläche bemessen werden. — Damit nicht zu grosse Gebäude und zu weite Wege entstehen, wird in grösseren Städten Allgemeinen eine Decentralisation und eine Anlage von Krankenhäusern an verschiedenen Punkten der Peripherie angestrebt; bei guten Communicationsmitteln sind indess auch grosse centrale Anlagen nicht nachtheil, zumal sie im Betriebe eher billiger sind als kleinere Spitäler.

Bezüglich der Grundform des Gebäudes unterscheidet man: 1) das Corridorsystem (Fig. 155). Bei demselben liegen die Krankenzimmer mittelbar neben einander und an dem gemeinsamen Corridor, und das Gebäude hat mehrere Stockwerke. Dasselbe wird entweder in Linienform ausgebaut, oder in H-Form oder in Hufeisenform, zuweilen auch wohl als gelassenes Viereck oder in Kreuzform. Das Pavillonsystem. Dasselbe ist wesentlich in Aufnahme gekommen




Fig. 155. Krankenhaus, Corridorsystem. 1 Krankenzimmer. 2 Wärterzimmer, davor Theeküchen. 3 Operationszimmer. 4 Badezimmer. 5 Kapelle. 6 Einzelzimmer.

dem Bau des Hospitals Lariboisière in Paris im Jahre 1858. Das Krankenhaus wird bei diesem System in mehrere Gebäude zerlegt und es sind diese entweder Baracken, d. h. Pavillons von nur einem Stockwerk, die einen oder zwei Krankensäle enthalten, ausserdem Badort, Theeküche und Wärterraum; oder Pavillons mit zwei Stockwerken, im Uebrigen eingetheilt wie die Baracken; oder sogenannte Blocks, Gebäude mit mehreren Stockwerken, in deren jedem mehrere nach Corridore verbundene Krankenzimmer liegen. — Den Pavillons gibt man mindestens einen derartigen Abstand von einander, dass der selbe der doppelten Höhe der Gebäude gleich ist. Entweder liegen einzelnen Pavillons ganz frei (Fig. 157), oder es führen lange, offene Gänge an ihrer Giebelseite entlang und sind mit den einzelnen Pavillons durch kurze Seitencorridore verbunden (Fig. 156). Wenn

irgend möglich, verlegt man in das Centrum der ganzen Krankenhausanlage das Oekonomiegebäude; das Verwaltungsgebäude lässt man die Strasse berühren; an einer anderen Stelle der äussersten Peripherie wird das Leichenhaus errichtet. Im Uebrigen werden die einzelnen Pavillons in sehr verschiedener Anordnung auf dem ganzen Terrain vertheilt.

Das Pavillonsystem verdankt seine Bevorzugung innerhalb der letzten Jahrzehnte vor Allem der Anschauung, dass dieses System die Ansteckungsgefahr völlig aufhebe. Zu dieser Rolle soll es namentlich befähigt sein, von gar keine Corridore die Baracken verbinden. Die genauere Erkenntnis der Infektionsvorgänge musste jedoch zu der Ueberzeugung führen, dass die grössere räumliche Entfernung der Krankenzimmer von einander für den Schutz gegen Uebertragung der Infektionserreger keineswegs ausreicht, sondern dass es ausserdem immer auf eine zweckmässige Beseitigung und Vernichtung der




Fig. 156. Hospital Lariboisière.
A Krankenpavillons (3 stöckig).
B Wärterinnen. C Wäsche.
D Verwaltung. E Kapelle.
F Bäder. G Operationszimmer.
H Depots.




Fig. 157. Berliner Garnisonlazareth.
A—F 2 stöckige Krankenpavillons.
G—J 1 stöckige Isolirpavillons. K Verwaltung.
L Oekonomie. M Magazin. N Beamte.
O Aerzte. P Wache. R Remise. S Eisschau.
T Leichenhaus.

Infektionsquellen und auf eine Hinderung der Verschleppung durch Aerzte, Wärter, Utensilien u. s. w. ankommt. In der That hat die praktische Erfahrung gezeigt, dass bei einer richtigen Desinfektion und zweckentsprechenden Prophylaxis ein Corridorhospital oft bessere Erfolge aufweist, wie ein schlecht geleitetes Barackenlazareth. Mehrfach ist es vorgekommen, dass in einem Hospital fortwährend Infektionen stattfanden und dass dasselbe deshalb für völlig unbrauchbar erklärt wurde. Man glaubte dann, der Grund hierfür liege nur darin, dass das Hospital auf schlechtem Boden stehe, oder unrichtig gebaut sei u. s. w. Sobald aber ein Wechsel des dirigirenden Arztes eintrat, geeignete prophylaktische Massregeln eingeführt und das Wartepersonal richtig geschult wurde, zeigte dasselbe Hospital die günstigsten Resultate. — Eine bedeutende Erleichterung des Schutzes gegen Uebertragungen wird durch eine stärkere räumliche Trennung der Kranken, wie sie das Pavillonsystem bewirkt, zweifellos gewährt. Ausserdem aber ist es bei der Pavillonbauweise weit eher möglich, jedem einzelnen Kranken zweckmässiges Licht und ausgiebige Luft zuzuführen; und aus diesen Gründen verdient das Pavillonsystem in erster Linie berücksichtigt zu werden.

Eine Unterkellerung der Baracken und Pavillons kann fehlen; allerdings muss dann für eine gute Abdichtung gegen den Untergrund sorgt sein; ausserdem empfiehlt es sich, in diesem Fall wo möglich Fussbodenheizung einzuführen.

Die Baracken werden aus dünnen Wandungen hergestellt. Als Baumaterial für Seitenwände, Dach und Fussboden empfiehlt sich echtes künstliches Steinmaterial in doppelten Lagen, zwischen welchen eine Luftschicht bezw. feinporiges Füllmaterial gelassen wird (z. B. Gypsblöcke, Korksteine, Xylolith, Faserplatten u. s. w.). — Bei allen Krankenzimmern müssen die Wände, Decken und Fussböden luft- und wasserdicht gearbeitet sein. Poröses Material bietet leicht die Abgerundungsstätte für Staub und Contagien, und ist verhältnissmässig schwer vollständig zu reinigen und zu desinficiren. Die Decken sollen daher einen Gypsverputz mit Wasserglaszusatz erhalten. Derselbe Verputz oder aber ein Oelfarbenanstrich soll an den Wänden angebracht werden, so dass die sämtlichen Begrenzungen des Zimmers leicht mit Wasser oder desinficirenden Lösungen abgewaschen werden können. Für den Fussboden ist entweder hartes, mit Leinöl getränktes Holz, besser aber Asphalt oder Mettlacher Fliesen, resp. Terrazzo (mittelgrosse Steinarmorstücke mit Cementmörtel verbunden) zu verwenden. Wegen der besseren Wärmeleitung der letztgenannten Steinmaterialien ist ihre Verwendung an die gleichzeitige Einführung von Fussbodenheizung gebunden, oder die Fussböden müssen wenigstens mit Linoleumteppichen deckt werden. Die Reinigung des Zimmers lässt sich noch dadurch erleichtern, dass längs der Wände ausgerundete Scheuerleisten hinlaufen, die mit genügendem Gefälle zu den Canälen hinführen.

Die Himmelsrichtung der Fenster des Krankensaals geht am Besten nach Süden oder bei völlig freiem Horizont nach Norden, bezw. nach Südost—Nordwest. Bei Pavillons, welche Fenster an beiden Längsseiten haben, ist diese Anordnung allein zulässig, da bei einer reinen Ost-West-Lage die Kranken durch die den ganzen Tag über tief in's Zimmer eindringende Sonne ausserordentlich belästigt werden würden.

Die Fenster sollen mindestens gleich $\frac{1}{6}$ der Bodenfläche sein; im Uebrigen gilt bezüglich ihrer Anordnung, der Vorhänge u. s. w. das bei den Schulen Gesagte.

Die Grösse des Krankensaals berechnet sich nach dem Grundsatz, dass der Kranke stündlich 80—120 cbm Luft zugeführt erhalten soll, dass aber die Ventilation für gewöhnlich höchstens eine zweifache Lüfterneuerung pro Stunde leistet. Daraus ergibt sich ein nothwendiger Cubikraum von 40—60 cbm; bei einer Höhe der Zimmer von 4.5 m entfallen demnach pro Bett 9—13 qm Fussbodenfläche.

Die Raumvertheilung fällt bei Corridorbauten je nach der Grösse und speciellen Bestimmung des Gebäudes sehr verschieden aus. Einigermassen uniform ist die Einrichtung der Pavillons und Baracken (vgl. Fig. 158a u. b). Ausser dem eigentlichen Krankensaal enthalten sie regelmässig einen Raum für den Wärter; ferner eine Theeküche, die




Fig. 158 a. Charité-Baracke, Querdurchschnitt.

als Spülzimmer und Aufwaschraum dient und in der sich ausserdem ein Wärmeschrank, Gaskocher u.s.w. befindet; endlich ein Closet und neben diesem wo möglich einen Vorraum, in dem alle Stechbecken u.s.w. aufbewahrt und desinficirt werden können. Ausserdem hat sich in vielen Krankenhäusern die Anlage eines sogenannten Tageraums an jedem grösseren Krankensaal resp. in jedem Pavillon bewährt, der für

den Aufenthalt der leichter Erkrankten und der Reconvalescenten während des Tages dient. Derselbe ist gewöhnlich mit einer Glaswand, welche Schiebe- und Klappfenster trägt, gegen aussen abgeschlossen; Marquisen müssen zum Schutz gegen Sonnenstrahlen angebracht sein. Entweder sind Galerien an der Längsseite der Baracke in solcher Weise




Fig. 158 b. Charité-Baracke, Grundriss.

zu Reconvalescentenräumen hergerichtet oder die beiden Giebel resp. einer derselben ist wesentlich verbreitert und mit einer Art Vorbau versehen (Fig. 158 a u. b.).

Heizung. Luftheizung ist für die Zwecke der Ventilation (s. unten) kaum zu umgehen; sie muss gut angelegt und sorgfältig betrieben werden; meist muss sie unterstützt werden durch Dampfheizung oder Oefen. Fehlt die Luftheizung, so muss die Warmwasserheizung oder Niederdruckdampfheizung mit guter Luftzufuhr verbunden werden;

Die Mantelöfen müssen für Ventilation und Circulation einstellbar sein. Speciell gerühmt wird für die Baracken solcher Krankenhäuser, welche nicht auf möglichst billige Einrichtungen angewiesen sind, die Fussbodenheizung. Dieselbe setzt feuersichere dichte Steinböden voraus, welche die schon erwähnten Vorzüge haben, dass

sich sehr leicht reinigen und desinficiren lassen und deren einziger Nachtheil, der einer zu argen Wärmeliegung, eben durch die Heizung in Fortfall kommt. Die Anordnung der Fussbodenheizung ist so, dass unter dem Steinboden sich 75 cm hohe bekriechbare Gänge ziehen, deren Boden und Decken mit Cementlichtet sind und deren Wände ausserdem durch




Fig. 159. Baracke des Hamburger Krankenhauses.
F Fussbodenheizung. L.G. Canal für die Zufuhr frischer Luft.
H.K. Heizkörper zur Vorwärmung der Luft.

die Eisenconstruction gestützt ist. In den Canälen liegen frei auf Eisenbahnschienen die Heizrohre, die entweder von einer Heisswasser- oder von einer Dampfheizung aus geheizt werden.

Eine gute Ventilation der Krankenhäuser ist wegen der Menge der dort sich entwickelnden üblen Gerüche unbedingt erforderlich. Im Winter stösst eine genügende Ventilation auf keine Schwierigkeiten, man in der continuirlichen Heizung einen hinreichend ausgiebigen Vorrath besitzt; im Sommer dagegen und in der Uebergangsperiode reicht man nur die Wirkung des Windes auf Dachreiter oder Schornsteine mit Saugaufsätzen auszunutzen; SHERINGHAM'sche Klappen sollen die Eintrittsöffnungen für die Luft dienen. Bei windstillem Wetter ist diese Ventilation entschieden zu wenig, und Gasflammen oder heizte Kamine oder Wasserventilatoren sollten unbedingt für die freie Zeit in Reserve gehalten werden. Ferner sind die Kipfenster, unter denen Betten stehen, unbedingt mit ausreichenden Schutzrichtungen zu versehen, um das Herabfallen der kalten Aussenluft zu verhüten. — Sorgfältig zu beachten ist, dass Räume mit starker Miasmentwicklung nicht durch Pulsion, sondern durch Aspiration Lüftet werden (siehe S. 407). — Dass die Ventilation nicht etwa im Winter, desinficirend zu wirken, und daher für Räume, in denen steckende Kranke untergebracht sind, keineswegs besonders verstärkt werden braucht, ist bereits S. 418 ausführlicher dargelegt.

Das Mobiliar der Krankenzimmer soll so beschaffen sein, dass es möglichst wenig zu Staubablagerungen Anlass giebt, leicht zu reinigen und leicht zu desinficiren ist. Gebeizte oder gestrichene Holzmöbel gestatten eine solche Desinfektion in genügender Weise.

Noch weiter gehende und wohl nicht absolut nothwendige Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Beschaffung des Mobiliars für das neue Hamburger Krankenhaus angewendet worden. — Die Betten sind dort aus eisernem Gestell und zwar aus dickem, gebogenem Gasrohr, welches mit heller Oelfarbe gestrichen ist. In dieses Gestell werden als Rahmen vier einzeln herausnehmbare, gelbe und lackirte Tannenholzbretter eingelegt, die in der Mitte nur 12 cm hoch sind; ferner wird eine Sprungfedermatratze verwendet von nur 1—2 cm Höhe. Dieselbe stellt ein Netz aus horizontal gelagerten Spiralfedern dar. Durch diese Construction ist der tiefe Bettkasten, der sonst schwer zu reinigen ist, vermieden. Ausserdem ist ein grosser Abstand unter dem Bett bis zum Fussboden erreicht, so dass auch dort die Reinigung sehr leicht vorgenommen werden kann. Auf dem Sprungfederrahmen liegt eine Wollmatratze; als Bedeckung werden nur weisse wollene Decken gewährt. Die gesammten Betten lassen sich leicht im Dampföfen desinficiren. Die Wollmatratzen bedürfen einer häufigeren Aufarbeitung, für welche aber in einem Krankenhaus reichliches Personal zur Verfügung zu sein pflegt. — Zu jedem Bett gehört noch ein Tisch und ein Stuhl; bei ersterem sind die Beine aus Gasrohr, die Platte aus Rohglas. Die Stühle haben ebenfalls ein Gestell aus Gasrohr und einen geschweiften Holzstuhl und Lehne, die mit Oelfarbenanstrich versehen sind. Nirgends finden sich enge Fugen, so dass jede Stelle der Möbel auf das leichteste abgewaschen werden kann.

Im Betrieb des Krankenhauses ist vor Allem auf penibelste Reinlichkeit zu achten. Jede Staubbildung ist zu vermeiden; Fussböden und Möbel sind stets feucht, niemals trocken zu reinigen; alle Infektionsquellen, wie Eiter, Fäces u. dgl., sind sofort zu zerstören; beschmutzte Leib- oder Bettwäsche von Infektionskranken ist in gesonderten Behältern unter Befeuchtung mit Carbolwasser oder Sublimatlösung aufzubewahren (vgl. Kap. X). Sehr empfehlenswerth ist die Aufnahme aller Sputa und dgl. in verbrennbaren Karton-Spucknapfen; s. unter „Tuberkulose“. — In jedem grösseren Krankenhaus muss sich eine Desinfektionsanstalt und eine Colonne von geschulten Desinfektoren befinden. Letzteren ist ausschliesslich die Abholung inficirter Wäsche, die Desinfektion der Krankensäle u. s. w. nach den unten gegebenen Vorschriften zu übertragen.

Isolirspitäler. Jedes grössere Krankenhaus muss über eine oder einige Baracken verfügen zur Aufnahme von Kranken, die besondere Infektionsgefahr bieten (Pocken-, Flecktyphus-, Cholerakranke u. s. w.). Derartige Baracken müssen von den übrigen Gebäuden des Krankenhauses mindestens 30 m Abstand haben: pro Bett rechnet man 200 qm Area und 13 qm Fussbodenfläche des Krankenzimmers. Im Uebrigen sind

betonten, zur Sicherung gegen Infektionsgefahr dienenden Anlagen (abwaschbare Fussböden, Wände, Möbel u. s. w.) bei den Kranken mit besonderer Sorgfalt in Anwendung zu bringen. — Der Personal ist unbedingt mit den Kranken zu isoliren; zureichend ist Wärterzimmer, Theeküche u. s. w. in der Isolir-Ordnung zu sehen. Wünschenswerth ist ferner die Anbringung eines Raumes, in welchem die Speisen und sonstigen Bedarfsgegenstände für die Kranken abgesetzt werden, und von wo gebrauchte Gegenstände, abgewaschen mit desinficirenden Lösungen oder in mit Sublimat-feuchtete Tücher eingehüllt, abgeholt werden. Der Wärter hat einen Vorraum zum Holen oder Bringen von Sachen erst nachher durch Abwaschen mit Sublimatlösung so viel als möglich zu reinigen. Im Vorraum wird auch ein langer, abwaschbarer Kittel aufbewahrt, den derselbe vor dem Betreten des Krankenzimmers anlegt; vor dem Verlassen des letzteren wird der Kittel mit Wasser gewaschen und demnächst im Vorraum wieder abgelegt.

Improvisirung eines Isolirspitals, resp. zur Ergänzung einer ungenügenden Anlage sind die neuerdings construirten zugbaren und transportablen Baracken sehr geeignet. Dieselben entweder aus einem leichten Holzgerüst, welches von aussen mit gefirnissetem und feuersicher imprägnirtem Leinen überzogen; der Zwischenraum zwischen äusserem und innerem Ueberzug mit Filz ausgelegt (DÖKER's Baracke); oder die Wände stellenweise aus Holz, die innen mit Leinwand, aussen mit Dachpappe überzogen und dazwischen eine Luftschicht enthalten, die Rahmen aus einem eisernen Gerüst eingesetzt (ZUR NIEDEN); oder die Wände aus Wellblech hergestellt (GROVE). Solche Baracken können in wenigen Kisten verpacken und sind binnen 6—12 Stunden fertig aufzustellen. — Die Temperaturverhältnisse in den Baracken sind nicht günstig. Die Luftschichten sind zweckmässig durch ein Füllmaterial (Kieselguhr und dgl.) zu ersetzen.

Hygiene-Schulen: H. COHN, Lehrbuch der Hygiene des Auges, 1892. — H. COHN, Der Schulhausbau, 1887. — H. COHN, Die Hygiene des Auges, 1883. — BURGERSTEIN u. NETOLITZKY, Schulhygiene in WEYL's Hygiene, 1894. — BURGERSTEIN, Suppl.-Band zu gen. Werke, 1901.

Krankenhäuser: RÖMER, Krankenhäuser, Deutsches Bau-Handbuch, 1868. — ESSE, Die Krankenhäuser, 1868. — DEGEN, Krankenanstalten, in OFFER'S u. v. ZIEMSSSEN's Handb. der Hygiene. — GRUBER, Neue Krankenhäuser, 1880. — DENEKE, Das neue Krankenhaus zu Hamburg, Viert. f. 1889. — RUPPEL u. MERKE, Krankenhäuser, in WEYL's Handb. der Hygiene, 1896. — FELIX, SÜRENSEN und BÜHM, Ueber Isolirspitäler, Ber. d. 1. hyg. Congr. zu Wien 1887.

Gefangenanstalten: KROHNE, Die Gefängnisbaukunst, im Handbuch des Gefängniswesens von v. HOLZENDORFF u. v. JAGEMANN, 1888. — BIR, Gefängnisshygiene, im Handbuch d. Hygiene, 1882.

Militärhygiene: KIRCHNER, Grundriss der Militär-Gesundheitspflege, Braunschweig 1891—96.

Andere öffentliche Anstalten: v. PETTENKOPF's und v. ZIEHME's Handbuch der Hygiene, 1882. — WEYL's Handb. d. Hygiene. 1894—96.

Neuntes Kapitel.

Beruf und Beschäftigung (Gewerbehygiene).

Die tägliche ärztliche Erfahrung lehrt, dass die Entstehung zahlreicher Krankheiten auf die Beschäftigungsweise der Erkrankten zurückzuführen ist. Vielfach hat die Beschäftigung ausschliesslich und trotz der im Uebrigen günstigen hygienischen Verhältnisse die Krankheit hervorgerufen; oft tragen nebenbei Mängel der Wohnung, Nahrung, Hauspflege u. s. w. die Schuld.

Auch die Statistik vermag einen bedeutenden Einfluss der Beschäftigung auf die gesamte Mortalität und auf die Frequenz einzelner Krankheiten zu erweisen. Als Beispiel möge die folgende (englischen Beobachtungen aus dem Jahre 1861—61 entnommene) Tabelle dienen:

	Sterblichkeitsprocente im Alter von				
	25—34 J.	35—44 J.	45—54 J.	55—64 J.	über 65 J.
Ganze Bevölkerung	1.72	1.57	1.57	3.05	6.97
Männer	1.53	1.44	1.46	3.3	6.93
Frauen	1.91	1.71	1.68	3.0	6.9
Arbeiter	1.7	1.48	1.46	2.8	5.85
Handwerker	1.71	1.57	1.56	3.46	7.38
Landarbeiter	1.76	1.71	1.76	3.75	8.02
Handwerker	1.71	1.74	1.74	3.14	6.96
Landarbeiter	1.76	1.76	1.76	2.31	5.75

Nach den Zusammenstellungen von 1892 auf dem internationalen Hygienischen Congress in London, zeigen insgesamt Zahlen:

	Auf je 1000 Lebende der betreffenden Berufs-klasse starben jährlich:		Relat. Sterblichkeit für 25—65jährige Männer, die bei Geistlichen beobachtete Minimalsterblichkeit = 100 gesetzt
	im Alter von 25—45 J.	im Alter von 45—65 J.	
e	4.6	15.9	100
.	5.5	16.2	108
e Arbeiter . . .	7.1	17.7	126
rer	6.4	19.8	129
.	8.3	19.7	143
.	7.8	21.7	148
ubenarbeiter . .	7.6	25.1	160
.	9.3	28.4	166
.	8.7	26.1	172
.	9.3	25.7	175
r	10.7	26.5	189
.	11.6	28.0	202
.	13.9	34.3	245
ier	15.3	45.1	300
bedienstete . . .	22.6	55.3	397

e genauere statistische Feststellung des Einflusses der Beschäftigung f grosse Schwierigkeiten und den bisher gewonnenen Zahlen haften sehr de Fehler an. Aus einigen wenigen Todesfällen wurde früher oft das nittliche Alter beim Tode berechnet und dieses fälschlich der mittleren uer gleichgesetzt. Selbst wenn nach einer korrekteren Methode ge- rird, so sind doch die Schlussfolgerungen mit grosser Vorsicht zu ziehen. berücksichtigen, dass Viele einen bestimmten Beruf wählen, weil der- er bereits vorher ausgebildeten schwächlichen oder kräftigen Consti- tspricht. Der Eine, von zartem Körper und vielleicht hereditär mit belastet, wählt mit gutem Grunde das Schneiderhandwerk, der Andere, nd ohne erbliche Belastung, wird Schmied oder Schlosser. Stirbt der n jungen Jahren, so kann man ebenso wenig sagen, dass dies die ner Beschäftigung war, wie man die Gesundheit und Langlebigkeit ren auf Rechnung seines Berufes setzen kann. — Ausserdem kommen bsverhältnisse, welche der betreffende Beruf gerade bietet, wesentlich ht. Ist in einem Distrikt das Angebot für eine bestimmte Beschäf- hr gross und der Lohn entsprechend niedrig, so liefert die Statistik Zahlen, aber unter anderen, günstigeren Verhältnissen zeigt derselbe illeicht eine wesentlich geringere Morbidität und Mortalität.

hygienische Bedeutung der Berufsthätigkeit tritt naturgemäss Neuzeit um so mehr hervor, je mehr die Bevölkerungsziffer je mehr die Menschen sich in den Städten zusammendrängen energischer daher der Einzelne seine Kräfte anspannen muss, eine Existenz zu schaffen. Dieser gesteigerte Einfluss der Be-

schäftigung auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der jetzigen Generation macht sich fast bei allen Berufsarten geltend. Nicht zum wenigsten werden davon die geistig Arbeitenden betroffen. Unter Beamten, Gelehrten, Officieren zeigen in den letzten Jahren Nervenkrankheiten und psychische Affectionen eine erschreckende Ausbreitung. Ernährungs- und Verdauungsstörungen, Augenleiden u. a. m. sind in zahlreichen Fällen auf eine derartige Berufsthätigkeit zurückzuführen. Leider stösst ein statistischer Nachweis der Krankheitsfrequenz auch bei dieser Kategorie von Arbeitenden auf grosse Schwierigkeiten, aber die ärztlichen Erfahrungen sprechen entschieden dafür, dass eine gewisse Entlastung und Schonung derselben dringend indicirt ist, sei es durch eine Herabminderung der an sie gestellten Anforderungen, sei es durch bessere Fürsorge für Ruhe oder sonstige Erleichterung ihrer Arbeit.

Das Interesse grösserer Kreise wendet sich indessen in unserem Jahrzehnt lediglich den in Gewerbebetrieben beschäftigten körperlich Arbeitenden zu, und insofern mit Recht, als diese den weitaus grösseren Theil der städtischen Bevölkerung ausmachen. Die Gewerbebetriebe haben ferner noch eine zweite hygienisch interessirende Seite, indem dieselben vielfach nicht nur auf die Arbeiter, sondern auch auf eine grosse Zahl umwohnender Menschen nachtheilig wirken. — Da die Hygiene des Berufs und der Beschäftigung zur Zeit geradezu identisch geworden ist mit einer Arbeiter- und Gewerbehygiene, soll auch in der folgenden Darstellung nur diese Art der Berufsthätigkeit eingehender berücksichtigt werden. Zuvörderst sind die Schädigungen der Arbeiter und die Ursachen der wichtigsten Arbeiterkrankheiten darzulegen; und zwar hängen diese theils von Mängeln der allgemeinen hygienischen Verhältnisse, theils unmittelbar von der Berufsthätigkeit ab. Sodann sind die Schädigungen, welche den Anwohnern aus gewissen Gewerbebetrieben erwachsen, zu erörtern und die Mittel zu ihrer Beseitigung anzugeben.

A. Aetiologie und Prophylaxis der Arbeiterkrankheiten.

1. Gesundheitsschädigungen durch die allgemeinen hygienischen Verhältnisse.

Unter Arbeitsverhältnissen im weiteren Sinne begreift man auch diejenigen Gesundheitsstörungen, welche nicht unmittelbar von der Beschäftigung abhängen, sondern auf einer Verschlechterung der allgemeinen Lebensbedingungen beruhen, wie Ernährung, Wohnung, Hautpflege u. s. w. anbelangt. Es sind die Verhältnisse des Arbeiters stets um die Grenze des

n zum Lebensunterhalt Ausreichenden zu bewegen pflegen, wird ein Zeit in Bezug auf das eine oder andere der hygienischen Postulate serordentlich häufig sein.

Es ist bereits S. 258 darauf hingewiesen, wie schwierig es zunächst für den üblichen Lohnsatz eine den Bedarf des Körpers wirklich deckende Nahrung zu beschaffen. Es gelingt dies kaum mit bewusster Auswahl der nahrhaftesten und preiswürdigsten Nahrungsmittel, gewisse denn ohne Kenntniss des Nährwerthes der Speisen und nur leitet von dem trügerischen Maassstab des Aussehens, Volums und Schmacks der Nahrung. Ein grosser Theil der Arbeiter und ihrer Familien zeigt dementsprechend die deutlichsten Symptome unzureichender Ernährung. Als eine unausbleibliche Folge hiervon darf der Alkoholismus angesehen werden, da die Empfindung der Energielosigkeit argemäss zu einem Reizmittel treibt, das wenigstens vorübergehend das Gefühl der Kraft und Leistungsfähigkeit hervorzaubert.

Nicht minder leiden zahlreiche Arbeiter unter ungenügenden Wohnungen. Die Mehrzahl lebt eng zusammengedrängt in Miethshäusern, die nichts von dem bieten, was im Kapitel „Wohnung“ bezüglich des Luftkubus, der Heizung, der Ventilation, der Beleuchtung u. w. als erforderlich bezeichnet wurde, und deren Schmutz und Verunreinigungen sich bald auch auf die wenigen Familien auszudehnen pflegt, welche ursprünglich noch das Bestreben hatten, sich ein behagliches Heim zu schaffen. — Auch die Kosten für reinliche Kleidung und Hautpflege sind schwer mit einiger Regelmässigkeit in das Budget des Arbeiters einzustellen.

Die Unsauberkeit in Kleidung und Wohnung wirkt wiederum leichtig unterstützend auf die Ausbreitung der Infektionsstoffe. Tuberculose, die akuten Exantheme, Diphtherie finden hier reichlichste Gelegenheit zu immer neuen Uebertragungen. Die Cholera infantum mordet in diesen Quartieren die weitaus zahlreichsten Opfer, weil die Wohnungen im Hochsommer oft unerhört hohe Temperaturen zeigen und weil eine zweckmässige Aufbewahrung der Milch und peinliche Sauberkeit bei ihrer Behandlung undurchführbar ist. Cholera-Epidemien nehmen häufig in den Wohnstätten der Arbeiter ihren Anfang und schwellen dort gleich so bedeutend an, dass an eine schnelle Ausrottung nicht mehr zu denken ist.

Besonders drückend wird die Lage der Arbeiter, wenn Krankheiten den täglichen Verdienst hindern und wenn durch dauernde Gesundheitsstörungen oder Alter Erwerbsunfähigkeit eintritt. Da die Möglichkeit der eigenen Fürsorge für solche Eventualität bei der Mehrzahl der

Arbeiter ausgeschlossen ist, droht hier die Entstehung eines Proletariats, das vollständig auf die Unterstützung Anderer angewiesen ist.

Maassregeln zur Beseitigung dieser ganzen Kategorie von Schädigungen der Arbeiter lassen sich selbstverständlich nicht mit einem Schlage und mit vollständig befriedigendem Effekt durchführen. Tragen doch auch sicher sehr viele Arbeiter durch schrankenloses Befriedigen ihrer Wünsche, frühzeitige Ehe, Mangel an Ordnung und Sparsamkeit zu ihrer schlechten wirthschaftlichen Lage bei. Aber unbekümmert hierum hat die Hygiene die Pflicht, für Schutz- und Abhilfemaassregeln, die wenigstens die schlimmsten Schäden treffen und deren Ausführung auf keine übergrossen Schwierigkeiten stösst, mit voller Energie einzutreten.

Die Ernährung des Arbeiters ist nach den S. 258 entwickelten Grundsätzen zu bessern. Belehrung über den Nährwerth, die Preiswürdigkeit und zweckmässige Zubereitung der Lebensmittel (Haushaltungs- und Kochschulen), Volksküchen und Consumvereine müssen hier helfend eintreten. — Dem Alkoholmissbrauch ist vorzugsweise durch die S. 238 besprochenen Kaffee- und Theehäuser entgegenzuwirken.

Eine Besserung der Wohnungsverhältnisse ist durch regle Unterstützung aller der S. 349 ff geschilderten Bestrebungen: Entlastung der Wohnungen von Kranken, Erlass von Bauordnungen und Flächlinienplänen, Gründung von Arbeitercolonieen, Baukassen u. s. w. anzustreben.

Reichliche Wasserversorgung der Wohnungen, Volks- und Schulbäder müssen die Reinlichkeit fördern. — Insbesondere muss die Bekämpfung ausgebrochener Infektionskrankheiten nach den im sechsten Kapitel entwickelten Grundsätzen durchgeführt werden.

Um den schlimmen Folgen der vorübergehenden oder dauernden Erwerbsunfähigkeit vorzubeugen, sind in den Krankenkassen sowie in der Unfall-, Alters- und Invaliditäts-Versicherung in den letzten Jahren in Deutschland vom Staate Einrichtungen getroffen, welche bereits vielen Unglück vorbeugen haben und bei weiterem Ausbau zweifellos noch vollkommen der Noth der kranken und älteren Arbeiter begegnen werden.

Die wichtigsten einschlägigen Gesetze sind folgende: 1) Gesetz über Krankenversicherung vom 16. VI. 1883. In Industrie und Gewerbe gegen Lohn beschaffte Personen sind verpflichtet einer Krankenkasse beizutreten; die Beiträge teilen sich Arbeiter, der Arbeitgeber. Die Krankenkassen sind von den höchsten Behörden, Fabriken oder Gemeinden begründet; diejenigen Personen, welche zu Hause nicht produciren, participiren an den Gemeindekranken-

men. Die Krankenkassen gewähren bis zu 18 Wochen freie ärztliche Behandlung und Krankengeld in Höhe des halben Tagelohns.

2) Gesetz über Unfallversicherung vom 6. VII. 1884. Die Unternehmer der Betriebe von gleicher Gefährlichkeit sind zu „Berufsgenossenschaften“ reinigt; sie erlassen Vorschriften zur Verhütung von Unglücksfällen und sammeln die Fonds zur Entschädigung der verunglückten Arbeiter. Letztere zahlen Kurkosten von der 13. Woche der Erkrankung ab; ausserdem eine Rente, die bei völliger Arbeitsunfähigkeit $\frac{2}{3}$ des Verdienstes beträgt. Oberste Verwaltungsbehörde ist das Reichs-Versicherungsamt in Berlin.

3) Gesetz über Invaliditäts- und Altersversicherung vom 22. VI. 1889. Versicherungspflichtig sind alle gegen Lohn beschäftigten Arbeiter, Dienstboten, Lehrlinge u. s. w. Je nach dem Einkommen sind wöchentlich 14—30 Pfennige zu zahlen, zur Hälfte vom Arbeitgeber, zur Hälfte vom Arbeiter. Das Reich zahlt jeder Rente 50 Mark Zuschuss. Anspruch auf Rente haben Personen über 15 Jahre und solche, die nicht mehr als $\frac{1}{3}$ gegen früher verdienen können.

4. Gesundheitsschädigungen durch die Beschäftigungsweise der Arbeiter.

Der unmittelbar gesundheitsschädliche Einfluss der Beschäftigung kommt zu Stande: 1) durch hygienisch ungenügende Beschaffenheit der Arbeitsräume; 2) durch die Muskelanstrengung und die Körperhaltung bei der Arbeit; 3) durch starke Lichtreize, Geräusche u. s. w., welche die Sinnesorgane schädigen; 4) durch excessive Temperaturen; 5) durch eingeathmeten Staub; 6) durch giftige Gase; 7) durch giftiges Arbeitsmaterial; 8) durch Contagien; 9) durch Unfälle.

1. Die Arbeitsräume.

Dieselben tragen sehr häufig den hygienischen Anforderungen in Bezug auf Luftraum, Ventilation, Beleuchtung u. s. w. nicht hinreichend Rechnung; doch wird die Durchführung der in dieser Richtung bereits von den meisten Regierungen erlassenen Vorschriften, von deren Erfüllung insbesondere die Genehmigung jeder neuen gewerblichen Anlage abhängig gemacht wird, ausreichenden Wandel schaffen.

Die Vorschriften bestimmen, dass die Arbeitsräume in Bezug auf Flächeninhalt, Lage, Heizung, Beleuchtung und Ventilation den allgemeinen Regeln der Gesundheitspflege entsprechen. Die Höhe der Arbeitsräume soll wenigstens 3,5 m, bei einer erheblichen Zahl von Arbeitern 4 m, bei grösseren Sälen 5 m betragen. Jedem Arbeiter sollen wenigstens 10 cbm Luftraum und 20 cbm frische Luftzufuhr gewährt werden; entwickeln sich im Arbeitsraum reichliche Mengen übelriechender Gase, wie z. B. in Bergwerken durch die russenden Lampen, so ist für kräftigere Ventilation zu sorgen. Bei zu trockener Luft ist durch Sprühregen, Dampfröhrzerstäuber oder Dampfstrahlapparate der nöthige Grad von Feuchtigkeit herzustellen. — Die Aborte sollen in gehöriger Zahl, für die Geschlechter getrennt, mit zugfreiem Zugang und so angelegt werden, dass keine Ausdünstungen in den Arbeitsraum gelangen. Ist ein Kleiderwechsel

der Arbeiter erforderlich, so müssen auch hierfür geeignete, für die Geschlechter getrennte Räume hergestellt sein. Dortselbst sollen ausreichende Waschrichtungen Platz finden. Bei grösserer Entfernung der Fabrik von den Wohnungen der Arbeiter sind geräumige und heizbare Speiseräume einzurichten, in welchen Vorkkehrungen zum Erwärmen der mitgebrachten Speisen angebracht sein müssen. Für gesundes Trinkwasser ist zu sorgen. Die Triebmaschinen, Transmissionen, Fallthüren und Treppenöffnungen haben eine solche Einfriedigung zu erhalten, dass eine Verletzung der Passanten ausgeschlossen ist. Ueber Verhütung und Verbreitung von Contagien in den Arbeiterräumen s. unten.

2. Die Muskelarbeit und die Körperhaltung

kann sehr mannigfaltige Gesundheitsstörungen hervorrufen.

Durch den Druck auf das Handwerkszeug entstehen in der Hand oft Schwielen, Blasen und chronische Entzündungen. Man beobachtet dieselben besonders bei Tischlern, Graveuren, Metaldrehern, Gerbern. An anderen Körperstellen können accidentelle Schleimbeutel entstehen, so ein Schleimbeutel am Ellenbogengelenk bei Lederappreteuren, ein solcher am vorderen Darmbeinstachel bei Webern durch den Druck des Brustbaumes, ferner an den äusseren Malleolen und am Köpfchen der Fibula bei Schneidern. — Schuster zeigen am Sternum oft eine umschriebene Vertiefung, welche durch den Druck des Leistens gegen den Brustkasten zu Stande kommt.

Bei fortgesetzter Anstrengung derselben Muskelgruppen beobachtet man, am häufigsten wiederum an der Hand, Sehnenscheiden- und Gelenkentzündungen, Contrakturen und Krämpfe der betreffenden Muskeln. Setzer, Tischler, Gerber, Juweliere, Blumenmacherinnen, welche sämtlich dauernd minutiöse Handarbeiten mit gewissem Kraftaufwand zu verrichten haben, leiden oft an diesen Affektionen. Die als „Schreibkrampf“ bezeichnete professionelle Coordinationsneurose findet man ausser bei Schreibern bei Graveuren, Setzern, Juwelieren, Näherinnen, Klavierspielern u. s. w. — Andere besonders angestrenzte Muskelgruppen hypertrophiren; nicht selten entstehen Rückgratverkrümmungen, wenn die Arbeit eine prononciert einseitige ist und eine forcirte Biegung oder Drehung des Oberkörpers veranlasst, z. B. bei Kesselschmieden, Schneidern, Schustern u. s. w.

Anhaltendes Aufrechtstehen führt zuweilen zu Varicen, Oedemen und Geschwüren an den unteren Extremitäten. Setzer, Schlachter, Gerber sind z. B. dieser Affektion ausgesetzt.

Weit häufiger kommen Circulationsstörungen in Folge von sitzender und gebückter Stellung vor. Schneider, Näherinnen, Stickerinnen, Schuster leiden fast immer an gastrischen Beschwerden, Ernährungsstörungen, resp. an Krankheiten der Beckenorgane. Auch die Behinde-

ng der freien Athmung durch die professionelle sitzende und gebückte itung wirkt begünstigend auf das Entstehen von Ernährungsstörungen.

Ferner kann wiederholte intensive Muskelanstrengung, wie bei Lastträgern, Schmieden, Schlossern, Bäckern erforderlich ist, Allgemeinbefinden stören, indem sie zu Emphysem und organischen rzfehlern disponirt; in selteneren Fällen führt sie auch zu Muskelreissungen und Hernien.

Selbstverständlich bedingt endlich jede Ueberanstrengung, sei dass die Arbeit für die individuelle Muskelkraft zu anstrengend ist, es, dass eine an sich leichte Arbeit zu lange ausgedehnt und nicht den gehörigen Ruhepausen unterbrochen wird, eine Schwächung Gesundheit.

Gegen die genannten Schädigungen kann grösstentheils nur die fmerksamkeit und Vorsicht des Einzelnen Schutz gewähren. Insbesondere muss der Arbeiter die Dauer der Arbeit und den Grad der strengung seiner individuellen Leistungsfähigkeit anzupassen suchen.

Einige Nachtheile sind durch Aenderung der Werkzeuge zu beseien; andere dadurch, dass die Arbeit mit Hülfe von Maschinen statt teltst der Muskeln geleistet wird. So ist z. B. die Verwendung einher Motoren für Nähmaschinen, die Herstellung von Leisten durch schinen u. a. m. anzustreben.

3. Schädigung der Sinnesorgane.

Vorzugsweise ist das Auge gefährdet. Entweder führt das fortsetzte Fixiren kleiner Gegenstände, eventuell bei ungenügender Bechtung, zu Myopie und deren schwereren Folgezuständen (Schreiber, weliere, Graveure, Blumenmacherinnen, Setzer); oder blendendes cht, grelle Wechsel zwischen Hell und Dunkel und strahlende Hitze wirken Ueberreizung des Auges (Heizer, Schmiede, Schmelzofenarbeiter, asarbeiter); oder mechanische Insulte, reizende Gase oder Staub führen rletzungen des Auges resp. Conjunctivitis und Blepharitis herbei remdkörper bei Arbeiten an Metaldrehbänken und Holzbearbeitungsaschinen; Steinsplitter bei Steinschlägern; Funken und Spritzer in engiessereien; verspritzende Säure und Dämpfe bei der Verarbeitung n Braunkohlentheer, Chlor, Salzsäure; Baumwollen- und Hanfstaub).

Zum Schutz gegen die letztgenannten Schädigungen werden Schutzbrillen verwendet, und zwar sind die betreffenden Fabrik-ternehmer gesetzlich verpflichtet, ihren Arbeitern Schutzbrillen zu fern. Sollen dieselben nur gegen gröbere Fremdkörper (Steinsplitter) ützen, so genügen Drahtbrillen. Andernfalls benutzt man Gläser

aus weissem (bei grellem Licht rauchgrauem), starkem Glas in springender Fassung, die auf eine dicht anschliessende Lederhaut aufgenäht sind. Gläser aus Glimmer sollen gegen strahlende Hitze besseren Schutz gewähren; das Material ist jedoch zu ungleichmässig und erschwert das deutliche Sehen. — Uebrigens werden alle Schutzbrillen von den Arbeitern ungern getragen, weil die Gläser leicht durch Beschlagen und Staub trübe werden und das Sehvermögen immer etwas beschränken. Die STROOF'sche Brille, bei welcher zwischen Glas und Fassung Schlitz und in der Fassung selbst noch Oeffnungen angebracht sind, soll von Condenswasser frei bleiben. — Die Schutzmaassregeln gegen die übrigen Schädigungen des Auges müssen wesentlich dem Einzelnen überlassen bleiben; bei Myopie und beginnender Sehschwäche ist die sorgfältige Beachtung der ersten Symptome und baldige Aenderung der Beschäftigung vor Allem indicirt.

Seltener wird das Gehörorgan durch das anhaltende betäubende Geräusch in Hammerwerken und Schmieden afficirt. — Ueber Gehörstörungen bei Arbeiten in comprimierter Luft s. unten.

4. Gesteigerter Luftdruck.

Arbeiten in comprimierter Luft haben die Taucher in der Taucherglocke zu leisten, in welcher durch kontinuierliche Zuleitung comprimierter Luft das Wasser verdrängt wird. In grösstem Umfang werden Arbeiten unter ähnlichen Verhältnissen ausgeführt bei der Fundirung von Brückenpfeilern, beim Schleusenbau, auch beim Tunnel- und Brunnenbau. Aus dem wasserführenden Boden wird das Wasser dadurch verdrängt, dass ein unten offener Hohlzylinder (Caisson) in den Boden eingesenkt und dass nun durch verdichtete Luft das Wasser zurückgedrängt und der Raum im Hohlzylinder so lange wasserfrei erhalten wird, wie die Arbeiten dauern. Je nach der zu überwindenden Wassersäule ist der anzuwendende Druck verschieden und beträgt nicht selten bis zwei Atmosphären und mehr. — Bei den in diesen Caissons beschäftigten Arbeitern treten die S. 117 geschilderten Symptome sehr ausgeprägt hervor; jedoch sind dieselben unbedenklich und wenig belästigend. Nur der Uebergang aus der komprimierten Luft in Luft von gewöhnlichem Druck muss aus den S. 117 angeführten Gründen mit Vorsicht und allmählich geschehen. Dies wird dadurch erreicht, dass am oberen Ende des Caissons eine Luftschleuse angebracht ist, die den plötzlichen Ein- und Austritt verhindert.

Die Arbeiter gelangen beim Einfahren zunächst in die Vorkammer V. Die von da in den Caisson führende Thür t_1 lässt sich aber vorläufig nicht öffnen, weil die Thür durch die innen befindliche komprimierte Luft fest ange-

icht wird. Erst nachdem die Arbeiter durch den Hahn h_1 Druckluft all-
 mählich in die Vorkammer eingelassen haben, so dass schliesslich der Druck
 dieser der gleiche wie im Caisson ist, lässt sich die Thür t_1 öffnen und die
 Arbeiter können absteigen. Gleichzeitig wird nun aber die von der Vor-
 kammer nach aussen führende Thür t_2 fest von innen an-
 geschraubt. Kommen unter diesen Umständen die ausfahrenden
 Arbeiter in die unter Ueberdruck stehende Vorkammer,
 können sie die Aussenthür nicht öffnen. Sie müssen erst
 durch den Hahn h_1 die verdichtete Luft der Vorkammer
 allmählich ausströmen lassen, und erst wenn dadurch der
 Druck dem der Aussenluft ungefähr gleich geworden ist,
 es ihnen möglich, den Raum zu verlassen.




Fig. 160.

5. Excessive Temperaturen.

Hohe Temperaturen kommen bei zahlreichen Ge-
 rebetrieben vor; oft in Form der strahlenden
 Wärme (z. B. bei Heizern, Schmelzofen- und Glas-
 weisern, Giessern, Schmieden, Bäckern), die jedoch
 verhältnissmässig gut ertragen wird, da bei diesen Betrieben eine sehr
 reichliche Luftzufuhr die Wärmeabgabe erleichtert. Nur kommt eine
 Ermüdung der fortwährend stark schwitzenden und erhitzten Haut zu
 Hauterkrankungen (Eczem, Lichen) zu Stande; ferner disponirt die
 reichliche Getränkaufnahme zu Verdauungsstörungen. — Weit nach-
 theiliger auf das Allgemeinbefinden wirkt der Aufenthalt in einem ge-
 schlossenen Arbeitsraum, dessen Luft eine Temperatur von 25—30°
 C. darüber zeigt und daneben noch eine hohe Luftfeuchtigkeit.
 Beispielsweise kommen solche Wärmegrade vor in tiefen Bergwerken
 und bei Tunnelbauten, wo die resultirende Wärmestauung oft die Ar-
 beiten aufs Aeusserste erschwert; ferner in Färb-, Dekatir- und Appre-
 turwerkstätten, Kammwoll-, Baumwoll- und Flachsspinnereien und
 Webereien, in den Drehersälen der Porzellanfabriken u. a. m. Bei den
 genannten Gewerben ist durch Grösse der Arbeitsräume, reichliche
 Ventilation, eventuell Einführung elektrischer Beleuchtung an Stelle
 der Gasbeleuchtung und insbesondere durch Umhüllung der Dampf-
 kessel mit Wärmeschutzmitteln (Schlackenwolle, Kieselguhr u. s. w.),
 resp. durch Ummantelung der Öfen nach Möglichkeit Abhülfe zu
 schaffen. In manchen Fabriken sind indess solche Schutzmittel nur
 in sehr beschränktem Maasse anwendbar, weil für die betreffende
 Technik hohe Temperaturen und hohe Feuchtigkeitsgrade erforder-
 lich sind; so z. B. geht das Verspinnen nur in Arbeitsräumen mit
 sehr feuchter Luft gut von Statten. — Ueber Schutz gegen Ver-
 wundungen s. S. 343.

6. Einathmung von Staub.

Während im Freien nur vorübergehend grössere Staubmengen einathmet werden, sind bei vielen Gewerbebetrieben die Arbeiter einer steten Staubinhalation ausgesetzt, und als Folge derselben beobachtet man massenhafte Einlagerungen der Staubtheilchen in die Schleimhäute, in die Lymphbahnen des Lungenparenchyms und in die Bronchialdrüsen. Die Symptome, die dadurch vorzugsweise veranlasst werden, sind die des chronischen Bronchialkatarrhs und in der Folge oft des Lungenemphysems.

Manche Beobachter führen auch pneumonische Erkrankungen auf direkte Staubeinwirkung zurück; ebenso wird Lungenphthise vielfach als Folge von Staubinhalation bezeichnet; und zwar wird namentlich metallischer und mineralischer Staub als gefährlich angeschuldigt, während vegetabilischer und animalischer Staub relativ selten Phthise veranlassen soll. Hier ist indess der Staub nicht die allein ausreichende Ursache, sondern ein wichtiges disponirendes Moment, welches Invasionspforten für die specifischen Erreger schafft. Es ist experimentell nachgewiesen, dass gleichzeitige Inhalation von scharfem Staub und Bakterien zu schwerer Infektion führt, die bei Inhalation von Bakterien allein oder von Staub allein ausbleibt. — Statistische Erhebungen über die Folgen der Staubinhalation stossen insofern auf Schwierigkeit, als es meist unentschieden bleibt, ob die Einathmung des Staubes den wesentlichsten Einfluss auf die Frequenz der Phthise geäussert hat, oder ob die sonstigen Lebensverhältnisse der betreffenden Arbeiter, die Vererbung und vor Allem die vermehrte Gelegenheit zur Aufnahme der Tuberkelbacillen in den theilweise mit Phthisikern besetzten Arbeitsräumen bedeutungsvoller ist.

HESSE hat die Menge des von einem Arbeiter in 10 Stunden eingeathmeten Staubes bestimmt:

in einer Rosshaarspinnerei zu	0,05 g.
„ „ Kunstwollefabrik	0,1 „
„ „ Mühle	0,13 „
„ „ Schnupftabakfabrik	0,36 „
„ „ Cementfabrik	1,1 „

Am wenigsten verderblich ist die Einlagerung von Kohlenstaub in die Lungen, die Anthrakosis, die zwar nicht selten chronischen Katarrh hervorruft, aber so selten mit Phthisis complicirt ist, dass manche Beobachter der Kohlenlunge geradezu eine Immunität gegen diese Krankheit zuschreiben wollen. Die gewerblichen Arbeiter, welche besonders leicht Kohlenlunge acquiriren, sind vor Allem die Bergleute der Kohlengruben; in geringerem Grade exponirt sind Köhler, Kohlenhändler und Kohlenträger, Heizer. Ferner wird Kohle in Form von Russ aufgenommen von Schornsteinfegern und Bergleuten; in Form von Graphit von Giessern, Formern und Bleistiftarbeitern.

Feinste Theilchen von Eisen, Eisenoxyd oder Eisenoxyduloxyd

die Siderosis pulmonum hervor; Kupfertheilchen wirken ver-
 ähnlich. Als Folge der eingelagerten Partikelchen entstehen
 ische Knoten und eine lobuläre, interstitielle indurirende Pneu-

Schmiede und Schlosser, ebenso Kupferschmiede, Klempner,
 cher u. s. w. kommen zwar mit feinen Eisen-, resp. Kupfertheil-
 n Berührung, doch sind die letzteren nicht fein genug, um in
 er Menge in die Lungen aufgenommen zu werden. Am meisten
 is dieser Kategorie noch die Feilenhauer exponirt. Dagegen ent-
 enorme Massen von feinstem Eisenoxydstaub bei der Benutzung
 z. rothen Smirgels (Englisch Roth), der als Polirmittel für Stahl
 iegel dient; ferner kommt beim Schleifen der Eisen- und Stahl-
 ein aus Eisen- und Steintheilchen gemischter Staub zur Wirkung.
 n Schleifstaub sind das Wesentliche die steinigen Partikel-
 welche im Ganzen ähnliche Erscheinungen hervorrufen, wie der
 sche Staub. Der Schleifstaub bildet sich nur beim Schleifen von
 Strick- und Stecknadeln, die trocken geschliffen werden, während
 leifen gröberer Objecte unter Befeuchtung erfolgt. — Von sonstigem
 lischem Staub gilt als besonders gefährlich der harte, spitzige
 staub, dem die Arbeiter in den Stampfwerken der Glasfabriken
 e Mühlsteinhauer exponirt sind. Beim Glasschleifen wird das
 pulver (Feuerstein oder Englisch Roth) gewöhnlich mit Wasser
 achtet, nur bei einigen seltenen Schliffarten werden die Arbeiter
 trockenen Staub gefährdet. Thonstaub wird von Ultramarin-,
 anarbeitern, Töpfern und Specksteinarbeitern, Kalkstaub in Form
 etzkalk von den Arbeitern der Kalköfen beim Ausnehmen des
 nten Kalks eingeathmet; in Form von kohlensaurem Kalk von den
 atterdrechslern. Sehr viel Staub entwickelt sich bei der Cement-
 tion, wo Kreide oder Kalk, Thon und Sand in sehr fein gemahlenem
 d gemengt werden. Gypsstaub belastigt hauptsächlich die Stuckar-
 beim Abschleifen des Stucks mit Bimsstein. Besonders grosse Mengen
 n gefährlichen Staubes liefert die Thomasschlackenindustrie.
 nter den organischen Staubarten führt der Tabaksstaub, der
 beim Rapiren (Zerkleinern mit Wiegemessern), Sortiren, Sieben
 acken des Tabaks in grosser Menge entwickelt, zuweilen — aber
 elten — zu Ablagerungen in den Lungen. Die überwiegende
 ahl der Arbeiter merkt auch bei langdauerndem Aufenthalt in
 staub keine Schädigung der Gesundheit. — Enorme Massen von
 treten in Baumwoll- und Wollspinnereien auf.

baumwollstaub entwickelt sich zunächst, wenn die rohe Baumwolle im
 olf zerrissen und gelockert wird; ferner wenn die gereinigte Baumwolle
 Krempel- und Kratzmaschinen durch spitze Kupferdrähte (Karden) in

parallele Lage gebracht und zum Spinnen vorbereitet wird. Insbesondere beim Reinigen der Karden von den daran haften gebliebenen Fasern erheben sich mächtige Wolken leichten Staubes.

Wollstaub tritt zunächst schon beim Sortiren und Klopfen der Wollen auf, dann beim Wolfen und Krempeln der Wolle sowie beim Scheeren des Tuchs. Besonders reichlich ist der Staub in der Kunstwollindustrie, wo Woll Lumpen im Reisswolf zerrissen werden.

Dem Staub von thierischen Haaren sind Bürstenbinder beim sog. Kämmen der Borsten, ferner Tapezierer, Sattler, Kürschner ausgesetzt; in weit höherem Grade aber die Arbeiter, welche bei der Fabrikation von Hüten aus Hasen-, Kaninchen- und Biberhaar beschäftigt sind, und speciell diejenigen, welche das Schneiden der Haare (Kürzen der Borstenhaare, bis sie mit dem Flaumhaar gleiche Länge haben) besorgen.

Vielfach werden die Felle vor dem Enthaairen mit Scheidewasser und metallischem Quecksilber behandelt, so dass Merkuronitrat sich bildet, das getrocknet und nachher geklopft und gebürstet. Dabei kann ein durch Beimengung jenes Quecksilbersalzes besonders gefährlicher Staub sich entwickeln.

Bei der Bearbeitung der Bettfedern, ferner bei der Bearbeitung des Holzes (in Fass- und Bleistiftfabriken) sowie in den Hadernsälen der Papierfabriken kommt es gleichfalls zu belästigendem Staub.

Auch die organischen Staubarten beeinträchtigen die normale Aufnahme von Athemluft und bewirken eine fortgesetzte Reizung der Respirationsschleimhaut, Neigung zu chronischen Katarrhen und damit häufig Invasionspforten für Contagien, an denen es in den betreffenden Arbeitsräumen nie zu fehlen pflegt.

Ueber giftigen und contagösen Staub siehe unten.


Die Schutzmittel gegen die Staubinhalation bestehen erstens in der Hinderung der Staubentwicklung; zweitens in der sofortigen Entfernung des einmal gebildeten Staubes durch Absaugen; drittens in Respiratoren, welche die Arbeiter in der staubhaltigen Luft anlegen.

Um die Staubproduktion zu hindern, könnte man daran denken, das Material anzufeuchten oder die Zerkleinerung unter Wasser vorzunehmen. Aus technischen Gründen kann jedoch nur in den seltensten Fällen von diesem Mittel Gebrauch gemacht werden. — Dagegen wird neuerdings die Zerkleinerung steiniger, Staub liefernder Massen in ganz geschlossenen Behältern, in den sogenannten Kugelmøhlen vorgenommen, die sich z. B. in Pochwerken bereits gut bewährt haben.

Am häufigsten wird die Entfernung des gebildeten Staubes versucht durch kräftige Luftströme. Die Anwendung derselben soll

nicht in Form eines den ganzen Arbeitsraum ventilirenden es erfolgen, der entfernt von der Stelle der Staubproduktion ein- austritt. Oben (S. 417) wurde bereits betont, dass eine solche lation zur Beseitigung von Staub unzureichend ist; soll sie aus- ; wirken, so muss eine so kräftige Luftbewegung vorhanden sein, ein Aufenthalt in dem betreffenden Raum kaum zu ertragen wäre trotzdem würde der Effekt meist ungenügend ausfallen. Der trom muss vielmehr seine grösste Geschwindigkeit dort entwickeln, er Staub entsteht, d. h. die Abströmungsöffnung muss in unmittel- r Nähe der Arbeitsplätze u. s. w. liegen, so dass es zum Ab- n des Staubes kommt, ehe derselbe sich im Raum verbreitet hat. n Anforderungen entsprechen die Exhaustoren, weite Rohre, in en mittelst kräftigen Motors ein starker aspirirender Luftstrom gt wird und deren trichterförmige Einströmungsöffnungen über noch besser unter den einzelnen Arbeitsplätzen angebracht sind zeitweise in unmittelbare Nähe der staubenden Objecte geführt n können. Die Exhaustoren werden mit gutem Erfolge benutzt zum Absaugen des Baumwollstaubes im Reisswolf, sowie beim gen der Karden; ferner zum Absaugen des bei der Hutabreibung ehenden Staubes, des Schleifstaubes in Nadel- und in Hornkamm- en, des Mühlenstaubes u. s. w.

Der Reisswolf wird mit einem dicht schliessenden Gehäuse umgeben, das den Canal *b* (Fig. 161) mit einer Vorkammer in Verbindung steht; aus wird durch die Oeffnung *e* mittelst en Aspirators die Luft fort- nd abgesogen. Die bei *a* ein- ie Baumwolle sammelt sich nach



61. Reisswolf mit Staubabsaugung.




Fig. 162. Staubabsaugung bei der Reinigung der Karden.

assiren des Wolfs bei *e* und wird dort durch eine Thür von Zeit zu Zeit genommen; der abgerissene lockere Staub aber wird bei *d* durch ein schichtiges Filter gerissen, gelangt in den Exhaustor und von da in's Freie. sollen die Karden gereinigt werden, so wird zunächst eine Verbindung en der Reinigungsstelle und einem Rohre (*a* in Fig. 162) hergestellt, das

über sämmtlichen Krempelmaschinen herläuft und zu einem mit Maschinenkraft betriebenen Ventilator führt. Dieses Rohr trägt mehrere Stützen (*b*), die für gewöhnlich verschlossen sind; soll die Reinigung beginnen, so wird das Gehäuse, welches die Karden bedeckt (*d*), zurückgeklappt und in den Stutzen ein Trichter *c* eingesetzt, dessen Oeffnung bis nahe auf die Karden reicht. Werden nunmehr die Baumwollreste mit Bürsten u. dergl. von den Karden gelöst, so werden sie vollständig in den Exhaustor abgeführt.

Vielfach finden auch Respiratoren Anwendung; dieselben bestehen aus feinmaschigen, porösen Stoffen, welche den Staub abfiltriren, die Luft aber passiren lassen sollen. Entweder werden nur feine Drahtgewebe verwendet oder solche mit Einlagen von Watte resp. Wollstoff, die eventuell angefeuchtet werden sollen; oder auch platte Schwämme, die angefeuchtet und fest vor Mund und Nase gebunden werden. Eine besondere Form stellen die Masken dar, welche den ganzen Kopf bedecken und eine Zufuhr von frischer, reiner Luft durch Schläuche erhalten. — Die Respiratoren werden jedoch von den Arbeitern sehr ungern benutzt. Haben sie enge Poren, so wird die Athmung erschwert, insbesondere wenn bereits Staubtheilchen in das Filter eingelagert sind. Weite Poren gewähren wiederum nicht genügende Zurückhaltung des Staubes. Empfehlenswerth sind daher die Respiratoren wesentlich nur zur vorübergehenden, kurzdauernden Benutzung in einer Luft, welche starke Staubmassen oder gar giftigen Staub enthält.

7. Die Einathmung giftiger Gase.

Abgesehen von den schädlichen resp. belästigenden Gasen, welche durch die Ansammlung von Menschen und durch die Beleuchtung geliefert werden, kommt es bei manchen Gewerben zu einer Produktion theils irrespirabler, theils toxischer Gase, welche oft schon in sehr kleinen Mengen gesundheitsschädigend wirken. Die wichtigsten derselben sind: Chlor, salpetrige Säure, Salzsäure, schweflige Säure; seltener kommen Kohlensäure, Kohlenoxydgas, Schwefelwasserstoff und Schwefelkohlenstoff in Betracht.

In der folgenden von LEHMANN aufgestellten Tabelle (S. 531) ist angegeben, bei welchen Concentrationen bzw. bei welcher Dauer der Einwirkung eine schädigende Einwirkung auf den Menschen zu Stande kommt.

Chlor kann zur Einathmung gelangen bei der Chlorkalkfabrikation und beim Schnellbleichen. Nur ein sehr kleiner Gehalt ist als unbedenklich anzusehen. Ein Gehalt von 0.005 p. m. ruft bereits starke Reizung der Schleimhäute hervor und muss bei dauernder Einwirkung als unzulässig bezeichnet werden. — Durch die Verwendung

	Concentrationen, die rasch gefähr- liche Erkrankun- gen bedingen	Concentrationen, die nach $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde ohne schwerere Stö- rungen zu ertragen sind	Concentrationen, die bei mehrstündi- ger Einwirkung nur minimale Sym- ptome bedingen
Salzsäuregas . . .	1.5—2.0 ‰	0.05 bis höchstens 0.1 ‰	0.01 ‰
Schweflige Säure .	0.4—0.5 ‰	0.05 ‰ od. weniger	—
Kohlensäure . . .	circa 30 ‰	bis 8 ‰	1 ‰ (?)
Ammoniak	2.5—4.5 ‰	0.3 ‰	0.1 ‰
Jod und Brom . .	0.04—0.06 ‰	0.004 ‰	0.001 ‰
od	—	0.003 ‰	0.0005—0.005 ‰
Schwefelwasserstoff	0.5—0.7 ‰	0.2—0.3 ‰	—
Schwefelkohlenstoff	10—12 mg i. 1 Lit.	1.2—1.5 mg i. 1 Lit.	—
Kohlenoxyd . . .	2—3 ‰	0.5—1.0 ‰	0.2 ‰

gut schliessender Apparate und reichliche Ventilation kann jedoch die Beimengung von Chlorgas zur Luft des Arbeitsraumes in den genannten Gewerben ziemlich leicht vermieden werden. Für kurzes Betreten eines mit Chlor erfüllten Raumes (Ausnehmen des fertigen Chlorkalks) ist das Verbinden von Respiratoren, welche mit Alkohol befeuchtete Schwämme enthalten, indicirt.

Salpetrige Säure entsteht bei Herstellung der concentrirten Salpetersäure, bei der Fabrikation der Eisenbeize, ferner bei der Bereitung des Nitrobenzols, das jetzt in grossem Maassstabe zur Darstellung der Anilinfarben Verwendung findet. In geringerem Grade entwickelt sich salpetrige Säure in den Münzen und bei der galvanischen Vergoldung.

Es lässt sich jedoch ein zu hoher Gehalt der Luft an salpetriger Säure bei allen diesen Gewerben mit einiger Vorsicht vermeiden. Die bei der Darstellung der concentrirten Salpetersäure auftretenden Dämpfe müssen durch Condensationsthürme mit Wasserregen geführt werden; im Uebrigen sind so viel als möglich geschlossene Apparate zu verwenden und es ist für reichliche Ventilation zu sorgen.

Salzsäuregas ruft bei einem Gehalt von 0.5 p. m. bei Versuchs- thieren schon deutliche Symptome von Reizung der Schleimhäute hervor. — Kleinere Mengen Salzsäuregas entstehen in der Töpferei (bei der Kochsalzglasur der Steingutwaaren, vgl. S. 534), bei der Glasfabrikation und bei der Zinnsalzdarstellung. In ungeheuren Massen entweicht Salzsäure in den Sodafabriken bei dem Sulfatprocess, durch welchen aus Kochsalz und Schwefelsäure Natriumsulfat und Salzsäure gewonnen wird. Während man diese Massen von Salzsäuregas früher

durch Schornsteine abströmen liess, werden dieselben jetzt gewöhnlich durch Waschen zunächst in doppelhalsigen mit Wasser gefüllten Flaschen (sogenannten Bonbonnes), dann in Coaksthürmen, in welchen Wasser herabrieselt, zurückgehalten. Bei ausreichender Ventilation der Arbeitsräume kommt es selten zu schädigender Einwirkung.

Schweflige Säure wirkt weniger intensiv; deutliche Giftwirkung tritt erst bei einem Gehalt von 0.5 p. m. hervor. Die schweflige Säure wird der Luft des Arbeitsraumes zugemengt z. B. in der Strohhutfabrikation beim Bleichen der Hüte, ebenso beim Bleichen von Seide, Woll- und Baumwollstoffen, von Darmsaiten u. s. w.; ferner beim Schwefeln des Hopfens. Zeitweise kommt es zu einer sehr starken Bildung der Säure in Alaun-, Glas- und Ultramarinfabriken; ferner bei der Schwefelsäurebereitung. Enorme Mengen von schwefliger Säure werden oft von den Röstöfen der Hüttenwerke geliefert; doch führt dies mehr zu einer Belästigung der Anwohner (s. unten), als zu einer Gefährdung der Arbeiter.

Die schädlichen Einwirkungen der schwefligen Säure in den Gewerben sind leicht durch Ventilationseinrichtungen zu vermeiden. Ueber die Beseitigung der Hüttengase siehe S. 535.

Kohlensäure wirkt erst bei sehr bedeutender Anhäufung toxisch (vgl. S. 154). Derartige Concentrationen kommen zuweilen vor in den Gährungsgeweben, in Bierbrauereien, Weingärkellern, Presshefefabriken. Ferner werden Brunnenarbeiter in tiefen Brunnenschächten, Todtengräber in Gräften, Lohgerber in Lohgruben einer Kohlensäure-Intoxikation ausgesetzt, jedoch nie ohne eine gewisse Fahrlässigkeit. In Bergwerken bilden sich zuweilen starke Kohlensäure-Ansammlungen, die schliesslich Intoxikation veranlassen können (matte Wetter). Hier müssen gute Ventilationsvorrichtungen Abhilfe schaffen.

Kohlenoxydgasvergiftung tritt zuweilen bei Gasarbeitern ein; häufiger können die Gichtgase der Eisenhütten und die Minengase zu Kohlenoxydgasvergiftung führen. Auch dieser Gefahr lässt sich meistens mit einiger Sorgsamkeit begegnen. Eine Abführung der Gichtgase wird neuerdings um so energischer angestrebt, als dieselben zur Winderhitzung oder Dampfkesselheizung vorteilhaft ausgenutzt werden können.

Schwefelwasserstoff ruft schon bei einem Gehalt von 0.5—0.6 pro mille gefährliche Wirkungen auf die Arbeiter hervor. Bei stärkerer Concentration können sehr plötzlich Krämpfe, Asphyxie und der Tod eintreten. Ausser bei manchen chemischen Präparationen, z. B. gewissen Arten der Verarbeitung von Sodarückständen, kann sich Schwefelwasserstoff in Kloaken, Canälen und durch sonstige Ansammlungen von faulenden Substanzen in solcher Menge entwickeln, dass toxische Wirkungen bei den Arbeitern auftreten. Die Gefahr lässt sich durch Vorsicht des Einzelnen um so leichter vermeiden, als in dem intensiven Geruch des Gases ein warnendes Symptom gegeben ist.

Schwefelkohlenstoffkrämpfe führen zuweilen zu Intoxikations-Erscheinungen bei den Arbeitern von Gummifabriken.

8. Beschäftigung mit giftigem Arbeitsmaterial.

Bei der Bearbeitung von giftigem Material kann die Aufnahme Giftes theils durch Einathmung von Staub oder Dämpfen erfolgen, s dadurch, dass in Folge von Berührungen und Hantirungen kleine Lecken des Giftes in den Mund, auf Speisen u. s. w. gebracht werden so in den Verdauungstraktus gelangen; theils endlich dadurch, von Hautwunden und Schrunden aus eine Resorption stattfindet. t kommen alle drei Wege in Frage; am häufigsten scheinen die tigungen zu Vergiftungen Anlass zu geben. — Die Stoffe, welche lewerbebetrieb hauptsächlich solche Vergiftungen veranlassen, sind: Zink, Quecksilber, Phosphor und Arsen.

Blei. Die Verwendung des Bleis zu den verschiedensten Gebrauchsständen (Glasuren der Kochgeschirre, Wasserleitungen, Kinderspiel-, Farben, Kitte u. dgl.) bewirkt Gefahren sowohl für zahlreiche erbliche Arbeiter wie auch für das kaufende Publikum. Von den er Bleiindustrie beschäftigten Arbeitern erkrankten 20—40 Procent chronischer Bleivergiftung. — Zunächst sind die Hüttenarbeiter hrdet; die Erzscheider relativ wenig, weit mehr die beim Rösten Schmelzen der Erze und beim Abtreiben des Werkbleis befügten Arbeiter, da ein Theil des Bleis und Bleioxyds sich bei m Processen in Form von Dampf verflüchtigt. Die hohe Temperatur und die starke Anstrengung unterstützen das Siechthum dieser gorie von Arbeitern. — Die Hauptmassen der beim Verhütten ehenden Dämpfe gelangen nach aussen, Blei und Bleioxyd scheiden dann allmählich wieder aus und veranlassen eine gefährliche Ausung bleihaltigen Staubes in der ganzen Umgebung der Hütte (Flugb, Hüttenrauch).

Die Verarbeiter des fertigen reinen Bleis, das zur Herstellung Pfannen, Schrot, Bleirohr, Folie u. s. w. verwandt wird, sind relativ g exponirt. In höherem Grade die Schriftgiesser, namentlich i Hobeln und Schleifen der aus einer Legirung von Blei, Antimon Zinn bestehenden Lettern. Schriftsetzer sind ebenfalls durch die rährende Berührung der Lettern, namentlich aber durch den in Setzkästen sich sammelnden resp. auf dem Fussboden durch das umtreten auf herabgefallenen Lettern entstandenen bleihaltigen b gefährdet.

Legirungen des Bleis mit Zinn werden ferner verwendet Löthen und Verzinnen, zu Folie, die zum Einwickeln von Käse, k u. s. w. dient, und zu Mundstücken von Flaschen; weite Kreise des ikums werden durch den Bleigehalt dieser Gebrauchsgegenstände

gefährdet. Besonders bedenklich ist die Benutzung von Schrot zum Flaschenspülen, da derselbe unter Zusatz von ca. 0.5 Procent arseniger Säure zum geschmolzenen Blei hergestellt wird.

In sehr erheblichem Grade tritt die Gefahr der Bleivergiftung in denjenigen Gewerben hervor, in welchen Verbindungen und namentlich Oxydationsstufen des Bleis hergestellt und verarbeitet werden.

Bleioxyd entsteht bei der Verarbeitung des Bleis auf Silber; nachdem es gemahlen, geschlemmt und gebeutelt ist, stellt es ein feines gelbes Pulver dar, das als Massicot in den Handel kommt und zur Herstellung von Bleiplatten und in der Glaserei (zur Herstellung der Glasarten von höherem Lichtbrechungsvermögen) Verwendung findet. — Das bis zur Rothgluth erhitze Bleioxyd liefert die Mennige, die durch Pulverisation und Beuteln in feinste Staubform gebracht werden muss und dann zur Herstellung von Oelkitt dient. Die Arbeiter sind bei vielen der angeführten Manipulationen dem bleihaltigen Staub sehr exponirt.

Bleioxyd findet sich ferner häufig in der Glasur der Töpferwaaren und im Email der emaillirten Eisenwaaren. — Unter den Thonwaaren unterscheidet man A) dichte, die so stark erhitzt sind, dass ihre Masse halb verglast ist, und die daher auch ohne Glasur undurchdringlich für Wasser sind. Dahin gehört 1) das echte Porzellan, an dünnen Stellen durchscheinend, mit stets bleifreier Glasur. 2) Steinzeug, nicht durchscheinend. Das feine weisse, porzellanähnliche enthält in der Glasur Bleioxyd und Borax. Das gemeine graubraune oder blaue Steinzeug, das z. B. zu Mineralwasserkrügen, Steintöpfen u. s. w. verarbeitet wird (Coblenzer Geschirr) enthält dagegen eine Kochsalzglasur, die stets bleifrei ist. Dieselbe wird so hergestellt, dass gegen Ende des Brennens ClNa eingeworfen wird; dasselbe wird durch die Kieselsäure des Thons und Wasser zersetzt, so dass sich HCl bildet, die entweicht (s. S. 531) und andererseits Natrium-Aluminiumsilikat, das die Glasur darstellt.

In eine zweite Abtheilung B) gehören die porösen Thonwaaren, bei denen die Masse nicht verglast ist, so dass sie ohne einen Glasurüberzug Wasser durchlassen. Porös sind z. B. die Fayencewaaren, mit meist blei- oder zinnhaltiger Glasur; ferner die gemeine Töpferwaare (gewöhnliches irdenes Kochgeschirr, Bunzlauer Geschirr). Hier ist die Glasur stets bleihaltig. Sie wird dadurch erzeugt, dass das Geschirr mit fein gemahlenem PbS bestaubt wird; es entweicht dann SO_2 und das entstandene PbO bildet mit Kieselsäure und Thonerde ein Blei-Aluminiumsilikat. Dieses die Glasur liefernde Silikat hält sich gegenüber verdünnten Säuren unverändert und lässt in diese kein Blei übergehen. Ist aber das Brennen mangelhaft gewesen oder war ein Ueberschuss von PbS zugesetzt, so wird z. B. von Essig Bleioxyd gelöst.

Emaillirte Eisenwaaren enthielten früher wohl bleihaltige Glasur, jetzt enthalten dieselben durchgehends nur Zinnoxid mit Spuren von Blei. Bei stärkerem Bleigehalt wird Blei an Essig abgegeben.

Den hervorragendsten Procentsatz von gewerblichen Bleivergiftungen liefern die Fabriken von Bleiweiss [basisches Bleicarbonat, $(\text{PbCO}_3)_2 + \text{Pb}(\text{OH})_2$]. Beim Ausnehmen des durch Einwirkung von Essig- und Kohlensäure auf Bleiplatten hergestellten Bleiweisses an

der dazu dienenden Kammer athmen die Arbeiter grosse Mengen Bleiweissstaub ein und verunreinigen sich in hohem Grade Kleidung und Haut; ferner kommen beim Schlemmen des Präparates die Hände mit gelöstem Bleiacetat in Berührung. Beim Mahlen und Verpacken des trockenen Präparates wird wiederum massenhafter Staub aufgewirbelt.

Das fertige Bleiweiss wird hauptsächlich verwendet von Malern; es liefert mit Oel verrieben die beliebteste weisse Farbe; Lackirer benutzen es bei der Herstellung von Lackfarben, ferner wird es bei der Fabrikation von Abziehbildern, in Wachstuchfabriken, in Strohhutfabriken u. s. w. gebraucht.

Die Schutzmaassregeln gegen die Gefahren der Bleivergiftung entstehen beim Verhüttungsprocess vor Allem in einer Abführung der




Fig. 163. Röstofen (A) mit Flugstaubkammern (B).

Bleidämpfe in lange Condensations-Canäle resp. Kammern, die schliesslich in eine hohe Esse ausmünden. An den Wandungen der Canäle setzt sich in grosser Menge der sogenannte Flugstaub ab, der später weiter verarbeitet wird. Durch derartige Einrichtungen lässt sich ein fast vollständiger Schutz der Hüttenarbeiter erzielen. — Das Ausnehmen des Flugstaubes darf nur nach vollständigem Erkalten der Kammern und eventuell unter Vorlegen von Respiratoren geschehen.

In der Bleiweissfabrikation ist zunächst das Ausnehmen des fertigen Bleiweisses und das Abtrennen desselben von dem noch unzersetzen Blei dadurch gefahrlos zu machen, dass die Kammern mit einem Exhaustor oder einem Wasserzerstäuber versehen werden. Oder die Arbeiter tragen eine Staubmaske, welche Kopf und Hals einschliesst und aus einer doppelten Wandung von Aluminiumblech besteht; durch die innere durchlochte Wandung wird stets frische Luft nachgepumpt. Beim Schlemmen erhalten die Arbeiter lange, kalblederne Däumlingshandschuhe und müssen die Hände mit Schmalz einreiben. — Das

Pulverisieren des Bleiweisses (und der Mennige) kann in völlig geschlossenen sogenannten Desintegratoren geschehen. Das Stauben beim Einpacken kann dadurch unschädlich gemacht werden, dass über jeder Packstelle ein Exhaustor in Thätigkeit ist in der Weise, wie es schematisch in Fig. 164 dargestellt ist. Packraum (und Pulverisirmühle) sind durch die Saugröhren *c*, die mit trichterförmigen Ansätzen (*b*) versehen werden können, mit dem Exhaustor *d* verbunden. Dieser treibt die staubhaltige Luft in die Cisterne *e*, wo die Luft zu einem Zickzacklauf gezwungen wird, dann in ein mit Coaksstücken gefülltes Eisenrohr *f* und von da in's Freie. — Auch das Anreiben des Bleiweisses mit Öl lässt sich in verschlossenen Gefässen vornehmen.




Fig. 164. Absaugung des Bleiweissstaubes.

In den übrigen Gewerben sind allgemeine Vorsichtsmaassregeln ausreichend (die übrigens auch in den Bleiweissfabriken trotz der vorherbesprochenen Schutzvorkehrungen wohl zu beachten sind), und diese bestehen vor Allem in peinlicher Sauberkeit. Namentlich sollen die Hände ohne gründliche Reinigung nicht mit dem Munde oder mit Speisen in Berührung gebracht werden. Letztere sollen auch der Luft der Arbeitsräume nicht ausgesetzt werden. Wascheinrichtungen und Bäder, sowie besondere Speiseräume sind daher unbedingt in jeder Fabrik vorzusehen. Ferner sind die Kleider häufig zu wechseln.

In manchen Bleiweissfabriken hat sich die regelmässige Verabfolgung von Milch an die Arbeiter ($\frac{3}{4}$ Liter pro Kopf und Tag) als Prophylaktikum gut bewährt; auch Schwefelpillen sind von Einigen empfohlen. In einer Fabrik sind gute Erfahrungen gemacht mit einem steten häufigen Wechsel der zu den gefährlichen Beschäftigungen benutzten Arbeiter, da erfahrungsgemäss nur eine länger dauernde Aufnahme von Blei Schaden zu bringen pflegt.

Gegen die Gefährdung des Publikums durch bleihaltige Gegenstände ist in Deutschland Schutz gewährt durch das Reichsgesetz von

187. Dasselbe bestimmt: 1) Ess-, Trink- und Kochgeschirre, die aus Metalllegierungen hergestellt sind, dürfen nicht mehr wie 10 Procent Zinn enthalten. An der Innenseite müssen solche Geschirre verzinnt sein, und zwar darf das Zinn höchstens 1 Procent Blei enthalten. Löthstellen an der Innenseite müssen mit einer Legierung von höchstens 1 Procent Bleigehalt gelöthet werden. Zu Bierdruckapparaten, zu Siphons für kohlensaures Wasser und zu Metalltheilen an Kinderwagenflaschen dürfen Legierungen von höchstens 1 Procent Bleigehalt verwendet werden. — Die Metallfolien, welche zur Packung von Zigarren-, Schnupftabak und Käse dienen, dürfen höchstens 1 Procent Blei enthalten. — Ferner darf für Saughütchen, Milchflaschen, Kinderspielzeug u. s. w. kein bleihaltiger Kautschuk verwendet werden.¹ 2) Email und Glasur von Ess- und Kochgeschirren darf beim halbstündigen Kochen mit 4 Procent Essigsäure haltendem Essig kein Blei an letzteren abgeben. — Die Einführung bleifreier Glasuren, z. B. aus Wasserglas und Calciumborat, stösst bei den gewöhnlichen Töpferwaaren auf grosse Schwierigkeiten.

So viel als möglich sollte übrigens dahin gestrebt werden, die Bleipräparate durch weniger schädliche zu ersetzen, z. B. das Bleiweiss durch Zinkweiss u. s. w.

Zink. Die Zinkhüttenarbeiter leiden zuweilen an einer chronischen Form von Zinkvergiftung. Derselben kann durch Ableitung der Zinkdämpfe in Flugstaubkammern und Essen begegnet werden. Das als Farbe und Lack viel gebrauchte Zinkweiss ist zwar weit weniger schädlich wie das Bleiweiss; doch ist immerhin beim Pulverisiren u. s. w. Vorsicht und Anwendung von Exhaustoren geboten. — Eigenthümliche Vergiftungserscheinungen mit Malaria-ähnlichen Symptomen (sogen. Zinkfieber) kommt bei Giessern vor, die mit geschmolzenem Messing (Legierung von Zink und Kupfer) zu thun haben; jedoch ist die genauere Entstehungsursache noch nicht sicher erkannt.

Quecksilber. Die Grubenarbeiter sind wenig, die Hüttenarbeiter etwas mehr exponirt; vor Allem aber kommen gewerbliche Quecksilbervergiftungen vor durch die Spiegelfabrikation, bei welcher das Quecksilber auf der Zinnfolie mittelst Tupfbäuschchen dauernd verrieben werden muss. Es kommt hierbei zur Verunreinigung der Luft mit Quecksilberdampf, hauptsächlich aber verbreitet

¹ Gummisachen, die mit Kindern in Berührung kommen, sollen aus weichem, schwarzem, auf Wasser schwimmendem Gummi bestehen, oder aus hellbraunem Kautschuk (mit unlöslichem Fünffach-Schwefelantimon gefärbt). Dieser Kautschuk enthält meist Zinkoxyd, das sich im Speichel lösen kann.

sich das Quecksilberamalgame durch Verschleudern als Staub in ganzen Räume. Die Vergiftung der Arbeiter scheint vorzugsweise durch Einathmung, nebenbei durch Verschlucken des Staubes und durch Berührungen zu erfolgen. — Ausser bei der Spiegelfabrikation beobachtet man noch bei der Herstellung von Thermometern und Barometern, ferner bei Vergoldern und Broncearbeitern Quecksilbervergiftungen. — Von Salzen des Quecksilbers ist das Mercurnitrat in der Hutmacherei, das Sublimat in Zeugdruckereien und in der medicinischen Praxis als Antisepticum in Gebrauch. Die Vergiftungen mit diesen Präparaten sind jedoch bei einiger Vorsicht leicht zu vermeiden.

Als Schutzmaassregel in den Spiegelfabriken wird vor Allem empfohlen, die Arbeiter nur kurze Zeit in den Belegäumen zu lassen und häufigen Wechsel des Personals einzuführen. Ferner ist auch hier, wie gegenüber der Bleivergiftung, Reinlichkeit, Kleiderwechsel u. a. v. indicirt. Die Belegäume sind mit Fussböden aus Cement oder Asphalt zu versehen, ferner gut zu ventiliren und zu reinigen. Tragen von Respiratoren ist in einigen Fabriken gebräuchlich; in anderen wird als Prophylaktikum Milch verabreicht; auch Mundspülwasser (Galläpfeltinktur, Lösung von übermangansaurem Kali oder Jodkalium) werden vielfach benutzt. Ausgiessen von Ammoniak in den Belegäumen bringt keinen wesentlichen Nutzen. — In den letzten Jahren wird der Quecksilberbelag der Spiegel allmählich durch den Silberbelag verdrängt und damit dem gewerblichen Merkuralismus am radikalsten entgegengearbeitet.

Phosphor. Der zur Zündholzfabrikation verwendete weisse Phosphor entwickelt in den Arbeitsräumen giftige Dämpfe, namentlich beim Bereiten der Zündmasse (Phosphor wird in siedende Gummilösung eingetragen, nach dem Erkalten werden unter Rühren oxydirende Substanzen und Färbemittel zugesetzt), sowie beim Eintauchen der Hölzer in die Zündmasse und beim Trocknen derselben. Theils durch die Einathmung der Dämpfe, theils durch Berührungen entsteht die sogenannte Phosphornekrose, eine langwierige Periostitis der Kiefer. — Die Vergiftung wird vermeidbar durch gründliche Ventilation der betreffenden Räume; an den exponirtesten Stellen müssen Exhaustoren angebracht werden. Ferner ist strenge Reinlichkeit und regelmässige ärztliche Controle der Arbeiter wünschenswerth, bei welcher alle diejenigen, welche cariöse Zähne oder Wunden im Munde haben, auszuschliessen sind. Besondere Mundspülwässer scheinen nichts zu nützen; dagegen will man in einzelnen Fabriken gute Erfolge beobachtet haben, wenn die Arbeiter Näpfehen mit Terpentin auf der Brust tragen resp. wenn in den Arbeits-

men solche Näpfchen aufgestellt sind; es soll dabei der P durch misirten Sauerstoff oxydirt werden. In anderen Fabriken scheint h das Aufstellen von Kupfersulfatlösung besser bewährt zu haben, aus welchem sich Phosphorkupfer neben metallischem Kupfer niederschlägt.

Jedenfalls sollte die Phosphorverarbeitung nur in Fabriken, nicht er als Hausindustrie geduldet werden. Ferner ist zu wünschen, dass e mit giftigem Phosphor präparirten Zündhölzer möglichst durch lehe verdrängt werden, die mit ungiftigen Substanzen hergestellt sind

B. mit chlorsaurem Kali, unterschwefligsaurem Blei und Gummi; er wie die schwedischen Zündhölzer aus chlorsaurem Kali und hwefelantimon als Zündmasse und braunem Phosphor und Schwefel-timon auf der Reibfläche).

Arsen. Bei der Verhüttung der Arsenerze sind die Arbeiter onders gefährdet, welche das Ausnehmen der sublimirten und in n sogenannten Giftkammern wieder verdichteten arsenigen Säure betrken; ferner diejenigen, welche das Verpacken der pulverförmigen enigen Säure besorgen. Hier kann akute Intoxikation drohen, und ist daher die Arbeit in besonderen leinenen Anzügen, welche den opf einschliessen und mit Glasfenstern versehen sind, zu verrichten; usserdem ist das Gegengift (Eisenoxydhydrat) stets vorrätig zu halten.

Chronischer, meist erst nach sehr langer Zeit manifest werdender envergiftung sind die Arbeiter ausgesetzt, welche mit der arsenigen lure oder deren Verbindungen dauernd zu hantiren haben. Dieselbe ird z. B. gebraucht als Beizmittel für Felle, zum Ausstopfen von hieren u. s. w.; namentlich aber zu Kupferarsenfarben (Schwein- unter Grün u. s. w.). Mit diesen Farben haben dann wieder Blumen- ucherinnen, Arbeiter in Buntpapier- und Tapetenfabriken, in Zeug- rbereien u. s. w. zu thun. Die gewerblichen Vergiftungen sind jedoch urch peinliche Reinlichkeit und gute Ventilation zu vermeiden.

9. Gefährdung der Arbeiter durch Contagien.

Die Arbeiter sind der Aufnahme von Contagien ausgesetzt theils urch die Berührung mit kranken Arbeitern sowie durch den Aufent- ult in inficirten Arbeitsräumen; theils haften Contagien an den zu arbeitenden Objecten.

Die erstgenannte Verbreitungsart gilt vor Allem für die Tuber- lose. Sobald eine Anzahl von Phthisikern unter den im gleichen um Arbeitenden sich befinden, ist die Gefahr, dass Gesunde Tuberkel- zillen aufnehmen, ausserordentlich gross, da die Erkrankten gewöhnlich m Husten rücksichtslos Sputumtröpfchen ausstreuen und das Sputum den Fussboden oder in's Taschentuch entleeren, wo dasselbe unter

den gegebenen Verhältnissen leicht austrocknen und in flugfähigen Staub verwandelt werden kann. — Durch die in Kap. X beschriebenen Vorsichtsmaassregeln beim Husten, durch Aufstellung von Spucknapfen und strenge Anhaltung zur Benutzung derselben, bezw. durch Invaliditätserklärung bei einigermaassen vorgeschrittener Phthise kann zu einem wesentlichen Theile die Verbreitung gehindert werden.

Die übrigen beim Gewerbebetrieb übertragbaren contagiösen Krankheiten treten gegenüber der Tuberkulose in den Hintergrund. Erwähnt sei nur noch Syphilis, die bei Glasbläsern zuweilen durch das Blasrohr verbreitet wird; ferner sind Typhusepidemien unter den Arbeitern einer Fabrik mehrfach beobachtet und entweder auf inficirtes Trinkwasser oder auf gemeinsam bezogene inficirte Nahrungsmittel oder auf Kontakte zurückzuführen. Typhusinfektionen sind besonders Grubenarbeiter ausgesetzt, die unter Tage das in den Stollen sich sammelnde und durch Harn oder Fäkalien leicht erkrankter Arbeiter nicht selten verunreinigte sog. „Seigewasser“ zum Händewaschen oder Trinken benutzen. — Bei solchen Bergarbeitern, ferner bei Ziegelarbeitern, die auf stagnirendes Wasser angewiesen waren, ist auch die durch Anchylostoma hervorgerufene Anämie beobachtet (vgl. S. 205).

Als contagiöses Arbeitsmaterial kommt theils solches in Betracht, welches von erkrankten Menschen stammt, theils solches von mit Zoonosen behafteten Thieren, theils Material, welches mit einem Gemenge verschiedenster Bakterien verunreinigt ist.

Der Ansteckung durch menschliche Contagien sind vor Allem die Lumpensortirerinnen der Papierfabriken, die Lumpensammler und Trödler ausgesetzt. Ferner liegen die gleichen Gefahren vor für Arbeiter in Kunstwollfabriken und in Bettfederreinigungsanstalten. Letztere pflegen ausserdem durchaus primitive Verfahren anzuwenden, mittelst welcher keineswegs die Contagien vernichtet werden. — Die Lumpen bedürfen entschieden einer strengeren sanitären Ueberwachung als bisher: vor ihrer Sortirung und weiteren Verarbeitung sollte ihre Desinfektion verlangt werden. Die Bettfederreinigungsanstalten müssen gleichfalls zur Anwendung von wirklich desinficirend wirkenden Apparaten verpflichtet werden. — Durch ihr Gewerbe sind auch Aerzte, Krankenhüter, Hebammen u. s. w. den verschiedensten Infektionen ausgesetzt und bedürfen fortwährend der Anwendung besonderer Vorsichtsmaassregeln (s. im folgenden Kapitel).

Die Uebertragung von Zoonosen erfolgt zuweilen auf Schlachter, Adlerker, Gerber, Lein- und Seifensieder, Wollarbeiter, Kürschner und Beschaararbeiten. Hauptsächlich kommt Milzbrand, seltener Rotz in Frage. Die im Vorstehenden erforderlichen Cautelen sind S. 487 bereits

prochen; Wolle und Rosshaare von nicht sicher unverdächtiger Herkunft sind stets erst einer Desinfektion zu unterziehen, durch welche Keime abgetödtet werden.

Canalarbeiter, Grubenräumer, kurz Arbeiter, welche mit bakteriellen thierischen Abfällen zu thun haben, sind, wenn sie Wunden an den Händen haben, septischen Infektionen ausgesetzt. Jedoch scheinenartige Erkrankungen relativ selten vorzukommen.

10. Unfälle.

Die Häufigkeit der Unfälle in den verschiedenen Berufszweigen läßt sich aus folgender nach Material aus dem Deutschen Reich zusammengestellten Tabelle von VILLARET:

Von 1000 der im Beruf Beschäftigten wurden im Alter unter 60 Jahren invalide:

Land- und Forstwirtschaft	3.5	Maschinen, Werkzeuge, Instrumente	5.6
Bergbau, Hütten- und Salinenwesen	23.7	Textilindustrie	5.1
Chemische Industrie	9.5	Holz- und Schnitzstoffe	4.7
Lebens- und Genussmittel	6.9	Baugewerbe	4.4
Metallverarbeitung	6.0	Papier und Leder	3.9
Wäsche- und Reinigung	6.0	Industrie der Steine und Erden	3.5

Der Bergbau liefert demnach weitaus die zahlreichsten Unfälle. Diese erfordern eine gesonderte Besprechung. Ausserdem sind die Unfälle durch explosives Material und Unfälle durch Maschinenbetrieb Folgenden zu erörtern. Ueber Verbrennungen und Verletzungen des Auges siehe S. 523. Andere gewerbliche Unfälle, wie die Verletzungen durch Handwerkszeug (Zimmerleute), Ueberfahren u. s. w. werden hier übergangen werden.

a) Unfälle in Bergwerken.

Auf 1000 Bergbauarbeiter entfallen jährlich 2.5 tödtlich Verunglückte. 40 Procent dieser Verunglückungen erfolgen durch Hereinbrechen von Gesteins- und Kohlenmassen, 24 Procent durch Sturz und Beschädigung beim Ein- und Ausfahren in den Schächten, 11 Procent durch schlagende und böse Wetter.

Der erstgenannten Art von Unfällen ist durch sorgfältigen Abbau und Ausbau der Gruben vorzubeugen; und zwar ist dieser besser in Stein oder in Mauerwerk als in Holz auszuführen; besondere Sorge ist dabei für Absperrung der Wässer zu tragen.

Das Ein- und Ausfahren geschieht mit Leitern, Seilfahrten oder Fahrkünsten.

Erstere finden als anstrengend und gefährlich selten mehr Verwendung. Die Fahrkünste bestehen in zwei neben einander im Schacht hängenden und zu bestimmten Abständen mit Bühnen versehenen Gestängen, welche durch Maschinenkraft intermittierend in entgegengesetzter Richtung um ein Gewisse auf und niederbewegt werden. In der kurzen Ruhepause am Ende jedes Habs schütten sich die beiderseitigen Bühnen in gleicher Höhe und der Fahrer muss ausstufen von der einen Bühne zur anderen Seite übertreten. — Bei der Seilfahrt werden die zur Förderung der Kohlen dienenden Förderkörbe, die an Kettenenden oder besser Stahlseilen bewegt werden, auch zur Einfahrt der Arbeiter benutzt.

Die durch Fahren verunglückten bei der Fahrkunst durchschnittlich 0.6, bei der Seilfahrt 0.1; letztere ist daher am meisten zu empfehlen. Dieselbe durch Fangvorrichtungen für den Fall des Ausweichens noch gefahrloser zu machen ist nicht genügend, sondern es ist sorgfältige Behandlung und Controle der Fahrkünste erforderlich.

Die Gefahren durch Regen und bösen Wetter sind durch richtige Wettervorhersagen und Ventilation der Gruben zu beseitigen. Zur Ventilation dienen die Ventilatoren der Maschinenventilatoren (s. S. 414). Die durch Regen gesammelter Wetter wird durch die Davy'sche Sicherheitslampe beseitigt, deren Kommunikationsöffnung mit der Grube durch einen Drahtnetz verschlossen ist. Da eine Entzündung durch die Lampe beim Wiederanzünden erloschener Lampen nicht zu vermeiden ist, so ist ein Mechanismus an den mit Benzin gespeisten Lampen angebracht, der beim Spannen und Losdrücken einer Spirale die Lampe durch einen Katalisator versehenen Papierstreifen in einen sicheren Zustand versetzt, so dass die Benzindämpfe Feuer fangen und sich wieder entzündet, ohne dass man sie zu öffnen braucht. Diese Wetteranzeiger, sind sogenannte Chen- oder Chen-Lampen, die darauf beruhen, dass in einem mit einem bestimmten Gas gemessenen Gefäss in Methan-, Kohlenoxyd- oder Kohlenwasserstoff ein Ueberdruck entsteht, welcher dann eine Quecksilberkugel angedrückt und damit einen elektrischen Strom schliesst. — Diese Chen-Lampen sind die FIEBER'sche Wetterlampe zu bewahren. Diese Lampe wird mit Spiritus gespeist und brennt farblos. Die Flamme wird durch einen Luftregulator reguliert. Bei Grubengasgehalt zeigt sich dann eine Veränderung der Flamme, die so höher und breiter wird, je mehr Gas sich in der Grube befindet. Auch die obengenannten Benzinsicherheitslampen werden zur Wettervorhersage benutzt. Bei geringem Gasgehalt der Luft verlängert sich die Flamme und wird spitzer; bei grösserem Gehalt steigt die Flamme

an den Deckel des Drahtkorbs, ist im oberen Theil roth gefärbt und rußt etwas; bei noch stärkerer Gasmischung entzündet sich diese innerhalb des Drahtnetzes und bildet eine Aureole, die noch fortbrennt, während die Lampenflamme erlischt.

b) Unfälle durch explosionsfähiges Material.

In Frage kommen Staubexplosionen und Explosionen in Sprengstoffwerken. (Ueber Gasexplosionen s. S. 437).

In der Luft vertheilter Staub kann namentlich dann zu einer plötzlichen, explosionsartigen Verbrennung Anlass geben, wenn die Staubteilchen Gelegenheit hatten, brennbare Gase auf sich zu condensiren. Kohlenstaub in Kohlengruben wird daher sehr explosiv, ebenso Mehlstaub in mit Gasbeleuchtung versehenen Mühlen. Eine kräftige Ventilation ist die geeignetste Vorsichtsmaassregel.

In Pulver-, Patronen- und Zündhütchenfabriken sind alle Arbeiten mit Metalltheilen auszuschliessen, ferner ist auf gründlichste Reinlichkeit und vollständige Beseitigung alles Pulverstaubes zu achten. Das Betreten der Räume ist nur mit Filzschuhen gestattet, die einzelnen Arbeitstische sind durch Drahtgaze vollständig zu trennen. — In den Dynamitfabriken sucht man die einzelne Arbeitsstelle noch strenger abzuräumen und zwar durch hohe und starke Wälle von Erde oder Mauerwerk zu umgeben. Eine Verbindung zwischen den Arbeitsstellen findet nur durch melartige Gänge statt.

In neuerer Zeit werden als Ersatz des Dynamits andere Sprengstoffe, z. B. Securit, Roburit u. a., empfohlen, die relativ wenig Gefahr bergen; auch sind Sprengstoffe (Hellhofit) construirt, die aus zwei Componenten bestehen, einem Nitroderivat und concentrirter Salpetersäure, jedes für sich nicht explosibel sind, sondern es erst im Moment des Zusammenbringens werden. Die Gefahr der zufälligen Explosion wird hierdurch fast ganz ausgeschlossen.

c) Unfälle durch Maschinenbetrieb.

Von den zahlreichen, bei der Construction und dem Betriebe der Dampfkessel und Dampfmaschinen erforderlichen Cautelen seien hier nur erwähnt zunächst die selbstthätigen Sicherheitsapparate an den Kesseln. Dieselben zeigen namentlich ein zu niedriges Sinken des Wasserstandes durch Signale, z. B. Pfeifen, an.

Sie werden entweder so construirt, dass ein im Kessel befindlicher Schwimmer eine Stange und an deren Spitze eine Kugel trägt; letztere verschliesst bei hinreichendem Wasserstand die Oeffnung eines Dampfcanals, der zu der Pfeife führt; beim Sinken des Wasserstandes hört der Verschluss auf und das Signal ertönt. Oder ein mit Pfeife versehenes Rohr ist für gewöhnlich mit einem

Pfropfen aus einer Legierung verschlossen, die im Wasser nicht, wohl aber in dem höher temperirten Dampf schmilzt. — Der ebenfalls wesentlich auf Lagerung von bestimmtem Schmelzpunkt beruhende SCHWANCKOFF'sche Apparat wird durch sichtbares und hörbares Signal 1) beginnenden Wassermangel, 2) beginnende Drucküberschreitung, 3) trockenes Anheizen eines Kessels, 4) abnorme Erhöhung der Wassertemperatur (Siedeverzug) an.

Was die Betriebseinrichtungen anlangt, so sind die Schwungräder einzufriedigen und stets mittelst mechanischer Hülfsvorrichtungen, niemals mit der Hand anzudrehen. Wellen sind mit Schutzhülsen und Schutzringen zu umgeben, Riementransmissionen mit Schutzkästen zu verdecken. Die Transmissionen sind nie mit der Hand zu bedienen, vielmehr sind Riemenauflieger und Ausrückvorrichtungen zu benutzen. Die Arbeiter sollen sich stets einer möglichst eng anliegenden Kleidung (eventuell besonderer Arbeitsanzüge, z. B. des SCHWANCK'schen Arbeiterschutanzuges) bedienen.

Einige specielle Sicherheitsvorrichtungen sind an landwirthschaftlichen Maschinen und an Kreissägen anzubringen. Von ersteren seien die Göpel genannt, deren Welle eingedeckt und deren Zahnräder und Triebwerke umkapselt sein müssen, ferner die Dreschmaschinen, welche früher vielfach Hand und Arm der mit dem Einlegen der Garben beschäftigten Arbeiter beschädigten und welche jetzt mit sogenannten Vorgelegen oder Einlegern versehen sind, so dass derartige Verletzungen vollständig ausgeschlossen sind. — Die Kreissägen führen zu Verletzungen dadurch, dass der Arbeiter mit der Hand gegen die Säge vorfällt oder dadurch, dass Holzstücke sich klemmen und von der rotirenden Scheibe mit grosser Gewalt fortgeschleudert werden oder endlich dadurch, dass die mit dem Forträumen der Spähne beschäftigten




Fig. 165. Schutzvorrichtung an Kreissägen.

Arbeiter dem unteren Theil der Säge zu nahe kommen. Letztere Gefahr kann durch Umkleidung des unter dem Tisch befindlichen Theils der Säge leicht vermieden werden. Um das Klemmen und Zurückschleudern des Holzes zu verhüten, wird an der hinteren Peripherie

ein Spaltkeil angebracht, dessen vordere Kante bis zur Dicke des Sägeblattes zugeshärft ist. — Um die Hand des beschäftigten Arbeiters zu schützen, existiren Einrichtungen wie in Fig. 165; das Blatt der Säge

im oberen Theil mit einem festliegenden Gehäuse (a) bedeckt; am vorderen und hinteren Ende befinden sich je zwei um einen Drehpunkt drehbare bewegliche Schwerter (b), die den unteren Theil der Säge decken. Das vorgeschobene Brett hebt die Schwerter, so dass das Schneiden nicht gehindert wird; hat das Brett die Säge passirt, so fällt sofort das vordere Schwerterpaar herunter. Derartige Vorrichtungen verringern sehr die Gefahr, beseitigen dieselbe aber nicht ganz.

Viele der im Vorstehenden geschilderten Gefahren für die Gesundheit der Arbeiter erscheinen noch weit bedenklicher, wenn es sich um jugendliche oder weibliche Arbeiter handelt.

Da das Wachsthum und die Entwicklung des Körpers erst mit dem 18. Jahre abgeschlossen ist, und da zwischen dem 12. und 16. Jahre gerade eine sehr erhebliche Aenderung des Körpers sich vollzieht, welche eine richtige Regulirung der Ernährung, der körperlichen Bewegung, des Schlafes u. s. w. verlangt, so ist eine gewerbliche Thätigkeit während dieser Zeit nur mit starken Einschränkungen zulässig. Enge, schlecht ventilirte Arbeitsräume, ungünstige Körperhaltung, Staubinhalation und dergleichen äussern in diesem Alter wesentlich schlimmere Wirkungen als gegenüber dem ausgewachsenen Organismus. — Ebenso ist die Frau wegen ihrer Constitution nach zu den gewerblichen Arbeiten weniger geeignet; besonders entstehen leichter tiefe Ernährungsstörungen und die inneren Organe werden durch sitzende Beschäftigung und durch Anstrengung krankhaft afficirt, vollends wenn Schwangerschaft und Wochenbett intercurriren und dabei keine genügend langen Arbeitspausen eingehalten werden. Es kommt hinzu, dass die verheiratheten Frauen, welche Fabrikarbeit betreiben, ihr Hauswesen nicht in Ordnung halten und ihren Kindern nicht die erforderliche Sorgfalt angedeihen lassen können.

Dementsprechend haben bereits die Regierungen fast aller europäischen Staaten Verordnungen erlassen, durch welche die Frauen- und Kinderarbeit beschränkt wird.

In Deutschland schreibt die Reichsgewerbeordnung (1. Juli 1883 und Juli 1891) vor, dass die Unternehmer bei der Beschäftigung von Arbeitern unter 18 Jahren, die durch das Alter derselben gebotene besondere Rücksicht nehmen und dass sie denselben die erforderliche Zeit zum Besuch der Fortbildungsschulen gewähren. Kinder unter 13 Jahren dürfen in den Fabriken nicht beschäftigt werden. Die Beschäftigung der Kinder unter 14 Jahren darf

Dauer von 6 Stunden täglich nicht überschreiten. Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, dürfen in den Fabriken nur dann beschäftigt werden, wenn sie in der Schule einen regelmässigen Unterricht von mindestens 3 Stunden täglich geniessen. Junge Leute zwischen 14 und 17 Jahren dürfen in den Fabriken nicht länger als 10 Stunden täglich beschäftigt werden. Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter dürfen nicht vor 5¹/₂ Uhr

Morgens beginnen und nicht über 8 $\frac{1}{2}$ Uhr Abends dauern. Zwischen den Arbeitsstunden müssen an jedem Arbeitstage regelmässige Pausen gewährt werden. Die Pausen müssen für Kinder eine halbe Stunde, für junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren Mittags eine Stunde, sowie Vormittags und Nachmittags je eine halbe Stunde mindestens betragen. — Wöchnerinnen dürfen während 3 Wochen nach ihrer Niederkunft nicht beschäftigt werden.

Zur Unterstützung der arbeitenden Frauen sind die Krippen und Kinderbewahranstalten (Kindergärten) von grosser Bedeutung; in ersteren finden die Säuglinge, in letzteren Kinder von 2—6 Jahren über Tag Aufnahme (ausserdem nehmen die Kinderhorte schulpflichtige Kinder in der schulfreien Zeit auf). — In den Krippen wachen geschulte Wärterinnen über die Ernährung der Kinder, über ihre sonstige Pflege und ihre Beschäftigung; ärztliche Revisionen sorgen namentlich für rechtzeitigen Anschluss contagiöser Kranker. Die Mütter bringen die Kinder in diese Anstalten, ehe sie zur Arbeit gehen und holen sie Abends wieder ab. Die für die Verpflegung zu zahlende Vergütung ist gering bemessen. Durch Beiträge der wohlhabenden Bevölkerung oder durch Zuschuss der Fabrikbesitzer sollte die Zahlung möglichst reduziert werden, und es wäre zu wünschen, dass jede grössere Fabrik, welche Frauen zur Arbeit einstellt, diese mit ausserordentlichem Erfolge wirkende humanitäre Einrichtung sich angelegen sein liesse.

B. Belästigung und Schädigung der Anwohner durch Gewerbebetriebe.

Gewerbliche Anlagen können die Nachbarschaft mit Explosions- und Feuersgefahr bedrohen. Durch gesetzliche Bestimmungen pflegt dieser Gefahr hinlänglich vorgebeugt zu sein. Ferner beeinflussen manche industrielle Anlagen (Hammerwerke, Kesselschmieden) die Nachbarschaft durch starken Lärm.

Die bestehenden Verordnungen gewähren gegen solche Etablissements wenig Schutz, da die Geräusche lediglich als belästigend anerkannt werden und die Anlage nur verboten wird, wenn öffentliche Gebäude sich in der Nähe befinden. Indess werden auch durch diese Geräusche zweifellos hygienische Interessen berührt. Es werden durch dieselben die Anwohner auf weite Entfernungen gezwungen, die Fenster geschlossen zu halten und somit auf das naturgemässe Ventilationsmittel während der wärmeren Jahreszeit zu verzichten. Ausserdem werden Kranke und Reconvalescenten, die auch unter Tages der Ruhe und des Schlafes bedürfen, geschädigt; und die geistig arbeitenden Umwohner werden in der Ausübung ihrer Berufsthätigkeit und ihres Erwerbes behindert. Es ist daher entschieden zu wünschen, dass den genannten Etablissements so viel als möglich Beschränkungen auferlegt werden, welche das Geräusch dämpfen, ohne doch den Betrieb zu beeinträchtigen, z. B. die Bestimmung, lärmende Arbeiten nur innerhalb geschlossener Räume vorzunehmen.

Von grosser Bedeutung ist die Verunreinigung von Luft und Wasser durch gewerbliche Anlagen.

Die Luft wird durch die Mehrzahl der Gewerbebetriebe mit grossen Mengen von Rauch und Russ verunreinigt. Durch gut

truierte Schornsteine, Einführung der Rauchverbrennung, die allerdings immer nur theilweise zum Ziele führt, namentlich aber durch fältigen, von geschulten Heizern geleiteten Betrieb (s. S. 386) lässt sich der Uebelstand sehr wohl einschränken. — Unrichtig ist es, übermässigen Rauch nur als belästigend, nicht aber als gesundheitsnachtheilig anzusehen. Normal sind die eingeathmeten Kohletheilchen nicht völlig indifferent für den Organismus (vergl. S. 164). Sodann wird in den Häusern, welche direct von der Rauchsäule getroffen werden, ein Oeffnen der Thüre völlig verhindert und selbst bei geschlossenen Fenstern die Belüftung beeinträchtigt. Ausserdem wirkt die oft grosse Menge schwefelige Säure, die im Rauch enthalten ist nachtheilig auf die Gesundheit und die Umwohner.

Besondere gasförmige Verunreinigungen entstehen bei folgenden Gewerbetrieben (abgesehen von den S. 531 genannten, giftige Gase produzierenden Anlagen):

Hüttenwerke liefern grosse Mengen schwefelige Säure, die durch Rösten der schwefelhaltigen Blei-, Zink- und Kupfererze gebildet wird. Die Vegetation wird durch solchen Hüttenrauch auf weite Entfernung geschädigt. — Häufig benutzt man jetzt den Hüttenrauch zur Herstellung von Schwefelsäure, eventuell nach vorausgegangener Concentration durch Absorption der Röstgase mittelst angefeuchteten Zinkbleis, Wasser u. s. w.; wo das nicht durchführbar ist, muss der Hüttenrauch durch Flugstaubbkammern (S. 535) und Ventilationsthürme unendlich gemacht werden. — Ferner entwickeln Ultramarinfabriken, Anilinfabriken und auch Hopfenschwefeldarren grosse Mengen von schwefeliger Säure.

Knochendarren und Knochenkochereien, ebenso Knochenbrennereien entwickeln auf sehr weite Entfernung üble Gerüche. Darmtöpfabriken liefern Fäulnissgase, wenn das Material längere Zeit bewahrt wird und in Fäulniss geräth. In Leimsiedereien entstehen beim Kochen des Leims, sowie durch das Lagern der Rohmaterialien (Lederabfälle, Flechsen, Knochen) sehr üble Gerüche. In den vorgenannten Gewerben ist eine vollständige Beseitigung der üblen Gerüche nicht zu erzielen, und dieselben sind daher in der Nähe von Wohnungen nicht zu dulden. Aehnliches gilt von Wachstuch- und Leinwandfabriken, in welchen beim Aufstreichen der Firnisse resp. Lacken in Theer und namentlich beim nachfolgenden Trocknen intensive Gerüche unvermeidlich sind.

Verunreinigung des Grundwassers und der Flussläufe erfolgt durch viele gewerbliche Abwässer. Dieselben enthalten theils mine-

ralische Gifte, theils grosse Mengen organischer fäulnissfähiger Stoffe, theils Contagien.

Mineralische Gifte finden sich z. B. in den Abwässern von Zinkblech- und Schwefelkiesgruben (Zinksulfat, Schwefelsäure), von Drahtziehereien (Schwefelsäure, Eisensulfat, Kalk), von Sodafabriken (Kalk, Arsen, Schwefelwasserstoff, Calciumsulfid, Natriumsulfid), der Kaliindustrie (namentlich Chlormagnesium), von Chlorkalkfabriken (Salzsäure, Arsen), von Schnellbleichen (Chlorkalk), von Färbereien (Kupfer-, Blei-, Antimon-, Arsen-Verbindungen), von Gerbereien (Kalk-, Arsen-Verbindungen).

Grosse Mengen organischer, fäulnissfähiger Stoffe liefern in ihren Abwässern die Stärkefabriken (1–4 g organische Stoffe in 1 Liter), Leinwandereien (ca. 2 g o. St. in 1 Liter), Bierbrauereien (1 g o. St. in 1 Liter), Zuckerfabriken (2–3 g feste Bestandteile, 0.3 g o. St. in 1 Liter), Papierfabriken (1–4 g o. St.), Sulfit-Cellulose-Fabriken (ausserordentlich grosse Mengen o. St., ausserdem Kaliumsulfat), Wollwäschereien (bis 30 g o. St.), Tuchfabriken und Färbereien (oft intensive Färbung des aufnehmenden Wassers), Gerbereien, Schlachthäuser.

Contagien können enthalten sein in den Abwässern der Zubereitungsanstalten für Thierhaare, der Schlachtereien und Gerbereien.

Schwere Gesundheitsschädigung der Anwohner kann von den Contagien und von mineralischen Giften ausgehen. Namentlich haben die arsenhaltigen Abwässer bzw. festen Abfälle der Anilinfarbenfabriken und der Gerbereien (wo Arsenverbindungen zum Enthaaren benutzt werden) mehrfach zu chronischer Arsenvergiftung der Umwohner mit zum Theil tödtlichem Ausgang geführt. Die Verbreitung kann dabei nicht nur durch Bäche und Flüsse erfolgen, sondern bei grobporiger Beschaffenheit der wasserführenden Bodenschichten auch durch das Grundwasser und die in dieses eingebauten Brunnen.

Am sinnfälligsten ist die Verunreinigung der Bäche und Flüsse durch schlammbildende, färbende und fäulnissfähige Stoffe. Wie bereits oben (S. 464) betont wurde, kommen die extremsten Grade von Flussverunreinigung nicht sowohl durch städtische Abwässer, als vielmehr durch Industrieabwässer zu Stande. Verpestender Geruch geht von solchen Flüssen auf weite Entfernungen aus und belästigt die in der Nähe angesiedelten Menschen; der Lauf des Wassers wird durch die Schlammablagerung und die Verpilzung der Oberfläche immer mehr gehemmt; jede Benutzung des Wassers ist durch seine Trübung, seine Farbe und seinen Gestank unmöglich geworden; die Fischzucht muss völlig aufhören.

Eine Reinigung der Industrieabwässer vor dem Einlauf in die Flüsse ist daher fast stets erforderlich. Die schwierige Frage ist nur, bis zu welchem Grade eine solche Reinigung verlangt werden soll. Die Industrie kann der Flüsse als natürlicher Recipienten ihrer Abwässer nicht entbehren, und vollständige Reinigung der letzteren ist gewöhnlich nur mit einem Kostenaufwand zu leisten, den die Industrie nicht tragen kann.

schon der geltenden Rechtsprechung kann auch der Unterlieger in völliges Reinhalten des Flusslaufs seitens der Oberlieger sein. Es wird vielmehr nur der Grundsatz festgehalten, dass die Fluss geleiteten Abwässer „nicht über das Gemeinübliche hinverunreinigt sein dürfen. Summieren sich im Lauf eines Flusses viele vorschriftsmässig gereinigte Fabrikabwässer, so kann doch die Verunreinigung des Flusswassers so hochgradig werden, dass dasselbe für mancherlei Zwecke nicht mehr verwendbar ist; ein Einspruch der Anwohner ist dann aber nicht statthaft.

Man sind nun Abwässer einer Fabrik noch als rein gereinigt anzusehen, wann als über das Gemeinübliche verunreinigt?

Vorgeschrieben sollen alle suspendirten, verschlammenden Theile der Abwässer vollkommen beseitigt und diese an der Einlaufstelle klar und rein sein. Dies ist durch die oben beschriebenen mechanischen und chemischen Klärmethoden relativ leicht zu erreichen. Hinter eingebrachte Klärteiche und Klärgruben mit Zusätzen von Kalk, Eisen- oder Eisensalzen pflegen das Erforderliche zu leisten. Die Angaben von MÜLLER-NAHNSEN (s. S. 477), LIESENBERG (Zusatz von Eisensulfat, Natriumaluminat und Kalk), HULVA (Zusatz von Eisen- und Eisensalzen, Kalk, Magnesia und Zellfaser), und viele andere sind in diesen Betrieben eingeführt und haben gegenüber den in anderen Abwässern leichteren Erfolg wie gegenüber den sehr variablen Abwässern.

In vielen Fällen genügt aber die Klärung der Abwässer allein, um sie in kleine und langsam fließende Wasserläufe, so dass sie in diesen oft dennoch stinkende Fäulniss und eine solche Verunreinigung des Wassers, dass dadurch eine Hemmung des Abflusses und Lagerung von faulenden festen Massen entstehen kann.

der Verpilzung theilhaftig sind 1. *Beggiatoa alba* (s. S. 81). Feiner, gelber, weisslich-grauer Belag, der vorzugsweise den schlammigen Boden bedeckt; in wenig bewegtem Wasser, Klärteichen; erzeugt Schwefelwasserstoff. Gleichzeitig intensive stinkende Fäulniss, Trübung des Wassers durch den Schlamm, der Schwefeleisen enthält. 2. *Sphaerotilus natans*; in den aufgeführten Spaltpilzen am nächsten stehend. Weissgelbliche oder schleimige Massen, in starkfließendem Wasser am reichlichsten. Bedarf an Sauerstoffzufuhr, wuchert vorzugsweise im Winter; im Sommer nur an Mühlrädern u. s. w. Die Pilzrasen entwickeln einen widerlich süßlichen Geruch. Verhältnissmässig zarte, 2—3 μ dicke lange Fäden aus kurzen, in farblosen eingeschlossenen Zellen bestehend. 3. *Leptomitia lacteus*; ein zu den vorhergehenden gehöriger Pilz. Dem vorigen makroskopisch ähnlich. Weiss bis gelblich und schwarzgraue Rasen oder Häute. Entwickelt sich ausschliesslich in sauren Fäden viel dicker wie bei *Sphaerotilus*, bis 45 μ , mit Einschnürungen ringförmigen, stark lichtbrechenden Cellulinkörnern.

Um auch die löslichen Bestandtheile der Abwässer so weit zu vermindern, dass keine sinnfällige Fäulniss und keine Verpilzung des Wasserlaufs mehr eintreten kann, müssen die oben aufgeführten Mittel: Berieselung, Bodenfiltration, Oxydationsverfahren zur Anwendung kommen. In vielen Betrieben ist damit in der That ausreichende Wirkung erzielt. Der Bodeneinfluss versagt aber oft z. B. bei den Zuckerfabriken, die gerade während des Winters in Betrieb sind.

Hier scheint das dem DIEDIN'schen Verfahren theilweise ähnliche Verfahren von PROSKOWETZ das beste zu leisten. Es besteht darin, dass zunächst eine Kalkfällung erfolgt, dass dann die Abwässer ein „hoch drainirtes“ Rieselfeld, darauf ein „tief drainirtes“ Rieselfeld passiren und nun in einen Sammelbrunnen gelangen; bei diesen Proceduren findet eine Spaltung der fäulnissfähigen organischen Stoffe durch intensive Fäulniss statt. Zum Schluss folgt nochmaliger Kalkzusatz und mechanische Klärung, durch welche die restirenden organischen Stoffe fast gänzlich ausgefällt werden.

Trotz guter Beseitigung auch der gelösten Abwässerstoffe lässt sich manchmal eine gewisse Verpilzung des Wasserlaufs doch nicht hintanhaltend. Es handelt sich dann aber gewöhnlich nur um eine Wucherung von *Leptomit* *lacteus*; während *Sphaerotilus* und *Beggiato* sich in erheblich stärker verunreinigtem Wasser entwickeln. Ausgedehnte Wucherung der beiden letztgenannten Pilze, sinnfällige Fäulniss und Trübung dürfen daher als die wesentlichsten Merkmale einer ungenügenden Abwässerreinigung angesehen werden.

Zur Errichtung von gewerblichen Anlagen, welche für die Umwohner erhebliche Belästigungen oder Gefahren herbeiführen können, ist vorherige Concession durch die zuständigen Behörden erforderlich. Zu diesen Anlagen gehören z. B. Gasanstalten, Kalk-, Ziegel-, Gypsöfen, Erzröstöfen, Metallgiessereien, Hammerwerke, Schnellbleichen, Darmsaiten-, Dachpappenfabriken, Leim- und Seifensiedereien, Knochenbarren, Gerbereien, Abdeckereien u. a. m. (s. Gewerbeordnung für das deutsche Reich § 16).

Ausserdem ist eine fortlaufende Controle aller zum Schutz der Umwohner und zur Sicherung der Arbeiter in den Gewerbebetrieben getroffenen Einrichtungen erforderlich. Diese Controle liegt in der Hand der Fabrikinspektoren. Dieselben haben auf die Sicherheit des Betriebes für die Arbeiter ihr Augenmerk zu richten, die Anbringung von fehlenden Schutzvorrichtungen anzurathen, die Uebereinstimmung der ganzen Einrichtung und des Betriebes einer Fabrik mit der erteilten Concession zu prüfen und zu controliren, die eventuelle Belästigung der Umgebung der Fabrik durch den Betrieb fest

stellen, vorkommenden Falles die Maassregeln zur Beseitigung zu treffen oder doch einzuleiten; endlich haben sie die Aufgabe, die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter und Frauen zu überwachen.

Litteratur: ROTH, BLUM, KRAFT u. A., Gewerbehygiene, in WEYL's Handb. der Hygiene, 1894—96. — HEINZERLING, Die Gefahren und Krankheiten der chemischen Industrie, 1886. — PÜTSCH, Die Sicherung der Arbeiter, 30. — KRAFT, Fabrikhygiene, 1891. — ALBRECHT, Handbuch der praktischen Gewerbehygiene, Berlin 1896. — KÖNIG, Die Verunreinigung der Gewässer, Aufl. 1899. — S. ferner die „Berichte“ der Fabrikinspektoren.

Zehntes Kapitel.

Die parasitären Krankheiten.

Die Verbreitungsweise der parasitären Krankheiten und die Schutzmaassregeln gegen dieselben haben bereits in mehreren der vorhergehenden Kapitel Berücksichtigung finden müssen, da die hygienische Bedeutung des Bodens, des Wassers, vieler Nahrungsmittel, der Abfälle u. s. w. vorzugsweise auf der gelegentlichen Verbreitung von Parasiten durch dieselben beruht. Die zerstreuten Details sind jedoch nicht geeignet, für den wichtigsten Theil der Lehre von den Krankheitsursachen ausreichendes Verständniss zu erzielen; und es erübrigt daher an dieser Stelle, eine zusammenhängende und übersichtliche Darstellung der Verbreitungsweise und der Verhütung der parasitären Krankheiten zu geben.

Zu den parasitären Krankheiten (mit einem weniger bezeichnenden Ausdruck „Infektionskrankheiten“ genannt) rechnen wir diejenigen Krankheiten, welche durch einen von aussen in den Körper des Kranken gelangenden und sich dort vermehrenden, mithin organisierten Krankheitserreger verursacht werden; gewöhnlich jedoch mit der praktischen Gründen gebotenen Einschränkung, dass die durch grössere tierische Parasiten (Finnen, Trichinen, Krätzmilben u. s. w.) verursachten Krankheiten als sog. „Invasionskrankheiten“ abgezwengt werden.

Jede parasitäre Infektion ruft einen Kampf zwischen den Parasiten und dem befallenen Organismus hervor. Die Kräfte, über welche die Parasiten dabei verfügen, sind vor allem ihre Vermehrungsfähigkeit in dem saftigen lebenden Körpers, trotz der Schutzvorrichtungen des

letzteren; bei manchen ausserdem die Sekretion löslicher Gifte; bei andern das Vermögen, Zellen des Körpers krankhaft zu verändern oder zum Absterben zu bringen; endlich bei vielen Parasiten die Eigenthümlichkeit, dass aus den Leibern der absterbenden Individuen Gifte entstehen. Ein theilweises Absterben erfolgt aber regelmässig wie bei jeder lebhaften Wucherung, so auch im lebenden Körper; ausserdem in letzterem oft in spezifischer Weise und in stark erhöhtem Maasse in Folge der Schutzeinrichtungen des Körpers, die auf ein Abtöden von Parasiten abzielen.

Der befallene Organismus seinerseits verfügt in seinen Säften über Stoffe, welche die Eindringlinge abzutöden und aufzulösen vermögen; sodann über Gegengifte, welche die Gifte des Parasiten neutralisiren; ferner über besondere Zellen, welche die Eindringlinge beseitigen helfen, indem sie dieselben intracellulär verdauen. Das Eindringen der Parasiten giebt den Anreiz zur erhöhten Bildung der Schutzstoffe seitens des gefährdeten Körpers; je besser ein Körper die Schutzvorrichtungen gegenüber einem Parasiten in Aktion zu setzen vermag, um so weniger ist er für eine Erkrankung durch diesen Parasiten disponirt und um so weniger virulent ist der Parasit ihm gegenüber. Die virulentesten Parasiten sind diejenigen, welche die schützenden Substanzen des Körpers unwirksam zu machen und auszuschalten vermögen, oder welche für die Schutzvorrichtungen des befallenen Individuums gar keine Angriffspunkte bieten.

Die Erkrankung ist entweder dadurch gekennzeichnet, dass der Parasit sich ungehemmt im Körper vermehrt, weil er durch die parasitentödtenden Substanzen des Körpers kaum merklich aufgehalten wird. Aldann genügt das Eindringen einer minimalen Zahl von Individuen des Parasiten in einen völlig gesunden Körper zur oft tödtlichen Infektion. Nach Ablauf der kurzen Inkubationszeit, welche für die Parasiten zur Ueberwindung der Widerstände des Körpers und zum siegreichen Vordringen ausreicht, kommt es in wenigen Tagen, ja Stunden zur Ueberschwemmung des Körpers mit ungezählten Parasiten. Am prägnantesten sehen wir dies bei den septischen Erkrankungen (Milzbrand-, Pneumokokkensepsis bei Versuchsthiereu, Pestsepsis u. s. w.). Lösliche Toxine spielen in diesen Fällen eine untergeordnete Rolle. Nur toxische Stoffe, welche aus den absterbenden Individuen der wuchernden Parasitenmasse oder vielleicht auch aus den unter dem Einfluss der Parasiten zerstörten Körperzellen entstanden sind, helfen den Ausgang beschleunigen.

Reicht die Virulenz des Parasiten nicht aus, um ihm ohne Weiteres ein Wachsthum im Innern des Körpers zu ermöglichen, so vermag er

ih vielleicht an gewissen Lokalitäten, z. B. auf Schleimhäuten, namentlich wenn dieselben vorher geschädigt sind, zu wuchern. Dringt er nun da in grösserer Zahl ins Innere des Organismus vor, so werden nächst eine Menge von Individuen geopfert, um die schützenden Stoffe des Körpers zu binden, und die beim Absterben frei werdenden Stoffe wirken dahin mit, dass schliesslich die überlebenden Individuen zu einer örtlichen oder allgemeinen Ausbreitung gelangen können.

Eine andere Kategorie von parasitären Erkrankungen ist dadurch gekennzeichnet, dass der Parasit vorzugsweise durch secernirtes Gift wirkt, das schon bei geringfügiger Wucherung in genügender Menge producirt wird, um den nicht genügend durch Antitoxin gesättigten Körper in kurzer Zeit schwer zu vergiften (Tetanus, Diphtherie).

Für die Ausbreitung der parasitären Krankheiten kommt zunächst in Betracht, dass dieselben sämtlich vom Erkrankten auf den Menschen fortgesetzt übertragbar sind. Die Uebertragung kann in manchen Fällen auf Schwierigkeiten stossen; vielleicht ist sie nur in einem begrenzten Stadium der Krankheit und unter Anwendung eines bestimmten Uebertragungsmodus (Blutüberimpfung, Zwischenwirth) ausführbar. Immerhin ist die Möglichkeit der Uebertragung vorhanden, solange die Parasiten sich im befallenen Körper vermehren und dadurch die Infektion bewirken.

In dieser fortgesetzten Uebertragbarkeit liegt der wesentlichste Unterschied gegenüber den Intoxikationen. In früherer Zeit hat man diese Grenze nicht scharf genug gezogen; insbesondere nahm man an, dass Infektionskrankheiten auch durch ein Miasma, d. h. durch gasförmige, chemische Körper, die nicht reproduktionsfähig sind, entstehen können. Dass riechende oder nicht riechende Gase, Emanationen des Bodens u. s. w. in gar keiner ätiologischen Beziehung irgend einer parasitären Krankheit stehen, ist bereits oben S. 159 näher begründet. Der Begriff der „miasmatischen Infektionskrankheiten“ ist daher völlig fallen zu lassen.

Mit den allen Infektionserregern gemeinsamen Eigenschaften der Vermehrungsfähigkeit und der Uebertragbarkeit ist aber noch nichts gesagt über die natürliche Verbreitungsweise der Infektionskrankheiten. In Bezug auf diese sind namentlich zwei Gruppen von parasitären Krankheiten zu unterscheiden:

Erstens Infektionskrankheiten, welche sich nur vom Kranken auf den Gesunden verbreiten, so dass der Kranke immer das Centrum für die Ausbreitung bildet. Die Erreger dieser Krankheiten lassen den Körper des Kranken in infektionstüchtigem Zustand und

gehen unverändert, entweder direct oder nach einem kürzeren oder längeren Aufenthalt in der Umgebung bezw. auf der Haut oder Schleimhaut unempfindlicher Menschen auf empfängliche Individuen über (Syphilis, Tuberkulose, Diphtherie u. s. w.). — Diese Krankheiten werden als contagiöse, ansteckende, bezeichnet.

Zweitens Krankheiten, bei welchen der Kranke keine wesentliche Rolle spielt, wo die Infektion vielmehr von irgend einem Theil der Umgebung aus erfolgt, in welchem die Erreger ohne merkliche Mitwirkung eines Kranken verbreitet sind. Dass der Kranke hier nicht das offenbare Centrum für die Uebertragung bildet, kann daran liegen, dass die Infektionserreger den Kranken nicht in infektionstüchtigem Zustand verlassen, sondern vielleicht erst in Zwischenwirthten eine Reifung erfahren müssen (Malaria); oder daran, dass die Erreger in der Umgebung sehr verbreitet sind resp. sich dort ausgiebig zu vermehren pflegen, so dass die im Kranken vorhandenen und von ihm ausgeschiedenen Erreger dem gegenüber gar nicht in Betracht kommen (Eiterkeime, malignes Oedem, Tetanus, Erreger der Cholera infantum). — Diese übertragbaren Krankheiten bezeichnet man als „ektogene“.

Beide Gruppen von Krankheiten lassen gewisse Uebergänge erkennen. Unter den Erregern der contagiösen Krankheiten giebt es allerdings obligate Parasiten, die nur im Körper des Warmblüters wuchern (Syphilis, akute Exantheme). Andere aber sind künstlich cultivirbar und auch unter natürlichen Verhältnissen zuweilen einer gewissen saprophytischen Vermehrung fähig (fakultative Saprophyten). Für gewöhnlich ist indess diese Vermehrung nicht derartig, dass den in der Umgebung neu gebildeten Individuen ein irgend wesentlicher Antheil an der Verbreitung zukommt; sondern die unverändert conservirten, vom Kranken ausgeschiedenen Erreger veranlassen vorzugsweise die Infektionen (Typhus, Cholera, Milzbrand). — Zuweilen scheint es aber doch vorzukommen, dass bei Typhus, Cholera, Milzbrand die äusseren Verhältnisse einer Wucherung der Erreger besonders günstig sind; oder dass in Folge zahlreichster Erkrankungen und mangelhafter Beseitigung der von Kranken ausgeschiedenen Erreger eine äussert umfangreiche Ausbreitung stattgefunden hat. In diesem Falle ändert sich das Bild der Verbreitungsweise. Es ist dann die Nähe eines Kranken und eine nachweisbare Verbindung mit einem solchen nicht mehr erforderlich, um die Infektion hervorzurufen, sondern es überwiegen die Infektionen von Theilen der Umgebung aus und die Krankheit nähert sich dem Typus der ektogenen Infektionskrankheiten (Cholera, Milzbrand im endemischen Gebiet).

Andererseits können auch die Erreger der ektogenen Infektionskrankheiten ausnahmsweise vom Kranken auf den Ge-
hen übertragen werden: so die Malaria durch Ueberimpfung von
t, malignes Oedem und Tetanus beispielsweise durch Injektions-
tzen, welche erst beim Kranken und dann beim Gesunden gebraucht
en; Eiterkokken durch die allerverschiedensten Kontakte. In
ocht geleiteten Hospitälern können sogar die meisten Eiterungen
sh Kokken veranlasst werden, die mehr oder weniger direct von
ren Kranken stammen. Ferner scheint es vorzukommen, dass
gene Krankheitserreger im befallenen kranken Menschen erheb-
an Virulenz zunehmen, so dass die vom Kranken ausgeschiedenen
ger viel leichter neue Opfer fordern und sich in ihrer Ver-
tungsweise den Contagien nähern. — Für gewöhnlich ist aber der
nke zur Entstehung dieser Infektionen nicht unbedingt erforderlich;
Erreger sind wie Saprophyten verbreitet, wachsen auf geeignetem
em Substrat und sind daher an gewissen Stellen der Umgebung
grosser Menge verbreitet. Mit Rücksicht auf ihre nur gelegent-
e parasitäre Rolle kann man sie als fakultative Parasiten
ichnen.

Durch eine solche Gruppierung ist indess die Verbreitungsweise
einzelnen parasitären Krankheit noch bei Weitem nicht hinreichend
nnzeichnet.

Bei den durch Contagion übertragbaren Krankheiten macht sich
. ein sehr verschiedener Grad von Contagiosität bemerkbar.
nke, die an einer bestimmten übertragbaren Krankheit leiden,
nen neben einander im gleichen Zimmer liegen ohne sich an-
ecken, weil bei dieser Krankheit erst innige Berührungen oder be-
lere Hantirungen die Uebertragung bewirken; bei anderen con-
ösen Affektionen ist dagegen die ganze Umgebung des Kranken in
tem Umkreis gefährdet. Es ist daher eine völlig falsche aber noch
manchen Aerzten verbreitete Vorstellung, dass die Ansteckung bei
en contagiösen Krankheiten gleichmässig verlaufen müsse; und
darf eine Krankheit durchaus nicht aus der Kategorie der contagiösen
halb gestrichen werden, weil ihre Ausbreitungsart dem Bilde ge-
wer stark contagiöser Krankheiten nicht entspricht. Auch Kranke
Krätze und Läuse können bei einiger Vorsicht und Reinlichkeit
anderen Kranken in einem Zimmer gehalten werden, ohne dass
ertragungen stattfinden; und doch wird Niemand deshalb leugnen,
für gewöhnlich die Uebertragung dieser Parasiten von Mensch zu
sch erfolgt.

Am stärksten contagiös sind offenbar diejenigen Infektionskrank-

heiten, bei welchen grosse Massen resistenter Erreger auf allen Wegen, durch Berührungen, durch die verschiedensten Gebrauchsgegenstände, durch Luftströmungen u. s. w. vom Kranken aus verbreitet werden und oft noch nach Monaten und Jahren in infektionstüchtigem Zustande auf gesunde Menschen gelangen; bei welchen ausserdem die Erreger sehr leicht in den Körper des Gesunden eindringen, und für welche eine sehr verbreitete Disposition unter den Menschen vorhanden ist (Pocken, Masern). Geringer wird die Contagiosität, wenn zwar die vom Kranken ausgeschiedenen Erreger zahlreich, resistent und auf den verschiedensten Wegen transportfähig sind, wenn aber die Empfänglichkeit des Gesunden beschränkt ist (Scharlach). Bedeutend verringert wird die Contagiosität, wenn die Erreger nur in bestimmten Sekreten des Kranken abschieden werden, wenn sie dazu von beschränkter Lebensdauer sind, wenn sie durchaus an eine bestimmte Invasionspforte, z. B. in den Darm gelangen müssen, um Infektion auszulösen, und wenn bei Gesunden hier noch gut funktionirende Schutzvorrichtungen den eingedrungenen Erregern entgegenwirken (Cholera). Endlich kommen noch Contagien von so geringer Resistenz vor, dass die Ansteckung fasst nur durch bewusste Berührung mit völlig frischem Sekret des Kranken zu Stande kommt (Syphilis, Hundswuth).

Aehnliche Differenzen gelten für die Erreger der ektogenen Infektionskrankheiten. Die weit verbreiteten Eiterkokken, die in jeder kleinsten Wunde eine Ansiedelungsstätte finden, bewirken zahllose Infektionen. Die Oedem- und Tetanusbacillen sind ebenso allgemein verbreitet, führen aber unendlich viel seltener zur Infektion, weil es dazu disponirender Wunden von ganz bestimmter Beschaffenheit bedarf. Die Malariainfektionen sind wiederum auf solche Oertlichkeiten und solche Jahreszeit beschränkt, in denen bestimmte Stechmücken schwärmen, und befallen Menschen nur dann, wenn diese Mücken von Malaria-kranken Parasiten bezogen haben und nach entsprechender Frist Menschen stechen.

Um bei der grossen Menge ausgesprochener Differenzen die Gesetzmässigkeiten in der natürlichen Verbreitung der Infektionskrankheiten schärfer zu erkennen, wird es nöthig sein, die einzelnen, im Vorstehenden nur flüchtig hervorgehobenen einflussreichen Momente genauer zu erörtern.

Bei der Ausbreitung einer Infektionskrankheit sind betheiligt:

1) Die Infektionsquellen, d. h. diejenigen Theile der menschlichen Umgebung, welche mit vom Kranken ausgeschiedenen infektionstüchtigen Parasiten behaftet sind. Es wird festzustellen sein, welche Infektionsquellen bei den einzelnen Krankheiten vorzugsweise in Betracht kommen,

lange dieselben Gefahr bieten, unter welchen natürlichen Verhältnissen sie ihre Gefährlichkeit einbüßen. Gegen die Infektionsquellen ist die in ihnen enthaltenen Parasiten werden wir bei der Bekämpfung der Infektionskrankheiten in erster Linie vorgehen müssen; und zwar können wir dabei entweder die Fernhaltung der Infektionellen vom Gesunden, oder ihre mechanische Beseitigung oder die Abtötung der Parasiten in's Auge fassen.

2) Die Infektionswege; d. h. die Wege, auf welchen der Transport der Parasiten von den Infektionsquellen zum Gesunden vermittelt wird, und die je nach der vorliegenden parasitären Krankheit und je nach den äusseren Verhältnissen grosse Verschiedenheiten aufweisen, nach diesen Wegen werden künstlich eingeengt werden und somit in der Bekämpfung der Infektionskrankheiten eine Rolle spielen können.

3) Die Empfänglichkeit bzw. Unempfänglichkeit des Gesunden gegenüber den Parasiten. Durch angeborene oder erworbene Empfänglichkeit grösserer Menschengruppen kann die natürliche Vererbung von parasitären Krankheiten erfahrungsgemäss erheblich beeinflusst werden. Ausserdem ist die absichtliche künstliche Aenderung der individuellen Empfänglichkeit ein mächtiges, in neuerer Zeit besonders beachtetes Hilfsmittel im Kampf gegen gewisse Infektionskrankheiten.

4) Oertliche, oft zeitlich wechselnde Einflüsse vermögen scheinend bei der Ausbreitung einer parasitären Krankheit zuweilen stark hervortreten. Es wird sich fragen, worauf diese Mitwirkung der örtlichen Verhältnisse beruht, und eventuell wird versucht werden müssen, auch diese Einflüsse bei der Bekämpfung der parasitären Krankheiten zu berücksichtigen.

I. Die Infektionsquellen.

A. Die Beschaffenheit der Infektionsquellen.

Bei den contagiösen Krankheiten kommen als wichtigste Infektionsquelle die frischen, unverdünnten Absonderungen (eventuell das Blut) des Kranken in Betracht. Die in den Absonderungen ausgeschiedenen Infektionserreger gehen, wenn sie erst auf diese oder jene Theile der Umgebung verschleppt sind, häufig nach kürzerer oder längerer Zeit zu Grunde oder werden geschwächt, sei es durch Austrocknen, Inaktivität, Belichtung, Concurrency mit Saprophyten oder andere in unserer natürlichen Umgebung wirksame schädigende Mittel; ferner vermögen Luft oder Wasser eine derartige Verdünnung der Erreger zu bewirken, dass die Infektionschancen minimal werden. Die grösste Gefahr bilden

daher die Exkrete selbst, bei Pocken die Hautschuppen, Auswurf u. s. w. bei Masern Hautschuppen Sputa, Nasensekret; bei Lungentuberkulose die Sputa; bei Abdominaltyphus, Cholera, Ruhr die Darmentleerungen, bei Typhus auch der Harn; bei Diphtherie die Sputa und das Mundsekret; bei den Wundinfektionskrankheiten der Eiter. Bei Syphilis, Gonorrhoe und Hundswuth sind die frischen Absonderungen mit seltenen Ausnahmen sogar die einzige Infektionsquelle.

Die Lebensdauer der Infektionserreger in den Ausscheidungen des Kranken variirt bedeutend je nach der spezifischen Resistenz des Parasiten und je nach den äusseren Bedingungen. Sehr kurz pflegt sie zu sein, wenn die Infektionserreger in flüssige Substrate gelangen in welchen Saprophyten stark wuchern; doch kommen Ausnahmen vor (Typhus-, Tuberkelbacillen). Ferner gehen manche Erreger durch Austrocknen rasch zu Grunde; hohe Temperatur begünstigt dies Austrocknen in bedeutendem Grade, Belichtung durch Sonnenlicht beschleunigt das Absterben; Einhüllung in schleimiges Sekret hindert dasselbe dagegen erheblich. Die längste Lebensdauer zeigen die Infektionserreger, wenn sie auf feuchtem Substrat in kalter, feuchter Luft und im Dunkel gehalten werden; es kommt dann weder zu lebhafter Wucherung von Saprophyten noch zu einem völligen Austrocknen. In Kellerräumen, in kaltem, feuchtem Boden u. s. w. können daher Absonderungen von Kranken am längsten virulent bleiben.

Bestimmte Zahlen für die Haltbarkeit der Parasiten in unserer Umgebung lassen sich bei dem maassgebenden Einfluss der jeweiligen äusseren Verhältnissen nicht geben. Bezüglich der akuten Exantheme ist empirisch ermittelt, dass die Erreger von Masern etwa 6 Wochen, von Scharlach 5 Monate, von Pocken 2 Jahre im trockenen Zustande lebensfähig bleiben; Eiter erregende Staphylokokken können unter Umständen ein Jahr und länger lebensfähig bleiben, Milzbrand- und Tetanussporen mehrere Jahre; Streptokokken in schleimiger Hülle mehrere Monate. — Weitere Angaben s. unten im speciellen Theil.

Sehr zu beachten ist, dass auch scheinbar Gesunde oder unmerklich Erkrankte virulente Krankheitserreger beherbergen und ausscheiden können, dann nämlich, wenn Menschen von Parasiten befallen sind, bei welchen die Disposition für die betreffende Erkrankung sehr gering ist (so bei den leichtesten Choleraerkrankungen, ferner bei der Diphtherie des Erwachsenen; s. unten).

Zweitens kommen in Betracht die mit den Absonderungen verunreinigten Wäschestücke; das Verbandzeug; die Betten, Kleider u. s. w. Diese repräsentiren bei den akuten Exanthemen, Diphtherie, Tuberkulose, Erysipel, Pyämie, Abdominaltyphus, Cholera u. s. w. Infektionsquellen von grosser Gefahr; flüssige Absonderungen werden

diesen Stoffen aufgesogen und auf grössere Flächen verbreitet; Krankheitserreger sind dann der Ueberwucherung durch Saprophyten ausgesetzt; andererseits trocknen fest zusammengelegte Bündel Wäsche und Kleider im Innern sehr schwer so vollständig aus, dass die Parasiten absterben.

Drittens: Ess- und Trinkgeschirre sind besonders häufig inficirt bei Diphtherie; zuweilen bei Cholera, Tuberkulose, den akuten Exanthemen.

Viertens: Sonstige Utensilien, die der Kranke gebraucht, Spielzeug, Bücher u. s. w.; Bettstellen, Möbel, Fussboden und andere dem Kranken nahe Theile der Wohnung müssen bei den akuten Exanthemen fast regelmässig, bei den übrigen Infektionskrankheiten als mehr oder weniger häufig inficirt angesehen werden.

Fünftens: Die Wohnungsluft kann in Staubform die Erreger der Diphtherie und der Tuberkulose, ferner Eiterkokken event. Typhusbacillen, dagegen niemals Cholerabacillen enthalten. Durch beim Husten ausgespritzte Tröpfchen können ausser den eben genannten Erregern auch Pneumokokken, Influenzabacillen, Pestbacillen, Diphtheriebacillen u. s. w. in die Luft übergehen.

Die Luft im Freien bietet (abgesehen von engen Höfen, Strassen, Gassen, ferner von zufällig aufgewirbeltem Hauskehricht u. s. w.) eine grosse Verdünnung und ist zu starkem Wechsel unterworfen, um eine dauernde Infektionsquelle zu fungiren.

Sechstens: Die Abwässer, der Tonnen-, Gruben- resp. Kloakenabwässer. Hier ist bereits eine gewisse Verdünnung eingetreten; ferner ist die Infektionsgefahr dadurch abgeschwächt, dass die Abwässer bei Berührung mit Menschen meist entzogen werden. Noch mehr vermindern die Infektionschancen, wenn eine weitere Mischung der infektiösen Abgänge mit zahlreichen andern, nicht infektiösen Wassermassen stattgefunden hat, wie z. B. in den Schwemmkanälen. Dagegen entsteht durch Einlassen der Abfallstoffe in einen Wasserlauf, der von zahlreichen Menschen zum Trinken, Baden u. s. w. benutzt wird, erhebliche Infektionsgefahr. Ferner ist der oberflächliche Boden zu einer Konservierung von Infektionsquellen in concentrirtem Zustande befähigt (Typhus, Cholera, s. unten). Sputa, Dejektionen u. s. w. entgehen hier oft längere Zeit der Verdünnung und es können die in ihnen enthaltenen Infektionserreger von der Bodenoberfläche aus auf verschiedenen Wegen wieder zum Menschen gelangen und Infektionen auslösen.

Siebtens: Schliesslich kommt der Genesene resp. der Verorbene in Betracht. Die von der Leiche ausgehende Gefahr wird gewöhnlich viel zu hoch angeschlagen und ist thatsächlich sehr gering, die Ausstreuerung von Infektionskeimen zum wesentlichsten Theile

durch die vom lebenden Kranken gelieferten Exkrete und durch seine Bewegungen und Hantirungen erfolgt. Die Infektionsgefahr seitens der Reconvalescenten ist dagegen um so beachtenswerther, weil sich auf der Haut und den Schleimhäuten nicht selten noch nach der Genesung und wenn bereits ungehemmter Verkehr mit Gesunden besteht, Infektionskeime vorfinden.

Bei den ektogenen Infektionskrankheiten sind die Erreger entweder nur in bestimmten Zwischenwirthen enthalten (Anopheles bei Malaria); oder sie sind weit verbreitet in gedüngter Ackererde, städtischen Wohnboden, und dem daher stammenden Staub (Tetanus und malignes Oedem); oder sie leben als Epiphyten dauernd oder zeitweise auf der Haut resp. auf gewissen Schleimhäuten gesunder Menschen (Staphylokokken der Haut; Streptokokken und Pneumokokken im Mundsekret; manche darmbewohnende Bakterien). Für die Erreger der sog. Cholera infantum bildet vorzugsweise die Kuhmilch eine geeignete Wucherungsstätte.

B. Fernhaltung, Beseitigung und Vernichtung der Infektionsquellen.

1. Fernhaltung der Infektionsquellen

lässt sich bei den nicht einheimischen Seuchen (Pest, Cholera u. a.) durch Grenzsperrren und Einfuhrverbote erreichen.

Früher versuchte man gegenüber einigen Infektionskrankheiten, namentlich Pest, Cholera und Gelbfieber, ganze Länder durch Grenzkordons derart abzusperren, dass jeder Verkehr von Menschen und Sachen abgeschnitten wurde. Eine vollständige Absperrung wurde selbst bei der strengsten Durchführung nicht erreicht, und eine Ausbreitung der Krankheit trotz der Sperre ist mehrfach beobachtet. Immerhin wurden zahlreiche Infektionsquellen zurückgehalten, die eingeschleppten Infektionsfälle waren seltener und es konnte der Entstehung grösserer Herde leichter vorgebeugt werden. Aber diese Vortheile wogen das grosse Aufgebot von Schutzmannschaft, die Nothwendigkeit, behufs Aufrechterhaltung der Sperre zu den strengsten Mitteln (Erschiessen) zu greifen, und vor Allem die enorme Schädigung von Handel und Verkehr, nicht auf; und dementsprechend sind zur Zeit nur noch ausnahmsweise Landsperren in Gebrauch.

In den letzten Jahren suchte man sich durch Revision der Reisenden, namentlich an der Landesgrenze, zu schützen. Bei diesen von Aerzten vorgenommenen Revisionen wurden etwaige Kranke isolirt, deren Gepäck sowie die benutzten Wagen desinficirt. Die aus verseuchten Orten kommenden Gesunden wurden veranlasst, an ihrem

seziell sich während einiger Tage einer ärztlichen Untersuchung zu len. Auch diese Revisionen sind — von besonderen Ausnahmefällen abgesehen — für den Durchgangs- und namentlich Eisenbahnverkehr gleichmässig fallen zu lassen oder nur auf die Beobachtung schwerer Verkehrsmittel durch das Zugpersonal zu beschränken, weil der Nutzen dem Mehraufwand und der Belästigung nicht entspricht. Die Einschleppung

von Seuchen erfolgt relativ selten durch den Eisenbahnverkehr. Viel wichtiger ist der kleine Grenzverkehr durch Arbeiter, Händler u. s. w., der täglich hin und her die Grenze passiren. Auf diese Passanten und von ihnen benutzten Grenzübergänge ist daher hauptsächlich die Aufmerksamkeit anzuwenden. Ferner erheischen die Schiffer und Flösser eine besondere Ueberwachung.

Leichter und vollständiger gelingt die Absperrung von Seen gegen die aus durchseuchten Ländern kommenden Schiffe. Man errichtet in der Nähe der Häfen auf abgelegenen Stellen, womöglich auf einer kleinen Insel, eine Quarantänestation einzurichten, die mit Lazarett u. s. w. versehen ist. Alle aus verdächtigen Häfen kommenden Schiffe werden dort vor dem Anlanden einer gesundheitspolizeilichen Kontrolle unterzogen. Ist keine Erkrankung vorgekommen und sind keine verdächtigen Waaren (die zur Conservirung der Infektionserreger geeignet sind) an Bord, so wird das Schiff freigegeben, vorausgesetzt, dass die Fahrt eine bestimmte Zeit — der Inkubationsfrist für die betreffende Krankheit entsprechend — gedauert hat. War die Fahrtdauer kürzer, so verbleibt das Schiff bis zum Ablauf der Frist in Quarantäne.

Sind dagegen unterwegs Erkrankungen vorgekommen, dann ist für die Passagiere eine Quarantäne von der Dauer der Inkubationsfrist einzuhalten. Erfolgt die Erkrankung zu Anfang einer längeren Fahrt, so setzen sich auf dem Schiffe nicht fort, so können die gesunden Passagiere gelandet und nach Angabe ihres Reiseziels entlassen werden.

Auch die Ein- und Durchfuhr solcher von einem Seuchenherde kommenden Waaren und Gebrauchsgegenstände, welche geeignet sind, Infektionserreger zu conserviren und zu verschleppen, kann verboten werden. Nahrungsmittel, getragene Wäsche und Kleider, ferner Lumpen unterliegen vorzugsweise diesen Beschränkungen.

Um rechtzeitig die vorgenannten Sperrmaassregeln durchführen zu können, ist durch internationale Vereinbarungen zu bestimmen resp. bereits bestimmt (für Cholera durch die Dresdener Conferenz von 1893), dass die ersten Fälle einer nicht einheimischen Infektionskrankheit gemeldet werden, und dass bei einer gewissen Häufung der Fälle die betreffenden Orte als Seuchenherde erklärt werden.

Hat trotz aller Sperrmaassregeln eine Einschleppung der Krankheit stattgefunden, oder tritt der erste Fall einer Infektionskrankheit auf, welche stets in Europa einheimisch ist und daher keiner Sperre unterliegt, so ist nach den gesetzlichen Bestimmungen zu verfahren, die in jedem Lande zur Abwehr gegen gemeingefährliche Krankheiten erlassen sind. Die in den einzelnen deutschen Staaten geltenden Bestimmungen sind zum Theil sehr veraltet und von einander abweichend; ihr Ersatz durch ein einheitliches Reichs-Seuchengesetz ist dringend wünschenswerth.

Vor Allem ist durch derartige Gesetze dafür zu sorgen, dass die Behörden von der vorgekommenen Erkrankung schleunigst Kenntnis erhalten. Es besteht daher Anzeigepflicht für Cholera, Fleckfieber, Pocken, Diphtherie, Darmtyphus, Rückfallfieber, Ruhr, Puerperalfieber, Scharlach und Masern; und zwar ist zur Anzeige verpflichtet der behandelnde Arzt resp. der Pfleger, der Haushaltungsvorstand und eventuell andere Haushaltungsgenossen oder der Hausbesitzer. Nach eingegangener Meldung ist die Polizeibehörde befugt, an Ort und Stelle Ermittlungen über Stand und Ursache der Krankheit vorzunehmen; dem beamteten Arzt ist, soweit es zum Zweck dieser Ermittlungen nöthig ist, der Zutritt zum Kranken resp. zur Leiche, eventuell auch die Entnahme von Leichentheilen zur Untersuchung zu gestatten.

Sodann sind die Erkrankten, und ebenso ansteckungsverdächtige Personen aus deren Umgebung, abzusondern. Ferner sind eine Reihe von weiteren Maassregeln je nach dem Ansteckungsgrade der Krankheit und nach der Ausdehnung des Herdes zu treffen. So sind Messen, Märkte u. dgl. zu verbieten; Schulkinder aus inficirten Häusern vom Schulbesuch auszuschliessen; verdächtige Wasserversorgungen sind zu sperren; die Desinfektion ist zu organisiren; die Schiffer und Flößer sind bei einigen Seuchen (Cholera, Typhus) besonderer Aufsicht zu unterwerfen.

Die wichtigste unter diesen Maassnahmen ist die rechtzeitige Isolirung des Kranken. Wenn irgend möglich, soll die Ueberführung in ein Isolirspital versucht werden, da eine ausreichende Absperrung im Hause des Erkrankten nur selten durchführbar ist. Der Transport des Kranken darf nicht mittelst öffentlichen Fuhrwerks, sondern nur mittelst besonderen Krankenwagens erfolgen. — Jedoch muss man sich Angesichts der vielfach herrschenden Abneigung gegen die Hospitalbehandlung sehr häufig mit der Isolirung im Hause begnügen. Der Kranke muss dann ein eigenes Krankenzimmer erhalten. Aus demselben sind vor dem Hineinschaffen des Kranken alle überflüssigen Möbel und Gebrauchsgegenstände zu ent-

en; nachdem es belegt ist, dürfen während der ganzen Dauer der Krankheit keinerlei Sachen ohne vorherige gründliche Desinfektion (s. unten) aus dem Zimmer entnommen werden. Der Krankenwärter darf mit dem Kranken abzusperren und darf das Krankenzimmer nie ohne vorausgegangene Desinfektion verlassen. Anderen Personen ist der Zutritt zum Krankenzimmer streng zu untersagen; eventuell auch sich dieselben vor dem Verlassen des Zimmers einer Desinfektion unterziehen. Findet durch Husten u. s. w. ein Beladen der Luft mit infektiösen Tröpfchen statt, so sind ventilirende Luftströme zu vermeiden, welche die Luft in andere Zimmer führen können. Bei Pneumonie kann durch Gazeumhüllung des Betts einer stärkeren Verunreinigung der Zimmerluft vorgebeugt werden. — Alle Exkrete des Kranken sind gesondert in Gefäßen oder Tüchern aufzufangen und müssen sofort zu desinficieren (s. unten).

Bei manchen übertragbaren Krankheiten ist eine vollständige Isolierung nicht erforderlich; man kann sich darauf beschränken, die wichtigsten Infektionsquellen nach Möglichkeit auszuschalten. So z. B. der Phthisiker meist nur anzuhalten, beim Husten gewisse Vorsichtsregeln zu beobachten und das Sputum in bestimmte Gefäße zu sammeln (s. im speziellen Theil).

Schulpflichtige Kinder sind, sobald der Verdacht auf Ausbruch einer contagiösen Krankheit vorliegt, von der Schule zurückzuhalten. Sobald die Krankheit manifest geworden, so dürfen auch die Geschwister nicht zur Schule geschickt werden, es sei denn, dass für eine völlige Abheilung des Erkrankten Sorge getragen ist (wozu thatsächlich höchstens die Möglichkeit vorliegt). — Die Isolierung soll andauern, bis die Krankheit mit Genesung oder Tod geendet hat und eine regelrechte Desinfektion aller in Betracht kommenden Objecte erfolgt ist. Ist sich eine zuverlässige Schluss-Desinfektion nicht durchführen, so ist im Allgemeinen die Dauer der Isolierung auf 4—6 Wochen zu messen sein.

2. Mechanische Beseitigung der Infektionsquellen.

Bis zu einem gewissen Grade gelingt die Beseitigung der Infektionsquellen durch die gewöhnlichen Reinigungsmethoden. Ein bloßes Abkehren hilft nichts, sondern erhöht nur die Gefahr durch die Verbreitung verdächtigen Staubes. Festes Abwischen entzieht nur von glatten Flächen (polirten Möbeln) staubtrockene Krankheitserreger. Sehr wenig wirksam ist ferner die Lüftung (vgl. S. 418), erst wenn sie durch mechanisches Reiben, Klopfen u. s. w. unterstützt wird. — Die Reinigung des Körpers, der Wohnung, ver-

schiedener Utensilien mit Wasser, und namentlich mit heissem Wasser und Seife (Schmierseife), leistet dagegen erheblich mehr und kann die Infektionschancen bedeutend herabdrücken. Bei häufiger Anwendung, bei starkem Wasserconsum und sicherer Abführung des gebrauchten Wassers liefert diese Art der Reinigung eines der besten Schutzmittel gegen die Ausbreitung von Epidemien, und die Gewöhnung einer Bevölkerung an Reinlichkeit, sowie die Gewährung reichlichen Wassers und bequemster Vorrichtungen zur Entnahme und zum Fortschaffen des Reinigungswassers kann für die Frequenz mancher infektiöser Krankheiten von ausschlaggebender Bedeutung sein. Auch durch Abreiben der mit Anstrich oder Tapeten versehenen Wandflächen der Zimmer mit frischem Brot kann eine ziemlich vollkommene mechanische Entfernung aller an der Fläche haftenden Krankheitserreger bewirkt werden; nur ist es schwer, grössere Wandflächen gleichmässig in zuverlässiger Weise zu behandeln. — Sehr zu beachten ist bei allen diesen Procedures, dass das zur Reinigung benutzte Wasser, der Kehricht, das verriebene Brot u. s. w. nicht zu Infektionsquellen werden; sie müssen desinficirt oder verbrannt werden, falls sie wieder mit Menschen in Berührung kommen können.

Selbst wenn aber aller grob sichtbare Schmutz durch Wasser und Seife entfernt und die Wände durch Abreiben mit Brot gereinigt werden, bleiben immer noch am Kranken, an der Wäsche und Kleidung, in vielen Theilen der Wohnung Infektionserreger zurück. Ein voller Schutz gegen Infektion wird daher erst durch gleichzeitige Anwendung eines Verfahrens erreicht, welches die Infektionserreger in allen diesen Theilen der Umgebung abzutödten vermag, d. h. durch die Desinfektion.

3. Vernichtung der Krankheitserreger, Desinfektion.

Zur Desinfektion eignen sich die verschiedenen Seite 49 aufgezählten Mittel.

Die Wirksamkeit derselben ist theils durch Laboratoriumsexperimente festgestellt. Vielfach sind aber auch mehr die natürlichen Verhältnisse nachgeahmt; Utensilien, Kleider, Theile einer Wohnung wurden zunächst mit Infektionserregern imprägnirt, dann das zu untersuchende desinficirende Mittel angewendet, und nachher geprüft, ob die vorher infectiösen Objecte noch Thiere zu inficiren vermögen resp. ob sie in guten Nährsubstraten Culturen der Erreger entstehen lassen. — Eine willkommene Ergänzung dieser Versuche liefern ferner die Erfahrungen über praktische, in Spitälern ausgeführte Desinfektionen, namentlich wenn letztere methodisch und nach Art eines Experiments angestellt wurden. So sind z. B. im Alexander-Hospital zu St. Petersburg die verschiedenen Baracken, welche Flecktyphus-, Typhus-, Pneumonie-Kranke u. s. w. beherbergten, in einer bestimmten Weise desinficirt und dann mit anderen Kranken resp. Reconvalescenten von anderen Krankheiten belegt. Traten dann Fälle

zuerst in der Baracke behandelten Krankheit unter der neuen Belegschaft, so musste die Desinfektion als nicht genügend betrachtet werden.

Aus diesen Experimenten hat sich ergeben, dass jedes Desinfektionsmittel (wie bereits S. 48 hervorgehoben wurde) nur in bestimmter Concentration und bei bestimmter Dauer der Anwendung wirksam ist; dass ferner die Wirkung auf verschiedene Bakterien und verschiedene Entwicklungszustände der Bakterien sich sehr ungleich verteilt; dass die zu desinficirenden Objecte von dem Mittel vollständig durchdrungen werden müssen; und dass dabei keine chemischen Aetzungen eintreten dürfen, welche die desinficirende Wirkung schwächen.

Für die Praxis der Desinfektion ist es ausserdem noch wichtig, dass die betreffenden Mittel die Objecte nicht beschädigen, dass das desinficirende Mittel für die mit der Ausführung der Desinfektion Betheiligten keine Gefahr bringt, und dass endlich die Desinfektion nicht kostspielig ist.

Nicht alle die S. 49 aufgeführten, zu einer Vernichtung von Bakterien befähigten Mittel erfüllen die hier präcisirten Anforderungen und eignen sich somit für die praktische Desinfektion. Ganz abzulehnen ist von den früher gebräuchlichen gasförmigen Desinfektionsmitteln, wie schweflige Säure, Chlor-, Brom- und Sublimatdampf. Schweflige Säure sollte in einer Concentration von 1·4 Volumprocent mindestens 8 Stunden einwirken, und es sollte zu dem Zwecke in 1 cbm Raum 20 g Schwefel verbrannt werden. Es werden hierdurch nur die in den oberflächlichsten Schichten gelegenen Krankheitskeime abgetödtet und auch diese nur bei gleichzeitiger Anfeuchtung der Objecte; dann aber werden letztere stark beschädigt. Chlor- und Bromgas eignen sich noch weniger, weil sie sich viel schwerer in den Theilen des Raumes vertheilen und weil sie die Objecte noch stärker beschädigen. — Sublimatdämpfe, durch Erhitzen von Sublimat hergestellt, verdichten sich, sobald sie sich abkühlen und ehe sie mit den Objecten in Berührung kommen, zu fester Substanz und dringen gar nicht ein. — Manche Verfahren (Sprengen mit Carbolwasser, Kalklyptol, Aufhängen von Carbolpapier, Ozonlämpchen u. s. w.) charakterisiren sich schon dadurch, dass dabei gar kein Versuch zur quantitativen Anwendung gemacht wird, als verwerfliche Schwindelmittel. Am besten bewährt haben sich zur praktischen Desinfektion folgende Mittel:

- 1) Verbrennen, jedoch nur für kleinere werthlose Gegenstände. Grössere Objecte, insbesondere das Stroh der Bettsäcke, können niemals in dem Hause des Erkrankten mit solcher Vorsicht verbrannt werden, dass keine Ausstreuerung von Infektionserregern dabei erfolgt.

2) Kochen in Wasser. Alle in Betracht kommenden Krankheitserreger werden schon durch 5 Minuten langes Kochen vernichtet. Bei schmutzigen und fettigen Substanzen, ferner bei schleimigen Absonderungen ist Sodazusatz zum Wasser (2 Procent) zu empfehlen. — Anwendbar für Ess- und Trinkgeschirr u. s. w. Nicht für beschmutzte Wäsche, in welcher durch das Kochen festhaftende Flecken entstehen.

3) Erhitzen in Wasserdampf auf 100° 5 Minuten; oder in gespanntem Dampf auf 110 — 120° 2 Minuten lang. Ist nur in besonderen Desinfektionsöfen ausführbar; deren Beschreibung s. unten. — Anwendbar für Betten, Kleider, nicht beschmutzte Wäsche; nicht für Leder, Pelze, Gummi.

4) Sublimat (1:2000). Am leichtesten zu bereiten durch Auflösung der ANGERER'schen Pastillen. Da Sublimat mit Eiweisskörpern unlösliche Verbindungen eingeht, ist dasselbe für frische Absonderungen nur verwendbar, wenn reichlich Kochsalz (1 Sublimat: 5 Kochsalz; für jeden Liter der Lösung 1:2000 einen gehäuften Theelöffel voll Kochsalz) zugegen ist; es wird dadurch die Ausfällung des Sublimats verhindert. Für phthisisches Sputum sind stärkere Concentrationen (5 p. m.) zu verwenden. — Die Giftigkeit der Lösungen 1:2000 ist eine sehr geringe. Die Maximaldosis (für innerlichen Gebrauch) ist erst in 30 resp. 60 ccm enthalten. Für die Desinfektion durch geschulte Desinfektoren ist Sublimatlösung daher ohne jedes Bedenken. Dagegen dürfen concentrirte Lösungen oder Pastillen dem Publikum nicht in die Hände gegeben werden, weil die Geruch- und Farblosigkeit der Lösung zufällige Vergiftungen möglich macht.

5) Carbolsäure (3 und 5 Procent) tödtet zwar Milzbrandsporen nicht, aber z. B. Eiterkokken schneller als die vorgenannte Sublimatlösung. — Wirksamer und für die vom Publikum vorgenommenen Desinfektionen am meisten zu empfehlen ist 5 procentige Lösung von Liqueur Cresoli saponatus, die auch durch Verdünnen der officiellen Aq. Cresoli ana mit Wasser hergestellt werden kann. — Die gebräuchlichen Carbol- und Cresollösungen sind zwar giftiger als das Sublimat in gleich wirksamer Concentration, da bereits in 0.5 ccm einer 5 procentigen Carbollösung die Maximaldosis enthalten ist, aber der starke Geruch der Lösung hindert unabsichtliche Vergiftungen. — Sublimat- und Cresollösung sind anwendbar für Abwaschen des Fussbodens und anderer Flächen, verschiedenster Utensilien, Ledersachen u. s. w.

6) Aetzkalk zur Desinfektion der Excremente, Düngerhaufen u. s. w. Für denselben Zweck kann auch Chlorkalk (in Breiform, 1:5 Wasser, den Defectionen zu gleichen Theilen zugesetzt, halbstündige Einwirkung; bei geklärten Abwässern viel dünner, s. S. 480), oder rohe Salzsäure

Schwefelsäure Verwendung finden (das Gemisch muss mindestens 000 freie Säure enthalten).

Der Aetzkalk wird folgendermaassen bereitet: Etwa 100 Volumtheile annter Kalk werden mit 60 Th. Wasser gelöscht (CaO in $\text{Ca}[\text{OH}]_2$ ver-
lelt), indem man die Kalkstücke in eine Schale legt, deren Boden mit dem
ser bedeckt ist. Die Kalkstücke saugen das Wasser auf und zerfallen
r starker Wärmeentwicklung zu Pulver von Kalkhydrat. Von diesem
er wird 1 Liter mit 4 Liter Wasser gemischt; man erhält so eine 20pro-
ge Kalkmilch. Oder fertiger gelöschter Kalk wird mit der entsprechenden
ge Wasser gemischt. — Um Latrineneinhalt ausreichend zu desinficiren,
en jedem Liter Inhalt 50 ccm Kalkmilch zugesetzt werden; die im Einzel-
erforderliche Menge ergibt sich sonach durch Ausmessen der Latrine.
las Ausmessen unthunlich, so rechnet man pro Kopf und Tag 0.4 Liter
dien und erhält dann aus der Dauer der Benutzung eine Schätzung der
anden Menge. Für Durchmischung des Inhalts mit der Kalkmilch ist
Möglichkeit zu sorgen.

7) Formaldehyd (CH_2O , Oxydationsprodukt des Methylalkohols)
lasform. Das Bestreben, die an den verschiedensten Objecten eines
nraumes haftenden Parasiten gleichzeitig durch ein gasförmiges
nficiens abzutödten, stiess früher auf unüberwindliche Schwierig-
en, falls die Objecte unbeschädigt bleiben sollten. Erst mit Hülfe
Formaldehyds ist eine durchaus schonende und doch ausreichende
nfektion der Wohnräume gelungen. Die praktisch in Betracht
menden Krankheitserreger werden abgetödtet, wenn 2.5 g Form-
ehyd pro Cubikmeter Wohnraum 7 Stunden lang, oder 5 g
maldehyd pro Cubikmeter $3\frac{1}{2}$ Stunden einwirken. Indessen
sen zum Gelingen der Desinfektion noch folgende wichtige Be-
rungen erfüllt sein:

Der Wohnraum muss abgedichtet werden, damit die erforderliche
centration des Gases erreicht wird. Nur bei rascher Entwicklung
k überschüssiger Gasmengen kann die Abdichtung unterbleiben.
Ferner muss gleichzeitig (oder vorher) die Luft mit Wasserdampf
rsättigt werden; es erfolgt dann an allen zugänglichen Flächen
ensation von Wasserdampf und Formaldehyd und dadurch eine
rflächliche Durchfeuchtung mit wirksamer Formaldehydlösung. An
men Gegenständen (Oefen, Schornsteine) erfolgt keine Condensation;
elben müssen gesondert desinficirt werden. — Da nur eine Ober-
chen-Desinfektion stattfindet und die Wirkung in porösen Stoffen
nur bis in sehr geringe Tiefe erstreckt, sind zunächst alle Objecte
der Formaldehyddesinfektion auszuschliessen, in welche Exkrete
Parasiten in grössere Tiefe eingedrungen sind, ebenso Exkrete
st in dickerer Schicht. Frische Sputa, grob verunreinigte Stellen des
sbodens, Taschentücher und sonstige mit Exkreten stärker beschmutzte

Wäsche sind daher durch Sublimat- oder Cresollösung gesondert zu desinficiren; Betten und Matratzen, die erheblich und nicht nur oberflächlich verunreinigt sind, müssen in den Desinfektionsöfen transportirt werden. Ausserdem müssen alle sonstigen für die Formaldehyddesinfektion geeigneten Objecte so in dem Wohnraum aufgestellt bzw. aufgehängt werden, dass ihre gesammten Oberflächen der Luft frei ausgesetzt sind. Die Gegenstände dürfen sich dabei nicht berühren oder einander zu nahe gerückt werden. — Bei sehr kleinen Zimmern und starker Füllung mit Gegenständen ist ein Zuschlag von Formaldehyd empfehlenswerth, da nicht eigentlich der Cubikraum, sondern die Masse der absorbirenden Flächen den Verbrauch beeinflusst.

Eine Beschädigung der Objecte tritt durch diese Art von Desinfektion nicht ein. Wohl aber hält sich der stechende, die Schleimhäute stark reizende Geruch des Formaldehyds sehr lange im Zimmer und haftet nachhaltig an Betten, Kleidern u. s. w. trotz energischem Lüftens. Praktisch verwendbar ist die Formaldehyddesinfektion daher erst geworden, seit man ein einfaches Verfahren kennt, um den Geruch zu beseitigen. Dasselbe besteht darin, dass zu Ende der Desinfektion noch bei geschlossenem Zimmer durch das Schlüsselloch Ammoniakgas eingeleitet wird. Dieses bildet mit dem Formaldehyd die feste Verbindung Hexamethylentetramin. Die Menge des Ammoniaks, das am einfachsten durch Verdampfen von käuflicher 25 procentiger Ammoniaklösung hergestellt wird, muss der Menge des entwickelten Formaldehyds angepasst werden.

Die Bereitung des Formaldehyds kann in sehr verschiedener Weise geschehen; wenn nur die oben aufgeführten Bedingungen richtig eingehalten werden, ist die Wahl des Apparats zur Formaldehydentwicklung nebensächlich und ist wesentlich nur nach den Kosten, der Einfachheit und praktischen Brauchbarkeit des Verfahrens zu entscheiden.

Früher versuchte man Lampen zu verwenden, in welchen Methylalkohol zu Formaldehyd oxydirt wurde. — TRILLAT, ROSENBERG und SCHLOSSMANN gingen von Formalin, der 40 procentigen wässrigen Lösung des Formaldehyds aus und suchten durch Verdampfen oder Versprayen daraus Formaldehyd in Gasform frei zu machen. Um aber eine Abscheidung von unwirksamen Polymerisationsprodukten zu verhindern, wie sie aus dem Formaldehyd leicht entstehen, benutzte TRILLAT Formochlorol (eine Mischung von Formalin mit Chloralciumlösung), ROSENBERG Holzin (Formalin mit Zusatz von Menthol), SCHLOSSMANN Glycoformal (Formalin mit 10% Glycerin). Es hat sich später gezeigt, dass diese Zusätze unnöthig und theuer sind und theilweise die Objecte stark beschädigen. — SCHERING empfahl die Vergasung von Pastillen von Paraform, ein bequemes, aber theueres Verfahren.

KRELL-ELB konstruierte Glühblocks, in denen Paraform vergast wird; das ist theurer und die Vertheilung des Formaldehyds ungleich. — Eine von Improvisation soll ermöglicht werden durch die Stahlbolzen von KRELL u. die eisernen Kugelketten von SPRINGFIELD. Dieselben sollen in einer Feuerung rothglühend gemacht und dann in Behälter mit Formalin eingelegt werden, so dass grosse Mengen Formaldehyd rasch verdampfen. Die erforderlichen Manipulationen sind schwierig, zuweilen tritt Entzündung des Formaldehyds ein, immer muss mit grossen Ueberschüssen von Formaldehyd gearbeitet werden. Für wiederholte Anwendung ist das Verfahren unbedingt zu vermeiden, es wird dann auch theurer als ein Verfahren mit besonderem Apparat. Für ausnahmsweise Improvisation sind erhitzte Chamottesteine besser als die eisernen Ketten (STEINITZ).

CZAPLEWSKI und PRAUSSNITZ haben Sprayapparate zum Versprayen von Formalin angegeben, die in der Praxis gute Resultate geliefert zu haben scheinen. — Wohl am meisten in der Praxis erprobt und bewährt hat sich die Verdampfung von verdünntem Formalin (Breslauer Methode). Da



Fig. 166.

Breslauer Apparat zur
Formaldehyd-Entwicklung.



Fig. 167.

Ammoniak-Einleitung.

er der Formaldehydentwicklung auch eine Entwicklung reichlicher Wasserdampfmengen durchaus erforderlich ist, ist es das Zweckmässigste, das zur Verdampfung jeweils erforderliche Formalin- und Wasserquantum zusammenzumessen und dies Gemisch in einem einfachen Behälter mit grosser Heizfläche zu verdampfen. Durch diese Verdünnung des Formalins wird dann gleichzeitig jeder Polymerisirung des Formaldehyds vorgebeugt. — Als Verdampfungsapparat kann der in Fig. 166 abgebildete Kupferkessel und die gehörige Spirituslampe benutzt werden. — Nach beendeter Desinfektion Ammoniak aus einem kleineren Kessel von der Form wie in Fig. 167 zu gießen; das durchs Schlüsselloch geleitete Rohr führt in eine Auffangrinne, Beschädigungen des Fussbodens vorzubeugen.¹ Die für jede Raumgrösse erforderlichen Mengen von Formalin, Wasser, Spiritus und Ammoniak sind aus folgenden Tabellen zu entnehmen:

¹ Die Apparate und Utensilien sind zu beziehen von G. HAERTEL, Breslau, Marktstrasse; BERGEL, Breslau, Kätzelohe; BOJE, Göttingen. Ausserdem lassen sich dieselben nach den genauen Angaben in FLÜGGE: Die Wohnungsdesinfektion durch Formaldehyd, Jena 1900, S. 12 von jedem Klempner hergestellt werden.

Tabelle 1.
Der „Breslauer Apparat“ ist zu beschicken mit:

bei 2.5 g Formaldehyd auf 1 cbm Raum				bei 5 g Formaldehyd auf 1 cbm Raum			
Raum- grösse in cbm	Forma- lin 40%	Wasser	Spiritus 86%	Raum- grösse in cbm	Forma- lin 40%	Wasser	Spiritus 86%
10	200	800	100	10	400	600	100
20	250	1000	250	20	500	750	250
30	300	1200	300	30	600	900	300
40	400	1600	400	40	800	1200	400
50	450	1800	500	50	900	1350	500
60	500	2000	600	60	1000	1500	600
70	550	2200	650	70	1100	1650	650
80	650	2600	750	80	1300	1950	750
90	700	2800	850	90	1400	2100	900
100	750	3000	950	100	1500	2250	950
110	800	3200	1050	110	1600	2400	1050
120	900	3600	1150	120	1800	2700	1150
130	950	3800	1200	130	1900	2850	1200
140	1000	4000	1300	140	2000	3000	1300
150	1050	4200	1400	150	2100	3150	1400

Anmerkung: Bei Zimmern von mehr als 150 cbm Inhalt sind unbedingt zwei Apparate zu verwenden. Auch bei Räumen zwischen 100 und 150 cbm empfiehlt es sich, zwei Apparate zu benutzen und jeden mit der halben erforderlichen Menge Formalin, Wasser und Spiritus zu beschicken.

Tabelle 2.
Der „Ammoniakentwickler“ ist zu beschicken mit:

bei 2.5 g Formaldehyd pro 1 cbm			bei 5 g Formaldehyd pro 1 cbm		
Raumgrösse in cbm	Ammoniak 25%	Spiritus 86%	Raumgrösse in cbm	Ammoniak 25%	Spiritus 86%
10	100	10	10	150	15
20	200	20	20	300	30
30	250	25	30	400	40
40	350	35	40	550	50
50	400	45	50	600	60
60	500	50	60	750	75
70	600	55	70	900	90
80	650	65	80	1000	100
90	750	75	90	1150	120
100	800	80	100	1200	130
110	900	90	110	1350	140
120	1000	100	120	1500	150
130	1050	105	130	1600	160
140	1150	110	140	1750	170
150	1200	120	150	1800	180

Die Wohnungsdesinfektion durch Formaldehyd repräsentirt einen utenden Fortschritt gegenüber dem früher üblichen Verfahren. es bestand darin, dass die Desinfekteure der Reihe nach die verdenen Theile der Wohnung einzeln behandeln mussten; den Fussn und viele Gegenstände durch Abwaschen mit Sublimatlösung, Wände durch Abreiben mit Brot, glatte Möbeln durch trockenes üben; so viel als möglich wurden die Gegenstände, insbesondere en, Kleider, Wäsche u. s. w. nach der Desinfektionsanstalt geschafft. Gelingen der Desinfektion hing im Einzelfall ganz von der Sorgab, welche der Desinfektor aufwendete; Nachlässigkeiten waren ler täglich wiederholten einförmigen Arbeit unvermeidlich. Ferner las Publikum besonders misstrauisch gegen das Fortschaffen der nstände aus der Wohnung; ein Verfahren, bei welchem alles in Wohnung verbleibt und dort ohne jede Beschädigung desinficirt, findet viel leichter Eingang. — Die Kosten stellen sich ausserer eher niedriger als bei dem früheren Verfahren der Wohnungsinfektion.

Allerdings wird man die Formaldehyddesinfektion nicht bei allen tionskrankheiten als genügend ansehen können; bei Pocken, Pest septischen Erkrankungen ist die Dampfdesinfektion der Betten Matratzen nicht zu entbehren; dieselbe muss in diesen Fällen en der Formaldehyddesinfektion erfolgen. Bei Cholera und Ruhr on letzterer abzusehen, und nur Bett und Theile des Wohnraums ist er unten angegebenen Weise (s. „Dienstanweisung“) zu desinficiren. Abdominaltyphus findet namentlich in engen Wohnungen eine rhebliche Verstreuung des Contagiums statt, dass die Formaldehydinfektion (event. neben der Dampfdesinfektion) am Platze ist. Bei den gen Infektionskrankheiten kann die Wohnungsdesinfektion auf die endung von Formaldehyd beschränkt werden.

Eine wichtige Ergänzung der Desinfektion bildet das Einhüllen Infektionsquellen, so dass die Verbreitung der Krankheitserreger h Berührungen, Luftströme und Insecten gehindert ist. Schon Einhüllen verdächtiger Objecte in trockene oder mit Wasser anachtete Tücher gewährt einen erheblichen Schutz; derselbe wird vollständig, wenn die Hüllen mit Sublimatlösung (1:2000) behtet sind. In derartiger Umhüllung können Infektionsquellen ohne hr für die Umgebung transportirt oder bis zur Vornahme der nfection aufbewahrt werden.

Für die praktische Anwendung der im Vorstehenden angeführten Desinfektionsmittel ist vor Allem eine Kolonne von geschulten Desinfektoren erforderlich, welche die Bereitung der Mittel und die Technik ihrer Anwendung genau kennen. Ferner bedarf es für die Ausführung eines der wichtigsten Desinfektionsverfahren, nämlich des Erhitzens in Wasserdampf von 100° , besonders construirter Oefen, deren Betrieb ebenfalls nur geschulten Desinfektoren überlassen werden darf. Beide, Desinfektoren und Desinfektionsöfen sollten sich daher überall finden, wo Desinfektionen vorgenommen werden, in Krankenhäusern, Gefängnissen u. s. w. Besonders wichtig ist aber für jede Stadt die Einrichtung einer öffentlichen Desinfektionsanstalt, in welcher das ganze Desinfektionswesen centralisirt ist und von welcher aus alle Desinfektionen im Publikum vorgenommen werden.

In diesen Desinfektionsanstalten sind alle diejenigen Gegenstände zu desinficiren, welche in der Wohnung des Kranken nicht ausreichend oder nicht ohne Beschädigung desinficirt werden können. Dahin gehören stärker verunreinigte Betten, Kleider, Matratzen, Stroh-säcke, Teppiche, Vorhänge, ferner beschmutzte Leib- und Bettwäsche.

Letztere wird zwar auch durch das beim Waschen übliche Verfahren desinficirt, da Wäsche mindestens eine halbe Stunde gekocht zu werden pflegt. Aber vor dem Kochen wird die Wäsche sortirt, in kaltem Wasser eingewaschen und vorgewaschen, damit nicht die Schmutzflecke durch das Erhitzen fixirt werden. Es wird fast niemals garantirt werden können, dass bei diesen Pro-ceduren nicht eine Weiterverbreitung der Krankheitserreger erfolgt. Daher ist es gerathen, auch die inficirte Wäsche durch die Desinfektionskolonne desinficiren zu lassen.

In den

Desinfektionsanstalten

befinden sich a) Oefen für die Desinfektion mittelst Wasserdampfes von $100-115^{\circ}$; b) Behälter mit Sublimatkoehsalzlösung; c) die Utensilien zur Formaldehyddesinfektion; d) die Transportwagen und die Utensilien für die Desinfektionskolonne.

a) Die Desinfektionsöfen enthalten einen Raum, in welchem die zu desinficirenden Objecte eingelagert oder aufgehängt werden und der von Dampf durchströmt wird. Sie sind entweder für ungespannten resp. sehr wenig gespannten Dampf von $100-104^{\circ}$ eingerichtet; oder aber für stark gespannten Dampf von mehr als 110° . In jedem Falle muss das Erhitzen in einer reinen Wasserdampf-Atmosphäre geschehen; sobald Luft neben Wasserdampf im Ofen enthalten ist, kommt eine vollständige Desinfektion nicht zu Stande (vgl. S. 51).

Bei den Apparaten für ungespannten Dampf ist daher die Einrichtung getroffen, dass der Dampf während der ganzen Desinfektionsdauer den Apparat durchströmt; ausserdem giebt man dem Dampf einen minimalen Ueberdruck (durch Verengerung der Abströmungsöffnung), damit jedes Eindringen von Luft in das Innere des Ofens sicher ausgeschlossen ist.

Das Austreiben der Luft aus dem Innern des Apparats und aus den darin befindlichen Objecten geht ferner am schnellsten von statten, wenn der Dampf oben ein- und unten abströmt; der specifisch leichtere Dampf verdrängt dann schichtweise und vollständig die schwere Luft.

Die Kleider, Betten u. s. w. sind vor dem an den Innenwänden des Apparats reichlich sich bildenden Condenswasser möglichst zu schützen; sie werden von demselben derartig durchnässt, dass leicht Schimmel entstehen. Ebenso ist zu vermeiden, dass die Objecte im kalten Zustand mit dem heissen Dampf zusammentreffen, da sonst zu starke Condensation im Innern der Objecte erfolgt. Man trifft daher Vorrichtungen, dass eine allmähliche Erwärmung der in den Apparat zu brachten Sachen erfolgt, ehe der Dampf einströmt. Ist dies geschehen, so bringt der heisse Dampf nur eine ganz minimale Durchsichtung der Sachen zu Wege, die sich auf's schnellste beseitigen lässt, wenn die Sachen nach dem Herausnehmen aus dem Ofen hindurch hergeschwenkt oder auf Regalen ausgebreitet werden. Bei grossen Apparaten bestehen besondere Einrichtungen zum Trocknen der Sachen innerhalb des Ofens; es wird dann die Dampfzufuhr abgestellt und durch Ventilationsöffnungen, wo möglich unter gleichzeitiger Erwärmung des Innenraums, ein kräftiger Luftstrom durch den Apparat geleitet.

Die einfachsten Desinfektionsöfen lehnen sich an die für das Sterilisiren von Utensilien in den Laboratorien gebräuchlichen Apparate an und bestehen aus einem grossen Wassergefäss, einem vertikalen Cylinder von 1—1½ m Höhe und 50—80 cm Weite und einem nach oben verjüngten Aufsatz, dem sogenannten Helm. Der Cylinder steht in einem mit Wasser gefüllten Falz des Wasserkessels; der Helm fasst wiederum in einen ebensolchen Falz des Cylinders. Ist hierdurch eine hinreichende Absperrung des Wasserdampfes erzielt. Der Wasserkessel ist entweder in einen Herd einzusetzen oder wird mit Gas geheizt; der Dampf durchströmt dann den Cylinder und entweicht schliesslich durch die enge Oeffnung des Helms; er zeigt, falls die Wärmeabgabe vom Kessel durch Umhüllung mit Kieselguhr, Filz u. dgl. behindert ist, noch bei Ausströmung eine Temperatur von 100°. In den Cylinder werden die Objecte eingehängt oder in Körben eingelagert.

Solche Apparate lassen sich in der primitivsten Weise und sehr billig

improvisiren. Ein Fass ohne Böden auf einen Waschkessel gestellt und mit durchlochem Deckel versehen, kann schon für einige Zeit ausreichende Dienste thun.

Für ständigen Betrieb haften diesen Apparaten aber mehrere Nachteile an. Die Durchfeuchtung mit Condenswasser beschädigt die Sachen; letztere sind in den aufrecht stehenden hohen Cylinder schwer hineinzubringen u. s. w.

Diesen Nachtheilen ist in den neuen Apparaten dadurch abgeholfen, dass der Cylinder horizontal gelagert ist und dass eine Vorwärmung des Apparats und der Objecte stattfindet, welche die Bildung von Condenswasser hindert.




Fig. 168. THURSFIELD'scher Desinfektionsofen.

A Mit Holz verkleideter Cylinder. B Feuerung. C Wassereinguss mit Wasserstandrohr.
E Signalpyrometer. F Thermometer. G Thür.

Besonders compendiös und praktisch ist der THURSFIELD'sche Desinfektionsofen. Der horizontal gelagerte Cylinder (A, Fig. 168) von 50 cm bis 1.5 m Durchmesser (je nach der Grösse der zu desinficirenden Objecte) ist aussen in einem Abstand von 3—19 cm von einem Blechmantel umkleidet; der untere Theil des Mantelraums wird mit Wasser gefüllt und dient als Kessel (s. den schematischen Durchschnitt, Fig. 169). Von der oberen Dampf enthaltenden Hälfte führen Oeffnungen den Dampf in das Innere des Cylinders; die Abströmungsöffnung wird unten (d) angebracht. Der Cylinder ist vorn und hinten durch Thüren geschlossen, die mit Schrauben dampfdicht angepresst werden. Um den äusseren Mantel ist zum Wärmeschutz noch eine Holz- oder Filzbekleidung gelegt. — In diesem Ofen findet nach dem Anheizen (mit Gas oder Feuerung) und vor dem Einstromen des Dampfes eine solche Vorwärmung des Apparats und der Objecte statt, dass eine kaum merkliche

ndensation erfolgt und kurzes Schwenken der herausgenommenen Kleider i Betten dieselben völlig trocken erscheinen lässt.

Von BUDENBERG in Dortmund ist ein sehr praktischer Desinfektionsofen konstruiert, der von einem besonderen Dampfentwickler mit Dampf versorgt wird. Der Ofen stellt einen liegenden ovalen Cylinder dar (Fig. 170), dessen Innenseite mit Schuppenblechen ausgekleidet ist und dadurch eine Durchdringung der Objecte hindert. Der Apparat empfiehlt sich besonders da, derselbe an einen bereits bestehenden Dampfkessel angeschlossen werden kann.

Grössere Apparate (von SCHIMMEL & COMP. in Chemnitz; RIETSCHEL & KNEBERG in Berlin S.; ROHRBECK in Berlin) enthalten einen Innenraum von 6 cbm und von quadratischem oder oblongem Querschnitt. Zum Betriebe dürfen sie eines grossen Dampfkessels. Eine Vorwärmung der Objecte wird ihnen dadurch erzielt, dass Heiz-

re oder Rippenheizkörper in das Innere des Apparats vorragen; diese werden zuerst mit Dampf angeheizt, erst wenn die Erwärmung genügend ist, lässt man den Dampf in den eigentlichen Desinfektionsraum strömen. Nach der Beendigung der Infektion wird wiederum nur durch Heizkörper erwärmt und zugleich

st man Luft durch den Innenraum lassen; dadurch erfolgt schnelles und vollkommenes Trocknen der Objecte.

Mehrfach hat man versucht, durch erhitzte Heizkörper dem strömenden Dampf eine höhere Temperatur geben, in der Absicht, damit eine schnellere Desinfektion zu erzielen. Versuche haben jedoch zweifellos ergeben, dass durch ein solches Verfahren eine desinficirende Wirkung nicht erzielt wird.

Die Apparate mit gespanntem Dampf von 110—120° (z. B. von WERTZ & HERRSCHER) sind nach den Zeichnungen der in den Laboratorien ge-

bräuchlichen Autoklaven-Ofen konstruiert. Besondere Vorsicht muss hier darauf verwendet werden, dass die Luft durch den Dampf vollständig ausgetrieben wird; schliesslich ist Dampf in den geschlossenen Apparat einzulassen, bis die Manometer ca. $\frac{1}{2}$ —1 Atmosphäre Ueberdruck und eingesetzte Thermometer entsprechende Temperatur von 110—120° zeigen. Hat die höchste Spannung 10 Minuten bestanden, so lässt man den Dampf aus- und wieder Luft einströmen. — Diese Apparate gestatten einen schnelleren Betrieb; aber die Benutzung muss eine peinlich sorgfältige sein; und die Apparate sind daher für gemeine Einführung nicht zu empfehlen.




Fig. 169. Durchschnitt durch den THURSVIELED'schen Desinfektionsofen.

a Wasser. b Dampf. c Desinfektionsraum.
d Dampfabführung. e Feuerung. f Thüröffnung.
g Manometer. h Thermometer.

Bei der Auswahl eines Ofens ist namentlich in Erwägung zu ziehen, dass in kleineren Städten und Anstalten die zu desinficirenden Objecte gewöhnlich einen sehr geringen Umfang haben. Es erschwert den Betrieb und erhöht die Kosten der Desinfektion in unnöthiger Weise, wenn dafür jedesmal ein grosser Apparat eingeheizt werden muss, während bei stärkerer Häufung der Objecte ein kleiner Apparat leicht mehrere Male an einem Tage beschickt werden kann. Für den selten vorkommenden Fall, dass einmal auch grössere Gegenstände, wie Sprungfederrahmen, durch heissen Dampf desinficirt werden sollen, sollten die gewöhnlichen Desinfektionsapparate nicht zugeschnitten werden; diese Objecte sind zweckmässiger in der Wohnung zu belassen, dort durch Formaldehyd oder eventuell mittelst Abreibens mit Sublimat zu desinficiren (s. unten). Nur bei kleinen Apparaten sind die Anschaffungs- und Betriebskosten so niedrig, dass eine weite Verbreitung der Desinfektion



Fig. 170. BUDENBERG's Desinfektionsofen.

einrichtungen sich erhoffen lässt. Für Landgemeinden und kleinere Städte reicht daher Apparat von 1.5 m Länge und 1 m Höhe des Innenraums vollkommen aus; dieselben können grosse Bündel von Betten, eine zusammengerollte Matratze u. dgl. auf einmal aufnehmen. Grössere Städte können einen grossen Apparat nicht entbehren, stellen aber zweckmässig daneben einen oder mehrere kleineren auf, die dann weitaus am häufigsten benutzt zu werden pflegen.

Die Aufstellung des Apparats in der Desinfektionsanstalt erfolgt gewöhnlich so, dass die letztere streng in zwei Abtheilungen geschieden ist, und dass die Trennungswand über die Mitte des mit zwei Thüren versehenen Desinfektionsofens hinwegragt. Durch einen besonderen Eingang gelangen inficirten Sachen in die eine (unreine) Abtheilung, werden von da in den Apparat eingeschoben, dann aber, um eine Reinfektion in der unreinen Abtheilung zu vermeiden, auf der anderen (reinen) Seite durch andere Person (oder nachdem die Desinfektoren auf der unreinen Seite ihre Dienstkleider gelassen und ein Rad passirt haben, das den einzigen Durchgang zur re-

bildet) aus dem Ofen herausgenommen und auf anderen Wagen dem Publikum wieder zugestellt.

Diese Einrichtung ist dann unbedingt nöthig, wenn dem Publikum die beliebige Einlieferung von desinfektionsbedürftigen Sachen in die Anstalt gestattet ist. Eigentlich sollte aber diese Erlaubniss nie gegeben werden; denn beim Transport der Sachen ist dann eine starke Ausstreung von Infektionskeimern ganz unvermeidlich. — Das einzig Richtige ist vielmehr, dass alle Sachen stets von geschulten Desinfektoren aus den Wohnungen abgeholt und nach der Anstalt transportirt werden. Diese sind instruiert, die Sachen in mit Sublimatlösung befeuchteten Säcken oder Laken zu befördern (s. unten), so dass weder unterwegs noch in der Anstalt eine Abkühlung von Krankheitserregern erfolgen kann. Alsdann ist die Aufrechterhaltung einer Trennung der reinen und unreinen Seite nicht mehr begründet; hält man dennoch daran fest, so geschieht das mehr zur Beruhigung für das Publikum. — Für ländliche Gemeinden sind fahrbare Desinfektionsöfen empfohlen; im Allgemeinen ist aber auch hier das Abholen der Desinfektionsobjecte nach dem an einer Centrale (Kreis-Krankenhaus) aufgestellten Desinfektionsofen einfacher, als der Transport des schweren und leicht beschädigten Ofens. Nur bei lokalen Epidemien ist der im Nothfall fahrbar herzustellende Apparat nach dem versuchten Ort zu schaffen.

Jeder Desinfektionsofen ist vor der praktischen Benutzung auf seine Leistungsfähigkeit zu prüfen und es ist eine Instruktion für den Heizer aufzustellen, nach welcher dieser die Desinfektion ausführt. — Für jedes System von Desinfektionsöfen ist festzustellen: 1) die Dauer des Anheizens, d. h. wie lange Zeit vom Anzünden des Feuers an vergeht, bis der abströmende Dampf 100° zeigt; 2) die Dauer des Eindringens, d. h. wie lange Zeit vergeht, bis die Temperatur von 100° auch in das Innere der Objecte vorgedrungen ist. Um diese zu bestimmen, wird in ein möglichst voluminöses Object, am besten ein Convolut wollener Decken, ein Maximalthermometer eingelegt; nach Ablauf einer gewissen Zeit wird der Ofen geöffnet und nachgesehen, ob das Thermometer bereits 100° erreicht hat. Ist das nicht der Fall, so muss der Versuch wiederholt werden. — Will man mit einem Versuche zum Ziel kommen, so legt man in das Innere des Deckenbündels ein Kontaktthermometer, dessen Legirung bei 100° schmilzt und das dann durch ein elektrisches Läutewerk das Durchdringen dieser Temperatur signalisirt. — Die Eindringungsdauer beträgt gewöhnlich zwischen 30 und 60 Minuten. 3) Von dem Moment ab, wo an allen Stellen der Objecte die Temperatur von 100° aufgetreten ist, beginnt die eigentliche Desinfektion, die dann noch 10 Minuten einzuwirken hat, um auch die widerstandsfähigsten Krankheitserreger abzutöden; für gewöhnlich genügen 5 Minuten. Durch Einlegen von Fäden mit Milzbrandsporen neben die Maximal- (resp. Kontakt-) Thermometer und Prüfen der Fäden nach vollendeter Desinfektion auf ihr Wachsthum in Culturen oder auf ihre Infektionsfähigkeit lässt sich über die Gesamtleistung des Apparats ein Urtheil gewinnen.

Die Resultate der Desinfektion in diesen Öfen sind vollkommen befriedigend. Die Vernichtung der Krankheitserreger erfolgt bei richtiger Handhabung regelmässig und sicher. Eine Beschädigung der Sachen tritt nicht ein; allerdings nur wenn eine gewisse Auswahl und vorsichtige Behandlung erfolgt. Auszuschliessen sind alle Leder- und

Gummisachen, die im Ofen hart werden und schrumpfen; ebenso Pelzwerk. Ferner alle mit Blut, Eiter oder Koth stark beschmutzte Wäsche; in derselben entstehen wie durch das Kochen (S. 566) fest haftende Flecke.

Teppiche und Tuchkleider sind möglichst wenig zu knicken, nur zu rollen oder zu hängen. Feine Herrenkleider verlieren etwas an „Façon“; feine Damenkleider werden reparaturbedürftig, da Plisséfalten ausgehen, Sammetstreifen gedrückt werden etc. — Dagegen werden einfachere Herren- und Damenkleider, Matratzen, Betten, Wäsche, Vorhänge etc. selbst bei oft wiederholter Desinfektion nicht geschädigt. Nur ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Objects von keinem Condenswasser getroffen werden und nirgends mit Metalltheilen des Apparats in Berührung kommen; letztere sind sorgfältig mit Friesstreifen zu umwickeln.

b) Ausser den Oefen befinden sich in den Desinfektionsanstalten Behälter von $\frac{1}{2}$ bis 1 cbm Inhalt, die mit Sublimat-Kochsalzlösung (1 g Sublimat, 12 g Kochsalz auf 2 Liter Wasser) oder mit Aq. Cresoli + Wasser ana gefüllt sind. Dieselben dienen zur Desinfektion der stark beschmutzten Wäsche. Diese muss von den Desinfektoren bereits in der Wohnung ausgeschieden und in einem besonders bezeichneten Sack zur Anstalt geschafft werden. Dort wird der ganze Sack für 6 Stunden in die Sublimatlösung eingelegt; dann wird in einem zweiten Behälter mit fliessendem Wasser die Sublimatlösung entfernt, darauf der Sack geöffnet, die Wäsche oberflächlich getrocknet und dem Eigenthümer wieder zugestellt. — Die Lösung kann mehrere Male benutzt werden, bis sie trübe und schmutzig wird. Jede Füllung kostet im Mittel 60 Pf.

c) Ferner werden alle Utensilien für die Formaldehydesinfektion vorrätig gehalten, die in der unten abgedruckten „Dienstanweisung“ aufgezählt werden. Für steten Ersatz des Formalins, des Spiritus und der Ammoniaklösung ist Sorge zu tragen.

d) In der Desinfektionsanstalt müssen Transportwagen vorhanden sein, je nach Bedarf kleinere Handwagen, Fahrräder oder grössere Wagen für Bespannung; durch Oelfarbenanstrich, Ausschlagen mit Zinkblech u. s. w. sind sie so ausgestattet, dass sie mittelst Abwaschens mit Sublimatlösung leicht desinficirt werden können.

Ausführung der Desinfektion.

Dieselbe ist verschieden, je nachdem dieselbe während der Krankheit oder aber nach Ablauf der Krankheit stattfinden soll. Erstere Desinfektion muss den Pflegern des Kranken überlassen werden; eine Controle durch Aufsichtsbehörden ist nicht durchführbar, und es kann

er diese Desinfektion dem Publikum nur angerathen, aber nicht ge-
lich vorgeschrieben werden.

Für die Desinfektion während der Krankheit sind Aq. Cresoli
Wasser zu gleichen Theilen und 20 procentige Kalkmilch aus-
hend. Alle frischen Absonderungen, Dejectionen, Sputa u. s. w.
! sofort mit Kalkmilch zu übergiessen (Sputa event. zu verbrennen,
nten); nach $\frac{1}{2}$ stündiger Einwirkung kann die Mischung in den Abort
hüttet werden, worauf etwas reine Kalkmilch nachzugiessen ist. Die
hmutzte Wäsche ist in ein grösseres Gefäss (Steintopf, Blechgefäss),
einige Liter Cresolwasser enthält, zu legen und dort unter gut
essendem Deckel aufzubewahren bis zur Abholung durch Desinfek-
e oder bis — nach Ablauf von 6 Stunden — die Desinfektion als
eichend anzusehen ist, so dass der Weiterbehandlung im Hause nichts
Nege steht. Verbandstücke u. dgl., ebenso die Hadern, welche zur
igung des Zimmers gedient haben, ferner Cartongefässe mit Sputum
unter Tuberculose) und anderen Exkreten werden im Zimmerofen
rannt. Ess- und Trinkgeschirr des Kranken darf entweder nicht
dem Krankenzimmer herauskommen und muss dort gereinigt werden;
man stellt es in einen eisernen, zur Hälfte mit Sodalösung ge-
en Kochof, der herausgereicht, sofort aufs Herdfeuer gestellt und
belassen wird, bis die Sodalösung $\frac{1}{4}$ Stunde im Sieden gewesen
Eine Waschschale mit Cresolwasser muss stets bereit stehen für die
nfektion des Pflegepersonals.

Nach Ablauf der Krankheit ist der Genesene durch Abwaschen
Gesichts, der Hände und Vorderarme mit Sublimatlösung zu desinfi-
1; Haar und Bart sind mit der gleichen Lösung zu bürsten; dann
er reine Wäsche und unverdächtige Kleidung anzulegen, darauf das
nkenzimmer zu verlassen und nun das Sublimat durch Abwaschen mit
ser wieder zu entfernen. Wenn möglich soll dem Anlegen der reinen
che ein Bad vorausgehen; das Badewasser ist event. durch Zusatz
10 Liter Kalkmilch oder 100 g Sublimat zu desinficiren. — Die
che ist mit Sublimatlösung zu waschen oder in ein mit Sublimat-
ng befeuchtetes Tuch einzuhüllen, möglichst bald einzusargen und
1 der Leichenhalle zu transportiren. Von da aus kann die Be-
zung unbedenklich mit den üblichen Feierlichkeiten erfolgen.

Das vom Kranken verlassene Krankenzimmer enthält dann stets
grosse Menge von Infektionsquellen. Dasselbe darf daher anderen
schen keinesfalls zugänglich sein, ehe nicht eine vollständige Des-
tion stattgefunden hat. Die Behörden haben in zahlreichen Städten
h Erlass besonderer Verordnungen eine Desinfektion am Schluss
r der Anzeigepflicht unterworfenen Krankheit obligatorisch ge-

- .. 10 g Quecksilbersublimat und etwas Kochsalz (event. 1 Liter Liq. Cresoli saponatus),
- l. 2 1/2 Liter Brennspirit,us,
- l. 1 Tasche aus Leinen zum Transportiren des Arbeitsanzuges (1 Blouse aus Leinwand, 1 Hose aus Leinwand, 1 Leinwandmütze mit vorderem und hinterem Schirm, Stiefeln von wasserdichter Leinwand),
- l. 1 Ammoniakentwickler nebst Spiritusflamme und Schlauch,
- l. 2 Liter Ammoniak (25 procentig),
- l. Maassgefässe zu 1 Liter und 1/2 Liter, letzteres mit Theilstrichen.
- l. 1 Blechrinne zum Auffangen verspritzter Ammoniaktropfen,
- l. Wäscheleinen,
- l. einige Holzklotze,
- l. 1 Formaldehyd-Verdampfungsapparat nebst Gestell und Spirituslampe,
- .. 2 Liter 40 procentige Formaldehydlösung und
- l. mehrere kleinere und grössere Säcke zur Aufnahme der nach der Desinfektionsanstalt zu schaffenden Gegenstände.

§ 5.

Die Desinfektion geschieht bei Diphtherie, Scharlach, Masern, Tuberkulose und Influenza in folgender Weise:

Pflanzen und lebende Thiere müssen aus dem Zimmer entfernt werden. Die Desinfektoren legen vor dem Krankenzimmer ihren Arbeitsanzug an, tauchen die desinficirende Lösung (eine Sublimatpastille und 2 Theelöffel voll Salz, bezw. 10 ccm Liq. Cres. sapon. auf 2 Liter Wasser im Ganzen 6 bis 10 ccm) und betreten dann das Krankenzimmer.

Sodann werden die Eimer mit Sublimatlösung gefüllt, die Bettbezüge und robbeschmutzte Wäsche werden hineingelegt, grobbeschmutzte Stellen des Bodens und der am Bett befindlichen Wand werden stark mit Sublimatg befeuchtet; etwaige frische Sputa und sichtbare angetrocknete Sputa mit 5 p. m. Sublimatlösung.

Darauf werden Bettstellen u. s. w. abgerückt, Thüren der Schränke geöffnet, die vollständig vorgezogen oder herausgenommen und an das betreffende Wandstück angelehnt, Spielsachen, Bücher u. s. w. frei aufgehängt oder aufgestellt. Unter Möbel mit niedrigen Füßen werden an einer Seite Holzklotze aufgelegt. Sodann wird das Gestell (s. Nr. 7) aufgeschlagen (in geeigneten Fällen statt dessen Wäscheleinen, s. Nr. 18); an demselben werden Betten, Kissen, kleinere Teppiche und Kleider so aufgehängt, dass sie nirgends auf den Boden und dass enge Falten nicht gebildet werden. Die Betten sind so aufgestellt, dass sie an den Zipfeln mit Bindfaden, der in Sublimatlösung getaucht und wieder ausgewunden worden ist, festgebunden und freihängend aufgestellt werden.

Kleider sind ebenfalls freihängend zu befestigen, Röcke und Blousen u. s. w., an denen man eine Stange durch beide Ärmel steckt, Rockkragen sind aufzulegen, sämtliche Taschen werden nach aussen umgewendet, Taschentücher werden in Sublimatlösung gelegt.

Dann werden Fenster und Stubenthüren mit Wattestreifen, die in Sublimatg getaucht und ausgedrückt sind, sorgfältig gedichtet. Sprünge in den Fensterrahmen und Thüren sind mit Kitt zu verschliessen.

Die Schlüssellocher der Thüren werden bis auf dasjenige der Aussenthür zugekittet. Auf Luftheizungs-, Ventilations- und andere Oeffnungen in den

Wänden (auch Rohrleitungen, Klingelleitungen u. s. w., welche zu Nebenräumen führen) ist zu achten; nöthigenfalls ist Verklebung mit Papier oder Kitt vorzunehmen.

Ofenthüren sind fest zu schliessen und ebenfalls mit Watte zu dichten, grobe Sprünge im Ofen sind zu verkleben.

Es ist überhaupt die grösste Sorgfalt auf die Dichtung des Zimmers zu verwenden, da hiervon der Erfolg der Desinfektion wesentlich abhängt.

Durch das Schlüsselloch der Thür wird die Blechrinne (s. Nr. 17) durchgesteckt und mit Draht befestigt. Sodann wird das Zimmer ausgemessen und die Formaldehydentwicklung vorbereitet.

Nach der dem Verdampfungsapparat beigegebenen Tabelle ist das flüssige Formalin mit Wasser zu mischen und in den Kessel einzufüllen. Gleichfalls aus der Tabelle ist die Spiritusmenge zu ersehen, welche in die Spirituslampe eingefüllt wird.

Der Apparat ist so aufzustellen, dass er ein Oeffnen der Thür ermöglicht.

Ferner muss, um jede Feuergefahr auszuschliessen, ein freier Raum im Umkreis von mindestens $\frac{1}{2}$ m um den Apparat gelassen werden. Ist wegen Kleinheit oder Ueberfüllung des Zimmers eine völlig feuersichere Anstellung des Apparats nicht möglich, so ist derselbe ausserhalb des Zimmers aufzustellen und das entwickelte Formaldehyd ist mit Hilfe einer Schlauchverbindung durch das Rohr der Blechrinne (Nr. 17) in das Zimmer zu leiten. Ein Desinfektor hat in diesem Falle den Apparat zu überwachen, bis der Spiritus vollkommen verbrannt ist.

Vor dem Verlassen des Zimmers legen die Desinfektoren ihre Arbeitskleidung ab, hängen sie auf das Gestell, waschen sich Gesicht, Bart und Hände mit Sublimatlösung. Es folgt Abdichten der Thür von aussen mit feuchten Wattestreifen und Kitt; der untere Thürtrand kann durch Vorlegen eines feuchten Handtuches verschlossen werden.

Frühestens sieben Stunden nach dem Anzünden des Spiritus kommt ein Desinfektor, um das Ammoniak zu entwickeln; die für den Raum nöthige Ammoniakmenge ist aus der Tabelle zu entnehmen.

Der Ammoniakentwickler wird mit dem aus dem Schlüsselloch hervorragenden Theile der Blechrinne durch einen starken Schlauch verbunden. (Siehe Gebrauchsanweisung.)

Im Beisein des Desinfektors wird das Ammoniak verdampft, wozu 100 bis 150 ccm Spiritus ausreichen. Eine Stunde nach Anzünden des Ammoniakentwicklers folgt Oeffnen des Zimmers und der Fenster, Auswaschen der in Sublimatlösung gelegten Wäsche, Weggiessen des Sublimats, Einordnen der Sachen u. s. w.

Muss die Desinfektion in möglichst kurzer Zeit beendet werden, so kann man die doppelte Menge Formaldehyd entwickeln (die dann erforderlichen Zahlen für Formalin, Wasser, Spiritus und Ammoniak sind aus der letzten Seite der Tabelle zu entnehmen), und dann schon nach $3\frac{1}{2}$ Stunden mit der Entwicklung des Ammoniaks beginnen.

Ist das zu desinficirende Zimmer in aussergewöhnlichem Maasse mit Gebrauchsgegenständen, insbesondere solchen, welche Flüssigkeiten aufsaugen, z. B. mit zahlreichen Matratzen, Kleidern u. s. w. gefüllt, so ist die doppelte Menge Formaldehyd zu entwickeln, und die Zeitdauer auf 7 Stunden auszudehnen.

§ 6.

Bei Pocken, Pest, Kindbettfieber, Rose und Abdominaltyphus neben der im § 5 angegebenen Formalindesinfektion die Desinfektion der dem Kranken benutzten Betten und Matratzen im Dampfapparat erforderlich.

Zu diesem Zwecke werden die genannten Gegenstände soweit möglich leicht in trockene Säcke eingehüllt, und diese dann in je einen mit Sublimat befeuchteten Sack gesteckt. Sorgfältig zugeschnürt werden die letzteren öffentlichen Desinfektionsanstalt befördert. Ueber die in den Säcken beliegenden Gegenstände ist dem Eigenthümer eine Bescheinigung zu hinterlegen. Das Bettstroh, der Strohsack und andere werthlose Gegenstände werden in Transporte ebenfalls in einen mit Sublimatlösung befeuchteten, besonders gekennzeichneten Sack eingehüllt. (Dampfdesinfektion oder Verbrennen.)

§ 7.

Bei Cholera und Ruhr ist von der Formalindesinfektion abzusehen.

Die Desinfektion hat sich bei diesen Krankheiten auf die Desinfektion der Betten, Wäsche und Kleider im Dampfapparate (§ 6), das gründliche Abwaschen der näheren Umgebung des Krankenbettes mit Sublimat- (oder Cresol-)Lösung und die Desinfektion des Abortes mit Kalkmilch zu beschränken.

§ 8.

Bescheinigungen über erfolgte Desinfektion sind auf Verlangen durch das Desinfektionsamt auszufertigen.

§ 9.

Auf Erfordern ihrer Vorgesetzten haben die Desinfektoren Reinigungsbäder zu nehmen.

§ 10.

Desinfektoren, die ohne triftigen Grund die Uebernahme einer Desinfektion ablehnen, eine übernommene Desinfektion säumig, nachlässig oder unvollkommen führen oder sich sonst in ihrem Amte unzuverlässig oder unfähig erweisen, können ohne Weiteres aus ihrer Stellung entlassen werden.

Die Kosten für die obligatorische Desinfektion sind nach einer von der Behörde vorzuschreibenden Taxe von dem Inhaber der Wohnung zu zahlen; im Unvermögensfalle wird die Zahlung seitens der Gemeinde geleistet. Im Interesse der möglichsten Ausdehnung der Desinfektion wäre es wünschenswerth, dass jede Desinfektion auf Kosten der Commune geschieht; wenigstens sollte die Grenze für die Anerkennung der Zahlungsunfähigkeit der Privaten so weit als möglich gezogen werden. Neben der obligatorischen Desinfektion kommen in kleineren Städten noch zahlreiche Fälle vor, in denen die Desinfektion von der Behörde verlangt, wohl aber von den Angehörigen des Hauses gewünscht wird. Für diese „fakultative“ Desinfektion ist natürlich stets Zahlung zu leisten, eventuell nach höherer Taxe.

Die Desinfektion, wie sie im Vorstehenden geschildert ist, repräsentiert eines der wichtigsten Schutzmittel gegen die Infektionskrankheiten. In keiner Stadt sollten daher diejenigen Einrichtungen fehlen, welche zur Durchführung einer rationellen Desinfektion erforderlich sind. Ohne öffentliche Desinfektionsöfen, Desinfektionscolonnen und eine genaue Desinfektionsordnung ist jeder Versuch einer Desinfektion nutzlos, die Ausgabe für die Desinfektionsmittel ist vergeudet, und fast stets werden zahlreiche Objecte unbrauchbar gemacht oder stark beschädigt. Allerdings darf man nicht erwarten, dass durch rationelle Desinfektions-einrichtungen alle Uebertragungen von Krankheitserregern vermieden werden. In einer grossen Zahl von Fällen wird während der Krankheit ungenügend desinficirt werden, und manchmal wird sogar eine befriedigende Schlussdesinfektion unausführbar sein. Es kann vorkommen, dass in einem Krankenzimmer sich zahlreiche Polstermöbel, Portiären u. dgl. finden, die eine ausreichende Desinfektion ohne Beschädigung der Sachen und ohne zu grossen Zeitverlust unmöglich machen. Es würde indess sehr unrichtig sein, mit derartigen Ausnahmen oder mit dem Hinweis auf die Mengen von Infektionserregern, welche während der Krankheit bezw. vom Rekonvaleszenten ausgestreut werden können, das ganze Verfahren für überflüssig erklären zu wollen. Für den einsichtigen Theil der Bevölkerung einer Stadt muss die Möglichkeit einer vollwirksamen Schlussdesinfektion unbedingt geboten sein; ohne eine solche kann der freie Verkehr mit gutem Gewissen nicht wieder aufgenommen werden.

II. Die Infektionswege.

Der Transport der Infektionserreger zu denjenigen Stellen des Körpers von gesunden Individuen, von denen aus die Invasion des Organismus erfolgen kann, vollzieht sich

Erstens: mittelst Berührungen, Kontakte (durch die Hände, Küsse u. s. w.). Gesunde Personen berühren Infektionsquellen (den Kranken, Exkrete, Wäsche, Essgeschirr u. dgl.) einerseits, die oberflächlichen Schleimhäute oder kleinste Hautwunden andererseits. Es ist dies der weitaus wichtigste und betretenste Transportweg, der aber gewöhnlich unterschätzt wird, weil namentlich viele manuelle Berührungen unbewusst und unmerklich sich vollziehen. Nachweislich bleiben aber bei der Berührung von Infektionsquellen sehr leicht Erreger an den Händen des Berührenden haften und werden nachweislich auch durch die üblichen Reinigungsverfahren nicht vollständig wieder entfernt; andererseits bringen alle Menschen ausserordentlich oft unbewusst die Finger mit dem Munde, der Nase, den Augen in Berührung,

er fügen sich durch Kratzen kleine Erosionen der Haut zu. Es ist aber ganz zweifellos, dass diese Art des Transportes für diejenigen Infektionserreger, die von einer dieser Berührungsstellen aus in den Körper einzudringen vermögen, d. h. für die akuten Exantheme, Infektionskrankheiten, Milzbrand weitaus am häufigsten, oft auch für Phthisie, Cholera, Typhus, Ruhr u. s. w. in Frage kommt.

Naturgemäss ist die Gefahr solcher Uebertragung am grössten für diejenigen Menschen, die berufsmässig mit Infektionsquellen zu thun haben. Die Pfleger des Kranken, die Angehörigen, der Arzt sind meistens exponirt; demnächst Wäscherinnen, Desinfekteure, ferner Hebammen, Lumpensortirer (der Infektion mit Rotz und Milzbrand auch Arbeiter, Rosshaararbeiter). In viel geringerem Grade sind Menschen exponirt, welche mit verdünnten Infektionsquellen zu thun haben, z. B. die Canalreiniger. — Ausserdem können aber gelegentlich auch andere Menschen durch zufällige Berührung mit Infektionsquellen inficirt werden. Die im gleichen Hause mit dem Erkrankten wohnenden sind Uebertragungen durch Treppengeländer, Thürgriffe dgl. ausgesetzt; im Menschengedrange der Strasse, in Läden, in Wägen, Pferde- und Eisenbahnwagen kann Jeder gelegentlich mit Krankenpflegern, Angehörigen, Wäsche- und Kleiderbündeln, an denen Infektionserreger haften, in Berührung kommen.

Zweitens: durch Genuss von Wasser und Nahrungsmitteln, welche Infektionserreger aufgenommen hatten. Diese Transportwege sind von besonderer Bedeutung bei denjenigen Infektionserregern, welche in Darmtraktus aus die Infektion veranlassen (Typhus, Cholera, Cholera infantum, Milzbrand beim Rindvieh). Unter den Nahrungsmitteln sind solche am gefährlichsten, welche einen günstigen Nährboden für pathogene Bakterien abgeben oder welche vielfach roh oder genügend gekocht genossen werden, Milch, Salat, Radisee u. s. w. — Sehr häufig und in besonders grossem Umfange kann Wasser inficirend wirken; auch dann, wenn es nicht als Getränk genossen, sondern nur zur Reinigung der Ess- und Trinkgeschirre, zum Baden oder dgl. benutzt wird.

Drittens: durch Einathmung werden die in der Luft in Form von Tröpfchen oder von Staub enthaltenen Krankheitserreger mit der Respirationsschleimhaut in Contact gebracht (Tuberculose, akute Exantheme u. s. w.). Vielleicht können auch eingeathmete Krankheitserreger durch Verschlucken von Speichel und Schleim in den Darmtraktus gehen und hier Infektion bewirken (Typhus).

Viertens: Stechmücken sind ausschlaggebend bei der Verbreitung der Malaria; Ungeziefer vermuthlich bei Recurrens. — Nicht

stechende Insecten, namentlich Fliegen, können Theilchen von Infektionsquellen auf den Körper des Gesunden, oder zunächst auf Speisen u. s. w. übertragen. Die Funktion dieser Insecten ist unter Umständen bedeutsam, weil sie die Infektionsquellen in concentrirten Zustände transportiren und dieselbe der verdünnenden Wirkung der Luft und des Wassers gleichsam entziehen.

Die Infektion ist nicht immer mit dem Transport der Erreger zu eine beliebige Stelle des Körpers vollendet; oft müssen vielmehr die Erreger an eine spezifische Invasionsstätte gelangen, und nur von dieser aus beginnt nach einer Inkubationszeit, welcher die Erreger zu ihrer Wucherung bedürfen, die Erkrankung. So etablirt sich z. B. die Gonorrhoe nur auf der Harnröhren- und Conjunctivalschleimhaut; der Wirkungsbereich und die Invasionsstätte der Typhus- und Choleraerreger ist auf den Darm beschränkt. Gelangen Typhusbacillen in Hautwunden, Cholerabakterien in die Lungen, Gonokokken auf die Darmschleimhaut, so resultirt keine Erkrankung.

Einige Infektionserreger verfügen über multiple Invasionsstätten; so kann der Milzbrand von Hautwunden aus, vom Darm und von der Lunge aus die spezifische Erkrankung hervorrufen. Tuberculose kann in der Lunge, im Darm, im uropoëtischen System beginnen; Diphtherie auf verschiedenen Schleimhäuten. Auch bei den akuten Exanthemen scheinen die oberflächlichen Schleimhäute in grosser Ausdehnung der Invasion zugänglich zu sein.

Die Bedeutung des einzelnen Transportweges für die Verbreitung einer bestimmten Infektionskrankheit hängt sehr wesentlich von der betreffenden Invasionsstätte für die Erreger ab. Für Tuberkelbacillen wird die Einathmung, für Typhusbacillen Wasser, für Erysipel werden Berührungen den weitaus wichtigsten Transportweg darstellen, während umgekehrt die Einathmung für Erysipel, Wasser für Tuberculose nicht in Betracht kommt.

Ferner ist es einleuchtend, dass die Lage und sonstige Beschaffenheit der spezifischen Invasionsstätte von Einfluss sein muss auf den Grad der Contagiosität einer Krankheit. Die akuten Exantheme übertreffen in dieser Beziehung z. B. die Cholera, weil die ersteren ausgebreitete Invasionsstätten besitzen, die durch die verschiedensten Kontakte und durch Luftkeime infectirt werden können, während bei der Cholera die Infektionserreger unbedingt in den Dünndarm gelangen müssen.

Nurige Forscher haben allerdings angenommen, dass die Krankheitserreger nicht durchaus an ihre spezifische Invasionsstätte gebracht werden müssen,

lern dass sie vermöge ihrer Kleinheit leicht die verschiedensten trennenden Abgrenzungen des Körpers passieren können und dass daher Bakterien, welche in Lunge oder in den Darm gelangen, von da durch Vermittelung der Lymphe des Blutes an die Stätte transportirt werden, welche für ihre Wucherung geeignet ist. Sowohl die Erfahrungen und Beobachtungen beim kranken Menschen, wie auch die neueren, unter Beachtung aller Cautelen ausgeführten Thierexperimente machen es jedoch wahrscheinlich, dass im Allgemeinen ein solcher direkter Durchtritt von Bakterien nicht vom Darm und auch nicht von der Haut aus stattfindet bezw. jedenfalls nicht über die nächsten Lymphdrüsen ausgeht. Die einzige Art des Vordringens von diesen Oberflächen aus ins Innere besteht in einem aktiven Durchwachsen spezifischer Arten von Bakterien.

Hinderung des Transports der Infektionserreger.

1) Die oben bezeichneten, oft zur Infektion führenden Kontakte, Berührungen von Mund und Nase mit den Händen, Küsse u. s. w., sollten möglichst einzuschränken; Sitte und Erziehung kann in dieser Hinsicht viel zum Schutze der Gesunden beitragen.

Bei den stark contagiösen Krankheiten (akuten Exanthemen) ist ein Schutz des Pflegepersonals und der nächsten Umgebung gegen infektiöse Berührungen nicht durchführbar. In solchen Fällen ist daher womöglich immune Personen zur Pflege zu bestellen, und Wärter ebenso streng wie die Kranken zu isoliren; Kinder im disziplinierten Alter sind vor allem bei Masern und Scharlach vom Erkrankten zu halten. Auch bei Diphtherie ist die besondere Disposition der Kinder zu berücksichtigen. Bei Phthisikern sind Menschen mit chronischem Bronchialkatarrh und mit erblicher Disposition möglichst nicht zur Pflege zuzulassen.

Um im Uebrigen die Pfleger (resp. die Angehörigen) vor Kontaktinfektionen nach Möglichkeit zu bewahren, sollen dieselben sofort bei Übernahme der Pflege ein abwaschbares Oberkleid anlegen, das mindestens bis zu den Knien herabreicht. Hat der Pfleger in bewusster Weise mit Infektionsquellen zu thun gehabt, so soll er die Hände mit Seifenwasser waschen, je nach Umständen auch das Oberkleid mittelst Seife in Cresolwasser getränkten Schwamms leicht abreiben. Unbedingt soll er die Hände vor jeder Nahrungsaufnahme desinficiren. — Verlässt er das Krankenzimmer, so hat er vorher Hände und Vorderarme mit Seifenwasser zu waschen und das Oberkleid abzulegen. Ausserhalb des Zimmers soll er sich des Verkehrs mit anderen Personen oder der Führung von Gebrauchsgegenständen nach Möglichkeit enthalten.

Der Arzt kann sich, seine Angehörigen und seine übrigen Patienten am besten dadurch schützen, dass er beim Besuch Contagiöser seine

Bewegungen überwacht, der Art, dass keine unbewusste Berührung seiner Kleidung mit Infektionsquellen erfolgt. Der Vorderarm ist (durch Abnahme der Manschetten und Zurückstreifen des Rockärmels) theilweise zu entblößen, oder es werden Gummiiärmel übergezogen; noch besser ein Oberkleid wie das des Pflegers, das jedesmal beim Betreten des Krankenzimmers angelegt wird und dort bis zum Ablauf der Krankheit verbleibt. Vor dem Verlassen des Krankenzimmers sind Hände und Arme, ebenso gebrauchte Instrumente (Stethoskop, Kehlkopfspiegel, Thermometer u. s. w.) mit Sublimatlösung zu desinficiren. Zweckmässig trägt für alle Fälle der Arzt ein kleines Fläschchen (zu 100 ccm) mit Sublimatlösung 1:2000 bei sich. Indem er sich etwas von der Lösung in die hohle Hand giesst und dann die Hände, Vorderarme und Ärmel damit tüchtig abreibt, kann er eine beschränkte Desinfektion ohne alle weitere Utensilien ausführen. Die geringe Menge Sublimatlösung trocknet so rasch, dass ein Abtrocknen mittelst Handtuch unnöthig ist.

In weitaus den meisten Fällen werden diese Schutzmassregeln ausreichen; zuweilen aber wird es vorkommen, dass der Arzt in Folge von unruhigen Bewegungen des Kranken, staubiger Luft u. s. w. (insbesondere bei Erkrankungen an akuten Exanthemen) seine ganze Kleidung, Gesicht, Bart für inficirt halten muss.

Fälschlicher Weise glauben manche Aerzte dann eine ausreichende Desinfektion zu erzielen, wenn sie sich mit Carbollösung oder dgl. besprengen oder „durch die Luft gehen“ oder die Kleider zum Lüften hinhängen. S. 418 ist dargelegt, dass die Krankheitserreger auf diese Weise durchaus nicht beseitigt werden.

In solchem Fall soll der Arzt Gesicht, Haar und Bart mit Sublimatlösung abwaschen, wie es den Desinfektoren vorgeschrieben ist, und seine ganze Kleidung mit einem Schwamm oder einer Bürste, die mit Sublimatlösung mässig angefeuchtet ist, gründlich abreiben resp. abbürsten.

Vollkommener sichert sich der Arzt, wenn er in einem zweckmässig gelegenen Zimmer (Vorzimmer) seiner Wohnung auf einem grösseren Tisch einen kleinen THURSFIELD'schen Desinfektionsofen aufstellt, etwa 20 cm weit und 60 cm lang. Ferner sind daselbst eine Waschschale, eine Flasche mit Sublimatlösung, ein Schwamm und zwei Shirtingtücher zum Einschlagen vorrätig zu halten. Nach dem Betreten dieses Zimmers befeuchtet der Arzt zunächst das eine Einschlagetuch mit Sublimatlösung, breitet es auf dem Tisch aus, darüber das zweite trockene Tuch, legt dann die Kleidung ab und wickelt sie in die Tücher ein. Das leicht umschnürte Packet kommt in den Desinfektionsofen und dieser wird angeheizt; dann wäscht der Arzt Gesicht und Kopf mit Sublimatlösung, nach einigen Minuten mit Wasser und Seife; inzwischen werden die Stiefel, der Tisch und der betretene Theil des Zimmers mittelst eines grossen

wamms mit Sublimat abgewaschen; schliesslich wird frische Kleidung angezogen. Bei einiger Uebung ist die ganze Procedur in 10 Minuten beendet. Die Kleidung wird nach einer Stunde aus dem Ofen herausgenommen. Tücher müssen nachher gebügelt werden. — Das geschnürte Kleiderpaket lässt sich auch ohne jede Gefahr nach der Desinfektionsanstalt transportiren.

2) Um die Aufnahme von Infektionserregern mit der Luft zu verhindern, müssen vor allem die oben (S. 563) betonten Vorschriften bezüglich des Vermeidens von Staub eingehalten werden. Bei akuten Krankheiten verhütet die Einreibung der Haut des Kranken mit Lanolin die Ablösung trockener Schüppchen. — Um sich vor den beim Husten ausgespritzten Tröpfchen zu schützen, müssen die in der Umgebung des Kranken befindlichen Personen sich während der Hustenstösse in eine 1 Meter Entfernung oder wenigstens nicht in der Richtung der Hustenstösse halten (s. unter „Tuberculose“). Beim Pflegepersonal ist vollständiger Schutz in diesen Fällen nicht möglich. Respiratoren helfen nichts. Selbst Masken mit Gazeschleiern lassen stets einen gewissen Bruchtheil der Luftkeime durchtreten.

3) Wasser ist namentlich zu Epidemiezeiten nur aus tadellosen Brunnen oder Brunnen zu entnehmen, Flusswasser dagegen wo möglich nicht zu benutzen; Filterwerke sind genau zu überwachen. Die Nahrung muss in Zeiten, wo Infektionen mit Typhus, Cholera, Ruhr, herrschen, stets gut gekocht genossen werden; Milch, Fleisch, Nahrungsmittel aus Gemüsekellern sind dann mit besonderer Vorsicht zu behandeln; die Küchengeräthschaften sind von Zeit zu Zeit einer Desinfektion mit kochender Sodalösung zu unterwerfen.

4) Die Schutzmaassregeln gegen eine Verbreitung von Infektionserregern durch Stechmücken s. unter „Malaria“.

III. Die individuelle Disposition und Immunität.

In den Krankheitserregern haben wir genau genommen niemals die einzige, ausreichende Ursache der Infektionskrankheiten zu sehen, sondern letztere entwickeln sich erst aus dem Zusammenwirken des Krankheitserregers und eines für dessen Entwicklung günstigen Substrats, des „empfänglichen“ oder für die Erkrankung „disponirten“ Organismus (Organs). Es ist irrelevant, ob jenes günstige Substrat vielleicht richtiger als „Ursache“, der Parasit dagegen als „auslösender Faktor“ bezeichnet wird; dem Sprachgebrauch entspricht es besser, die Bezeichnung „Ursache“ für den die Erkrankung plötzlich auslösenden Erreger beizubehalten. Keinesfalls darf aber die Disposition vernachlässigt werden; sie spielt bei verschiedensten Infektionskrankheiten eine

äusserst wichtige Rolle und hat auch auf die Art der natürlichen Ausbreitung solcher Krankheiten erheblichen Einfluss.

Seit lange hat man beobachtet, dass unter einer Anzahl von gesunden Individuen, welche in gleicher Weise mit Infektionserregern in Berührung kommen, nur einige erkranken, während andere selbst bei wiederholter Infektionsgefahr resp. bei absichtlicher Infektion gesund bleiben; letztere bezeichnet man als unempfindlich oder immun oder refractär für die betreffende Infektionskrankheit.

Man unterscheidet eine angeborene Immunität resp. Disposition und eine erworbene; letztere kann auf natürlichem Wege, z. B. durch Ueberstehen einer parasitären Erkrankung, entstanden oder absichtlich, künstlich durch sog. Schutzimpfung hervorgerufen sein.

Im Folgenden sollen zunächst diejenigen Eigenschaften des Körpers und die Vorgänge im Körper besprochen werden, welche auf Grund neuerer Beobachtungen und experimenteller Forschungen als Ursache der Immunität angesehen werden müssen. Sodann sind die absichtliche Herstellung der Immunität und die einzelnen künstlichen Immunisirungsmethoden, namentlich so weit sie sich praktisch für die Bekämpfung der parasitären Krankheiten verwenden lassen, zu erörtern.

A. Wesen und Ursachen der Disposition und Immunität.

1. Aeussere Ursachen.

Aeusserlich gelegene Schutzvorrichtungen des Körpers können die angeborene Empfänglichkeit von ganzen Thierspecies oder von einzelnen Individuen einer Species bestimmen, indem sie je nach ihrer besseren oder schlechteren Entwicklung das Eindringen der Parasiten und deren Hingelangen zur specifischen Invasionsstätte erschweren oder erleichtern. So ist der Magensaft je nach dem Grade seiner sauren Reaktion im Stande, bei der einen Thiergattung resp. bei einigen Individuen die auf eine Wucherung im Dünndarm angewiesenen Infektionserreger stärker zu schädigen, als bei anderen Gattungen bzw. Individuen, bei denen in Folge des geringen Säuregrades diese Schutzpforte leicht passirt wird (Cholera). Ferner bieten die engen und verschlungenen Eingangswege, das Flimmerepithel und die empfindliche, Hustenstösse auslösende Schleimhaut des Respirationstraktus ein bedeutendes, aber sowohl nach der Thierspecies wie individuell verschiedenes entwickeltes Hinderniss für das Eindringen von Parasiten in tiefere Theile der Lunge. An verschiedenen Invasionsstätten äussert das normale schleimige Sekret bakterioide Wirkungen (Vagina); oder die Epithelkleidung setzt dem weiteren Vordringen der Parasiten und der Be-

tion ihrer giftigen Produkte kräftigen Widerstand entgegen; und h in dieser Beziehung scheinen erhebliche Differenzen vorzuliegen, dass z. B. eine scheinbar unbedeutende Auflockerung des Epithels ch Katarrhe und dgl. ausschlaggebend werden kann für die Ent- kelung der parasitären Krankheit. Auch durch phagocytäre Wir- g (s. unten) scheinen Epithelzellen sich am Schutze des Körpers en eindringende Parasiten zu betheiligen. Hat ein Durchtritt von imen durch die Lymphspalten einer Schleimhaut stattgefunden, dann d es vor allem die Lymphdrüsen, welche die Eindringlinge ab- gen und abzutöden versuchen.

Häufig ändert sich die Empfänglichkeit desselben Individuums hrend des Lebens, und es wird eine Immunität oder Disposition urch erworben, dass äussere Invasionspforten sich schliessen oder en. Für septische Erkrankungen entsteht die Disposition durch inden der äusseren Haut und der Schleimhäute, durch Sekretstagna- u. s. w., während sorgfältiger Schutz der Wunden oder Ausheilung die position beseitigt. Gastricismen- disponiren zu Cholera, vielleicht h zu Typhus, chronische Bronchialkatarrhe zu Phthise, Pharynx- arrhe zu infektiöser Angina; Beseitigung derartiger Affektionen durch ionung oder auf medikamentösem Wege stellt eine relative Immunität : Auf einer Aenderung des Epithels an der Invasionspforte beruht nigstens theilweise wohl die Immunität gegen Diphtherie, die wir den meisten erwachsenen Menschen im Gegensatz zum kindlichen ganismus beobachten.

Auch zur Bekämpfung der parasitären Krankheiten sind diese rhältnisse insofern auszunutzen, als Menschen, die durch Mängel : äusseren Schutzvorrichtungen für eine Krankheit disponirt sind, h Möglichkeit aus dem Infektionsbereich eines Erkrankten fern zu ten sind (vgl. S. 587).

2. Innere Ursachen.

Ausser den besprochenen äusseren Schutzvorrichtungen müssen iefellos Vorkehrungen im Inneren des Körpers die Empfänglichkeit hohem Grade beeinflussen, da auch nach künstlicher Einimpfung, che die äusseren Schutzpforten durchbricht, die Differenzen zwischen ponirten und immunen Thieren sich geltend machen. In Folge her innerer Schutzvorrichtungen ist z. B. ausser dem Menschen kein ier für eine Infektion durch Syphilis, Scharlach, Cholera, Gonorr- u. s. w. empfänglich. Andere Infektionskrankheiten, wie Milzbrand, erculose, Rotz kommen bei zahlreichen Species vor, haben aber h ihre immunen Ausnahmen, z. B. sind Ratten gegen Milzbrand,

Kaninchen gegen Rotz, Hühner gegen Tetanus, Hunde gegen Tuberculose völlig oder relativ immun. Geringfügige Rassedifferenzen sind oft ausschlaggebend für die Disposition resp. Immunität gegenüber einer Infektionskrankheit. Die weissen Hausmäuse sind für Infektion mit *Micrococcus tetragenus* empfänglich, die grauen unempfänglich. Neger sind immun gegen Gelbfieber und zeigen eine geringere Disposition für Malaria als die weisse Rasse.

Ferner beobachten wir ein Freibleiben einzelner Individuen bei Epidemien von akuten Exanthenen, seltener bei Masern und Pocken, häufig bei Scharlach; ferner in ausgesprochener Weise bei Recurrens, Abdominaltyphus, Cholera, Tuberculose. Allerdings muss man bei der Beurtheilung solcher Fälle vorsichtig verfahren und sicher sein, dass das Ausbleiben der Erkrankung nicht etwa auf dem Fehlen des Contagium beruht. Erst wenn an der Uebertragung infektionstüchtiger Erreger gar nicht zu zweifeln ist, darf auf Immunität als Ursache des Nicht-Erkrankens geschlossen werden.

Die wirksamen inneren Vorrichtungen werden — entsprechend den S. 552 gegebenen Darlegungen — verschiedener Natur sein können, je nachdem die Erreger vorzugsweise durch ihre Wucherung im Körper oder durch Produktion von Toxinen den Organismus schädigen. Die durchgreifendste Gegenwehr, und zugleich diejenige, welche gegenüber der erstgenannten Kategorie von Erregern allein Aussicht auf Erfolg bietet, wird in der Vernichtung der eingedrungenen Erreger bzw. in ihrer Wachstums hemmung bestehen. Bei der zweiten Kategorie von Erregern wird dagegen schon eine Beseitigung der Toxinwirkung ausreichenden Schutz gewähren, ohne dass die Wucherung der Erreger besonders gehemmt zu werden braucht. — Beide Arten von Schutzmitteln finden im Körper Verwendung; und zwar werden dieselben theils von gewissen Zellen des Körpers, den Phagocyten, geliefert, theils sind sie in Bestandtheilen der Körperflüssigkeiten enthalten.

a) Die Phagocytose.

METSCHNIKOFF und seine Schüler sehen die wesentlichsten Schutzeinrichtungen in der Phagocytose. Sie nehmen an, dass Sensibilitätserscheinungen lebender Körperzellen für die Immunität von ausschlaggebender Bedeutung sind: lebende auf chemotaktische Reize reagirende Zellen nähern sich im immunen Körper den Krankheitserregern, nehmen sie in ihr Inneres auf und tödten sie dort ab, während Mikroben, für die der Körper empfänglich ist, sie abstossen und daher von ihnen unberührt bleiben. Die Fähigkeit, eingedrungene Keime aufzunehmen und intracellulär zu verdauen, kommt zahlreichen vom mittleren Keimblatt abstammenden Zellen zu. Man unterscheidet mobile und fixe

agocyten. Zu den ersteren gehören vor allem die mehrkernigen Makrophagen (Mikrophagen) und die grossen einkernigen Leukocyten (Makrophagen); zu letzteren gehören viele Endothelzellen, ferner Pulpazellen der Milz und des Knochenmarks, einige Bindegewebs- und Nerven- und Nervenzellen. Die beweglichen Phagocyten werden von den Mikroben gelockt, so dass sie sich an der gefährdeten Stelle massenhaft anammeln und unter Umständen diese gegen das gesunde Gewebe durch einen so dichten Wall abgrenzen, dass schon darin ein bemerkenswerther Schutz gegeben ist. Ausserdem aber findet in den angesammelten Phagocyten oder in den festen Phagocyten der befallenen Organe eine Vernichtung der Mikroben statt durch mikrobicide Stoffe, welche vorrätig sind oder nach Bedarf gebildet werden, z. B. Nukleinsäuren, die aus dem Kern in die Zelle gelangen und für die in der Zelle eine solche Wirkung nachgewiesen ist.

Erworbene Immunität beruht nach METSCHNIKOFF auf einer Steigerung der phagocytären Fähigkeiten des Körpers. Durch verschiedene Reize soll zunächst Phagocytose eintreten, welche stimulirend wirkt und zu einer Verstärkung der phagocytären Reaktion führt. Das Ueberleben einer parasitären Krankheit führt zu einer höheren specifischen Resistibilität und zu gesteigertem Fressvermögen gegenüber diesen Parasiten. Künstliche Immunisirung mit abgeschwächten Erregern erfolgt in ähnlicher Weise.

METSCHNIKOFF hat seine Auffassung durch sehr zahlreiche Beobachtungen gestützt und in scharfsinniger Weise vom allgemein biologischen Standpunkt aus vertheidigt. Die Betheiligung der Phagocyten am Vorgang der Immunität darf seither als unbestritten gelten.

Indess ist der Organismus in seinem Kampf gegen eindringende Mikroben keineswegs ausschliesslich auf den Schutz durch Phagocytose angewiesen, und letztere ist in sehr vielen Fällen für einen Schutz unzureichend. Es ist nachgewiesen, dass eine chemotaktische Anlockung der Leukocyten bei vielen Bakterien nicht ausgeht von den Stoffwechselprodukten des lebenden Parasiten, sondern von solchen Produkten der Bakterienzelle, die erst beim Absterben der Zelle freigesetzt werden. Vollvirulente lebenskräftige Parasiten bedürfen daher oft erst einer Schädigung durch andere Einflüsse im Thierkörper, ehe die Anlockung der Leukocyten und die Phagocytose in Funktion treten kann. In solches Zugrundegehen durch andere Einflüsse, unabhängig von der Betheiligung von Zellen, beobachtet man z. B. nach der Impfung mancher unempfindlicher Thiere mit Milzbrand, Rauschbrand u. s. w.; man kann hier deutlich verfolgen, wie ein Degeneriren und Absterben der eingebrachten Erreger vor sich geht, ohne dass Phagocyten in

der Nähe sind. Auch das Einbringen der Erreger in einer Umhüllung, welche einen Zutritt von Phagocyten ausschliesst, ändert nichts an diesen Absterbeerscheinungen. Nachträglich, wenn bereits eine Degeneration oder der Tod der Erreger eingetreten ist, wird dagegen Phagocytose beobachtet.

Auch wenn die Phagocytose nichts anderes leistete als diese Aufnahme und Fortschaffung bereits geschwächter oder tochter Erreger, würde sie ein werthvolles Schutzmittel für den Organismus darstellen, insofern dadurch die beim Absterben der Bakterien frei werdenden Toxine beseitigt werden. Ausserdem aber sind anscheinend manche Bakterienarten der Phagocytose direct wohl zugänglich; und endlich sind Leucocyten und andere phagocytäre Zellen hervorragend an der Produktion und Sekretion der im Folgenden zu besprechenden löslichen Stoffe theilhaft, welche offenbar viele eingedrungene Bakterien zu schädigen vermögen.

Die in den zellfreien Säften, vor allem im Blutplasma oder Blutserum des Körpers enthaltenen, den Körper gegen die Bakterienwirkungen schützenden Stoffe haben in neuerer Zeit in aussergewöhnlichem Maasse Interesse erregt und eine grosse Zahl von Untersuchungen veranlasst. Ueber ihre Beschaffenheit und den Mechanismus ihrer Wirkung ist von EHRLICH auf Grund der von ihm und seinen Mitarbeitern MORGENROTH, WASSERMANN, M. NEISSER u. A., sowie von BEHRING, PFEIFFER, WERNICKE, METSCHNIKOFF, BORDET, ROUX, CALMETTE, DEMM, VAN DER VELDE u. A. erzielten experimentellen Resultate eine Theorie aufgestellt, die zum Verständniss der Vorgänge bei der Immunität ausserordentlich viel beigetragen hat. Der folgenden Darstellung ist daher diese EHRLICH'sche Theorie durchweg zu Grunde gelegt. Jedoch kann hier aus der übergrossen Fülle des Materials nur das Wichtigste und für das Verständniss der neueren Immunitätslehre Wesentlichste mitgetheilt werden.

b) Schutzstoffe im Blut und in anderen Säften des Körpers.

Man unterscheidet 1) Antitoxine, 2) Agglutinine und Präcipitine, 3) Cytolysine (Bakteriolysine).

Antitoxine.

Während chemisch definirte Gifte, z. B. Alkaloide, im Parenchym nur lockere Bindung erfahren und während die „Gewöhnung“ an solche Gifte nicht auf Antitoxinbildung, sondern auf Aenderungen der Eliminierung u. s. w. beruht, werden die Bakterientoxine (ferner die Phytalbumosen wie Ricin, Abrin; gewisse thierische Sekrete wie Schlangengift) an das Protoplasma bestimmter Zellbezirke specifisch gebunden; sie werden assimiliert, ähnlich wie die Nährstoffe, denen sie in gewisser Weise nahe stehen. Eine derartige Assimilation können wir uns verständ-

machen durch die Annahme, dass die Zelle aus einem Leistungskern aus Seitenketten besteht, Atomgruppen, denen die Aufnahme theilweise Verarbeitung von Nährstoffen zufällt. Derartige Seitenketten bezeichnen wir als Receptoren. Jede lebende Zelle besitzt eine grössere Zahl, ausgezeichnet durch verschiedene Atompirungen, an welche nur ganz bestimmte andere Atomgruppen ankert werden können. Bildlich kann man sich dies so vorstellen, ob der Receptor an seinem Ende wie ein Schloss geformt ist, in nur ein bestimmter Schlüssel passt.¹⁾ Solche Receptoren, die nur eine einfache Haftstelle haben, bezeichnet man als Receptoren erster Ordnung im Gegensatz zu später zu besprechenden Receptoren,




Fig. 171.
Entstehung der Antitoxine.

noch andere seitliche Ausläufer haben. Den Receptoren erster Ordnung fällt die Aufnahme von Toxinen, Fermenten und anderen Zellstoffen zu, während hochmolekulare Eiweissstoffe nur von Receptoren zweiter Ordnung bewältigt werden.

Die Toxine, welche auf irgend eine Zelle wirken, können diese Wirkung nur ausüben dadurch, dass sie eine Haftgruppe besitzen, welche auf einen Receptor der Zelle passt. Die Toxinmoleküle bestehen sonach aus einer haptophoren Gruppe und einer toxophoren Gruppe; ist erstere mit dem Receptor verankert, dann erst kann die Wirkung zu Stande kommen. Die Bakterientoxine sind indess sehr kleine Körper; z. B. kann man durch mässige Wärme ihre toxophore Gruppe zerstören, und nur die resistendere haptophore Gruppe bleibt bestehen. Mit dieser bleibt aber die Affinität zu den betreffenden

¹⁾ Die Figg. 171—173 sollen nur ein Beispiel einer solchen bildlichen Darstellung geben, das sich mir beim Unterricht als praktisch brauchbar erwiesen hat.

Receptoren erhalten und es kann daher auch durch diese Reste Sättigung der Receptoren eintreten, ohne dass Intoxikation zu Stande kommt; solche geschwächte Toxine bezeichnet man als Toxoide.

Sind Receptoren gesättigt, so bleibt ihnen keine Funktion mehr und sie werden als unbrauchbar von der Zelle abgestossen. Nicht selten muss es aber unter dem Einfluss schädigender Momente mittleren Grades — wie bei allen Zellen — zu einer gesteigerten Zellleistung und zu reichlicher Produktion neuer Seitenketten kommen. In diesem Sinne muss die Einwirkung der Toxine selbst die Zelle zur Bildung überschüssiger Receptoren veranlassen; sogar in solcher Menge, dass die Zelle sich ihrer im ungesättigten Zustand entledigt und sie in die Körpersäfte abstösst. Solche frei cirkulirende Receptoren vermögen dann ebenfalls die haptophore Gruppe des Toxins zu verankern und damit das ganze Giftmolekül in den Säften mit Beschlag zu belegen, so dass dasselbe nicht auf Zellen der Gewebe seine Wirkung äussern kann. Diese abgelösten, frei cirkulirenden Receptoren (Seitenketten) fungiren daher als Antitoxin.

Mit Blut, welches derartiges Antitoxin enthält, kann man durch Reagensglasversuche zeigen, dass zwischen Toxin und Antitoxin eine chemische Bindung nach Aequivalenten stattfindet (nur bei sehr starken Verdünnungen nicht ganz gesetzmässig); durch gelinde Wärme wird die Bindung beschleunigt. Es erfolgt dabei keine Zerstörung des Toxins; denn beim Schlangengift, beim Gift des *B. pyocyaneus* kann in der Toxin-Antitoxin-Verbindung das in diesem Fall hitzeempfindlichere Antitoxin zerstört werden und dann zeigt sich das Toxin noch voll wirksam. Durch Toxoide (s. oben) erfolgt in der gleichen Weise Bindung des Antitoxins. — An gewissen Blutgiften (Ricin, Abrin), die in der gleichen Weise wie die Bakterientoxine Antitoxine bilden und mit ihnen chemische Verbindungen eingehen, haben sich diese Vorgänge besonders gut studiren lassen.

Ueber die Natur der Antitoxine ist noch wenig bekannt; die Eiweissreaktionen ihrer Lösungen deuten darauf hin, dass sie mindestens sehr zähe an Eiweissstoffen haften. Im Ganzen sind sie resistenter als die übrigen Antikörper; vertragen Erwärmen, Licht, Fäulnis relativ gut.

Angeborener Immunität gegenüber Toxinen begegnen wir nicht selten; Igel und Schweine sind gegen Schlangengift, Ratten gegen Diphtherietoxin, Hühner gegen Tetanusgift unempfindlich. Eine solche angeborene Giftfestigkeit kann entweder darauf beruhen, dass es an geeigneten Receptoren für das Gift fehlt. Oft ist bei empfänglichen Individuen nur ein bestimmtes Organ mit solchen Receptoren aus-

tattet. So wird das Tetanus-Gift nur an Zellen des Centralnervensystems verankert. Verimpft man die Organe eines tetanusvergifteten Thieres auf andere Thiere, so ist eine Giftwirkung mit dem Gehirn nicht zu erzielen, wohl aber mit den verschiedensten anderen Organen, welchen das Gift ungebunden geblieben ist. Bei unempfänglichen Individuen braucht es daher nur an geeigneten Receptoren in bestimmten Organen zu fehlen. (Histogene Immunität.)

Oder die Immunität beruht auf dem Vorhandensein von fertigem Antitoxin, bezw. darauf, dass auf die Einwirkung des Giftes der Körper mit reichlichster Neubildung und Abstossung von Receptoren zu agiren vermag. Dieser Fall liegt bei der angeborenen Immunität vor; in ausgeprägtem Maasse zeigen bei gewissen Tetanus-empfindlichen Thieren Hirn und Rückenmark vorhandenes Antitoxin, so dass mit der Emulsion dieser Organe Tetanusgift neutralisirt werden kann. Die natürlich erworbene Gift-Immunität und die absichtliche Immunisirung dagegen ausschliesslich auf Antitoxinbildung zurückzuführen.

Natürlich erworbene Giftimmunität tritt zu Tage nach dem Uebergehen einer auf Toxinwirkung beruhenden parasitären Krankheit, z. B. der Diphtherie oder des Tetanus. In der Rekonvalescenz beobachtet man im Blutserum einen gesteigerten Gehalt von Antitoxin gegenüber dem betreffenden Toxin. Hier sind offenbar durch das in den Organismus verlebte Toxin Receptoren gebunden und abgestossen; die Zellen haben aber mit Ueberproduktion neuer Receptoren reagirt; freie solche Receptoren cirkuliren in Folge dessen im Blute und bewirken so dessen höheren Antitoxingehalt. — Das frei cirkulirende Antitoxin scheint nicht lange haltbar zu sein; nach Wochen oder höchstens Monaten findet man starke Abnahme des Antitoxingehalts.

Nach dieser Erfahrung ist das Vorgehen bei der künstlichen Immunisirung klar vorgezeichnet. Zwar wird es sich nicht empfehlen, im Menschen direct Toxin zu injiciren; die Dosis würde Angesichts der sehr verschiedenen individuellen Empfänglichkeit viel zu schwer bemessen sein. Man verzichtet vielmehr besser ganz darauf, dass der Mensch selbst aktiv das Antitoxin herstellt, sondern man injicirt das Toxin Thieren und wartet bei diesen die Bildung von cirkulirendem Antitoxin ab, unter fortgesetzter Controle des Antitoxingehalts des Thieres im Reagenzglas. Ist Antitoxin nachweisbar, so injicirt man die gesteigerte Toxindosis, auf die hin der Körper mit weiterer vermehrter Antitoxinbildung reagirt. Durch allmähliche Steigerung der Toxindosen wird es so gelingen, ein an Antitoxin sehr hochwerthiges Serum zu erhalten. (Auch die Milch säugender immunisirter Thiere enthält in grosse Mengen Antitoxin enthalten.)

Solches thierisches Serum mit künstlich vermehrtem cirkulirendem Antitoxin ist dann Menschen zu injiciren, die von dem betreffenden Toxin bedroht oder befallen sind. Diese Art der Immunisirung muss für den Körper der schonendste Eingriff sein. Der Körper wird dabei gar nicht aktiv, er verhält sich völlig passiv; das in ihn eingebrachte vollkommen fertige Antitoxin fängt das Toxin ab und macht es unschädlich. (Siehe unten: passive Immunisirung.)

Von grosser Bedeutung ist die Auswahl der für die aktive Giftimmunisirung bestimmten Versuchsthiere. Die Affinität zwischen den Receptoren verschiedener Thierspecies und dem Gift ist offenbar sehr ungleich. Man wird, um ein Antitoxin mit möglichst gesteigerter Affinität zum Toxin zu bekommen, das vielleicht sogar im Stande ist bereits bestehende Verankerungen an menschlichen Zellen zu lösen, Thiere wählen müssen, die für das Toxin ganz besonders empfänglich sind. (Bei Diphtherie Pferde, Affen.)

Zu beachten ist ferner, dass die Bakterientoxine meistens noch nicht in reinem Zustand isolirt erhalten werden können, sondern oft theilweise verändert sind oder Gemenge mehrerer Gifte repräsentiren. So können sich Toxoide bilden, die ebenfalls Antitoxin absorbiren, ohne dass sie selbst Giftwirkung haben, so dass dadurch die Bindungsverhältnisse zwischen Antitoxin und wirksamem Toxin verschoben werden. Ausserdem finden sich z. B. in Diphtheriekulturen Toxone, Gifte, welche gegenüber den Receptoren des Diphtherietoxins indifferent sind und die dementsprechend von der Antitoxinwirkung nicht berührt werden. Toxone der Diphtheriebacillen scheinen die spät auftretenden Lähmungen zu veranlassen, die bei der Behandlung von Diphtheriekranken mit BERNHEIM'schen Antitoxin offenbar gar nicht beeinflusst werden können.

Ein Einverleiben fertigen Antitoxins kann nur gegen das Gift helfen, das noch nicht zu fest verankert ist oder dessen Verankerung durch stärkere Affinitäten des Antitoxins wieder gelöst werden kann. Namentlich vom Tetanustoxin weiss man, dass es verhältnissmässig früh an Receptoren des Centralnervensystems gebunden wird, und dass es daher schon in einer relativ frühen Periode der Krankheit nicht mehr gelingt, den Kranken zu retten.

Agglutinine und Präcipitine.

Durch Zusatz von Blutserum zu Bakterienaufschwemmungen, zu Erythrocyten oder zu gewissen eiweisshaltigen Flüssigkeiten sehen wir häufig eine Art von Gerinnung eintreten; Zusammenballung und Häufchenbildung der zelligen Elemente (Agglutininirung), Trübung und Niederschlagsbildung bei Eiweisslösungen (Präcipitine, Coaguline).

Nach EHRLICH's Vorstellung sind an dieser Blutwirkung Receptoren zweiter Ordnung betheiligt, d. h. solche, welche neben der Haftgruppe noch einen seitlichen Arm tragen, der in eine fermentartig wirkende (zymophore, also z. B. Gerinnung verursachende) Atomgruppe ausläuft. Werden geeignete Substanzen an diese Receptoren gefesselt, so tritt das Ferment in Aktion und führt die an die Seitenkette fixirte Substanz in die geronnene Modifikation über. Auch hier kommt es beim

sat gesättigter Rezeptoren leicht zu solcher Ueberproduktion, dass gesättigte Rezeptoren abgestossen werden und frei im Blut cirkuliren. Diese Rezeptoren, die also aus einer Haftgruppe und der angelagerten zymophoren Gruppe bestehen, sind dann die in dem betreffenden Blut vorhandenen Agglutinine bzw. Präcipitine. Sie vermögen sich an die Rezeptoren der Bakterienzellen, der Erythrocyten oder gewisser weissen Körper anzulagern und so bei diesen die Gerinnung zu bewirken.

Dass die zymophore Gruppe fest angelagert ist und nicht etwa aus einem besonderen mittelst einer zweiten haptophoren Gruppe angelagerten Molekül besteht, das geht aus Versuchen hervor, bei denen man (z. B. durch Hitze) die Agglutinine wirkungslos macht. Hier müsste man erwarten, dass die der toxo-




Fig. 172.

Entstehung der Agglutinine und Präcipitine.

zophoren Gruppe analoge zymophore Gruppe zuerst und allein geschädigt wird; dass nach dem Erhitzen ein Hinzufügen neuer zymophorer Moleküle das Agglutinin wieder reaktiviert. Eine derartige Reaktivierung konnte indess von uns nicht beobachtet werden. — Neuere Untersuchungen scheinen indess dafür zu sprechen, dass doch eine Trennung in einen wirksamen und einem nur anlagerungsfähigen Antheil erfolgen kann; damit würden die Agglutinine den Rezeptoren dritter Ordnung analog aufgebaut und diesen anzureihen sein. — Auch die Eiweissnatur der fällbaren Substanz ist neuerdings zweifelhaft geworden.

Die Agglutinine sind relativ widerstandsfähige Substanzen; sie werden durch Erhitzen auf 60° noch nicht wirkungslos. Ueber ihre Wirkungsstätte ist nichts Sicheres bekannt.

Eine Agglutination von Bakterien durch Serum ist bisher beobachtet bei Typhusbacillen, Cholera (GRUBER, WIDAL), Pest-, Pneumonie-, Rekurrenserregern; neuerdings bei Tuberkelbacillen; ferner bei Lili- und Proteusbacillen. Die Erscheinungen, die dabei auftreten, sind

Seite 63 für die Typhusbacillen beschrieben; über die Art, wie die Untersuchung anzustellen ist, siehe im Anhang.

Agglutinirendes Serum findet man bei vielen normalen Individuen, jedoch in relativ geringem Grade. Viel höhere Agglutininwerte erhält man bei Menschen, welche eine parasitäre Krankheit überstanden haben; und besonders bei Menschen oder Thieren, die künstlich durch Einverleibung lebender abgeschwächter oder abgetödteter Parasiten immunisirt sind. Hochgradige agglutinirende Wirkung erstreckt sich in specifischer Weise nur auf die eine Art von Parasiten, welche auf den Organismus eingewirkt und die vermehrte Bildung von Agglutininen veranlasst hatte; bei niederen Agglutinationsgraden tritt der specifische Charakter der Reaktion mehr zurück.

Die Immunität gegen parasitäre Krankheiten scheint von dem Agglutiningehalt des Blutes nicht abzuhängen. Thiere mit angeborener Immunität zeigen manchmal ausgesprochene Agglutination gegenüber den betreffenden Erregern (Pferdeblut und Tetanusbacillen). Auch bei erworbener oder künstlich hervorgerufener Immunität geht diese der Agglutininwirkung des Blutes meist nicht parallel; Beobachtungen wie die, dass in der Typhusrekonescenz bei stetig steigendem Agglutiningehalt Recidive der Krankheit vorkommen, stellen jede Beziehung zwischen Agglutination und Immunität in Frage. Nur nach Injektion von steigenden Dosen abgetödteter und lebender Tuberkelbacillen bei Versuchsthieren hat KOCH neuerdings einen Parallelismus zwischen der Agglutination des Blutes gegenüber Aufschwemmungen von sehr fein verriebenen Tuberkelbacillen und dem Immunitätsgrade beobachtet. — Im Allgemeinen müssen wir nach dem bis jetzt vorliegenden Material die Agglutination als eine vom eigentlichen Immunisirungsvorgang unabhängige und diesen nur oft begleitende Erscheinung auffassen.

Ausser Agglutininen für Bakterien existiren im Serum vielfach Agglutinine, welche die Erythrocyten anderer Thierspecies zum Zusammenballen bringen. Ein Serum kann verschiedene solche Agglutinine enthalten; normales Ziegen Serum z. B. agglutinirt die Erythrocyten des Menschen, der Taube etc. Wird Ziegen Serum mit Tauben-Erythrocyten so zu sagen gesättigt, so behält es trotzdem die agglutinirende Wirkung gegenüber Menschenblut. Bildung neuer specifischer Agglutinine und Steigerung der vorhandenen ist auch hier in hohem Maasse möglich durch Behandlung der Thiere mit Injektionen fremder Blutarten. Dabei treten gleichzeitig die unten beschriebenen Hämolytine auf; letztere sind aber hitzeempfindlicher und durch Hitze von 55° lassen sich daher die Agglutinine von den Hämolytinen trennen.

Die Reaktionsfähigkeit des thierischen Organismus gegenüber einverleibten fremden thierischen Materials geht dann noch weiter und erstreckt sich auch auf gewisse thierische eiweisshaltige (?) Flüssigkeiten. Nach Injektion von Kuhmilch treten im Serum Stoffe auf, welche das Kasein der Kuhmilch ausfällen, nicht aber das von Ziegen und Frauenmilch, und umgekehrt nach Injektion

Ziegenmilch nur spezifische Coaguline für diese. Fremdes Blutserum ruft Bildung von Präcipitinen hervor, welche spezifisch in diesem Serum Trübung Niederschlag hervorrufen.

Durch Vorbehandlung von Kaninchen mit Injektionen von Menschenblut man ein Serum erzielt, das noch in grössten Verdünnungen von Menschenblut Trübung hervorruft, während andere Blutarten (mit Ausnahme des Affenblutes) klar bleiben bzw. erst bei viel stärkeren Concentrationen Trübungen weisen (feinste Reaktion zum Nachweis von Menschenblut nach WASSERMANN, UHLENHUTH). Muskelextrakt von Pferdefleisch, Kaninchen wiederholt injiziert, giebt ein Serum, das zum Nachweis von Pferdefleisch geeignet (s. S. 305).

Man darf wohl annehmen, dass allen diesen Reaktionseinrichtungen im Körper bis zu einem gewissen Grade die Bedeutung von Schutzreaktionen gegen fremde in den Körper eindringende Zellen und Stoffe kommt. Aber die endgültige und wesentliche Wirkung gegenüber eindringenden Zellen kommt anscheinend nicht den Agglutininen, sondern den Cytolysinen zu.

Cytolysine (Bakteriolysine, Hämolysine u. s. w.).

Die Hauptfunktionen im Zellleben des Körpers fallen offenbar den Receptoren dritter Ordnung zu. Ihnen kommt die Fähigkeit zu, einerseits hochmolekulare Eiweissstoffe und andererseits im Blut kreisende Fermente an die Zelle zu fesseln und dadurch jene Moleküle zu zerlegen und assimilierbar zu machen. Die Receptoren müssen zu diesem Zweck mit zwei haptophoren Gruppen ausgestattet sein; die eine passt in eine haptophore Gruppe des Eiweissmoleküls oder der Bakterienzelle oder der Erythrocyten; die andere passt zur haptophoren Gruppe des Ferments. Von letzterem müssen wir annehmen, dass es ein Toxin ähnlich gebaut ist; es besitzt ausser der haptophoren haptophore Gruppe. Diese frei cirkulirenden, gelegentlich von den Receptoren dritter Ordnung abgefangenen und gefesselten Fermente bezeichnet EHRLICH als Complemente. Sie wirken vorzugsweise lytisch, auflösend, ähnlich peptonisirenden Enzymen. Wahrscheinlich sind in dem normalen Blut verschiedene solche Complemente enthalten. — Bei mässiger Hitze zerfallen sie wie die Toxine und es bleibt nur die haptophore Gruppe übrig, die als „Complementoid“ bezeichnet wird. — Als ihre Bildungsstätten sind experimentell die Leukocyten ermittelt, ausserdem die an der Blutbildung beteiligten Organe, Milz, Lymphdrüsen und Knochenmark.

Gelangen Bakterienzellen ins Blut, die an die eine haptophore Gruppe des Receptors verankert werden können, so führt die zweite haptophore (complementophile) Gruppe das geschilderte Complement heran und die Bakterienzelle wird in Folge dessen aufgelöst. Der gesättigte

Receptor wird nun abgestossen, im Ueberschuss reproducirt und schliesslich cirkuliren im Blut freie Receptoren dritter Ordnung, d. h. Receptoren mit zwei haptophoren Gruppen. Diesen hat EHRLICH die Bezeichnung „Amboceptor“ beigelegt. Sie können im Blut kreisend in ihrer einen Haftstelle Complemente aufnehmen oder schon aufgenommen haben und so bereit sein, dieses an geeignetes Material heranzubringen. Das Complement allein ist wirkungslos, weil seine haptophore Gruppe zwar in den Amboceptor, aber nicht direct in die haptophore Gruppe des Eiweissmoleküls bzw. der Bakterienzelle passt. Die Amboceptoren




Fig. 178.

Entstehung der Cytolysine.

spielen daher eine ungemein wichtige Vermittlerrolle für die Wirkung des Complements. Sie werden durch eine grosse Verschiedenheit ihrer freien haptophoren Gruppe ausgezeichnet sein und dadurch den Körper in Stand setzen, sehr verschiedene Moleküle mit dem gleichen Complement zu verketten.

Aus dieser Vorstellung heraus lassen sich folgende fundamentale Beobachtungen über die Wirkung des Blutserums auf Bakterienzellen erklären:

1) Das dem normalen, nicht vorbehandelten Thier entnommene Blutserum zeigt im Reagensglas energische baktericide Wirkung (NUTTALL, BUCHNER). Das baktericide Vermögen des gleichen Serums erstreckt sich nicht gleichmässig auf alle Bakterien; die eine Art wird vielmehr ausgiebig, andere werden wenig, wieder andere gar nicht abgetötet. Auch das Serum verschiedener Thierspecies verhält sich ungleich. — Erwärmt man wirksames Serum kurze Zeit auf 55°, so verschwindet die baktericide Fähigkeit und das Serum wird zum guten

abstrat für dieselben Bakterien, die vor dem Erhitzen im Serum un-
de gingen.

BUCHNER bezeichnete die Stoffe des Serums, die in dieser Weise
m sind, als Alexine. Wir fassen dieselben jetzt auf als
irkulirende, durch geeignete Amboceptoren zur Wirkung
ge Complemente, die z. B. als Verdauungsfermente des inter-
ren Stoffwechsels stets in grösserer Zahl vorhanden sein müssen.
Moleküle vieler Bakterien passen in die Amboceptoren und fallen
h der Auflösung anheim.

Die Alexine betrachtet man als eine wesentliche Ursache der
orenen Immunität. In der That sehen wir oft die baktericide
ng des Serums gegenüber einer Bakterienart parallel gehen mit
empfindlichkeit der betr. Thierspecies. Nicht selten fehlt indess

Parallelismus. Diese Abweichungen sind aber insofern uner-
h, als offenbar nicht der momentane Gehalt des Blutes an Alexinen,
1 Reagenzglas zur Wirkung gelangt, für die Immunität von Be-
ig ist, sondern die Schnelligkeit, mit der im Bedarfsfall Alexine
gemacht werden können. Zweifellos wird ein Körper, der wenig
ie im Blute hat, doch über reichliche Bildungsstätten und Depots
en können, von denen aus sich der Alexingehalt des Blutes immer
wieder ergänzt. — Für manche Krankheiten zeigt sich freilich
instliche Ausschaltung der Complemente (siehe unten) ohne Wir-
so dass keineswegs jede angeborene Immunität ausschliesslich
e Alexine zurückzuführen ist.

1) Ist durch Ueberstehen einer parasitären Krankheit oder durch
tliche Einbringung bestimmter Krankheitserreger Immunität er-
en, so erhält das Serum spezifische hochgradig auflösende
ng gegenüber der betreffenden Bakterienart. Die Wirkung zeigt
m Reagenzglas aber nur, wenn das Serum ganz frisch ist; sehr
erlischt sie; und durch Erwärmen auf 55° wird das Serum sofort
z. Die Wirkung tritt indess wieder hervor, wenn die Mischung
rum und Bakterien in die Bauchhöhle normaler Meerschweinchen
racht wird. (PFEIFFER'scher Versuch, siehe Seite 77 und im „An-
) Ferner kann sie auch im Reagenzglas wieder auftreten, wenn
dem inaktiven Serum etwas Peritonealexsudat oder Blutserum
normalen Meerschweinchens zusetzt.

auch dieses früher schwer erklärliche Verhalten wird ohne Weiteres
idlich, wenn wir annehmen, dass durch die Immunisirung die
itige Vermehrung solcher Amboceptoren stattgefunden hat,
1 spezifische Affinität zu den betreffenden Bakterienzellen be-

Die „Amboceptoren“ oder „spezifischen Immunkörper“ haben auch

hier die Funktion, das nichtspecifische Complement zu die Bakterienzellen heranzubringen. Die Complemente sind aber — wie schon hervorgehoben — sehr wenig widerstandsfähig: im älterem oder erwärmten Serum fehlt es daher an wirksamem Complement, während die specifischen Amboceptoren erhalten sind. In der Bauchhöhle des Meerschweinchens, im frisch entnommenen Peritonealexsudat und in normalen Blut sind stets Complemente vorhanden: sobald daher diese zugefügt werden, vermag die specifische Bakterienauflösung wieder vor sich zu gehen, das Immunserum ist reaktivirt.

Auftreten specifischer Bakteriolyse beobachtet man bei erworbener Immunisirung gegen Cholera, Typhus, Pest, *B. coli*, *B. pyocyaneus*. Es ist nicht zu bezweifeln, dass in diesen Fällen der Lysingehalt des Blutes die wesentliche Ursache der Immunität ausmacht.

Allerdings hat man sowohl gegen die lytischen Wirkungen des normalen wie des Immunserums eingewendet (BACHMANN), dass das Absterben der Bakterien im Serum nur durch Plasmolyse zu Stande komme, die eine Folge der Uebertragung in chemisch differentes Substrat sei; und dass aus den Beobachtungen im Reagenzglas nicht auf die Vorgänge im lebenden Thier geschlossen werden dürfe. Indess lässt sich zeigen (WASSERMANN), dass in lebenden immunisirten Thier die Ausschaltung des Immunkörpers oder des Complements möglich ist, und dass dann in entsprechendem Maasse die Resistenz gegen Infektionen absinkt. Eine solche Ausschaltung ist durch Antikörper möglich, die man erhält, wenn man ein Thier mit Immunkörpern oder Complementen vorbehandelt. In letzterem Falle injicirt man z. B. ganz frisches normales Blutserum, das reichlich Complement, oder nach vorsichtigem Erwärmen wenigstens noch Complementoide enthält; es wird dadurch die Bildung von Receptoren (bezw. Amboceptoren) veranlasst, die besonders starke Affinität zum Complement haben und dasselbe binden, als Anticomplement (s. Fig. 173) darstellen. Wird Blut mit Anticomplement Thieren injicirt, dann wird das vorhandene Complement gebunden, und gleichzeitig bleibt die Immunität aus, abschon genügend Immunkörper (Amboceptoren) vorhanden sind. — Das Complement wird übrigens sehr rasch im Körper regenerirt.

Die z. B. bei Typhus beobachtete lange Dauer der specifischen Immunität scheint auf der grossen Haltbarkeit der specifischen Amboceptoren zu beruhen, die viel resistenter sind als die Complemente und auch einer raschen Ausscheidung offenbar nicht unterliegen.

Eine Verwendung der baktericiden Eigenschaften des Blutes zur Schutzimpfung lässt sich — wie bei den Antitoxinen — entweder durch aktive oder durch passive Immunisirung erreichen. Bei der aktiven werden die abgeschwächten oder abgetödteten Erreger einverleibt und der Geimpfte bildet selbst die specifischen Amboceptoren (Typhus, Cholera, Pest). Zur passiven Immunisirung werden eventuell Thiere zu benutzen sein, welche hoch aktiv immunisirt sind, und denen das an Amboceptoren reiche Blut entzogen und zur Injection bei dem zu schützenden Menschen

endet wird. Entgegengesetzt den Erfahrungen mit den Antitoxinen ist hier aber die Sache so, dass die aktive Immunisirung relativ leicht und sicher gelingt und vielfache Variationen gestattet. Passive Immunisirung durch baktericides Immunserum ist dagegen schwierig, der Gehalt des Blutes an Antikörpern nicht so hoch getrieben werden kann, wie es bei den Antitoxinen möglich ist. Ausserdem ist der Vorgang complicirter durch die nothwendige Mitwirkung der Complemente. Es ist z. B. beobachtet, dass ein Immunserum bei der einen Artspecies kräftig wirkt, bei anderen aber wirkungslos bleibt, weil es das erforderliche Complement fehlt.

Das Blutserum vermag ausser gegenüber den Bakterien noch gegenüber rothen Zellen lytische Wirkungen zu äussern, schon in normalem Zustand, hochgradiger aber, wenn es durch Einverleibung solcher Zellen vorbehandelt wird. Besonders gut zum Studium dieser Vorgänge eignen sich die rothen Blutkörperchen. Injicirt man einem Thier Erythrocyten einer anderen Thierspecies, so bilden sich Heterolysine, gegen Blutkörper derselben Thierspecies, welche im Reagenzglas die Erythrocyten auflösen und das Blut farben machen. Eine Auflösung der eigenen Blutkörper durch Autolysine geht auf normaler Weise nicht, sondern nur unter pathologischen Verhältnissen zu Stande. Die Bildung der Immunkörper, die Ausschaltung des Complementes, Reaktivirung durch Zufügen neuen Complementes lassen sich hier genau beobachten und meist deutlicher beobachten, wie bei den Bakteriolytinen. — Ferner bildet man durch Injektion von Leukocyten ein Leukolysin; durch Injektion fremden Spermatozoön ein Heterospermatoysin, das die fremden Spermatozoön sofort zum Stillstand bringt und schliesslich auflöst, während die von derselben Species stammenden Spermatozoön unwirksam bleiben. Durch Injektion von Spermatozoön von derselben Art entsteht dagegen spezifisches Isospermatoysin. Auch durch Einverleibung bestimmter Nierenzellen können Nephrolysin, Neurolysin u. s. w. gebildet werden. — Injicirt man Cytolysine einem andern Thier, so bilden sich in diesem Anticytolysine, aus Antizwischenkörper und Anticomplement bestehend.

Nach neueren Untersuchungen von EMMEICH und Löw handelt es sich bei der Auflösung der Bakterien durch Immunsera um Enzyme, die nicht nur von Thierkörper, sondern auch von den Bakterien selbst gebildet werden. Das Serum vermag z. B. die aus Cultur des *Bac. pyocyaneus* extrahirbare Pyocyanase zu zerstören und andere Bakterien energisch aufzulösen. Unter den rothen Verhältnissen im Innern des Körpers scheint diese Wirkung stärker auszutreten. Jedoch ist die Pyocyanase im Körper wenig haltbar; besser geeignet ein Pyocyanase-Immunprotein, welches zur Immunisirung verwendbar ist. Die Verfolgung dieser Untersuchungen wird vermuthlich zu weiteren interessanten Ergebnissen führen.

Nicht jede erworbene Immunität werden wir auf die Anwesenheit spezifischer Amboceptoren zurückführen dürfen; z. B. nach der Pocken- und Hundswuth-Schutzimpfung werden spezifische Immunkörper im Blut wenig oder gar nicht gefunden. Vielleicht läuft bei diesen

Krankheiten der Immunisirungsprocess vorzugsweise im Gewebe bestimmter Organe ab (vergl. die histogene Immunität gegen Toxine bei Tetanus).

B. Die absichtliche Herstellung der Immunität und die Schutzimpfungen.

1. Erhöhung der allgemeinen Resistenz gegen parasitäre Krankheiten.

Man kann zunächst versuchen, die Empfänglichkeit gegenüber den verschiedensten Infektionskrankheiten dadurch zu schwächen und die Resistenz des Körpers zu stärken, dass man die nicht specifischen inneren Schutzeinrichtungen, Phagocyten und Alexine vermehrt und möglichst funktionsfähig macht.

In der That sind in dieser Beziehung experimentell verschiedene Ergebnisse ermittelt, die eine gewisse praktische Verwertung gestatten. Positive Resultate bezüglich der Resistenzvermehrung hat man bei Versuchsthiere namentlich durch die verschiedensten Mittel erzielt, welche stärkere Leukocytose hervorrufen. Injektion von Hefenukleä, Pilokarpin, Zimmtsäure; oder Injektion von lebenden oder abgetödteten mehr saprophytischen Bakterien (*B. prodigiosus*, *coli*, *pyocyanus* u. s. w.); oder auch künstliche Herstellung von örtlicher Hyperämie, sei es durch äussere Applikation von Alkohol, sei es durch Umschnüren u. s. w. bewirken erschwerte oder verlangsamte Infektion, anscheinend vorzugsweise in Folge der erhöhten Thätigkeit der Leukocyten. Theils wirken dieselben als Phagocyten und durch ihre örtliche Häufung, theils liefern sie Complement. — Auch ein kurzdauernder Schutz gegen Cholera konnte z. B. durch Injektion von normalem Blutserum, Harn, Bouillon u. s. w. in die Bauchhöhle von Meerschweinchen bei diesen ausgelöst werden. Hier greift theils die Leukocytose ein, theils das aktiv erhöhte Zuströmen von Complementen zwecks Verdauung der injicirten Substanzen.

Die Beobachtungen, dass hungernde Thiere empfänglicher werden, dass Ueberanstrengung (Ratten im Tretrad), Störungen der Wärmeregulirung, künstlicher Diabetes, fortgesetzte Dosen von Chloral, Chloroform u. s. w. die Resistenz gegen eine einzelne oder gegen mehrere Infektionskrankheiten herabsetzen, sind sicher in der gleichen Weise zu deuten; die Sensibilität der Phagocyten und die Produktion von Receptoren und Complement nimmt entsprechend ab und in Folge dessen wächst die Empfänglichkeit des Körpers. — In anderen Versuchen hat man eine höhere Alkalescenz des Blutes als förderlich für die Resistenz erkannt; es steht noch nicht fest, welcher der oben genannten direct wirksamen Faktoren hierdurch beeinflusst wird. — Schliesslich wird in manchen Fällen die Versorgung eines einzelnen Organs mit Blut, Leukocyten und Receptoren ausschlaggebend sein für die Disposition

des Körpers, an einer parasitären Krankheit mit bestimmter Wucherungsstärke der Erreger zu erkranken.

Für den praktischen Zweck einer Steigerung der Unempfänglichkeit des Menschen lässt sich aus diesen Beobachtungen nur folgern, dass eine Lebensweise und eine Ernährung, welche normalen Ablauf des Zellebens in allen Organen ermöglicht und welche speciell die schützende Rolle der Leukocyten und die Fähigkeit der Zellen zur reichlichen Produktion von Receptoren und Complementen unterstützt, einen gewissen Schutz gegen Infektionen gewähren wird.

Genauere, den in Betracht kommenden Körperfunktionen wirklich angepasste Verhaltensmaassregeln lassen sich indess zur Zeit nicht feststellen; man muss sich mit den Lehren der allgemeinen Hygiene begnügen und hoffen, dass unter der grossen Summe von Lebensregeln, welche diese giebt, auch solche sich befinden, welche die Empfänglichkeit für diese oder jene Infektionskrankheit herabsetzen. Selbstverständlich arbeiten wir auf diese Weise immer mit einem grossen, speciell für die Bekämpfung der Infektionskrankheiten belanglosen Ueberlast von Lehren, die auch von der überwiegenden Mehrzahl der Menschen auf die Dauer gar nicht befolgt werden können, und die noch zu vielfach auf recht unsicherem Boden stehen. Viel aussichtsvoller ist es daher, gegenüber der einzelnen Infektionskrankheit eine Beeinflussung der specifischen Disposition zu versuchen.

2. Specifische Schutzimpfungen.

Active Immunisirung durch Einverleibung der Krankheitserreger oder ihrer wirksamen Bestandtheile.

Der Geimpfte stellt selbst activ die Antikörper her. Dabei zeigen sich Reaktionserscheinungen, die sich bis zu erheblicher Krankheit steigern können. Der Impfschutz tritt erst nach 5—10 Tagen ein; dauert aber Monate bis Jahre.

a) Die älteste Methode der Schutzimpfung bestand in der absichtlichen Ansteckung Gesunder an Personen, welche an einer ansteckenden Krankheit leicht erkrankt waren. — Man stützte sich dabei auf die Erfahrung, dass gegen manche parasitäre Krankheiten durch einmaliges Ueberstehen eine langdauernde Unempfänglichkeit erworben wird. Nicht alle Infektionskrankheiten gewähren diesen Schutz; Pyämie, Erysipel, Malaria, Recurrens, Pneumonie, Diphtherie, Influenza zeigen häufig schon kurze Zeit nach dem Ueberstehen der ersten Erkrankung eine gewisse Immunität; einige hinterlassen sogar in ausgesprochener Weise eine gezielte Empfänglichkeit des Körpers. Andere Krankheiten bewirken nur für eine Zeit Immunität, aber nicht ausnahmslos und nicht gleichartig bei den verschiedenen Thierspecies; so z. B. der Milzbrand, der

nachweislich bei Menschen und Pferden recidivirt, während Hammel und Rinder durch einmaliges Ueberstehen der Krankheit für längere Zeit geschützt werden. Cholera bewirkt in der Regel für einige Monate bis Jahre einen Schutz gegen wiederholte Erkrankung. Eine ausgesprochene, lange Zeit andauernde Immunität tritt nach einmaligem Ueberstehen von Pocken, Scharlach, Masern, Flecktyphus und Abdominaltyphus ein.

Von grosser Wichtigkeit war die weitere Erfahrung, dass schwere und leichte Erkrankungen in Bezug auf die dadurch gewährte Immunität häufig gleichwerthig sind. Man beobachtet oft, dass ausserordentlich leicht verlaufende Fälle von Scharlach, Masern, Abdominaltyphus, Cholera einen eben so vollen Schutz gegen die gleiche Krankheit hinterlassen, wie Erkrankungen der schwersten Art. In Folge dessen hat man wiederholt versucht, z. B. in Epidemien von Masern und Scharlach, welche vorzugsweise aus leichten Fällen bestanden und in welchen also muthmaasslich ein wenig virulentes Contagium die Erkrankungen bewirkte, gesunde Kinder mit den kranken absichtlich in Berührung zu bringen, damit dieselben durch das Ueberstehen der leichten Erkrankung einen Schutz acquirirten gegen etwaige schwere Formen derselben Krankheit.

b) Schutzimpfung durch absichtliche kutane oder subkutane Einimpfung vollvirulenter lebender Krankheitserreger.

Diese Schutzimpfung wurde in grossem Maassstabe im vorigen Jahrhundert ausgeführt in der Form der Variolation gegen die Pocken.

Man hatte die Erfahrung gemacht, dass die Erkrankung bei künstlicher Einimpfung des Pockenvirus in die Haut in der Regel relativ leicht verläuft. Einige Tage nach der Impfung bilden sich an den Impfstellen Pusteln aus, die am 9. Tage den Höhepunkt der Entwicklung erreichen; am 7. und 8. Tage tritt heftiges Fieber ein und am 10. Tage eine allgemeine Eruption von Pusteln, die aber schon vom 12. Tage ab zurückgeht.

Der Erfolg der Variolation war immerhin kein sehr befriedigender; auf 300 Geimpfte entfiel ein Todesfall; die Erkrankung war in zahlreichen Fällen eine schwere; ausserdem trug die Variolation sehr zur Verbreitung der Pocken bei, da die von den Geimpften stammenden Erreger bei Ungeimpften schwere Variola hervorriefen.

Später ist — mit noch weniger günstigem Erfolg — die kutane Einimpfung von Syphiliscontagium (Syphilisation) versucht worden.

Der theilweise günstige Effekt dieser künstlichen Einimpfungen gegenüber der natürlichen Ansteckung erklärt sich dadurch, dass die Krankheitserreger an der gewählten Impfstelle ungünstigere Wachstumsbedingungen finden als auf den für gewöhnlich betroffenen Schleimhäuten, und dass dadurch dem Körper besser Gelegenheit gegeben ist, sich durch Antikörper und durch Leukocytose gegen die Krankheitserreger zu wehren.

Viel besseren und praktisch verwertbaren Effekt der subkutanen Impfung virulenter Erreger hat man bei solchen Bakterien beobachtet, die subkutan überhaupt nicht wuchern und von da keine Allgemeininfektion des Körpers zu Wege bringen, z. B. bei Cholerabacillen. Unter dem Einfluss dieser Bakterien kommt es dann zur energischen Bildung von specifischen Antikörpern. Die Untersuchung des Blutes nach solchen Impfungen zeigt, dass sich dasselbe ähnlich verhält wie das Serum von Menschen, welche die betreffende Krankheit erstanden haben. Da aber die gleiche Wirkung auch nach der Einimpfung frisch abgetödteter Culturen jener Erreger beobachtet wurde, so hat man in der Praxis gewöhnlich abgetödtetes Material verwendet und hat wenigstens eine solche Impfung der Verwendung von lebender Kultur vorausgehen lassen. Ueber diese Impfungen s. unten sub d).

Ferner gehört hierher noch die Schutzimpfung gegen Lungenseuche der Pferde durch Inokulation der Erreger am Schwanzende der Thiere. In dem lockeren Gewebe dieser Impfstelle sind anscheinend schlechtere Wucherungsbedingungen für den Erreger gegeben, als an anderen Hautstellen; und es kann daher hier zur zeitigen Bildung von Antikörpern kommen. — Andererseits kann bei Rauschbrand durch intravenöse Injektion der Erreger eine günstige Beeinflussung der letzteren und eine leichtere Erkrankung erzielt werden, als bei subkutaner Impfung.

c) Schutzimpfung mit künstlich abgeschwächten lebenden Krankheitserregern. Die beschränkten und oft bedenklichen Folgen der Einimpfung vollvirulenter Erreger, und andererseits die Beobachtung, dass auch eine Ansteckung durch schwach wirkende Erreger vollen Schutz gegen nochmalige Erkrankung verleihen kann, musste zum Bestreben führen, womöglich abgeschwächte Erreger zu verwenden bzw. künstlich für die Zwecke der Schutzimpfung herzustellen. Eine solche Abschwächung wurde erzielt:

α) Von PASTEUR durch begrenzte Einwirkung schädigender Mittel auf die virulenten Krankheitserreger (s. S. 52).

PASTEUR's erste Experimente betrafen die Hühnercholera. Zwei Vaccins, von denen der erste stärker, der zweite weniger abgeschwächt ist, werden den Thieren in einem Zwischenraume von 12—15 Tagen eingeimpft. Die Thiere erkranken hierdurch eine lokale Affektion, nach deren Ueberstehen sie gegen die Impfung mit virulenten Erregern der Hühnercholera immun sind. — Fernere Schutzimpfungen betrafen den Rauschbrand des Rindviehs, den Milzbrand der Schafe und des Rindviehs, sowie den Schweinerothlauf. Das Verfahren bei diesen Seuchen ist dem vorgeschilderten ähnlich, gewöhnlich werden zwei Vaccins mit einer Pause von ca. 12 Tagen mittelst Injektionsnadeln subkutan injicirt.

Die praktischen Resultate sind bei manchen dieser Schutzimpfungen befriedigend, bei anderen, so namentlich bei der Schutzimpfung der Schafe gegen Milzbrand, weniger befriedigend. Es kommt hier vor, dass die Thiere schon nach der Impfung schwer erkranken und sterben. Andererseits bewirken zu

schwache Impfstoffe keinen genügenden Schutz. Ferner ist in Betracht zu ziehen, dass der Impfschutz nicht für Lebenszeit andauert und die Impfung daher in Oefteren wiederholt werden muss.

Abweichend ist die von PASTEUR gegen die Hundswuth erfundene Schutzimpfung. Da dieselbe nur bei bereits gebissenen Menschen zur Anwendung gelangt, hat sie im Grunde mehr den Charakter eines Heilverfahrens. Obwohl die Erreger der Hundswuth noch völlig unbekannt sind, ist PASTEUR doch die Herstellung eines abgeschwächten Vaccins der Hundswuth durch allmähliches Austrocknen von Stücken des Rückenmarks wuthkranker Kaninchen gelungen; je länger solche Stücke in Fläschchen mit Kalistücken aufbewahrt und dadurch ausgetrocknet sind, um so stärker ist die Virulenz vermindert. Den Patienten wird zunächst eine Aufschwemmung aus einem stark abgeschwächten Rückenmarkstück in Bouillon subkutan injicirt, allmählich wird virulenteren Stücken übergegangen; schliesslich werden vollvirulente Aufschwemmungen vertragen und bei den so Geimpften haben dann auch die Bisse keine Tollwuth im Gefolge. — Der Modus der Impfung ist neuerdings nicht merklich geändert, seither scheinen die Resultate der Impfung sehr günstig zu sein und Schädigungen durch das Impfverfahren nicht mehr vorzukommen.

β) Durch Züchtung der Krankheitserreger unter ungünstigen Lebensbedingungen; namentlich fortgesetzte künstliche Cultur auf todttem Substrat, z. B. bei Rotz, Streptokokken, Pneumokokken u. s. w. Dabei kommt entweder eine allmähliche Anpassung an das veränderte Nährsubstrat zu Stande und damit eine Abschwächung der Virulenz, oder es findet eine Art Auslese der weniger virulenten, aber auf dem betreffenden Nährsubstrat besser gedeihenden Erreger statt. — Die Verwendung der in solcher Weise abgeschwächten Erreger zu Schutzimpfungen ist z. B. derart, dass sie als Vorläufer einer Impfung mit virulentem Material benutzt werden (Cholera).

Oder durch den Durchgang virulenter Krankheitserreger durch wenig empfindliche Thiere. Die Bacillen des Schweinerothlaufs können z. B. Kaninchen nur ausnahmsweise und nach grossen Dosen; nach kurzen Passagen durch Kaninchen, bei denen die Erreger für diese virulenten waren, rufen sie beim Schwein nur Leichte, aber immunitätverweckende Erkrankung hervor. Die mannigfaltigsten Abstufungen der Virulenz lassen sich mit diesen Krankheitserregern durch dessen Züchtung auf verschiedene Thiere gewinnen. — Hierbei gebietet vor Allem auch die Schwierigkeit, die Thiere durch den Pasteurisirungs- und Kochpocken zu verwunden. Auch ist zu bedenken, dass experimentell der Nachweis, dass das Geringste an der Menschenpocken auf Küther übertrug, sich nicht mit Kütherpocken hervorrufen lassen. Erleichterung auf die Auslösung der Impfung bewirkt aber Schutz gegen das Geringste an der Menschenpocken. Nachweis in sterilen Thier oder, ja, auch in der Impfung der Thiere: die Impfung von Kindern durch die Thiere zu gewinnen werden zunächst nur einer stark (aber

ist völlig) abgeschwächten Cultur von Tuberkelbacillen in geringer, ist wirksamer Dosis injicirt; darauf wird letztere gesteigert; später wird virulentere Cultur verwendet.

d) Schutzimpfung durch abgetödtete Krankheitserreger.

α) Gegen Cholera asiatica hat HAFKINE in Indien in grossem Masstabe subkutane Schutzimpfungen mit Choleracultur ausgeführt, indem früher schon FERRAN solche Impfungen nach einem ähnlichen, aber weniger sicheren Verfahren vorgenommen hatte. PFEIFFER und KOLLE haben durch exakte Versuche an Menschen und Thieren die richtigen wissenschaftlichen Unterlagen für diese Impfungen gewonnen.

HAFKINE injicirte subkutan zunächst $\frac{1}{12}$ bis $\frac{1}{8}$ frischer Agarcultur von einem Choleravibrio, der durch fortgesetzte Uebertragung von Cultur zu Cultur seine Virulenz eingebüsst hatte, oder $\frac{1}{12}$ Cultur getödteter Vibrionen; nach 5 Tagen $\frac{1}{12}$ Cultur lebende virulente Vibrionen, nach abermals 5 Tagen $\frac{1}{8}$ Cultur der letzteren.

PFEIFFER und KOLLE zeigten durch fortgesetzte Prüfung des Serums, dass eine einzige Injektion vollkommen genügt; ferner dass die Anwendung lebender Cultur nicht mehr leistet wie die abgetödteter. Am besten erfolgt daher die Impfung mit $\frac{1}{10}$ Agarcultur (2 mgr frische Culturmasse in 1 ccm Aufschwemmung), die vor der Injektion reichlich Erwärmen auf 56° während einer Stunde oder durch Chloroformimpfung abgetödtet wird. Nach der Injektion stellt sich lokal eine massige Infiltration mit grosser Schmerzhaftigkeit bei Druck und Bewegungen her, daneben zeigt sich Temperatursteigerung bis 39° , Mattigkeit und Appetitmangel. Nach 2—3 Tagen ist die Reaktion gelaufen. Vom 5. Tage ab beginnt die eintretende Immunität sich durch die stärkere specifisch bakterienlösende Kraft des Serums zu dokumentiren; am 20. Tage ist sie auf dem Höhepunkt; manchmal ist noch nach Jahresfrist deutlich erhalten.

HAFKINE's ausserordentlich zahlreiche Beobachtungen während des Herrschens von Choleraepidemien lassen keinen Zweifel daran kommen, dass auch die natürliche Infektion durch diese Art der Immunisirung wirksam bekämpft wird.

β) In ähnlicher Weise ist PFEIFFER und KOLLE die Immunisirung gegen Abdominaltyphus gelungen. 2 mgr frischer Cultur in 1 ccm Aufschwemmung werden durch mehrstündiges Erwärmen auf 56° sterilisirt und unter die Rückenhaut gesunder Menschen injicirt; es treten ringsum lokale Reaktionserscheinungen und daneben Frösteln, Schwindel und Fieber bis 38.5° auf. Schon nach 6 Tagen zeigt das Serum der Geimpften specifische Agglutininirung und Bakterienauflösung in solchem Masse, wie sie sonst nur bei Typhusreconvalescenten vorkommt.

Bei Versuchsthieren lässt sich eine ausserordentliche Häufung der specifischen Antikörper der Cholera- und Typhusbacillen durch Behandlung mit allmählich gesteigerten Dosen Cultur bewirken (Pfeiffer, vgl. S. 603). Am besten eignen sich Meerschweinchen und Ziegen. Das Serum solcher Thiere zeigt hochgradige specifisch baktericide und bakterienlösende Kraft. Um dieselbe genauer zu bestimmen, werden abgestufte Serummengen, durch Zusatz von Bouillon stets auf 1 cm gebracht, mit der 10fachen Menge der tödtlichen Minimaldosis Cultur (dos. letalis minima gewöhnlich = $\frac{1}{10}$ Oese) gemischt und Meerschweinchen von ca. 200 gr Gewicht intraperitoneal injicirt. Durch wiederholt entnommene Proben wird der Verlauf der Auflösung der Bakterien beobachtet, namentlich aber der Tod oder die Genesung der Thiere abgewartet. Während normales Serum den Titre 0.1 bis 0.5 hat (d. h. von solchem Serum sind 0.1 bis 0.5 ccm nöthig, um unter den angegebenen Verhältnissen den Tod des Thieres durch die 10fache tödtliche Dosis gerade noch zu verhindern), kann für das Serum von immunisirten Ziegen ein Titre von 0.0002 und weniger erreicht werden.

7) Gegen Pest führte Haffkine in Indien eine Schutzimpfung in der Weise aus, dass er 4 Wochen alte Culturen der Pestbacillen in Butterbouillon eine Stunde auf 70° erhitze, und von der dadurch abgetödteten Cultur $\frac{1}{2}$ —3 ccm injicirte; nach 8 Tagen erfolgte womöglich eine zweite Injektion. Die danach eintretenden örtlichen und allgemeinen Erscheinungen waren meist geringfügig. Nach 7 Tagen ist der Impfschutz ausgebildet; seine Dauer beträgt 7 Monate und mehr. — Die statistischen Nachrichten über die Erfolge der Impfung in Indien ergeben etwas unsichere Wirkung. Durch eine von der deutschen Pestkommission ausprobierte bessere Herstellung des Vaccins und strengere Controle gestaltet sich das Ergebniss der Impfung günstiger. Da die immunisirende Substanz an die Leiber der Pestbacillen gebunden ist, werden nicht Bouillon- sondern Agarculturen benutzt; diese werden in Kochsalzlösung 1 Stunde auf 65° erhitzt; dann folgt ein Zusatz von $\frac{1}{2}$ Procent Phenol. Von diesem Präparat wird so viel injicirt, wie $\frac{1}{2}$ —1 Agarcultur entspricht.

Eine künstliche Steigerung der aktiven Immunisirung, so dass schliesslich das Blutserum erheblichere Mengen specifischer Antikörper enthält, lässt sich bei Pferden erreichen, jedoch nur in sehr langem Zeitraume und unter schliesslicher Verwendung lebender Culturen (Yersin).

e) Schutzimpfung durch Bakterienextrakte.

Die in den vorigen Verfahren specifisch wirksamen Stoffe der Bakterienzelle lassen sich theilweise aus den Bakterienleibern der Culturen extrahiren und durch Filtration von jenen trennen. Mit den so erhaltenen

terienproteinen sind gegenüber den Erregern der Tuberculose, der Cholera, der Hühnercholera, Pneumokokken, Proteusarten, Pyocyaneus, in grossen Dosen auch bei Milzbrand, Erfolge erzielt, die indess, so die Immunisirung in Frage kommt, an Stetigkeit zu wünschen lassen, während therapeutisch bessere Resultate erzielt werden. Bei manchen Bakterien scheint die Abtrennung der wirksamen Stoffe der Leibessubstanz im unveränderten Zustande gar nicht oder nur bei Anwendung besonderer Hilfsmittel, z. B. Auspressen unter sehr hohem Druck, zu gelingen.

Als Beispiele derartiger Bakterienextrakte seien angeführt das Tuberkulin (Koch) und das Mallein. — Das ursprüngliche Tuberkulin ist durch Fällung eingedampfter Glycerin-Bouillonculturen mit Alkohol gewonnen. Das neue Präparat wird durch Verreiben der trockenen Culturen gewonnen, in Wasser vertheilt und centrifugirt werden. Die obere Schicht *TO* ist dem alten Tuberkulin ähnlich; die zurückbleibende Masse *TR* bildet die Grundlage des neuen Präparats. Nach der BUCHNER'schen Methode (Zumischen Infusorienerde und feinem Quarzsand zur feuchten Pilzmasse und Auspressen 4–500 Atm.) wird aus frischen Culturen ein Tuberculo-plasmin gewonnen. — Mallein wird erhalten durch Eindampfen und Filtriren von Culturen von Rotzbacillen in Glycerinbouillon. Unsichere Wirkung. — LUSTIG und SCHOTT haben Pestculturen mit Kalilauge extrahirt, mit Säure gefällt, und Niederschlag im Vakuum getrocknet. Der so erhaltene Impfstoff scheint dem oben beschriebenen Pestvaccin keine wesentlichen Vortheile vorzuzuziehen. — Bei Cholera und Typhus liessen sich wirksame Plasmine nach BUCHNER'schen Verfahren herstellen.

f) Schutzimpfung durch lösliche Stoffwechselprodukte, welche Bakterien während ihrer Wucherung in die Culturensubstrate überlassen lassen, gelingt praktisch vorzugsweise bei denjenigen Krankheits-erregern, die durch Toxine wirken. Insbesondere können in dieser Weise Impfungen gegen Diphtherie und Tetanus immunisirt werden (BEHRING). Bei Diphtherie verfährt man so, dass man eine grössere Menge Bouillon zur Herstellung; nach 4 Wochen werden die Bacillen durch Carbol oder Formalin abgetödtet, und nun injicirt man von dieser Flüssigkeit empfangenen Thieren (Meerschweinchen, Hammeln, Pferden) zunächst sehr kleine Dosen; nach einigen Tagen erhöht man die Dosis und fährt so fort, bis die sonst sicher tödtliche Dosis anstandslos ertragen wird. — Bei Tetanus werden Pferden Bouillonculturen mit 0,5% Carbol injicirt. Bei den ersten Dosen wird — allmählich abnehmend — Jodtrichlorid zugegeben. — Für den Menschen ist die Methode wegen der Unsicherheit der Dosirung nicht verwendbar (vgl. oben S. 598).

Passive Immunisirung durch Uebertragung von Serum hoch immunisirter Thiere.

Durch fortgesetzte Steigerung der Toxindosen oder der Menge und Zahl der injicirten Bakterien lassen sich solche Concentrationen

von Antitoxin bezw. Amboceptoren im Serum der Versuchsthiere herstellen, dass eine kleine Menge des Serums, nicht mehr als in einer Injektion subkutan einem Menschen einverleibt werden kann, hinreicht, um die Gefahr einer Invasion der betreffenden Krankheitserreger aufzuheben (vgl. S. 598). Eine solche Serumübertragung ruft keinerlei Reaktion im geimpften Körper hervor; es bilden sich daraufhin keine neuen Antitoxine und keine neuen Amboceptoren; aber es entsteht relativ rasch, jedenfalls innerhalb 24 Stunden, eine Immunität, die nur durch die übertragene Menge Antitoxin ausgeübt wird. Allerdings wird letzteres gewöhnlich innerhalb einiger Wochen wieder aus dem Körper eliminiert und dann ist die Immunität vorüber.

a) Uebertragung von Antitoxinen.

α) bei Diphtherie (BEHRING). Pferde werden mit vorsichtig steigenden Dosen aktiv immunisirt; der Antitoxingehalt des Serums wird fortdauernd geprüft; es muss ein sehr hoher Antitoxingehalt erreicht werden, damit das zur passiven Immunisirung verwendete Serum kein zu grosses Volum repräsentirt. — Bei der Prüfung benutzt man in Deutschland die Mischungsmethode, d. h. im Reagenzglas werden Mischungen von Toxin und Antitoxin in abgestuften Mengen hergestellt und dann an Meerschweinchen geprüft. Früher ging man aus von einem Diphtherienormalgift, d. h. von einer Giftlösung, welche in 0.01 ccm ausreichend Gift enthält, um ein Meerschweinchen von 250 gr in 4—5 Tagen zu tödten. 1 ccm dieser Giftlösung ist also = + 25000 M., d. h. kann 100 Meerschweinchen von je 250 gr Gewicht tödten. Blutserum, von welchem 0.1 ccm die Wirkung von 1 ccm Normalgift aufhebt, bezeichnet man als Normalserum; 1 ccm desselben enthält eine Immunisirungseinheit (I. E.). Ein hundertfaches Normalserum enthält in 1 ccm 100 I. E. — Da aber das Toxin nicht einheitlich zusammengesetzt ist, sondern wechselnde Mengen Toxoid und Toxon (s. oben) enthält, benutzt man jetzt ein Normal-Antitoxin als Ausgangspunkt für die Controle, d. h. 2 gr trockenes Serum von 1700 I. E., geschützt gegen Luft, Licht, Feuchtigkeit aufbewahrt, das im Bedarfsfall in einer Glycerin-Kochsalzlösung gelöst wird.

Zur Immunisirung empfiehlt es sich, 100—200 I. E. zu injiciren. Der Schutz hält ungefähr 3 Wochen an.

β) Bei Tetanus (BEHRING). Die Vorbehandlung der Versuchsthiere s. S. 613. Die Prüfung des Antitoxingehalts des Blutes erfolgt wie beim Diphtherieantitoxin; nur ist dieselbe hier erleichtert dadurch, dass ein (durch Ammonsulfatfällung erhaltenes) trockenes Testgift hergestellt und dauernd aufbewahrt werden kann. 20 Anti-

inheiten (= 20 Tet. A. N.) genügen zur Immunisirung, die beim Menschen in Frage kommen kann, wenn durch gewisse Verletzungen (tiefere Wunden, Verunreinigung mit Erde) Tetanus droht.

γ) Zur passiven Immunisirung gegen Pest wird das oben erwähnte, von Pferden nach langer Vorbehandlung gewonnene Serum benutzt (YERSIN). Der Impfschutz tritt rasch ein, dauert aber nicht 12 Tage. Die Leistungsfähigkeit der Methode wird noch werden beurtheilt.

δ) BEHRING und RANSOM haben ein antitoxisches Cholera-Serum durch Vorbehandlung von Pferden mit löslichem Cholera Gift stellt; dasselbe ist praktisch noch nicht erprobt.

b) Uebertragung von Bakteriolyseinen.

Passive Immunisirung durch Uebertragung eines mit specifischen Antikörpern hochbeladenen Serums ist bei Cholera, Typhus, Rauschbrand, Schweineseuche u. s. w. versucht. Jedoch werden jetzt nicht diejenigen Concentrationen von Antikörpern erreicht, die einer sicheren alleinigen Wirkung erforderlich sind (vgl. auch S. 5).

C. Combinirte aktive und passive Immunisirung.

Es liegt nahe, die Vortheile bei der Immunisirungsmethoden zu nutzen und ihre Nachtheile erheblich zu verringern dadurch, dass gleichzeitig durch (abgeschwächte) Krankheitserreger aktiv und ein Serum immuner oder specifisch immunisirter Thiere passiv immunisirt. Das Serum bewirkt dann eventuell, dass der Schutz sofort eintritt und dass die Reaktions-(Krankheits-)erscheinungen in Folge der Immunisirung geringer werden; letztere gewährt dagegen eine merklich längere Dauer des Impfschutzes.

Eine solche combinirte Methode ist für Pest empfohlen, aber praktisch nicht genügend geprüft. — Bewährt hat sie sich bei einigen Thierkrankheiten: bei Schweinerothlauf (gleichzeitige Einimpfung von wenig abgeschwächten Bacillen und „Susserin“); bei Rinderpest (durch Galle abgetödteten Thiere, welche Antikörper und abgeschwächte Erreger neben sich enthält, mit eventueller Nachimpfung mit Rinderpestblut; oder der „Simultanmethode“, virulentes Blut + Serum); neuerdings bei Maul- und Klauenseuche scheint ein Ge-

brauch von wirksamer Lymphe aus den Blasen mit Serum natürlich zu sein. Bei immunen oder immunisirten Rindern („Seraphtin“) Erfolg zu haben.

Noch andere menschliche Infektionskrankheiten werden sich voraussichtlich für Schutzimpfungen zugänglich erweisen. Trotzdem dürfen wir keineswegs hoffen, alle oder auch nur die meisten Infektionskrankheiten durch Schutzimpfungen zu bekämpfen. Bei manchen Er-

regern, z. B. Streptokokken, Influenzabacillen hat sich bis jetzt in sehr zahlreichen, vielfach variirten Experimenten keine Art von Immunisirung erreichen lassen. Für die Streptokokken ist durch Versuche an Menschen erwiesen, dass derselbe Stamm von Erregern viele Male hinter einander in kurzen Zwischenräumen typisches Erysipel hervorrufen kann. Von Gonorrhoe, Pneumonie wissen wir aus praktischen Erfahrungen, dass sie ebenfalls nach dem Ueberstehen der Erkrankung leicht recidiviren. Bei anderen Krankheiten, z. B. bei Diphtherie, ist der Impfschutz, den das Ueberstehen der Erkrankung oder die Immunisirung hinterlässt, zu kurz, als dass man an die Einführung einer allgemeinen Schutzimpfung denken könnte. Bei wieder anderen, wie z. B. bei Cholera und Abdominaltyphus, sind die zur Fernhaltung der Uebertragung geeigneten prophylaktischen Maassregeln so einfach, und unter vorgeschrittenen Culturverhältnissen so leicht durchführbar, dass aus diesem Grunde ausgedehntere Schutzimpfungen hier nicht in Betracht kommen. Wohl aber sind letztere zur Zeit, wo eine Epidemie grassirt, bei vereinzelt Personen anwendbar, welche der Ansteckung besonders exponirt sind. — Tritt in kleineren Orten oder in Stadttheilen eine stärkere Häufung von Diphtheriefällen hervor, so kann es auch zweckmässig sein, die Schulkinder in grösserem Umfang zu immunisiren; ferner wird es angezeigt sein, in den Familien, wo ein Diphtheriefall vorkommt, die Angehörigen und namentlich die übrigen Kinder mit Schutzimpfung zu versehen. Auch beim Ausbruch von Pest ist mit Schutzimpfungen von Angehörigen, Aerzten, Krankenwärtern, Desinfektoren u. s. w. zu rechnen.

Für eine allgemeine, obligatorische Impfung eignen sich dagegen bis jetzt nur die Pocken. Gegenüber den Pocken versagen unsere sonstigen prophylaktischen Maassregeln so sehr und die Impfung ist so gefahrlos und von so sicherer und langanhaltender Wirkung, dass dieselbe hier unbedingt den besten und rationellsten Schutz repräsentirt (s. im speciellen Theil).

IV. Die örtliche und zeitliche Disposition zu Infektionskrankheiten.

Bei näherer Betrachtung der im Vorstehenden aufgezählten mannichfaltigen Infektionsquellen, Transportwege und Empfänglichkeitsgrade ergibt sich ohne Weiteres, dass dieselben keineswegs bei jeder Ausbreitung einer Infektionskrankheit in gleicher Weise in Funktion treten können, sondern dass vielfache Variationen — der Art, dass bald

bald jene Infektionsquellen eine grosse Rolle spielen, während re fehlen; dass dieser Transportweg offen, jener verschlossen . s. w. — selbstverständlich sind. Demnach dürfen wir auch von herein keinerlei gleichmässige Ausbreitung der Infektionskrankheiten rten, sondern müssen uns diese Ausbreitung als etwas so Wechselndes so von kleinlichen Zufälligkeiten Abhängiges vorstellen, dass weder hartnäckige Lokalisation, noch ein scheinbar unvermittelter Sprung Krankheit, noch eine Pandemie uns überraschen darf.

Wir begegnen aber ferner gewissen auffälligen Gesetzmässigkeiten in der örtlichen und zeitlichen Verbreitung mancher Infektionskrankheiten. Die eine Stadt bzw. das eine Land zeigt sich regelmässiger ergriffen als das andere; gewisse Zeitabschnitte gehen mit einer anderen Häufung von Krankheiten zusammen, andere mit einer Verringerung. Diese gesetzmässigen Differenzen haben seitens der „Realisten“ zur Annahme einer lokalen und zeitlichen Disposition geführt; diese soll ihren Grund in besonderen, von der natürlichen Beschaffenheit der Oertlichkeit ausgehenden, zeitlich wechselnden Einflüssen auf die Krankheitserreger haben, so dass nicht mehr der Kranke die von ihm ausgehenden Infektionsquellen, sondern eben jene Beschaffenheit der Oertlichkeit für die Ausbreitung der Krankheit ausschlaggebend wird.

Oertliche Differenzen der Art beobachtet man zwischen den verschiedenen Klimaten; oft aber auch innerhalb desselben Klimas und zwar angeblich vorzugsweise als Folge einer verschiedenen Bodenbeschaffenheit. Zeitlich sich wiederholende Schwankungen sollen theils in besonderen Witterungsverhältnissen, theils wiederum mit zeitlich wechselnden Bodenverhältnissen zusammengehen.

Es ist indess bereits in einem früheren Kapitel ausgeführt, dass Klima und Witterung nur bei wenigen Krankheiten einen unmittelbaren Einfluss ausüben; ebenso wurde früher gezeigt, dass auch die verschiedenen natürlichen Lebenssubstrate, insbesondere der Boden, nur ausnahmsweise geeignet sind, die Verbreitung der Infektionserreger zu beeinflussen. Jedenfalls werden wir daher diese Momente erst dann bei unserer Erklärung örtlicher und zeitlicher Differenzen heranziehen können, wenn einige andere bei dieser wechselnden Vertheilung der Infektionskrankheiten sicher und zweifellos mitwirkende Faktoren für die Erklärung nicht ausreichen.

Nun ist es ganz zweifellos, dass die Verbreitung der Infektionskrankheiten, die Gangbarkeit der Transportwege und die individuelle Möglichkeit sich ausserordentlich verschieden gestalten, je nach den Verkehrsverhältnissen eines Ortes und Landes, nach den Sitten

und Lebensgewohnheiten, nach der Beschäftigungsweise, der durchschnittlichen Wohlhabenheit, nach den Wohnungs- und Ernährungsverhältnissen, endlich nach dem Grad der Durchseuchung der Bevölkerung; und alle diese Momente zeigen so viele örtliche und zeitliche Differenzen, dass sie ausgeprägte örtliche und zeitliche Differenzen im Auftreten der Infektionskrankheiten als selbstverständlich erscheinen lassen.

So sind Handels- und Verkehrszentren den Infektionsquellen exponierter als abgelegene Orte. Eine in überfüllten Wohnungen und in Fabrikräumen in steter enger Berührung lebende, schlecht genährte Bevölkerung gewährt ungleich bessere Bedingungen für die Ausbreitung der Infektionsquellen, als eine zerstreut wohnende, vorzugsweise im Freien beschäftigte, wohlhabende Bevölkerung. An dem einen Orte können gute Einrichtungen zur Entfernung der Infektionsquellen (Wasserleitung, Canalisation, Schlachthäuser) bestehen, während in anderen Städten oder Ländern eine Reinhaltung der Wohnung, Kleidung und Utensilien von Infektionserregern auf viel grössere Schwierigkeiten stösst. Selbst scheinbar unbedeutende Gewohnheiten sind oft von erheblichem Einfluss. In manchen Orten wird die Wäsche, und speciell die Wäsche von Kranken, niemals in der Wohnung, sondern ausserhalb der Stadt gereinigt; in anderen Orten erfolgt die Reinigung in unmittelbarer Nähe der Wohnung, an undichten Schachtbrunnen, deren Wasser auf diese Weise leicht inficirt wird. In einer anderen Stadt dient ein vielseitig benutzter Fluss zur Aufnahme aller Abfallstoffe und zum Reinigen der Wäsche. In wieder anderen Städten bewirken gewisse Gewerbe ein Zusammenströmen zahlreicher infektionsverdächtiger Wäschestücke und Lumpen.

Ebenso unterliegen die Transportwege örtlichen und zeitlichen Schwankungen. An einem Orte ist eine geeignete Krankenpflege eingerichtet, die Bevölkerung ist zu Reinlichkeit erzogen, die Nahrung wird sorgfältig zubereitet und in gekochtem Zustand genossen, für tadelloses Wasser ist Sorge getragen. In anderen Ländern, Städten und Stadttheilen ist eine Isolirung des Kranken unmöglich; es existirt kein geschultes Pflegepersonal; an regelmässige Reinigung der Hände und der Kleidung ist die Bevölkerung nicht gewöhnt; die Nahrung wird oberflächlich zubereitet, verunreinigtes Wasser wird zum Trinken, zum Reinigen der Ess- und Trinkgeschirre u. s. w. benutzt.

Auch die natürliche und die erworbene Disposition oder Immunität ist für die Verbreitungsweise der Infektionskrankheiten äusserst bedeutungsvoll. Oft zeigt eine ganze Bevölkerung eine durchschnittlich höhere Empfänglichkeit gegen vom Darm aus eindringende Infektions-

er, als die Bevölkerung einer anderen Stadt, weil schlechte Ernährung, Neigung zu Excessen u. dgl. dort vorherrschen und die örtlichen Schutzvorrichtungen des Körpers schwächen. Das Erleben von Epidemien und ihr zeitweises Verschwinden ist nicht selten die Durchseuchung und die dadurch erzielte Immunität eines Teils der Bevölkerung zurückzuführen. Ueberspringt eine Epidemie einzelne Bezirke, so erklärt sich dies oft daraus, dass vor nicht langer Zeit an dieser Stelle ein Hauptherd derselben Seuche bestanden hatte und dass zur Zeit der neuen Invasion wenig empfängliche Individuen vorhanden waren. — Masern und Scharlach treten bei uns als Kinderkrankheiten auf, weil ihre verbreiteten Keime gewöhnlich schon in der Kindheit acquirirt werden, dann aber eine lange dauernde Immunität hinterlassen. Das Auftreten dieser Krankheiten wird indessen ein wenig anderes, wenn sie etwa unter einer vorher noch nicht durchgesehenen Bevölkerung Platz greifen; auch die Erwachsenen erliegen ihnen ebensowohl wie die Kinder (Masernepidemien auf abgelegenen Inseln).

Auch zeitliche Differenzen kommen in ähnlicher Weise zu Stande. Das Leben der Bevölkerung in der warmen Jahreszeit bietet durch den langen Aufenthalt im Freien, die Gelegenheit zum Baden, die Sicherung der Reinigung von Wäsche und Wohnung weit weniger Chancen für die Ausbreitung gewisser Contagien, als der Winter. Eine bestimmte Jahreszeit äussert vielleicht auf die Frequenz gewisser Krankheiten dadurch Einfluss, dass in dieser Zeit die Gruben und Tonnen zum Humus und die Fäkalien, und mit diesen Infektionserreger, vielfach verbreitet werden. Auch die Ernte von Nahrungsmitteln, die in oberflächlichem, mit menschlichen Excrementen gedüngtem Boden gewachsen sind, kann in demselben Sinne wirken. Ferner kommt die zeitlich bedeutend wechselnde Menge der Insecten in Frage. Endlich veranlasst die individuelle Disposition starke Differenzen der zeitlichen Verbreitung, und insbesondere liefern die in der warmen Jahreszeit grassirenden Verdauungsstörungen eine ausgesprochene Disposition für Typhus, Cholera und Ruhr.

Am wenigsten werden noch diejenigen Infektionskrankheiten, welche hochcontagiös sind und stets über reichlichste Infektionsquellen und reichste Transportwege verfügen, von diesen zeitlichen und örtlichen Schwankungen betroffen werden, weil beim Fehlen der einen Infektionsgelegenheit immer noch andere Gelegenheiten zur Genüge vorhanden sind. Dennoch beobachtet man selbst bei den akuten Exanthemen ausgeprägte gesetzmässige Schwankungen. S. 132 wurde bereits die jahreszeitliche Schwankung der Pocken betont und erklärt. Aber auch

starke lokale Differenzen fehlen nicht. So sind, während in Europa im Laufe dieses Jahrhunderts stets Scharlachepidemien grassirten und während manche dieser Epidemien fast von Ort zu Ort zogen, einzelne Städte Jahrzehnte lang völlig verschont geblieben, obgleich sie zweifellos im Verkehr mit inficirten Orten gestanden hatten. In Münster hat eine solche scharlachfreie Zeit 50 Jahre lang gedauert; in Tuttlingen 35 Jahre, in Ulm 17 Jahre; auffällig lange Pausen sind in Lyon, ferner im ganzen Departement Indre-et-Loire beobachtet.

In weit stärkerem Grade müssen aber derartige zeitliche und örtliche Schwankungen hervortreten bei denjenigen Infektionskrankheiten, welche nicht so exquisit contagiös sind, wie die akuten Erytheme, sondern bei welchen die Infektionsquellen, die Transportwege, die Invasionsstätten beschränkt sind und wo nur bei einem gewissen Zusammenwirken äusserer Umstände eine weitere Ausbreitung der Infektion resultirt.

Typhus, Cholera, Ruhr, Diphtherie u. a. m. gehören zu diesen Krankheiten; und bei ihnen werden daher örtliche und zeitliche Schwankungen am häufigsten und am prägnantesten beobachtet, ohne dass deshalb von vornherein andere Momente zur Erklärung herangezogen werden müssen, als die früher aufgezählten Einflüsse des Verkehrs, der Lebensverhältnisse und der Disposition der Bevölkerung.

Auch für diese Infektionskrankheiten liegt somit zunächst kein Anlass vor, die Ursache der örtlichen und zeitlichen Schwankungen in geheimnissvollen, am Boden haftenden Einflüssen auf das ektogene Leben der Krankheitserreger zu suchen und dieselben damit den „miasmatischen“ Krankheiten anzureihen. Vielmehr werden wir erst specieller prüfen müssen, ob jene Einflüsse, welche die Ausbreitung vom Kranken aus thatsächlich in erster Linie bestimmen, vollkommen hinreichen, um alle beobachteten örtlichen und zeitlichen Schwankungen zu erklären; oder ob noch ein nicht aufzuklärender Rest bleibt, der uns zwingt, andere lokale und zeitliche Einflüsse in Erwägung zu ziehen.

Sicher ist es, dass wir bis jetzt nur eine einzige menschliche Infektionskrankheit kennen, deren Auftreten wirklich an eine bestimmte Lokalität und an einen bestimmten Boden einigermaassen gebunden ist, nämlich die Malaria; aber nur deshalb, weil der Zwischenwirth des Parasiten, Anopheles, ohne feuchten Boden nicht gedeihen kann. Halten wir Kranke mit Malariaparasiten von solchem Boden fern, oder verhindern wir die Regeneration von Anopheles, so vermag von dem „siechhaften“ Boden keine Malaria auszugehen.

Im Einzelfalle stösst der Nachweis derjenigen Momente, welche eine örtlich oder zeitlich verschiedene Ausbreitung der Infektion veranlasst haben, oft auf

ierigkeit; aber bei aufmerksamer Beobachtung der Sitten, Gebräuche u. s. w. gt es doch zuweilen, eine exquisite lokale und zeitliche Disposition in nntester Weise aufzuklären. So war z. B. in einem „unerklärlichen“ Fall örtlich und zeitlich begrenztem Milzbrand die Disposition lediglich dadurch gt, dass nur zu einer bestimmten Jahreszeit, nämlich wenn der Futtervor- auf die Neige ging, dem Futter Milzbrandsporen von dem inficirten Fuss- n des Futterraums in einem bestimmten Stallgebäude beigemischt wurden, elchem früher ein milzbrandiges Thier abgehäutet war. — Es ist zu hoffen, es der Detailforschung noch in zahlreichen weiteren Fällen gelingen wird, oft versteckten und scheinbar geringfügigen Ursachen für ein eigenthümlich ches und zeitliches Verhalten der Infektionskrankheiten genauer darzulegen.

Beispiele örtlicher und zeitlicher Disposition liefern uns auch manche sionskrankheiten, obwohl deren Erreger gewiss nicht zum Boden in irgend her Beziehung stehen. So kommt die Trichinose beim Menschen in Nord- ica, in Frankreich, im Orient u. s. w. so gut wie gar nicht, in Deutschland gen häufig vor; auch hier sind aber einzelne Gegenden besonders exponirt, re fast frei. Noch stärkere lokale Differenzen zeigt die Verbreitung der binose unter den Schweinen, die z. B. in der Provinz Hannover sehr selten, er Provinz Posen sehr häufig erkranken. Ferner beobachtet man in vielen anden, besonders in den ländlichen Distrikten, Epidemieen von Trichinose ntlich zum Anfang des Winters. — Diese örtliche und zeitliche Vertheilung, ohne die Entdeckung der Trichinen und ohne die Kenntniss ihres Lebens- es vielleicht auch die Trichinose zu einer Bodenkrankheit gestempelt haben le, sind einfach in Lebensgewohnheiten der Bevölkerung begründet, die in m Falle klar vor Augen liegen. In den immunen Ländern herrscht eben Verbot Schweinefleisch zu essen, oder die Sitte, das Schweinefleisch nur in gekochtem Zustand zu geniessen. In Posen ist es die Verwahrlosung der veinställe, die zur stärkeren Verbreitung der Trichinose führt; und zu An- des Winters veranlasst die Gewohnheit der ländlichen und kleinstädtischen lkerung, die gemästeten Schweine in dieser Jahreszeit zu schlachten und erzehren, die Häufung der Fälle.

Bekämpfung der örtlichen und zeitlichen Disposition. nach den vorstehenden Ausführungen die örtliche und zeitliche osition bei allen contagiösen Krankheiten sich aus Differenzen der Verbreitung der Infektionsquellen, in der Gangbarkeit der sportwege und aus Unterschieden der individuellen Disposition mmen setzt, so beseitigen die gegen diese drei einflussreichen nente gerichteten Maassregeln auch zugleich die örtliche und iche Disposition. Alle im Vorstehenden aufgeführten, speciellen pro- laktischen Verfahren, im grossen Maassstabe auf eine ganze Be- erung angewendet, müssen zu einer Verminderung der an den be- enden Orten beobachteten Frequenz der Infektionskrankheiten führen.

Vorzugsweise einflussreich sind gegenüber den contagiösen nkheiten folgende Maassnahmen: 1) Controle des kleinen Grenz- ehrrs und der Schiffer und Flösser, 2) strenge Handhabung der eigepflicht; Einrichtungen für bakteriologische Diagnostik, 3) Isolir-

spitäler, die eine völlige Absperrung des Kranken- und event. des Wartepersonals gestatten, 4) öffentliche Desinfektionsanstalten und Desinfektionskolonnen, 5) eine gut organisirte häusliche Krankenpflege und zweckmässige Belehrung der Kranken, 6) eine gegen Infektion gesicherte Wasserversorgung, 7) rationelle Beseitigung der Abwässer und Reinhaltung der Bodenoberfläche, 8) Ueberwachung des Lumpenverkehrs, 9) Ueberwachung der Nahrungsmittel und deren Verkaufsstätten, 10) ähnliche Ueberwachung der Schulen und Fabriken.

Bei den ektogenen Infektionskrankheiten sind ausgedehntere Maassregeln gegen die Infektionsquellen kaum durchführbar. Eiterkokken, die Erreger von malignem Oedem und Tetanus sind so allgemein verbreitet, dass es aussichtslos sein würde, dieselben an einigen Orten zu vernichten oder zu beseitigen. — Ueber die Bekämpfung der Cholera infantum und der Malaria s. im speciellen Theil.

Die Mehrzahl der Maassnahmen gegen die Infektionskrankheiten erfordert von Seiten der Communen eine fortgesetzt Arbeit und allmähliche Vorbereitung bereits in epidemiefreien Zeiten. Diejenigen Städte, welche zielbewusst diese Arbeiten durchgeführt haben, sind zum Theil in geradezu überraschendem Grade durch eine Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse und durch eine Verminderung der Infektionskrankheiten belohnt, und liefern ein anregendes Beispiel für diejenigen Städte, welche die modernen hygienischen Einrichtungen bis jetzt noch verschmähen.

Seitens der „Lokalisten“ wird bei Typhus, Cholera, Gelbfieber u. s. w. ausschliesslich auf die Beseitigung der lokalen und zeitlichen Disposition im Sinne dieser Schule, d. h. auf eine Reinigung und Drainirung des Bodens Werth gelegt. Die Beseitigung der contagiösen Absonderungen, die Desinfektion u. s. w. halten die Lokalisten für irrelevant und die dafür verausgabten Geldsummen für weggeworfen. Dagegen soll durch Canalisation oder geregelte Abfuhr der Boden so weit von organischen Verunreinigungen befreit werden, dass er nicht mehr zur Entwicklung und Reifung der Krankheitserreger geeignet ist, oder es sollen die Feuchtigkeitsschwankungen des Bodens, die denselben zeitweise zu seiner wichtigen Funktion geeignet machen, durch Canalisation oder Drainage beseitigt werden. — Es ist bereits mehrfach ausgeführt, dass diese Anschauungen mit unseren heutigen Kenntnissen über die Lebens Eigenschaften der Krankheitserreger und mit unseren zweifellosen Erfahrungen über die Contagiosität der in Rede stehenden Krankheiten im Widerspruch stehen. Es würde daher nicht zu verantworten sein, wollten wir im Vertrauen auf die Richtigkeit einer unbewiesenen und unwahrscheinlichen Hypothese jene gut begründeten und bewährten Maassnahmen gegen die Infektionskrankheiten unterlassen.

Specielle parasitäre Krankheiten.

Für einzelne besonders wichtige Infektionskrankheiten sei im den die Verbreitungsart und die Prophylaxis speciell zusammen-
 . Bezüglich der übrigen parasitären Krankheiten muss auf die ende allgemeine Aetiologie verwiesen werden. Die Wundinfek-
 ankrankheiten sind hier übergangen, weil dieselben in dem chirurg-
 und geburtshülflichen Unterricht eingehende Berücksichtigung

1. Cholera und Diarrhoea infantum.

Die Aetiologie der Cholera infantum ist noch verhältnissmässig aufgeklärt. Zunächst ist es schon schwierig, eine richtige Vor-
 z von der Frequenz der Krankheit zu erhalten. Unter den auf dtenscheinen verzeichneten Todesursachen der Kinder sind Lebens-
 he, Atrophie, Diarrhoe mit einem bedeutenden Procentsatz ver-

Krämpfe sogar mit dem grössten Procentsatz, der überhaupt
 mt (S. 5). Alle diese Todesursachen sind zweifellos in einer
 rossen Anzahl von Fällen eigentlich und richtig als „Cholera
 iarrhoea infantum“ zu bezeichnen. Es wäre sehr zu wünschen,
 urch eine genauere Angabe der Todesursachen und namentlich
 nöglichstes Vermeiden der Bezeichnung „Krämpfe“ in Zukunft ein
 bareres statistisches Material geliefert würde. Jedenfalls ist durch
 he statistische Beobachtungen festgestellt, dass die Gesamt-
 heit der Kinder im ersten Lebensjahre vollständig durch die Todes-
 1 Cholera infantum und der verwandten Krankheiten beherrscht
 nd daher die für erstere gewonnenen Zahlen den Untersuchungen
 holera infantum theilweise zu Grunde gelegt werden dürfen.
 erner bietet die Aetiologie der sog. Cholera infantum, die eigentlich
 1 schlechter Kollektivname für eine Reihe klinisch und ätiologisch
 edener Krankheiten ist, noch besondere Lücken insofern, als die
 ichen Erreger nicht bekannt und experimentelle Studien uns
 ur zu gewissen Vermuthungen geführt haben. Wir sind daher
 ich auf die Resultate statistischer Erhebungen über die ört-
 und zeitliche Verbreitung der Mortalität im 1. Lebensjahre bezw.
 rblichkeit der Säuglinge an allen Verdauungskrankheiten
 engenommen angewiesen.

urch diese Erhebungen ist nun zunächst ermittelt, dass die Ver-
 skrankheiten in charakteristischer Weise von der Aussentempe-
 genauere von der Wohnungstemperatur, abhängig sind; ferner,
 ieselben fast ausschliesslich bei künstlich genährten Kindern,
 selten bei Brustkindern vorkommen; drittens dass sie auf dem

Lande wenig, in den Städten um so mehr verbreitet sich zeigen, je grössere letztere sind.

Die Abhängigkeit der Säuglingsterblichkeit von der Aussen-temperatur geht zunächst aus folgender Tabelle hervor:

	Auf 100 Lebend- geborene treffen im 1. Lebensjahr Gestorbene	Mittlere Tempera- tur des heissesten Monats
Norwegen	10.4	14.5
Schottland	11.9	14.6
Schweden	13.5	16.0
Sachsen	26.3	18.5
Württemberg . . .	35.4	19.0

Genauere Beobachtungen zeigen, dass die hohe Säuglingsterblichkeit überall da fast völlig fehlt, wo die Temperatur des heissesten Monats nicht über 16° hinausgeht. Die grösste Frequenz erreicht sie, wenn lange Perioden hoher Temperatur und hohe Wärmemaxima auftreten, während die Häufigkeit abnimmt, sobald die Maxima von geringerer Höhe sind und nächtliche Abkühlung erfolgt (Seeklima, Höhenklima).

Ebenso ist die zeitliche Vertheilung durchaus an das Vorkommen dauernd hoher Temperaturen gebunden, und zwar sind vorübergehende hohe Temperaturen im Frühsommer, die sich innerhalb der Wohnungen noch nicht in stärkerem Grade bemerklich machen, von relativ geringem Einfluss (s. S. 380).

Der Einfluss der Ernährungsweise ergibt sich aus folgenden Tabellen, die in Berlin zu wiederholten Malen gewonnen sind. Dort wurde bei der Volkszählung (zuerst am 1. December 1885) die Zahl der mit Muttermilch, Thiermilch und Milchsurogaten ernährten Säuglinge festgestellt; und da bei den Todesfällen der Säuglinge ebenfalls die Ernährungsweise notirt wurde, war es möglich, den Procentatz von Todesfällen zu ermitteln, welchen jede einzelne Gruppe liefert (БОЕЧКН). Schon bei Registrierung der Gesamtmortalität traten sehr prägnante Unterschiede hervor.

1885 starben in Berlin vor Ablauf des 1. Lebensjahres auf je 1000 der in gleichem Alter lebenden Kinder:

Bei Ernährung	
Mit Muttermilch	7.6
Mit Ammenmilch	7.4
Halb Brustmilch, halb Thiermilch .	23.6
Mit Thiermilch	45.8
Mit Thiermilch und Milchsurogaten	74.8

Noch krasser fallen die Differenzen aus, wenn nur die Todesfälle der Säuglinge an Verdauungskrankheiten in Rechnung gezogen werden.

Die relative Sterblichkeit der Kinder unter 1 Jahr nur an Verdauungskrankheiten betrug:

	Für eheliche Kinder	Für uneheliche Kinder
Reine Brustmilch	1.3	1.0
Halb Brustmilch, halb Thiermilch . . .	7.6	23.7
Voll Thiermilch	18.7	29.9
Thiermilch und Surrogate	51.1	71.9

Der Gegensatz endlich zwischen grösseren Städten, kleineren Städten und den Landgemeinden wird durch nachstehende Tabelle erläutert.

Von 100 Todesfällen entfallen auf Cholera und Diarrhoea infantum:

	Procent
Ganz Preussen	3.2
Nur die Landgemeinden	1.4
Nur die Stadtgemeinden	7.2
62 Stadtgemeinden mit 20 000 bis 100 000 Einwohner	8.8
Köln	13.9
Berlin	16.4

Es erscheint somit ausser allem Zweifel, dass ein Zusammentreffen hoher Wohnungstemperatur und künstlicher Ernährung für das häufige Auftreten dieser Verdauungskrankheiten von kritischer Bedeutung ist; und wir müssen uns sonach die Ansicht bilden, dass als die wesentliche Ursache verbreitete Bakterien anzusehen sind, welche bei höheren Temperaturen, wie sie im Hochsommer in städtischen Wohnungen auftreten, sich lebhafter in der Milch vermehren, während in der kalten Jahreszeit, oder bei kühler Aufbewahrung der Milch, in kleinen Städten und auf dem Lande die Regel ist, zu keiner Vermehrung im Stande sind. Vermuthlich bilden diese Bakterien beim Wachsthum in der Milch, vielleicht auch in den Nahrungsresten im kindlichen Darms, toxisch wirkende Produkte. Allerdings scheinen auch gesunde Kinder höchst selten in dieser Weise zu erkranken; die Mehrzahl der Todesfälle betrifft Kinder, die schon vorher Verdauungsstörungen aufwiesen und bei denen in Folge dessen jene Bakterien eine zu akuter Wirkung gelangen können. — Ausserdem wird vermuth-

lich der kindliche Körper durch die hohe Wohnungstemperatur und die daraus resultierende Wärmestauung in besonderem Grade für die Krankheit disponirt. — In Krankenhäusern, Findelhäusern ist übrigens mehrfach eine Verbreitung schwerer Enteritis durch Contagion beobachtet.

Nach der abweichenden Ansicht einiger Aerzte soll die Cholera infantum wesentlich durch directe Einwirkung der hohen Wohnungstemperaturen auf den kindlichen Organismus zu Stande kommen und als „infantiler Hitzschlag“ aufzufassen sein (MEINERT). Es ist beobachtet worden, dass in heissegelegenen Wohnungen die Wärmebilanz der Kinder leicht gestört wird; bei im übrigen gesunden Kindern tritt Wärmestauung, Temperaturerhöhung auf $38.0-38.4^{\circ}$ und zuweilen Uebergang dieser Wärmestauung in typischen Brechdurchfall ein. Die hervorragende Betheiligung der künstlich genährten Kinder soll darin begründet sein, dass bei künstlicher Nahrung eine mangelhafte Anpassung derselben an den Bedarf der Wärmeregulation (Ueberernährung und unzureichende Wasseraufnahme) stattfindet, während bei Brustnahrung eine vollkommene Anpassung erfolgt. — Dieser Auffassung widersprechen jedoch die zahlreichen neueren Erfahrungen über den günstigen Einfluss sterilisirter Kuhmilch.

Die prophylaktischen Maassregeln müssen in erster Linie darauf hinausgehen, die Ernährung der Kinder mit Muttermilch zu begünstigen. Eine Sterilisierung der Kuhmilch vor der Verabreichung in der oben (S. 287) angegebenen Weise und Aufbewahrung derselben in kühlen Räumen ist in ärmeren Familien schwer durchführbar. Hier kann nur eine Lieferung fertiger sterilisirter Nahrung und frühzeitige Aufnahme der erkrankten Kinder in besondere Spitäler helfen, wo sie thunlichst mit Frauenmilch genährt werden. Eine wesentliche Besserung der Sterblichkeit ist von einer gründlichen Reform der Wohnungsverhältnisse zu erwarten.

2. Diphtherie.

Die Frequenz der Diphtherieerkrankungen beträgt in den grösseren Städten 0.2 bis 0.4 p. m. der Lebenden und mehr. Für eine genauere Verfolgung örtlicher und zeitlicher Einflüsse ist das statistische Material oft ungeeignet, weil die Unterschiede zwischen diphtherischer und nicht diphtherischer Angina, zwischen einfacher Diphtherie und Scharlachdiphtherie nicht genügend berücksichtigt werden. — Der sehr ungleiche Verlauf der Krankheit in verschiedenen Epidemien lässt darauf schliessen, dass die Erreger in ihrem Virulenzgrade beträchtliche Differenzen aufweisen können.

Durch die Erfahrung steht unzweifelhaft fest, dass die Diphtherie durch Contagion verbreitet wird. Aerzte, Krankenwärter, Angehörige werden häufig nachweislich durch einen Kranken infectirt. Die Inkubationszeit bis zum Ausbruch der Krankheit beträgt gewöhnlich 2—3 Tage. — Als die wesentlichsten Infektionsquellen haben wir

ausgehusteten Membranen, Sputa, Speichel und die damit verunreinigten Gegenstände anzusehen. In dicken Schichten angetrocknet, leben die Erreger 3—4 Monate, bei unvollständigem Austrocknen bis 7 Monaten lebendig. Im Munde des Reconvalescenten können sich Erreger nachweislich noch etwa 4 Wochen, manchmal Monate lang, lebendig und virulent erhalten. Besonders gefährlich sind von den Kranken und Reconvalescenten benutzten Ess- und Trinkgeschirre, Löffel, Taschentücher u. s. w. Ferner ist ersichtlich, dass Erwachsene und unempfindliche Kinder Diphtheriebacillen verbergen und übertragen können, obwohl sie gar keine Krankheitserscheinungen oder nur die einer leichten Angina darbieten. — Ein langsames Wachsthum der Diphtheriebacillen findet vielleicht auf Nahrungsmitteln gelegentlich statt, hat indess kaum besondere Bedeutung.

Die diphtherieartigen Erkrankungen verschiedener Thierspecies (Pferde, Tauben, Hühner, Katzen u. s. w.) können menschliche Diphtherie nicht hervorrufen.

Die Transportwege für das Diphtherievirus bilden vorzugsweise die Verbindungen der Infektionsquellen (Mund des Kranken, Ess- und Trinkgeschirre, Wäsche u. s. w.) einerseits, des eigenen Mundes andererseits.

Kindern ist ein solcher Transport besonders begünstigt, da sie ihre Finger und verschiedenste Gegenstände fortgesetzt und im unreinlichsten Zustande in den Mund zu führen pflegen. Häufig vollzieht sich die Übertragung in Schulen und Kindergärten. — Selbstverständlich kommen durch Küsse, ferner durch directes Anhusten der mit Unterbrechung oder Pinseln des Rachens Beschäftigten Infektionen zu Stande.

Luft giebt anscheinend nur in der Nähe des Kranken und nur bei Anlässen zu Uebertragungen Anlass, wenn kurz zuvor Tröpfchen des Mundes verspritzt sind.

Die individuelle Disposition nimmt vom 6. Jahre ab allmählich, bis zum 13. Jahre an sehr rasch ab. Dass eine zarte, leicht verletzbare, eventuell eine katarrhalisch afficirte Rachenschleimhaut (hyperämische Tonsillen) zur Erkrankung disponirt, wird von den meisten Autoren angenommen und ist auch durch Thierexperimente wahrscheinlich gemacht.

Eine ausgesprochene örtliche und zeitliche Disposition tritt bei der Verbreitung der Diphtherie nicht hervor. Differenzen der Frequenzen werden bei der Vergleichung verschiedener Länder und Städte allseits beobachtet, gehen aber nicht über die bei jeder contagiösen Krankheit vorkommenden Schwankungen hinaus; ausserdem pflegen die Differenzen sich im Laufe der Jahre durchaus nicht constant zu zeigen. — Auch die jahreszeitliche Schwankung ist so unbedeutend

(im Sommer erfolgt gewöhnlich eine Abnahme der Erkrankungen) und so inconstant, dass ein irgend erheblicher Einfluss der Witterung daraus nicht abgeleitet werden kann.

Die Prophylaxis ist vor Allem auf strenge Isolirung und eine rationelle Desinfektion angewiesen, die während des ganzen Verlaufs der Krankheit auf Sputa, Wäsche und Ess- und Trinkgeschirr, nach dem Ablauf der Krankheit auch auf Theile der Wohnung auszudehnen ist (Formalindesinfektion, s. oben). Der Reconvalescent soll noch längere Zeit besonderes und nach dem Gebrauch zu desinficirendes Ess- und Trinkgeschirr benutzen. Vom Schulbesuch sind erkrankte des Kinder und deren Geschwister mindestens 4 Wochen nach Abstossung Belags zurückzuhalten (s. S. 506). Erwachsene sollten Kinder überhaupt nicht auf den Mund küssen, keinesfalls sobald die geringsten Symptome einer Angina beim Erwachsenen vorhanden sind. — Kommt ein Diphtheriefall in einer Milchwirtschaft vor, so ist der Milchverkauf zu sistiren, wenn nicht Garantie für vollständige Absperrung des Kranken gegeben ist — Unter geeigneten Verhältnissen ist Schutzimpfung exponirter gesunder Kinder mit dem BEHRING'schen Antitoxin indicirt. — Für die frühzeitige Sicherung der Diagnose, von der die Isolirung, die Desinfektion, die frühzeitige Behandlung mit Heilserum und die Schutzimpfung der Angehörigen abhängig gemacht werden muss, ist die bakteriologische Untersuchung von Probematerial aus der Mundhöhle des Kranken sehr wichtig. Dieselbe muss in besonderen Untersuchungsstationen (gratis) ausgeführt werden, die so eingerichtet sind, dass der Bescheid nach im Mittel 6 bis 8 Stunden dem einsendenden Arzte zugeht. Solche Stationen sind z. B. in Breslau, New-York, Paris, Königsberg im Betrieb (s. Anhang).

Einige Autoren vertreten die Ansicht, dass die bakteriologische Untersuchung bei Diphtherieverdacht überflüssig und dass unter allen Umständen Antitoxin zu injiciren sei. Letzteres ist zuzugeben; daraus folgt aber nicht, dass die ätiologische Aufklärung dann keinen Werth mehr habe und unterbleiben könne. Vielmehr vermag erst der Ausfall der bakteriologischen Untersuchung in vielen Fällen darüber zu entscheiden, ob Isolirung, Desinfektion u. s. w. erfolgen muss oder nicht. Auch nachdem der Kranke Antitoxin bekommen hat, verstreut er virulente Diphtherieerreger, welche die Umgebung und sogar immunisirte Kinder gefährden, da die Erreger viel länger haltbar sind, als der Schutz einer immunisirenden Injektion anhält. Trotz der vollen Berechtigung einer frühzeitigen Serumbehandlung ist daher neben dieser die ätiologische Aufklärung und eine auf diese gegründete Prophylaxe für die Bekämpfung der Diphtherie von grösster Bedeutung.

3. Cholera asiatica.

Die asiatische Cholera herrscht seit langer Zeit im Gangesdelta und in Bengalen als endemische Krankheit. Dort finden die Krankheitserreger, begünstigt durch hohe Temperatur, Feuchtigkeit und

arme Mengen abgestorbener Pflanzen und Thiere, vielleicht Gelegentlich zu ausgiebigem Wachsthum, namentlich in Sümpfen, Teichen, anssufern u. dgl. Ausserdem wird dort die endemische Verbreitung durch unterstützt, dass in Folge der massenhaften, sorglosesten Ausnutzung der vom Kranken stammenden Erreger die ganze Umgebung neuer wieder durchseucht wird.

Von Niederbengalen aus hat die Cholera seit dem Jahre 1817 weitere Schritte gemacht, sich zunächst auf das übrige Indien ausgedehnt und vom Jahre 1819 ab auch die Grenzen Indiens überschritten.

Seither ist kaum ein Land von der Cholera verschont geblieben. Nur die Gegenden, mit welchen Indien ausschliesslich durch langdauernde Seen in Verkehr steht, wie Australien und das Capland; ferner viele verkehrlose Gegenden der arktischen Zone und des Hochgebirges sind bis jetzt von derselben freigeblieben (s. S. 138, 144). — Europa wurde in fünf Invasionen heimgesucht. Die erste im Jahre 1823 erstreckte sich nur bis Astrachan; 1829 erfolgte der Einbruch über Russland und diesmal blieb die Cholera bis 1837 auf europäischem Boden, wurde auch nach Canada verschleppt und von da im übrigen Amerika verbreitet. 1847 wurde zum dritten Mal Europa und der grösste Theil des übrigen Erdtheils von der Cholera heimgesucht, die erst 1858 ihre Wanderung aufstellte. Der vierte, besonders verheerende Zug begann 1865 von Aegypten aus und dauerte bis 1875. 1882 wurde die Cholera wiederum nach Mekka eingeschleppt, verbreitete sich 1888 nach Aegypten, betrat 1884 in Toulon europäischen Boden, dehnte sich 1884—86 in Südfrankreich, Italien, Spanien und Österreich-Ungarn aus und herrschte gleichzeitig in Süd-Amerika, China und Japan. Nach einer fünfjährigen Ruhepause drang die Seuche im Frühjahr 1892 nach Afghanistan und Persien nach Russland vor, brach im Frühsommer in Deutschland aus, drang im späteren Sommer nach Holland und Deutschland, wo sie jedoch (ausser Hamburg) nur kleinere Krankheitsherde hervorrief. Während des Winters 1892/93 setzte sie sich in sporadischen Fällen in Russland, Frankreich, Italien und Deutschland fort und gelangte im Sommer in Russisch-Polen und Galizien zu grösserer Ausdehnung.

Ueber die Ursachen und die Verbreitungsweise dieser mörderischen Seuche bestanden die widersprechendsten Ansichten, bis es Koch im Jahre 1883 gelang, die Erreger der Cholera aufzufinden, ihre Lebensbedingungen kennen zu lernen und die Verbreitungsart der Krankheit an allen wesentlichen Punkten aufzuklären.

Die Infektionsquellen lassen sich leicht entnehmen aus den 77 geschilderten Lebenseigenschaften des Kommabacillus.

Die concentrirtesten und gefährlichsten Infektionsquellen sind selbstverständlich die Dejectionen des Cholerakranken und die mit diesen verunreinigte Wäsche. Gelegentlich können auch der Fussboden, verschiedenste Gebrauchsgegenstände, Teppiche, die Kleider des Wartersonnens u. s. w. mit Dejectionen verunreinigt werden. Bei schlechten Vorrichtungen zur Entfernung der Abfallstoffe, auf unsauberen Höfen u. s. w. finden sich auch nicht selten Reste von Dejectionen auf der Ober-

fläche des Erdbodens, und können von da durch allerlei Kontakte verbreitet werden. Eine entschiedene Gefahr bieten oberflächliche Rinnsale, oberflächliche Wasseransammlungen, Bäche und Flüsse, in welche Abwässer und Excremente gelangen. Hier sind häufig die Bedingungen für lange Conservirung und zuweilen wohl sogar für Vermehrung der Kommabacillen gegeben.

Von den Dejektionen des Kranken und den mit diesen beschmutzten Objecten aus kann dann der Transport der Bacillen zum Gesunden dadurch erfolgen, dass Menschen die Infektionsquellen einerseits, ihren Mund oder unmittelbar nachher genossene Nahrungsmittel andererseits berühren und so Kommabacillen direct in den Mund bringen. Letzteres braucht nicht unmittelbar nach der Berührung der Infektionsquelle zu geschehen; es ist nachgewiesen, dass die Kommabacillen bis zu einer, vielleicht sogar bis zu 2 Stunden an der Hand lebendig bleiben; später sind sie durch Austrocknen getödtet. Derartige directe Uebertragungen werden bei den mit dem Kranken beschäftigten Menschen, die nicht an strenge Reinlichkeit gewöhnt sind, ferner bei Kindern, leicht und häufig vorkommen. Bei einiger Vorsicht und Reinlichkeit sind sie dagegen völlig zu vermeiden, zumal die Kommabacillen nur in sichtbaren, feuchten oder erst kürzlich angetrockneten Dejektionsresten im lebenden Zustand erhalten zu sein pflegen. — Wäscherinnen sind theils denselben Berührungen, theils aber auch dem Verspritzen des inficirten Waschwassers exponirt und bedürfen daher schon grösserer Vorsicht, um der Infektion zu entgehen.

Ferner kann eine Verschleppung des Infektionsstoffs durch Fliegen erfolgen. Verschiedene Beobachter haben nachgewiesen, dass Fliegen, die auf Dejektionen oder beschmutzter Wäsche gesessen haben, lebende Kommabacillen noch nach Stunden auf Nahrungsmittel übertragen können. In kleinen Wohnungen, ohne räumliche Trennung zwischen dem Erkrankten und Küche bzw. Vorrathsraum, muss im Spätsommer und Herbst, wo Unmassen von Fliegen in solchen Wohnungen ihr Wesen treiben, dieser Modus der Verschleppung ernstlich in Betracht kommen.

Nahrungsmittel können bei feuchter Aufbewahrung die auf ihnen durch Berührungen oder durch Fliegen deponirten Kommabacillen noch lange (bis zu 8 Tagen) conserviren. — Besondere Gefahr bietet das Wasser. — Dasselbe wird am leichtesten inficirt, wenn es in oberflächlichen stagnirenden Ansammlungen besteht (indische Tanks), in welche gewohnheitsmässig allerlei Abwässer hineingelangen und mit diesen gelegentlich Reste von Dejektionen oder z. B. das Spülwasser, das zur Reinigung der für Dejektionen benutzten Gefässe resp. der mit Dejektionen besudelten Wäsche gedient hat. Wo ein solches Wasser

allen häuslichen Zwecken, zum Kochen und zum Trinken verwendet wird, wie es im endemischen Gebiet der Cholera thatsächlich geschieht, ist die Gefahr einer Ausbreitung der Cholera durch Wasser naturmässig ausserordentlich gross.

Ferner sind solche Bäche und Flüsse stark exponirt, welche Abwasser aufnehmen, oder in welchen Wäsche gespült wird, oder auf denen Fischer und Flösser leben. Letztere pflegen ihre Dejektionen und Abwasser direct in den Fluss zu schütten; sie sind aber andererseits öfters auch an Cholera erkrankt, weil sie das Flusswasser ohne jede Reinigung benutzen. Die Schiffe können ausserdem durch das Bilgewater (Kielwasser) die Kommabacillen verschleppen, das sie an inficirten Stellen des Flusses in das Schiff nehmen und an anderer Stelle landaufwärts oder abwärts gelegener Stelle wieder in den Fluss lassen.

Auch Grundwasserbrunnen sind der Infektion mit Cholerakeimen ausgesetzt, wenn oberflächliche Rinnsale in den Brunnen führen und durch z. B. das zum Reinigen von Wäsche oder von Geschirren benutzte Wasser in den Brunnenschacht gelangt.

Die Existenz lebender Kommabacillen in Wässern, die in der Nähe eines Choleraherdes sich finden und als Ursache der Choleraausbreitung in Betrachtung sind, stützt sich neuerdings nicht nur auf Vermuthungen und Analogieen mit Laboratoriumsexperimenten, sondern es sind in einer grösseren Anzahl von Epidemien die Kommabacillen in dem verdächtigsten Wasser aufgefunden und durch die PFEIFFER'sche Reaktion (s. Anhang) mit voller Sicherheit differenzirt worden.

Die Infektion mittelst eines Wassers, das Kommabacillen enthält, kann schon dadurch erfolgen, dass dasselbe zum Reinigen des Ess- und Trinkgeschirrs, zum Ausschwenken der Bierseidel u. s. w. benutzt wird. Meistens am häufigsten kommt sie sicher dadurch zu Stande, dass das betreffende Wasser getrunken wird. Je mehr die Sommerwärme zum Wassertrinken anregt, um so häufiger kommt diese Infektionsgelegenheit zu Stande.

Frage. Sie ist um so gefährlicher, als die Kommabacillen wahrscheinlich gerade mit einem Trunk frischen Wassers am leichtesten ungeschädigt im Magen passiren. Wird Wasser in den Magen eingeführt, so tritt dasselbe in kleinerer Menge sogleich in den Dünndarm über; nach etwa einer Stunde erfolgt rascher Uebertritt des Restes; auch dieser Rest hat dann aber nachweislich nicht saure Reaktion, so dass kein schädlicher Einfluss auf die Kommabacillen eingewirkt hat und dieselben ungeschwächt in den Dünndarm übertreten können. Das Wasser bildet somit das Substrat, in welchem die Kommabacillen am leichtesten in den Dünndarm vordringen.

Im Gegensatz zum Wasser hat die Luft als Transportmittel der

Keime keine Bedeutung, weil sie bei demjenigen Grad von Austrocknung, der für einen Transport von Staubtheilchen durch Luftströme Bedingung ist, nicht lebendig bleiben. Nur durch Verspritzen von Flüssigkeiten (Brandung der Meereswellen, Reiben und Schwenken der Wäsche im Waschbottich u. s. w.) werden lebende Kommabacillen auf gewisse Entfernungen durch kleine Wassertröpfchen verbreitet; ebenso können wohl beim Hantiren mit halb getrockneter beschmutzter Wäsche Partikelchen mit noch lebenden Kommabacillen herabfallen oder im nächsten Umkreise verschleudert werden. Dabei vollzieht sich die Verbreitung aber immer nur in demselben Raum und während kurzer Zeit; und dann ist gewöhnlich an solcher Stelle gleichzeitig noch grössere Gefahr gegeben durch die gewiss vorhandene Möglichkeit zur Verbreitung der Infektionserreger mittelst Berührungen und Fliegen. Die Luft bietet also durchaus keine spezifische Infektionsgelegenheit. Die besondere Gefahr der Luftinfektion besteht eben nur dann, wenn die infektiösen Theilchen in Form von feinsten Tröpfchen oder Stäubchen in der Luft schweben bleiben und durch Luftströmungen aus der näheren Umgebung der Infektionsquellen hinausgeführt werden können, so dass sie von Menschen, welche gar nicht unmittelbar mit dem Kranken oder dessen Wäsche zu thun haben, eingeathmet und verschluckt oder auf Nahrungsmitteln, die entfernt vom Kranken aufbewahrt sind, deponirt werden.

Dass eine derartige Luftinfektion durch Kommabacillen in der That nicht möglich ist, haben besondere Versuchsreihen mit aller Bestimmtheit dargethan; und gerade durch dieses Fehlen einer Uebertragung mittelst Luftströmungen unterscheidet sich die Verbreitungsweise der Cholera wesentlich von derjenigen der akuten Exantheme.

Von bedeutendem Einfluss auf die Ausbreitung der Cholera ist die individuelle Disposition. In den letzten Epidemien wurden zahlreiche ganz leicht, kaum unter Krankheitssymptomen verlaufende Cholerafälle, die auch in früheren Epidemien oft beobachtet waren, von denen es aber damals zweifelhaft blieb, ob sie der asiatischen Cholera zuzurechnen seien, bakteriologisch untersucht. Dabei wurden über Erwarten häufig Kommabacillen constatirt. Die meisten dieser leichten Affektionen gelangen offenbar gar nicht zur Kenntniss eines Arztes.

Des öfteren ist dann aber beobachtet, wie in Folge eines Excesses oder einer Verdauungsstörung, zuweilen auch ohne ersichtlichen Anlass, aus den leichtesten Erkrankungen sich plötzlich ein schwerer Choleraanfall entwickelte. Ebenso konnten bei solchen Personen, welche bereits als genesen galten, welche aber noch Kommabacillen in den Dejektionen hatten, schwere Recidive auftreten; alles Zeichen, dass die Kommabacillen der leichten oder protrahirten Fälle nicht etwa eine Einbusse an Virulenz erlitten hatten.

individuelle Empfänglichkeit kann für den Verlauf der Infektion geradezu ausschlaggebend sein. Bei völlig gesunden Menschen werden die Kommabacillen oft schon der Abtödtung durch den Wirt unterliegen. Sind sie trotzdem in den Darm eingedrungen, so können sie bei manchen Menschen überhaupt nicht oder nur in ganz geringer Weise zur Wucherung und verschwinden in einigen Tagen vollständig. Bei anderen Menschen mit normalem Darm scheinen sie sich stark zu vermehren, aber nur gesteigerte Transsudation in den Darm zu veranlassen und nur beunruhigende Krankheitssymptome hervorzurufen. Erst unter abnormen Bedingungen erfolgt plötzlich schwere Erkrankung. Daher verleiht nach allen Erfahrungen das einmalige Ueberleben der Cholera in den meisten Fällen eine gewisse Immunität; besitzt diese Immunität nicht bei allen Befallenen gleich deutliche Dauer und ist von sehr verschiedener, meist nur einige Monate, ein Jahr und länger währenden Dauer.

Die Verbreitungsweise der Cholera, wie sie sich aus den im Folgenden aufgeführten, durch Beobachtung und Experiment festgestellten Eigenschaften des Kommabacillus ergibt, deckt sich vollständig mit dem, was durch epidemiologische Beobachtung ermittelt ist.

Es ist zunächst in sehr vielen Einzelfällen constatirt, dass die Cholera vom Kranken auf die in seiner Nähe befindlichen gesunden Menschen durch Berührungen übertragen wird (Contactcholera). Die Incubationszeit beträgt 2—6 Tage. — Durch den Cholerakranken kann die Wäsche erfolgt die Verschleppung der Krankheit in bis dahin gesunde Orte. Zuweilen geschieht dies auf sehr weite Entfernungen. So wurde (1865) die Cholera von Odessa nach Altenburg verschleppt; dort erfolgt die Verbreitung durch den Naheverkehr. Nach der Verschleppung stecken sich an dem ersten Fall gewöhnlich einige Angehörige; von diesen greift die Krankheit allmählich auf Nachbarn, auf nahe verwandte Verwandte, auf Arbeitsgenossen u. dgl. über. Die Fäden, durch welche nach einander Erkrankten verknüpfen, sind oft mit Bestimmtheit nachzuweisen.

Die ersten Cholerakranken aus einer Gegend häufen sich bei ungeschultem Personal, bei armer unreinlicher Bevölkerung und in überfüllten Wohnungen, bei sorgloser Behandlung der Cholerawäsche u. s. w. die Infektionen durch Berührungen, Fliegen und Nahrungsmittel. Die Kranken sind Aerzte, das geschulte Pflegepersonal der Lazarethe, reinigende Menschen, die mit beschmutzten Fingern weder Mund noch Nahrungsmittel berühren und die Nahrungsmittel nicht in dem Haus aufbewahren, keiner Infektion ausgesetzt.

Vielfach sind aber Choleraepidemien constatirt, welche einem wesentlich anderen Typus zeigen: es sind dies die explosionsartig ausbrechenden Massenepidemien. Diese konnten stets auf eine Infektion der gemeinsamen Wasserversorgung zurückgeführt werden (Hamburg, Nettleben). Dagegen hat man sehr oft beobachtet, dass Städte, die ein der Infektion nicht zugängliches Wasser benutzen, von explosionsartigen Choleraepidemien sicher verschont bleiben, oder dass früher ergriffene Städte nicht wieder ergriffen wurden, nachdem sie eine tadellose Wasserversorgung eingeführt hatten (Waisenhaus in Halle a. S., Calcutta, Altona u. a. m.).

Von verschiedenen Epidemiologen (v. PETTENKOFER) ist darauf hingewiesen worden, dass sich manche Eigenthümlichkeiten in der örtlichen und zeitlichen Vertheilung der Choleraepidemien nicht mit Hilfe jener Lebens Eigenschaften des Kommabacillus genügend erklären lassen, sondern dass dies nur gelinge unter der Annahme eines vom Boden ausgehenden örtlich und zeitlich wechselnden Einflusses.

Thatsächlich beobachtet man, dass die Cholera in den befallenen Ländern, Provinzen und Städten nicht eine gleichmässige Ausbreitung zeigt, sondern dass starke örtliche Verschiedenheiten hervortreten. Manche Provinzen und Städte werden auch bei wiederholten Zügen der Cholera stets in auffällig geringem Grade ergriffen. Einige grössere Städte blieben bisher völlig von Cholera verschont (Rouen, Versailles, Hannover, Stuttgart, Frankfurt a. M.). — Auch innerhalb ein- und derselben Stadt treten örtliche Unterschiede in der Cholerafrequenz hervor.

Ebenso ist die jahreszeitliche Vertheilung der Cholerafälle keine gleichmässige, sondern zeigt auffallend starke Schwankungen. Im endemischen Gebiet der Cholera pflegt die Frequenz im Laufe der Regenzeit allmählich abzunehmen, in der regenlosen Zeit und im ersten Anfang der Regenzeit zu steigen. In Mitteleuropa tritt die Cholera vorzugsweise im Spätsommer und Herbst epidemisch auf; in den Gegenden, wo der Tiefstand des Grundwassers in den Herbst zu fallen pflegt, trifft das Maximum der Cholera ungefähr mit dem tiefsten Stande des Grundwassers zusammen, wie aus folgender Tabelle hervorgeht.

Indess erklären sich alle diese örtlichen und zeitlichen Differenzen sehr wohl aus selbstverständlichen Verschiedenheiten in Bezug auf die Behandlung der Infektionsquellen, die Gangbarkeit der Transportwege und die persönliche Empfänglichkeit.

Örtliche Differenzen kommen schon dadurch zu Stande, dass der eine Ort resp. das eine Land der Einschleppung viel stärker ausgesetzt ist, als andere. Grosse Hafenstädte, die östlichen Provinzen Deutschlands sind stärker exponirt als im Innern gelegene Städte und Provinzen. Ferner verringern alle die oben (S. 621) besprochenen Momente, z. B. gute Organisation der Anzeigepflicht, Vorkehrungen zur Isolirung des Kranken und zur Desinfektion, gute Schwemmcanalisation u. s. w. die Chancen der Ausbreitung für eine Stadt. In demselben Sinne wirkt gut geschultes Pflegepersonal, sorgfältige Behandlung der Nahrung, tadellose Wasserversorgung, mässige Lebensweise. Viele dieser, die Disposition herabsetzenden Einflüsse gehen Hand in Hand mit Wohlhabenheit, geringer Wohndichtigkeit und Gewöhnung an Reinlichkeit. Vergleichende Untersuchungen zeigen dementsprechend, dass die Cholerafrequenz in auffälliger Weise

	München			Preussen		
	Cholera (1885 bis 1884)	Regen (28jähr. Mittel)	Grund- wasser ¹	Cholera (1848—59 Preussen)	Regen (Berlin 16 jähr. Mittel)	Grund- wasser ² (Berlin)
		mm			mm	
r	442	53.3	0.55	4576	40.3	0.72
ar	94	29.6	0.54	1596	34.8	0.79
.	78	48.5	0.60	340	46.6	0.88
.	30	55.6	0.64	181	32.1	0.96
.	—	95.1	0.67	842	39.8	0.88
.	1	111.9	0.72	8713	62.2	0.69
.	15	108.8	0.73	16672	66.2	0.56
it	1868	104.4	0.72	63728	60.2	0.45
nber . . .	1066	68.1	0.63	102810	40.8	0.40
er	138	53.1	0.54	65777	57.5	0.38
nber . . .	651	50.0	0.49	32836	44.5	0.47
nber . . .	861	42.9	0.51	13765	46.2	0.50

mt in Provinzen und Städten mit geringer Wohlhabenheit und grosser dichtigkeit. Wie sehr auch innerhalb derselben Stadt die Armen von holera bevorzugt werden, geht z. B. aus einer von Kösser für Budapest stellten Statistik hervor. Danach betrug die Intensität des Auftretens der Krankheiten bei Armen, wenn die Intensität bei Wohlhabenden 0 gesetzt wird,

für Cholera	211	für Typhus	114
„ Blattern	174	„ Masern	108
„ Phthise	148	„ Keuchhusten . . .	73

Auch das zeitliche Vorherrschen der Cholera im Spätsommer und Herbst n übrigens zahlreiche Ausnahmen vorkommen, z. B. die Winterepidemien nchen, Schlesien, Petersburg u. s. w.) erklärt sich aus ähnlichen Momenten. ermehrungsfähigkeit der Kommabacillen im Flusswasser bei höherer Tempe- die Verschleppung des Contagium, durch Fliegen, der vermehrte Genuss Vasser und roher Nahrung, namentlich aber die in dieser Jahreszeit bei sehr grossen Theil der Bevölkerung verbreiteten Verdauungsstörungen die damit gegebene individuelle Disposition einer ganzen Bevölkerung, ren ungezwungen das häufige Anschwellen der Epidemien gerade im st. Aber andererseits sind alle diese Momente nicht derart unumgänglich licher resp. nicht so ausschliesslich auf den Herbst beschränkt, dass nicht zu anderer Zeit gelegentlich Epidemien vorkommen könnten, und dement- hend fällt auch die Akme manchmal in den Winter, manchmal in das Frühjahr. Somit bleibt im Grunde kein Raum für irgend ein anderes, neben dem nabacillus die örtliche und zeitliche Ausbreitung der Cholera in maass- der Weise beeinflussendes Moment. Tritt hier und da das Bedürfniss

¹ Grundwasserstand über dem Nullpunkt; letzterer 515 m über dem Adria- n Meer (nach Soyka).

² Nullpunkt 32 m über dem Adriatischen Meer (nach Soyka).

hervor, mitwirkende Ursachen für eine auffällige örtliche oder zeitliche Verteilung der Cholerafrequenz heranzuziehen, so liegt es am nächsten, auf die noch wenig erforschte individuelle Empfänglichkeit, vielleicht auch auf die Möglichkeit einer Mitwirkung anderer Darmbakterien zurückzugreifen.

Dass aber, wie es die Ansicht der Lokalistens ist, der Boden und das Grundwasser irgend welchen directen Einfluss auf den Choleraerreger und dadurch auf die Cholerafrequenz ausübe, dafür fehlen alle Anhaltspunkte. Die Beweise, welche für einen solchen Zusammenhang hervorgebracht wurden, haben sich sämtlich nicht als stichhaltig erwiesen. Den Fällen, wo ein Fels- oder Lehmboden Choleraimmunität und durchlässiger Boden Disposition bewirkt haben sollte, stehen andere Beobachtungen gegenüber, wo gerade die gegenteilige Beziehung herrschte. Auch die Grundwasserbewegung zeigt sehr oft Abweichungen von der behaupteten Congruenz mit der Choleraausbreitung, und da, wo die Congruenz vorhanden ist, erklärt sie sich ungeszwungen daraus, dass sowohl die Choleraakme wie der niedrigste Grundwasserstand in den Herbst fallen. So lange aber nicht zwingende Thatsachen uns auf einen Zusammenhang der Cholerafrequenz mit dem Boden hinweisen, müssen wir schon deshalb von der Bodenhypothese absehen, weil sie nicht im mindesten zur Aufklärung beizutragen vermag, sondern nur verdunkelt. Denn nach allem, was jetzt über die Beziehungen zwischen Boden und Mikroorganismen experimentell ermittelt ist (s. S. 193), können wir uns gar keine begründete Vorstellung darüber machen, wie der Choleraerreger in den Boden hinein- und aus dem Boden herausgelangen oder in welcher Weise sonst irgendwie der Boden auf den Infektionserreger resp. auf den Infektionsvorgang von Einfluss sein sollte.

Prophylaktische Maassregeln. Sehr wichtig ist die Vorbereitung jeder Stadt durch Bekämpfung der lokalen Disposition im contagionistischen Sinne, d. h. durch Beschaffung von Isolirspitälern, geschulten Pflegern, Kranken-Transportwagen, Desinfektionskolonnen, Canalisation u. s. w.

Die Hinderung der Einschleppung ist nach den von der Dresdener Cholera-Conferenz 1893 gefassten Beschlüssen zu regeln. Sie erfolgt in den Häfen durch Revision und Quarantäne der aus versuchten Ländern kommenden Schiffe (nach den S. 561 gegebenen Grundsätzen), an den gefährdeten Stellen der Landesgrenzen durch Revision der im täglichen Verkehr die Grenze passirenden Arbeiter, Händler u. s. w. und Isolirung der Erkrankten. Eine Revision und Desinfektion der Eisenbahnreisenden und ihres Gepäcks ist überflüssig. — Strengere Maassregeln sind gegenüber dem Verkehr auf schiffbaren Flüssen indiciert. Auf besonderen Controlstationen sind dort die Schiffe anzuhaken, das Personal ärztlich zu untersuchen; wenn Choleraverdächtige gefunden werden, sind diese nebst dem übrigen Insassen des Schiffs in eine Isolirbaracke zu schaffen, das Schiff ist zu desinficiren und hat zügige Quarantäne durchzumachen. In Bezug auf Waaren hat die Dresdener Conferenz bestimmt, dass Einfuhrverbote gegen versuchte Länder und Ausfuhrverbote von Choleraherden aus

assen werden dürfen bzw. müssen für Leibwäsche, getragene Kleider, brauchtes Bettzeug und solche Lumpen, welche noch nicht in der Grosshandel üblichen Weise hergerichtet und verpackt sind. Von deren Waaren sind nur solche einer Desinfektion zu unterziehen, an denen anzunehmen ist, dass sie thatsächlich mit Choleraentleerungen schmutzt sind. Der Briefverkehr soll von Beschränkungen völlig frei bleiben; die Behandlung von Postpaketen richtet sich je nach dem Inhalt nach den für Waaren im Allgemeinen gegebenen Bestimmungen.

Die Isolirung des Erkrankten soll, wenn dieser zustimmt, in dem Lazareth geschehen, namentlich bei den ersten Fällen. Gegen den Willen des Erkrankten sollte die Ueberführung nur ausnahmsweise wirkt werden, da rigorose Maassregeln leicht zu der besonders zu achtenden Verheimlichung von Erkrankungen führen. Die Absperrung im Hause muss unter Zuziehung geschulter und mit der Desinfektion vertrauter Pfleger geschehen. Die Desinfektion während und nach Ablauf der Krankheit hat nach den oben gegebenen Vorschriften zu erfolgen. Leichen sind nur vom Leichenhaus (Lazareth) aus zu bestatten. Von da aus darf nach vorschriftsmässigem Einsargen ein Leichengefolge erlaubt werden.

Für Beschaffung unverdächtigen Wassers (event. durch Abyssinierinnen) ist zu sorgen; bei Flusswasserversorgungen muss der Filtertrieb sorgfältig controlirt werden; steht kein anderes als verdächtiges Wasser zur Verfügung, so ist alles zur Verwendung gelangende Wasser Minuten zu kochen. — Verdächtige Nahrungsmittel sind vor dem Essen zu kochen resp. trockener Hitze auszusetzen.

Die persönliche Empfänglichkeit ist durch vorsichtige Lebensweise und sorgfältige Beachtung jeder gastrischen Störung herabzusetzen. Die Bevölkerung ist durch öffentliche Bekanntmachungen über den nachtheiligen Einfluss penibelster Reinlichkeit und der Sorgfalt in der Vorbereitung der Nahrung, sowie über die Gefahr, welche Excesse und Abstrichismen bedingen, zu belehren. — Schutzimpfungen nach der LEFKINE-PFEIFFER'schen Methode können unter den S. 616 dargestellten Einschränkungen Verwendung finden und zur Eindämmung der Seuche beitragen.

4. Abdominaltyphus.

Der Procentsatz, mit welchem sich der Abdominaltyphus an der Bevölkerung theilnimmt, ist im Allgemeinen kein bedeutender (1 bis 2 Procent); jedoch ist das zeitweise Auftreten in stärkeren Epidemien signalisirt, Beunruhigung hervorzurufen.

Als ursächliche Erreger des Abdominaltyphus sind ausschliesslich die S. 62 beschriebenen Bacillen anzusehen. In die menschliche Umgebung gelangen dieselben vorzugsweise durch die Absonderungen, die Wäsche u. s. w. von Typhuskranken. Zwischen Infektion und Ausbruch der Krankheit liegt im Mittel eine Inkubationszeit von 2—3 Wochen. Dass die Bacillen in ähnlicher Verbreitung wie Saprophyten im Boden oder Wasser vorhanden sind, oder dass sie aus verbreiteten Saprophyten gelegentlich entstehen, ist nach dem jetzigen Stande der Forschung nicht anzunehmen.

Als Infektionsquellen kommen die Dejektionen und der Harn des Kranken in Betracht, und zwar auch von leicht Kranken, die oft erst nach Wochen oder überhaupt nicht bettlägerig sind, sowie von Reconvalescenten, deren Harn namentlich noch nach Monaten zeitweise Massen von Typhusbacillen enthalten kann. Da die Typhusbacillen sowohl im trockenen Zustande wie namentlich auch in flüssigen Substraten in Gemeinschaft mit Saprophyten mehrere Monate lebensfähig bleiben, erstrecken sich die Infektionsquellen erheblich weiter, als z. B. bei der Cholera: nicht nur Wäsche, Kleider (Beinkleider) u. s. w. können infektiös sein, sondern auch der Tonnen- und Grubeninhalt, in welchen Typhusinjektionen gelangt sind, die Bodenoberfläche, auf welche Dejektionen entleert sind, oder Ackererde, die mit solchem Grubeninhalt gedüngt war. — Von der Bodenoberfläche aus oder durch das Spülwasser der Wäsche können die Bacillen ferner in Schachtbrunnen gerathen und das Trinkwasser inficiren; noch leichter erfolgt diese Infektion, wenn das Trink- und Brauchwasser aus einem Flusse bezogen wird, welcher die Abwässer aus Wohnungen oder von Schiffen aufnimmt.

Innerhalb des Wohnhauses können Theilchen der Dejektionen leicht auf Nahrungsmittel gelangen (z. B. in Milch); und hier wird unter günstigen Umständen eine Vermehrung der Erreger stattfinden. Auch im Boden und Wasser vermögen die Typhusbacillen wohl unter gewissen Umständen eine Vermehrung zu erfahren, ohne dass jedoch hierdurch eine wesentlich grössere Infektionsgefahr zu Stande kommt.

Als Transportwege fungiren zunächst Berührungen von Infektionsquellen einerseits, des Mundes andererseits. Bei Wärtern und Angehörigen bestehen erhebliche Chancen für diesen Infektionsmodus; man beobachtet in Folge dessen nicht selten, dass das Wartepersonal der Typhusstation in Hospitälern und ebenso die Wäscherinnen, welche die Wäsche der Typhuskranken zu besorgen haben, inficirt werden. Kommen solche Fälle schon bei einem geschulten Personal und in gut eingerichteten Krankenhäusern vor, so ist kein Zweifel, dass in

Privatquartieren diese Art der Uebertragung ausserordentlich viel häufiger sich ereignen und geradezu einen erheblichen Procentatz der Infektionen veranlassen wird. Bei dichter Bewohnung, schlechter Entfernung der Abfallstoffe, Verunreinigung der Bodenoberfläche in der Nähe der Wohnung können sich sehr umfangreiche, rasch ansteigende Contactepidemien entwickeln, die dem Verlauf der Wasserepidemien ähnlich sind.

Der zweite häufig vorkommende Infektionsmodus ist der durch das Trinkwasser. Derselbe liegt namentlich plötzlich ausbrechenden Epidemien zu Grunde. Werden centrale Wasserleitungen inficirt, oder wiederum Flusswasserleitungen besonders disponirt sind, so können gleichzeitige Masseninfektionen von enormem Umfang entstehen (Liegnitz, Fünfkirchen). Ferner werden oft kleinere, scharf begrenzte Gruppenkrankungen beobachtet, bei welchen constatirt ist, dass alle Erkrankten aus dem gleichen, gegen verdächtige Einflüsse nicht genügend geschützten Brunnen getrunken hatten. Nicht selten kommt es zur Infektion bisher unverdächtigter Brunnen und Quellen durch abnorm starke Niederschläge, Schneeschmelze, Ueberschwemmungen, welche ein Einsickern von Oberflächenwasser bewirken. — Einige Male scheinen an verdächtigen Brunnen auch echte Typhusbacillen nachgewiesen zu sein, während meistens Verwechselungen mit ähnlichen Bakterien nicht genügend ausgeschlossen sind. Ausserdem ist des Oefteren constatirt, dass Ortschaften, die mit reinem Quell- und Leitungswasser versorgt sind, relativ wenig unter Abdominaltyphus zu leiden haben und dass eine gut angelegte Wasserversorgung in derselben Stadt eine Verringerung der Erkrankungsfälle verursachte. — An die steil aufsteigende Curve der durch Wasser verursachten Erkrankungen schliesst sich nach Ablauf von etwa 4 Wochen meist eine neue Erhebung der Curve an, die durch Kontakte von den zahlreichen Ersterkrankten aus verursacht ist.

Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass bei Aerzten und Laien eine entschiedene Neigung besteht, alle Typhusinfektionen ohne Weiteres auf Verunreinigung des Wassers zu setzen. Zur Zeit lautet fast jedes ärztliche Gutachten über die Aetiologie einer Typhusepidemie dahin, dass im Wasser die Ursache zu suchen sei. Man sucht dabei entweder zu zeigen, dass die am Typhus Erkrankten ihr Wasser sämmtlich aus einem bestimmten Brunnen bezogen haben und dass sonst Nichts den Kranken Gemeinsames und der Infektion Verdächtiges vorgelegen hat; also die Uebereinstimmung der lokalen Begrenzung der Epidemie mit der lokalen Begrenzung des Versorgungsbereichs des Brunnens bildet das Argument. Dieser Beweis ist aber oft nicht fehlerfrei, weil man dabei auf die Aussagen zahlreicher Menschen angewiesen ist, die gewöhnlich derartigen Erhebungen ein grosses Misstrauen entgegenbringen und oft nicht die Wahrheit sagen. Durchaus unrichtig würde es sein, wollte man sich etwa nur auf die Aussagen der Erkrankten beschränken. Ist der Versorgungs-

bereich des Brunnens sehr gross, haben z. B. 500 Menschen daraus getrunken und 3 oder 4 sind erkrankt, so spricht das nicht für Infektiosität des Wassers, die vielleicht durch ausschliessliches Befragen der Erkrankten wahrscheinlich geworden wäre. — Zu bedenken ist, dass mit aller Sicherheit viele Fälle von Gruppenerkrankungen beobachtet sind, wo eine Infektion durch Wasser ausschliessen und durch Milch, begünstigte Kontakte u. a. w. erfolgt war. — Eine andere Art der Beweisführung stützt sich darauf, dass der verdächtige Brunnen geschlossen wurde und dass dann nach einiger Zeit die Epidemie aufhörte. Da wir aber wissen, dass die Typhusepidemien fast stets einen zeitlich begrenzten Verlauf haben, auch ohne dass irgend etwas am Brunnen geschieht, und da sehr häufig die Schliessung des Brunnens erst nach längerer Dauer der Epidemie zur Ausführung gelangt, zu einer Zeit, wo auch ohne jeden Eingriff ein Aufhören der Epidemie wahrscheinlich war, so ist es keineswegs ohne Weiteres zulässig, in dem Brunnenschluss den Grund für die Beseitigung der Infektionsquelle zu erblicken.

Diese Skepsis, die für die wissenschaftliche Beweisführung unerlässlich ist, darf natürlich nicht hindern, dass in der Praxis jeder Brunnen als verdächtig bezeichnet und einstweilen geschlossen wird, in den möglicher Weise infektiöses Abwasser gelangen können. Eine völlig sichere Aufklärung der Aetiologie gelingt eben beim Typhus schon wegen der langen Inkubationszeit selten und man muss daher praktisch meistens mit Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten rechnen.

Drittens können Infektionen durch Nahrung stattfinden; einmal durch solche pflanzliche Nahrungsmittel, welche aus einem mit Typhusbacillen imprägnirten Boden stammen. Gemüse aus Garten- und Ackerland, welches unmittelbar an die Stadt grenzt und mit frischem Tonnen- und Grubenhalt aus städtischen Häusern gedüngt ist, bietet besondere Infektionsgefahr. Ferner kann der Genuss von Nahrungsmitteln, welche in der Wohnung mit Infektionsquellen (z. B. auch mit infektiösem Staub von angrenzendem Gartenland) in Berührung gekommen sind, die Uebertragung bewirken.

Selten wird eine Infektion durch Einathmung erfolgen. Vielleicht mag es in der Nähe von Gartenland, das mit infektiösem Material gedüngt ist, gelegentlich zu einer Aufnahme von Typhusbacillen mit der Inspirationsluft und demnächst zum Verschlucken des mit den Keimen beladenen Schleims und Speichels kommen. Für gewöhnlich werden da, wo die Möglichkeit zu dieser Art der Infektion gegeben ist, die übrigen Transportwege stets breiter und betretener sein.

Die individuelle Disposition scheint ähnlich wie bei der Cholera von grosser Bedeutung zu sein. Sie ist zwischen dem 15. und 30. Lebensjahre am grössten. Gastricismen, Obstipation befördern anscheinend die Entstehung der Krankheit; Gemüthsbewegungen wohl nur insofern, als sie leicht zu Gastricismen und zu grosser Sorglosigkeit in der Nahrungsaufnahme führen. — Nach einmaligem Ueberstehen der

krankheit bleibt eine Immunität gewöhnlich für lange Zeit zurück; zuweilen sind Recidive nach 5—10 Jahren beobachtet.

Eine ausgesprochene örtliche Disposition zeigt der Abdominaltyphus nicht. Immune Zonen, Länder und Orte existiren nicht. In Island, Finnland, Mittel- und Südeuropa, Indien, Cochinchina, China, Australien, Capland, Nord-, Mittel- und Südamerika kommt Abdominaltyphus in grosser Ausdehnung vor. Länder, die man früher wohl für immun gehalten hat, wie Indien, Algier, haben seither nachweislich schwere Typhusepidemien durchgemacht. Eine vermeintliche Immunität einzelner Städte besteht immer nur für einige Jahre, wir sehen, dass gerade der Abdominaltyphus ungemein starke Schwankungen der Frequenz an demselben Orte zeigt und dass Perioden grösserer und geringerer Typhusmortalität abwechseln. Diese Schwankungen erschweren die Vergleichung verschiedener Städte bedeutend, und lassen eine solche nur innerhalb sehr langer Zeiträume zulässig erscheinen. Uebrigens sind gewisse Differenzen der örtlichen Frequenz selbstverständlich, da nach der Art des Wasserbezugs, der Entfernung der Abfallstoffe u. s. w. die Infektionsgelegenheiten in verschiedenen Städten erheblich variiren.

Auch eine deutliche zeitliche Disposition macht sich beim Auftreten des Abdominaltyphus nicht immer bemerkbar, wie aus folgender (dem Werke von Hirsch entnommenen) Tabelle hervorgeht:

			Sommer	Herbst	Winter	Frühling
Schweden	1858—77	Kranke	44 750	49 334	51 573	42 354
Hamburg	1873—80	Todte	286	390	453	817
Berlin . .	1854—79	„	3 625	5 384	3 100	2 685
Breslau . .	1863—78	„	646	774	591	510
Eipzig . .	1851—65	Kranke	299	378	236	139
Prag . . .	1874—76	„	237	239	428	335
Bayern . .	1857—70	Todte	10 758	11 648	12 722	12 037
München .	1852—68 u. 1873—79	„	1 164	1 153	2 120	1 691
Basel . . .	1824—73	„	557	710	528	418
London . .	1848—62	Kranke	716	1 072	541	328
Paris . . .	1867—78	Todte	1 005	1 646	928	573

Die für ganze Länder erhobenen Zahlen zeigen so gut wie keine jahreszeitliche Schwankung. In der Mehrzahl der Städte ist aber eine Steigerung der Typhusfälle im Herbst bemerkbar; in München und Prag liegt die Akme im Winter. Die Steigerung der Frequenz im Herbst ist dem Abdominaltyphus mit den verschiedensten Erkrankungen der Verdauungsorgane gemeinsam und vermuthlich zum Theil auf die gesteigerte Disposition zu allen Verdauungskrankheiten zurückzuführen. Bei der Verbreitung des Typhus durch Wasser tritt ausserdem vielleicht ähnlich wie bei der Cholera in der hohen Temperatur des Wassers im Herbst ein einflussreiches Moment gegeben. Auch die in dieser Jahreszeit besonders starke Verunreinigung der Bodenoberfläche mit infektiösen Keimen, sowie Gebräuche bei der Feld- und Gartenarbeit, das Aufbringen des Düngers und das Einholen der Gemüse mögen von Einfluss auf die herbstliche Akme sein.

Nach v. PETTENKOFER ist die Typhusfrequenz in vielen Städten vom Grundwasserstande abhängig. In der That ist in München, Salzburg, Frankfurt a. M., Berlin u. s. w. regelmässig ein Zusammenfallen der höchsten Frequenz mit dem Absinken des Grundwassers beobachtet, und diese Coincidenz ist um so auffallender, als sie an einigen Orten unbekümmert um die Jahreszeit auftritt; in Berlin im Spätsommer und Herbst, in München im Winter. Im Kap. IV. ist dargelegt, weshalb trotzdem die von PETTENKOFER gezogenen Folgerungen einer bedeutungsvollen Rolle des tieferen Bodens und des Grundwassers nicht als richtig anerkannt werden können. Vielmehr verweist uns dieser Zusammenhang lediglich auf eine gewisse Bedeutung der Beschaffenheit der Bodenoberfläche, wenn nicht die eigenthümliche Coincidenz in völlig anderer Weise durch abweichende Sitten und Gebräuche ihre schliessliche Erklärung findet.

Vor allem würde es aber durchaus unrichtig sein, wollte man die gesammten Typhusfälle als abhängig vom Grundwasserstande bezeichnen. Die Steigerung, welche die Zahl der Typhusfälle in dem Quartal mit niedrigstem Grundwasserstand über die durchschnittliche Zahl der anderen Quartale erfährt, beträgt nur 10–20 Procent der gesammten Typhusfälle (in Berlin 17 Procent). Liegt wirklich in dem Sinken des Grundwassers ein die Ausbreitung des Typhus begünstigendes Moment, so wirkt dasselbe demnach jedenfalls nur auf einen kleinen Bruchtheil aller Typhusfälle, und der ganze grosse Rest kommt auch ohne diese Mitwirkung und trotz Ansteigens und Hochstandes des Grundwassers zu Stande.

Die prophylaktischen Maassnahmen sind ähnlich wie die gegen die Cholera empfohlenen. Sie bestehen in Isolirung, organisirter Krankenpflege und Desinfection; ferner in guter Beseitigung der Abfallstoffe und Sorge für gutes Wasser aus Brunnen oder centralen Leitungen. Besondere Vorsichtsmaassregeln sind anzuwenden, wenn in Milchwirthschaften, Schlächtereien und Gemüsehandlungen Typhusfälle vorkommen. In Zeiten von Epidemien ist es empfehlenswerth, die Nahrung nur in gut gekochtem Zustand zu geniessen. Das Pflegepersonal muss durch genaue Instruction, durch täglich mehrmals vorzunehmende Desinfection der Hände, und durch sofortige Beseitigung der inficirten Wäsche geschützt werden. Für Angehörige und Pfleger empfiehlt sich unter besonderen Umständen eine Schutzimpfung nach dem PFEIFFER-KOLLE'schen Verfahren.

5. Variola.

Ueber *Cytoryctes variolae*, die als Erreger der Pocken angesprochene Amöbenart s. S. 82. — Das Contagium ist in den Hautschuppen, dem Sputum und Nasensekret der Kranken enthalten. Es ist im trockenen Zustand lange Zeit, nach einzelnen Angaben über drei Jahre, lebensfähig. Wäsche, Kleider und alle sonstigen vom Kranken benutzten Gebrauchsgegenstände repräsentiren daher gefährliche Infektionsquellen, die auch ohne dass sichtbare Beschmutzung vorliegt, Massen von In-

sektionserregern enthalten können. Ebenso ist die Luft der Krankenzimmer als bedenkliche Infektionsquelle anzusehen, da sie das Contagium sowohl in Form von Tröpfchen, die beim Husten und Sprechen versprüht sind, als auch in Form von trockenem Staub enthalten kann.

Als Transportwege fungiren vor allem Berührungen der verschiedensten Art, directe und indirecte; ferner die Einathmung der Luft von Krankenzimmern. Auch die Luft im Freien soll in der Nähe von Pockenspitälern die Uebertragung der Krankheit mehrfach bewirkt haben; jedoch ist in keinem dieser Fälle jeder andere Infektionsmodus sicher auszuschliessen. Gelegentlich kann der Transport der Erreger auch durch Nahrungsmittel (Milch) und durch Insecten erfolgen.

Die individuelle Empfänglichkeit erstreckt sich auf alle Lebensalter. Eine im Mittel zehn Jahre und länger dauernde Immunität wird durch Ueberstehen der Krankheit bewirkt; in einzelnen Ausnahmefällen scheinen frühere Recidive vorzukommen.

Eine örtliche Disposition tritt in manchen Ländern hervor. So veranlassten die Pocken in den einzelnen Provinzen Preussens 1816—1874 folgende Todesfälle pro 100000 Einwohner:

Provinz Preussen	13.8	Provinz Schlesien	9.6
„ Brandenburg	9.8	„ Sachsen	7.3
„ Pommern	8.1	„ Westfalen	7.0
„ Posen	21.0	„ Rheinland	5.5

Führt man die Berechnung nach kleineren Bezirken durch, so erhält man noch weit stärkere Differenzen; z. B. im Reg.-Bez. Aurich 1.0; Schleswig 1.8; Wiesbaden 2.2; dagegen in Bromberg 22.4 pro 10000.

Diese örtliche Disposition harmonirt mit der Häufigkeit der Einschleppung von verseuchten Ländern, namentlich aber mit der Wohlhabenheit der Provinzen und den mit dieser variirenden Sitten und Gebräuchen. Die schlechten Wohnverhältnisse in den östlichen Landestheilen, die längere Dauer des Winters daselbst, welche zu längerem Aufenthalt in geschlossenen Räumen nöthigt, die geringere körperliche Reinlichkeit der dort vorhandenen slavischen Volksreste, namentlich auch die schwierigere Durchführung der allgemeinen Impfung begünstigen die Uebertragung der Krankheit. — Zur Heranziehung irgend welcher anderer der Lokalität anhaftender Einflüsse auf die örtliche Vertheilung der Pocken liegt keinerlei Anlass vor.

Zeitliche Schwankungen finden sich mehrfach; z. B. in tropischen und subtropischen Gegenden und besonders da, wo starke Contraste zwischen Sommer und Winter hervortreten. Die stärkere Häufung der Pocken erfolgt regelmässig im Winter und erklärt sich, wie bereits S. 133 näher ausgeführt wurde, durch den vermehrten Aufenthalt der

Menschen in geschlossenen Räumen und die Erschwerung der Reinigung von Körper, Kleidung und Wohnung.

Die prophylaktischen Maassregeln können sich zunächst auf strenge Absperrung des Kranken (im Isolirspital), auf Pflege durch geschulte und gegen Pocken immune Wärter, auf energische Desinfektion während und nach der Krankheit und schleunige Schutzimpfung der einer Ansteckung exponirten Personen erstrecken. — Da aber der Kranke meist schon ehe die Erkrankung zur Kenntniss der Behörden gelangt, weitere Uebertragungen veranlasst hat, und da gegenüber einer grösseren Zahl von Erkrankten Isolirung und Desinfektion nicht überall mit der hier nöthigen und allein wirksamen rigorosen Strenge durchzuführen ist, so reichen unsere sonst üblichen prophylaktischen Maassnahmen zur Bekämpfung dieser Krankheit oft nicht aus. Es wird dies durch die neuere Pockenstatistik derjenigen Länder und Städte bestätigt (Frankreich, Oesterreich), in welchen die moderne Desinfektionstechnik bereits seit mehreren Jahren Eingang gefunden hat und eine Isolirung der Erkrankten seit lange versucht ist, ohne dass eine Hemmung der Ausbreitung gelungen wäre (s. unten).

Bei den Pocken bietet andererseits eine Schutzimpfung besonders günstige Aussichten, weil hier ein Impfstoff vorhanden ist, der mit ausserordentlicher Zähigkeit seinen bestimmten Virulenzgrad beibehält, der ferner eine sehr mässige, durchaus unbedenkliche Impfkrankheit erzeugt und schliesslich einen sicheren Impfschutz auf die Dauer von nahezu 12 Jahren und länger gewährt.

Dieser Impfstoff ist von dem englischen Landarzt EDWARD JENNER in der Lymphe der Kuhpocke entdeckt. Die Kuhpocken entstehen durch zufällige Uebertragung menschlicher Variola (besonders beim Melken), seit Einführung der Impfung auch durch Vaccinepusteln, und repräsentiren eine abgeschwächte Varietät des Pockenvirus, die unter dem Einfluss des wenig empfänglichen Körpers der Kuh oder des Kalbes entsteht. Die Kuhpocken befallen vorzugsweise weibliche Thiere, die dann unter 2—3 tägigem Fieber erkranken und am Euter Pusteln zeigen, deren Sekret beim Menschen ähnliche Pusteln hervorruft. JENNER fand den Volksglauben, dass das Ueberstehen der Kuhpocken gegen Variola Schutz verleihe, bereits vor, er lieferte aber im Jahre 1796 erst den bestimmten Beweis für diese Schutzkraft dadurch, dass er die mit Kuhpocken geimpften Menschen nachher mit echten Pocken inficirte, ein Experiment, welches ihm durch die damalige Sitte der Variolation ermöglicht wurde. Ferner zeigte JENNER, dass die Uebertragung der Kuhpocken von Mensch zu Mensch möglich sei und dass dieser humanisirte Impfstoff die gleiche Schutzkraft äussert, wie der vom Thier stammende animale Impfstoff. Dadurch wurde in damaliger Zeit, wo man die Kuhpocken für eine besondere, nur spontan und selten auftretende Krankheit hielt, und wo man von deren künstlicher Uebertragbarkeit von Thier zu Thier noch nichts wusste, überhaupt erst die Ausführbarkeit der Impfung in grossem Maassstabe und ein Impfwang möglich.

Ohne die gesetzliche Einführung eines allgemeinen Impfwangs erwies sich die JENNER'sche Schutzimpfung nicht genügend, um die Ausbreitung der Pocken zu hemmen. Viele entziehen sich aus Leichtsinne oder Unglauben der Impfung; durch diese werden dann auch alle die zahlreichen Menschen in Gefahr gebracht, bei welchen durch ungenügend ausgeführte, erfolglose oder nicht rechtzeitig wiederholte Impfung der Impfschutz ausgeblieben war.

In Deutschland ist daher gesetzlich bestimmt, dass jedes Kind vor Ablauf des Kalenderjahres, welches auf das Geburtsjahr folgt, zum ersten Male, im Ablauf des Jahres, in welchem die Kinder ihr 12. Lebensjahr vollenden, zum zweiten Male (Revaccination) geimpft wird. Der gesetzlichen Pflicht ist obzuliegen, wenn mindestens eine Impfpustel entwickelt ist; wünschenswerth ist die Entwicklung von vier Pusteln, da sich gezeigt hat, dass der Grad der Schutzimpfung von der Zahl der entwickelten Pusteln abhängig ist. (Pockenranke mit einer schlechten Narbe lieferten noch 12 Procent Todesfälle, solche mit zwei guten Narben 2-3 Procent, mit vier guten Narben 0.05 Procent.)

Der Impfwang erscheint indess nur dann gerechtfertigt, wenn der Schutz gegen Variola unzweifelhaft feststeht und wenn zweitens keine Gesundheitsschädigung durch die Impfung bewirkt wird.

Die Schutzkraft der Pockenimpfung geht zunächst auf das Bestimmte hervor aus dem durchweg negativen Ergebniss der von JENNER und seinen Schülern in mehreren Tausenden von Fällen vorgenommenen Experimente, welchen die geimpften Individuen nachträglich mit Inhalt von echten Variolapusteln geimpft wurden.

Ferner ergibt sich diese Schutzkraft in schlagender Weise aus den statistischen Zusammenstellungen. Freilich dürfen diese nicht etwa in der Weise ausgelegt werden, dass nur eine Anzahl von Pockenkranken befragt wird, ob sie in der Jugend geimpft seien. Die so erhaltenen Aussagen sind stets unsicher, wenn aber meist, fälschlicher Weise, bejahend, da z. B. in Preussen seit 1835 das Unterlassen der Impfung mit Polizeistrafe bedroht war.

In richtigerer Weise hat man in Städten, welche von stärkeren Pockenepidemien heimgesucht waren, eine Statistik zu gewinnen versucht, indem man aus dem Ausweis der amtlichen Impflisten die Zahl der überhaupt Geimpften und die der Nichtgeimpften und ferner die Zahl der unter den Pockenkranken vorhandenen Geimpften und Ungeimpften feststellte. Bei einer solchen Zusammenstellung, z. B. in Chemnitz, hat sich ergeben, dass nur etwa 1.6 Procent Krankheitsfälle auf die Geimpften, dagegen 60 Procent und mehr auf die Nichtgeimpften entfielen.

Starke Differenzen in der Pockenmortalität treten ferner hervor, wenn man dasselbe Land vor und nach der Einführung des Impfwangs verglichen wird. Aber hierbei der Einfluss der Durchseuchung möglicher Weise die Zahlen beeinflussen könnte, ist es noch richtiger, verschiedene Länder und Städte von ungefähr derselben Bevölkerungsziffer und dem nämlichen Culturzustand zu vergleichen, und zwar einerseits solche, in welchen der Impfwang besteht, andererseits solche, bei welchen die Impfung höchstens fakultativ eingeführt ist. Dabei zeigt sich ausnahmslos, dass in den Ländern und Städten ohne Impfwang (Oesterreich, Prag) die frühere hohe Pockenmortalität sich bis in die neueste Zeit erhalten hat, während sie in den angrenzenden Ländern und Städten mit Impfwang (Preussen, Dresden) enorm reducirt ist. Aus der umhüllenden Tabelle geht dieses Resultat klar hervor.

Das frühere deutsche Impfgesetz war keinesweg geeignet, einen vollen

Impfschutz zu erzielen; namentlich bestand früher kein Revaccinationszwang, und es ist längst bekannt, dass eine einmalige Impfung nicht für Lebenszeit Schutz gegen Pockenerkrankung gewähren kann. Deutlich ersichtlich wird diese Differenz durch einen Vergleich der Pockenerkrankungen in Preussen einerseits beim Civil, andererseits beim Militär. Bei letzterem bestand bereits seit dem Jahre 1834 Revaccinationszwang. In Folge dessen hörte beim Militär von diesem Jahre ab die Pockensterblichkeit fast ganz auf, während sie bei der Civilbevölkerung Preussens (und ebenso in den Armeen der anderen Länder) nach wie vor einen beträchtlichen Procentsatz erreichte.

Pockensterblichkeit auf 100 000 Einwohner.

Jahr	Preussen	Oesterreich	Dresden	Prag	Jahr	Preussen	Oesterreich	Dresden	Prag
1880	2.6	64.7	3.6	290.2	1880	2.6	64.7	3.6	290.2
1881	3.6	81.4	2.7	64.6	1881	3.6	81.4	2.7	64.6
1882	3.6	94.8	1.3	57.8	1882	3.6	94.8	1.3	57.8
1883	2.0	59.2	0.9	225.5	1883	2.0	59.2	0.9	225.5
1884	1.4	50.8	0.4	359.9	1884	1.4	50.8	0.4	359.9
1885	1.4	60.1	1.2	57.3	1885	1.4	60.1	1.2	57.3
1886	0.5	38.2	0	55.5	1886	0.5	38.2	0	55.5
1887	0.5	41.7	0	84.9	1887	0.5	41.7	0	84.9
1888	0.3	61.5	0	250.0	1888	0.3	61.5	0	250.0
1889	0.5	53.7	0	118.3	1889	0.5	53.7	0	118.3
1890	0.1	24.9	0.4	1.2	1890	0.1	24.9	0.4	1.2
1891	0.1	28.7	0	36.1	1891	0.1	28.7	0	36.1
1892	0.3	25.6	0	101.4	1892	0.3	25.6	0	101.4
1893	0.4	14.9	0	39.0	1893	0.4	14.9	0	39.0
1894	0.3	...	0	0.9	1894	0.3	...	0	0.9

Erst das am 8. April 1874 in Kraft getretene Reichsimpfgesetz führt den Revaccinationszwang ein. Aus den seitherigen Erfahrungen ergibt sich, dass geradezu ein völliges Erlöschen der Pockenepidemien eingetreten ist, und dass selbst sporadische Fälle von Pocken im Innern Deutschlands fast gar nicht und nur in den Grenzbezirken zeitweise in etwas grösserer Zahl vorkommen.

Andererseits sind keine schwereren und unvermeidlichen Gesundheitsstörungen mit der Schutzimpfung verbunden. Normaler Weise bewirkt die Impfung nur eine lokale Reaktion und sehr geringe Störung des Allgemeinbefindens. Am 4. Tage entwickelt sich an der Impfstelle eine Papel, am 5. Tage ein Bläschen, am 7. Tage ist die erhabene, perlgraue, mit einem 2 mm breiten rothen Saum umgebene Impfpocke ausgebildet. Vom 8. Tage an wird der Inhalt eitrig, die Pustel bricht auf, trocknet ein; die Pocke fällt nach 3-4 Wochen ab und hinterlässt eine strahlige Narbe. Selten tritt vorübergehend höheres Fieber, Hautjucken, eine Empfindlichkeit der Achseldrüsen, ein ausgedehnterer bläschenförmiger Ausschlag u. dgl. auf.

Zuweilen sind allerdings schwerere Schädigungen durch die Impfung beobachtet; erstens Wundinfektionskrankheiten und zwar am häufigsten Erysipel, das entweder (als sog. Früherysipel) am 1.-2. Tage nach der Impfung, gewöhnlich gleichzeitig bei mehreren Kindern, auftrat und auf virulente Streptokokken

rückzuführen war, die durch die Hand des Arztes, die Impflancette, andere Lancetten resp. durch die verwendete Lymphe in die Impfwunde gelangt waren, oder es trat ein sog. Späterysipel ein am 5.—12. Tage, nachdem die Pusteln bereits aufgebrochen oder aufgekratzt waren. In diesem Falle sind aus der Umgebung des Kindes durch Berührungen, Wäschestücke u. s. w. Erysipelkokken die Wunde gelangt. Jede beliebige andere Wunde würde unter diesen Umständen denselben Verlauf genommen haben und es ist daher das Späterysipel nicht der Impfung direct zur Last zu legen.

Zweitens können Contagien durch die Lymphe, die von einem Impfling genommen wird, auf andere Impflinge übertragen werden. Infektion mit Variolaphilis hat in etwa 700 gutbeglaubigten Fällen stattgefunden. Die Möglichkeit einer ähnlichen Uebertragung muss auch für Tuberculose zugegeben werden, wenn auch der exakte Nachweis bisher nicht geführt ist.

Drittens hat man wohl behauptet, dass allgemeine Ernährungsstörungen, namentlich Skrophulose, in Folge der Impfung auftreten. Ein Beweis für diese Behauptung ist bisher nicht erbracht. Die Impfung geschieht gewöhnlich in einem Alter, in welchem die ersten skrophulösen Symptome zum Vorschein zu kommen pflegen und es ist daher unausbleiblich, dass diese Coincidenz nicht logisch geschulten Beobachtern als Beweis für einen ätiologischen Zusammenhang angesehen wird. Von zahlreichen, unbefangenen Aerzten werden krankhafte Ernährungsstörungen als Folgen der Impfung entschieden bestritten. Empfehlenswerth ist es jedenfalls, Kinder, bei welchen Verdacht auf beginnende Skrophulose besteht, für ein Jahr von der Impfung zurückzustellen und erst zu impfen, nachdem die skrophulösen Symptome auch für die Angehörigen bereits manifest geworden sind.

Die Uebertragung von Wundinfektionserregern und event. von Contagien präsentieren immerhin sehr beachtenswerthe Gefahren für die Impflinge, welche vollkommen geeignet sind, den Impfzwang als ungerechtfertigt erscheinen zu lassen. Die Vorschriften des neuen Reichsimpfgesetzes gewähren indes vollkommene Sicherheit gegen diese Gefahren.

Um die Wundinfektion zu vermeiden, ist in dem Gesetz angeordnet, dass die Impfung nur von Aerzten und durchaus unter aseptischen Cautelen vorgenommen wird. Der Arzt hat seine Hände vor der Impfung zu desinficiren (Sublimatlösung, Carbolwasser, Alkohol); die Instrumente sind durch Ausglühen oder Auskochen oder Alkoholbehandlung keimfrei zu machen. — Eine Desinfektion des Armes des Impflings ist gewöhnlich nicht durchführbar; die Vorschrift, dass die Kinder rein gewaschen und mit reiner Wäsche zum Impftermin kommen müssen, ist dagegen streng zu beachten. — Die Lymphe ist mit keimfreien Instrumenten direct aus dem Vorrathsglas zu entnehmen oder ist von diesem erst auf ein keimfreies (ausgekochtes) Glasschälchen auszugießen, dann aber sorgfältig vor Verunreinigung zu schützen.

Um die Lymphe von Contagien frei zu halten, ist jetzt durchweg der humanisirten Lymphe animale Lymphe substituiert, welche in Staatsinstituten unter besonderen Vorsichtsmaassregeln gewonnen wird. Aus den Vorschriften der „staatlichen Anstalten zur Gewinnung von Thierlymphe“ sei hervorgehoben, dass junge Rinder oder Kälber von mindesten 3, womöglich 5 Wochen benutzt werden sollen; dieselben sind vor der Impfung vom Thierarzt zu untersuchen. An den gesund befundenen Thieren wird die Impffläche (Unterbauch, innere Schenkelflächen) rasirt, mit Seife und warmem Wasser gereinigt, mit pro mille Sublimatlösung oder Carbolwasser desinficirt und das Desinficiens

mit sterilem Wasser wieder entfernt. Die Impffläche wird dann mit zahlreichen Schnitten versehen und in diese humanisirte oder animale Lymphe eingebracht. Bei Benutzung der humanisirten Lymphe als Impfstoff erhält man die sog. Retrovaccine; dieselbe wird dem durch Weiterimpfen der animalen Lymphe gewonnenen Impfstoff vielfach vorgezogen, weil dieser sich leicht abschwächen soll. Doch scheint die Abschwächung durch Benutzung älterer Kälber mit Auswahl der besten, schon am 4. Tage entwickelten Impfpusteln vermeidbar. — „Originäre“ Lymphe, von zufällig auftretenden natürlichen Kuhpocken herührend, bietet keine besonderen Vortheile. — Auch Impfung der Kälber mit Menschenblättern würde zulässig sein, wenn nicht die Gefahren einer Ausbreitung der Krankheit so schwer auszuschliessen wäre.

Die Kälber werden nach der Impfung vom Thierarzt beobachtet, in besonderem Stall gehalten, und sofort ausrangirt, wenn ihre Temperatur 41.5° übersteigt; ausserdem werden sie nach der Lymphabnahme obducirt, und der Thierarzt hat die inneren Organe sorgfältig zu untersuchen.

Die Kälberlymphe wird am 4.—5. Tage abgenommen; da die Pusteln sehr saftarm sind, wird nicht nur der Inhalt derselben entleert, sondern es werden mittelst scharfen Löffels oder Lanzette die Pusteln (möglichst blutfrei) abgekratzt. Die gewonnene Masse wird mit Glycerin (oder einem Gemisch aus Glycerin und destillirtem Wasser) im Mörser innig verrieben, so dass eine emulsionsartige, graugelbliche, trübe Flüssigkeit entsteht; oder nach der Verreibung lässt man durch Sedimentiren oder Centrifugiren die festen Theile abscheiden und benutzt nur die obere, klare Flüssigkeit (seltener). Zum Abfüllen und Versenden werden nur sterilisirte Glasgefässe benutzt.

Die frische animale Lymphe enthält stets zahlreiche Bakterien, meist Saprophyten, häufig aber auch progene Staphylokokken, seltener Streptokokken. Diese Bakterien sind ohne Einfluss auf die Entwicklung der Pustel und die Entzündungserscheinungen. Gewinnt man die Lymphe durch Desinfektion der Impffläche vor Abnahme der Lymphe u. dergl. Maassregeln möglichst keimfrei, so bewirkt das keinen Unterschied; selbst Impfung mit völlig keimfreiem Blut geimpfter Kälber macht unter Umständen die gleichen Reizerscheinungen. Die Bakterien der Lymphe dringen offenbar gar nicht in die tieferen Hautschichten ein, sondern bleiben auf der Epidermis; und der Pustelinhalt erweist sich bis zum 7. Tag als steril. Von dem gewöhnlichen Keimgehalt der Lymphe droht daher keine Gefahr; immerhin wird man wünschen müssen, ihn nach Möglichkeit zu verringern, und dazu ist die längere Einwirkung des Glycerins geeignet. Den besten Effekt hat ein Gehalt der Lymphe von 60 Procent Glycerin.

Wird ausnahmsweise humanisirte Lymphe benutzt, so muss der Abimpfung auf das Genaueste untersucht werden; in die Pusteln sind am 6. bis 7. Tage mit spitzer Lanzette mehrere flache Einstiche zu machen; die nach kurzer Zeit in durchsichtigen Tropfen hervortretende Lymphe ist in feinen Capillaren aufzusaugen, dann mit 2 Theilen Glycerin zu mischen und wieder in Capillaren abzufüllen, die zugeschmolzen oder versiegelt werden.

Die Impfung der Kinder erfolgt am Oberarm, bei Erstimpfungen gewöhnlich auf dem rechten, bei Wiederimpfungen auf dem linken Arm. Es genügen 4 seichte Schnitte von 1, bis 1 cm Länge. Die einzelnen Schnitte sollen mindestens 2 cm Abstand von einander haben. Stärkere Blutungen sind zu vermeiden.

Als Impfmesser benutzt man am besten glatte, leicht zu reinigende Instrumente; z. B. das Impfmesser von Ruzs. Die Messer sollen nicht zu scharf

, damit nicht Schnitte mit scharfen Wundrändern, sondern mehr skarificirte Wunden, die zur Resorption besser geeignet sind, entstehen. — Niemals darf in einem Termin das Messer, mit welchem die Schnitte gemacht sind, ohne Weiteres der gemeinsam verwendeten Lymphe in Berührung kommen, da sonst Contamination von einem Kind auf das andere übertragen werden könnten. Das Messer ist vielmehr vor dem Eintauchen in die Lymphe sorgfältig zu desinficiren. In grösseren Terminen benutzt man zweckmässig zwei Messer, das eine zum Schneiden, das andere zum Auftragen der Lymphe; während das eine benutzt wird, wird das andere desinficirt.

Ein Schutzverband ist im Allgemeinen nicht erforderlich. In besonderen Fällen kann man einen Verband mit Gazewatte oder einen PAUL'schen Minerverband (mittels Tube wird auf jeden Schnitt ein Tropfen einer Paste von Zinc. oxyd., Wachs, Glycerin u. s. w. aufgebracht und mit Wattescheibchen bedeckt) verwenden.

Nach 6 bis 8 Tagen, gewöhnlich am gleichnamigen Tage der folgenden Woche, findet der Nachschautermin statt. Die Erstimpfung hat als erfolgreich zu gelten, wenn mindestens eine Pustel zur regelmässigen Entwicklung gekommen ist. Bei der Wiederimpfung genügt schon die Bildung von Knötchen oder Bläschen an den Impfstellen.

Trotz aseptischer Ausführung der Impfung und einwandfreier Lymphe kommt es zuweilen zu stärkeren örtlichen Reizerscheinungen; die Rötthe der Haut und eine gewisse Schwellung erstreckt sich über das ganze Impffeld und noch um mehrere Centimeter über dasselbe hinaus. Aus den obigen Ausprägungen geht hervor, dass für diese Erscheinungen nicht die gewöhnlich in der Lymphe vorhandenen Bakterien verantwortlich gemacht werden dürfen. Die Entzündung wird vielmehr durch das Vaccinecontagium selbst bedingt, und ist um so stärker hervor, je frischer und concentrirter die Lymphe ist, je mehr sie demnach dem Kind individuell mehr oder weniger angepasst ist. Dass der letztere Umstand in erster Linie betheiligt ist, geht aus Versuchen hervor, bei welchen die Lymphe von Pusteln mit starker eitriger Reaction und andererseits von normalen Pusteln auf je einen Arm desselben Individuums verimpft wurde; die auf beiden Armen entwickelten Pusteln zeigten keinen Unterschied, während andere Individuen auch auf die Lymphe aus reizlosen Pusteln stärker reagirten. — Immerhin muss man vermeiden, die Reizwirkung der Lymphe möglichst zu mildern. Dies kann in erster Linie dadurch geschehen, dass man die Lymphe vor der Benutzung mindestens 4 Wochen lagern lässt (bei einem Alter über 3 Monate kann in diesem Falle der Impferfolg nachlassen). Ferner dadurch, dass man nur kleine Mengen Lymphe verwendet und dass man die Schnitte mit möglichst grossem Abstand voneinander anlegt. — Durch kühlende Umschläge und Borsalbe pflegen meistens die Reizerscheinungen bald zurückzugehen.

Wirkliches, fortschreitendes Erysipel wird jetzt eigentlich nur noch beobachtet, wenn die aufgekratzten Pusteln durch die Impflinge selbst oder deren gehörige inficirt werden. Im Hinblick hierauf ist die Vorschrift zu betonen, dass Kinder aus einer Umgebung, in der Rose-artige Erkrankungen vorgekommen sind, nicht zur Impfung gebracht werden dürfen.

War die Impfung ohne Erfolg, so ist dieselbe im nächsten Jahr zu wiederholen. War sie auch zum dritten Mal ohne Erfolg, so ist der gesetzlichen Pflicht genügt, der Impfling wird dann als natürlich immun angesehen.

Genaueres über die Technik der Impfung und das Impfgeschäft siehe im

Reichsimpfgesetz bzw. den vom Bundesrath dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen.

Das Impfgesetz in seiner jetzigen Gestalt lässt keinerlei begründete Einwände mehr zu und die Opposition gegen den Impfwang, welche noch immer theils von solchen, die in ihrer Familie einen jener bedauerlichen Infektionsfälle erlebt haben, wie sie das frühere Impfglement zuließ, theils und wesentlich von den principiellen Besserwissern und Oppositionsmännern genährt wird, sucht vergeblich nach neuen Angriffspunkten. Es ist indess nicht zu vergessen, dass in früherer Zeit wirklicher Grund für eine Opposition vorlag und dass die Verbesserungen, welche in das deutsche Reichsimpfgesetz aufgenommen sind und welche dieses vor allen andern Impfgesetzen auszeichnet, zu einem Theile der impfgnerischen Agitation zu danken sind.

6. Scharlach, Masern, Flecktyphus.

Scharlach ist in Europa seit Jahrhunderten allgemein verbreitet; in anderen Continenten, namentlich in Asien und Afrika scheinen grosse Gebiete frei geblieben zu sein. In Europa tritt Scharlach theils in sporadischen Fällen, theils in Epidemien auf. Letztere können dann zu Stande kommen, wenn seit der letzten allgemeineren Invasion wieder eine ausreichende Zahl von empfänglichen Individuen sich angesammelt hat. Nicht selten bleiben selbst in grösseren Städten Zwischenräume von 20 und mehr Jahren zwischen zwei Epidemien. Die Mortalität differirt in den verschiedenen Epidemien erheblich; sie kann 3 Procent und 30 Procent betragen. — Ueber die Infektionsquellen und Transportwege ist noch wenig Sicheres bekannt. Absichtliche Uebertragung von Blut und Hautschuppen Scharlachkranker hat oft im Stich gelassen; andererseits hat man deutliche Ansteckung durch Wäsche, Möbel u. s. w. beobachtet. Manches spricht dafür, dass Scharlach nicht nur im späteren Krankheits- oder im Reconvalescentenstadium ansteckt, sondern sogar vorzugsweise im ersten Beginn der Angina. Durch die Luft scheint das Contagium sich nicht leicht zu verbreiten; ist die Verbreitung durch Berührungen des Kranken oder der inficirten Wäsche, Kleider, Gebrauchsgegenstände etc. gehindert, so besteht wenig Infektionsgefahr mehr. In England ist wiederholt Transport des Contagiums durch Milch beobachtet. — Die individuelle Disposition für Scharlach ist am grössten im Alter von 1—8 Jahren, Erkrankungen bei älteren Kindern und bei Erwachsenen sind indess durchaus nicht selten. Unter den Kindern sind bei weitem nicht alle disponirt; wir sehen oft, dass in kinderreichen Familien nur ein Kind erkrankt. Im Allgemeinen befällt Scharlach dasselbe Individuum nur einmal; doch werden Ausnahmen, sogar 3- und 4fache Recidive, beobachtet. Die Inkubationszeit beträgt gewöhnlich 3—5 Tage. — Eine örtliche Disposition ist nicht nachzuweisen; eine zeitliche Disposition nur in dem Sinne, wie sie für

Arbeiter in Herbergen und Asyle niedrigster Art; diese bilden die Centren für die Weiterverbreitung. Auch später werden die besser die meisten ansteckenden Krankheiten beobachtet wird, nämlich eine geringe Steigerung im Herbst und Winter (vgl. S. 133). — Die Prophylaxis besteht in Absperrung, Verbot des Schulbesuchs, Desinfektion (Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd). Von erfolgreichen Schutz- oder Heilimpfungen ist nichts bekannt; auch die Versuche, die gefährlichen Begleiter des Scharlachprocesses, die Streptokokken, durch Antikörper zu bekämpfen, sind einstweilen erfolglos geblieben.

Masern. Contagium unbekannt. Inkubation 10—14 Tage. Die Masern treten ebenfalls periodisch in Epidemien auf, wenn eine hinreichende Zahl empfänglicher Individuen zur Zeit der Einschleppung vorhanden ist. — Auch hier zeigt sich ferner eine sehr verschiedene Mortalität in den einzelnen Epidemien. — Infektionsquellen: Hautschuppen, Nasen schleim, Thränen, Betten, Wäsche, Kleider; auch im trockenen Zustand ist das Contagium lange haltbar. Zahlreiche Beobachtungen sprechen dafür, dass es in Form von flugfähigem Staub in den Wohnungen und Häusern verbreitet werden und dass daher Ansteckung auch bei Solchen erfolgen kann, die nicht in die Nähe des Kranken oder in Berührung mit seinen Effekten gekommen sind. Im ersten Stadium der Erkrankung kann besonders leicht Ansteckung erfolgen, vermuthlich durch Einathmung der beim Niesen und Husten verschleuderten Tröpfchen. — Die individuelle Disposition ist sehr ausgedehnt; nach langem Intervall seit der letzten Epidemie wird bei erneuter Einschleppung ein sehr hoher Procentsatz der Menschen ergriffen. Da wo öftere Epidemien auftreten, werden vorzugsweise nur Kinder befallen, die Erwachsenen sind grösstentheils durch das frühere Ueberstehen der Krankheit immunisirt. — Lokale Einflüsse fehlen; zeitlich ist eine Zunahme der Frequenz im Herbst und Winter zu verzeichnen (vgl. S. 133). — Die Prophylaxis kann wenig leisten. Isolirung des Kranken führt selten zu einem Verschluss aller Transportwege; auch Desinfektion kann, insbesondere während der Krankheit, nicht viel helfen. Da die Krankheit bei sorgfältiger Behandlung und bei Schonung in der Reconvalescentz im Ganzen günstig zu verlaufen pflegt, sieht man gewöhnlich von prophylaktischen Maassregeln (mit Ausnahme der Meldepflicht und des Verbots des Schulbesuchs) ganz ab.

Flecktyphus. Contagium unbekannt. Ist seit etwa 20 Jahren in Deutschland nur noch in vereinzelten Fällen aufgetreten; in früherer Zeit wurde namentlich Schlesien von ausgedehnten Epidemien befallen (in der Stadt Breslau im Jahre 1856 6000 Erkrankte, 1000 Gestorbene). Jetzt ist die Krankheit auf Russland, Galizien, den Orient und Irland

beschränkt. Lokale und zeitliche Beeinflussung besteht nicht. — Die Einschleppung erfolgt gewöhnlich durch Vagabonden und umherziehende situirten Klassen meist verschont; schlechter Ernährungszustand und Unreinlichkeit scheint zu disponiren. Ueber den Modus der Infektion ist wenig Sicheres bekannt. Auf weitere Entfernungen durch Gegenstände und Waaren scheint die Uebertragung selten zu erfolgen; die in der Nähe des Kranken beschäftigten Menschen sind dagegen sehr exponirt. 1857 starben in Breslau 7 Aerzte und 11 Wärterinnen an Flecktyphus, 78 Wärterinnen erkrankten; 1868 erkrankten daselbst 68 Aerzte und Wärter, 6 Procent aller Erkrankten. — Die Inkubation dauert in der Regel 5—8, ausnahmsweise bis 14 Tage. Recidive sind sehr selten. — Die Prophylaxe muss strengste Isolirung und gründlichste Desinfektion ins Auge fassen; ausserdem wo möglich Verwendung von durchseuchtem Personal.

7. Influenza.

Die Influenza (Grippe) ist seit dem 12. Jahrhundert bekannt; von Zeit zu Zeit ist sie als Pandemie aufgetreten; innerhalb der letzten 50 Jahre z. B. 1843, 1847—48, 1850—51, 1855, 1857—58, 1873—75, 1889—90. Dazwischen liegen alljährlich beschränktere Epidemien in irgend welchen Ländern.

Die Erreger der Influenza sind die S. 70 beschriebenen Bacillen.

Als Infektionsquellen sind das Bronchialsekret und das Nasensekret, sowie die damit beschmutzten Gegenstände, Wäsche u. s. w. anzusehen. Nur relativ frische Sekrete sind gefährlich, da die Erreger durch Austrocknen zu Grunde gehen und auch im feuchten Sputum gewöhnlich nicht über 2 Tage virulent bleiben. Der trockne Staub des Krankenzimmers ist daher nicht als Infektionsquelle anzusehen; wohl aber können beim Husten und Niesen feuchte Theilchen des Sputums sich in der den Kranken umgebenden Luft verbreiten, und diese Tröpfchen bilden die wesentlichste Infektionsquelle.

Als Infektionswege fungiren Berührungen z. B. der Taschentücher, der Hände des Kranken einerseits, der eigenen Schleimbäute der Nase oder des Mundes andererseits; namentlich aber die Einathmung frischer, vom Kranken versprühter Sputumtröpfchen. Auch gelegentliche Uebertragung durch Nahrungsmittel und durch Insecten ist denkbar. — Das Contagium scheint bei Gesunden sehr leicht, schon auf flüchtige Berührung hin, zu haften. Dass die Ansteckung Gesunder durch den Aufenthalt in der Nähe von Kranken erfolgt, ist unzählige Male beobachtet.

Eine Verschleppung des Contagiums auf weite Strecken durch die Luft im Freien ist völlig ausgeschlossen. Man hat früher wohl ge-

subt, dass Winde das Contagium rascher verbreiten, als dies durch den Verkehr möglich ist. Insbesondere sollte Schiffen auf hoher See das Contagium durch den Wind zugeführt werden können. Diese Behauptungen sind durch die genaueren Beobachtungen während der letzten Epidemien widerlegt. Die Ausbreitung der Krankheit erfolgte niemals schneller als der Verkehr und konnte in sehr vielen Fällen trotz aller Bestimmtheit auf Einschleppung durch Kranke zurückgeführt werden. Wo dieser Nachweis sich nicht führen liess, haben wir keinen Grund und auf einen anderen Verbreitungsmodus zu schliessen, sondern müssen annehmen, dass die Kranken (event. leicht Erkrankten) oder die vom Kranken stammenden Sachen, welche das Contagium einschleppt haben, nicht mehr nachträglich aufgefunden werden konnten.

Auch bezüglich der Schiffe ist constatirt, dass Erkrankungen auf den Schiffen nur vorkommen, wenn innerhalb der letzten 6 Tage (die Inkubationszeit zu 2—6 Tagen angenommen) ein Verkehr mit verseuchtem Land oder mit verseuchten Schiffen stattgefunden hat und so die Möglichkeit der Aufnahme des Contagiums vom Kranken aus gegeben war. — Ferner an isolirt gelegenen oder gegen den Verkehr abgeschlossenen Orten in verschiedensten Ländern (Gebirgsdörfer, Klöster, Gefängnisse) vielfach beobachtet, dass der Beginn der Erkrankungen erst von dem Zeitpunkt datirt, wo ein persönlicher Verkehr mit Influenzakranken stattgefunden hatte.

Die individuelle Empfänglichkeit erstreckt sich vom 2. Lebensjahre ab durch alle Alter und ist vielleicht in den mittleren Jahren am grössten. Völlige Unempfänglichkeit kommt weit seltener vor, als bei anderen Krankheiten; jedoch werden manche Individuen nur sehr leicht ergriffen. Eine Steigerung der Empfänglichkeit scheint durch Grippe, Catarrhe und Erkältungen bewirkt zu werden.

Ueber die nach Ablauf der Krankheit entstehende Immunität gehen die Ansichten noch weit auseinander. Bei manchen Menschen scheint keine Immunität oder sogar eine gesteigerte Disposition zurückzubleiben; während im Allgemeinen doch wohl eine gewisse Immunisirung für kurze Dauer eintritt.

Eine örtliche Disposition oder Immunität wird nicht beobachtet. Ein Ort und kein Land hat sich den wiederholten Zügen der Influenza gegenüber dauernd immun gezeigt. Während jeder einzelnen Epidemie greifen gewöhnlich einzelne Städte und innerhalb der ergriffenen Städte einzelne Anstalten mit isolirt lebender Bevölkerung verschont. Hier tritt es dann an einer Einschleppung des Contagiums durch Kranke; doch selten aber erfolgt diese noch in einem späteren Stadium und dann breitet sich in der betreffenden Stadt resp. Anstalt eine Epidemie

aus zu einer Zeit, wo in der ganzen Umgegend die Seuche schon erloschen ist. (Göttinger Irrenanstalt 1891.)

Eine zeitliche Disposition besteht ebenfalls nicht. Die Influenza ist zu allen Jahreszeiten unter den verschiedensten klimatischen und Witterungsverhältnissen beobachtet.

Völlig unverständlich ist es, wie trotz der eindeutigen Resultate der in den letzten Epidemien gesammelten Beobachtungen einzelne Gelehrte noch immer die Ansicht zu vertheidigen suchen, dass die Influenza keine contagöse, sondern eine miasmatische Krankheit sei, die durch die Winde von Ort zu Ort verbreitet wird. Das betreffende Miasma soll entweder ein gasförmiger Körper oder ein belebtes Wesen sein. Die Quantitäten dieses räthselhaften Gases, resp. dieses Lebewesens, die an einem räthselhaften Orte (selbst im kältesten Winter) fortdauernd producirt werden, müssten geradezu unglaubliche sein, da der Zug der Influenza sich Wochen hindurch über ganze Erdtheile erstreckt. Ehe man zu solchen absurden, von aller Analogie mit bekannten Vorgängen unendlich weit entfernten Annahmen greift, sollte man doch lieber von allen Erklärungsversuchen Abstand nehmen, wenn wirklich die bei anderen Krankheiten üblichen Uebertragungsweisen sich auf die Influenza absolut nicht anwenden lassen. Thatsächlich ist aber das Verhalten der Influenzaepidemien vom contagionistischen Standpunkt aus und unter Berücksichtigung der Lebens Eigenschaften des Influenzabacillus ohne alle Schwierigkeit zu erklären.

Auch der Umstand, dass die Influenza oft so plötzlich um sich greift und einen so auffällig grossen Bruchtheil der Bevölkerung befällt, ist sehr wohl mit einer Verbreitung durch Contagien vereinbar. Zunächst ist der Ausbruch nie wirklich so plötzlich, wie es hier und da behauptet ist. Immer kommen zunächst vereinzelte Fälle, die kaum diagnosticirt und registriert werden, und dann erst schwillt die Seuche allmählich an, allerdings in rascher Progression. Letzteres erklärt sich aber ungezwungen daraus, dass das Contagium so leicht haftet, dass die individuelle Empfänglichkeit sehr verbreitet, die Inkubation sehr kurz (im Mittel 3 Tage) und die Ansteckung durch die zahlreichen nicht bettlägerigen Kranken sehr erleichtert ist. Brechen andere stark contagöse Krankheiten in eine voll empfängliche Bevölkerung ein, so sehen wir, dass in ähnlich rascher Anschwellung ein ebenso grosser Prozentsatz der Bevölkerung ergriffen wird. (Masern auf den Faröerinseln u. s. w.)

Prophylaktische Maassregeln. Da die Krankheit gewöhnlich erst diagnosticirt wird, wenn sie bereits stärkere Ausbreitung erlangt hat, sind Sperren und Isolirungen von geringem Werth, ausser in Anstalten, die wirklich abgeschlossen gehalten werden können. Aus demselben Grunde, dann aber auch, weil das Contagium ohne unser Zuthun so rasch abstirbt, ist eine regelrechte Desinfektion nicht erforderlich. Alle auf eine Schutzimpfung gerichteten Experimente sind bisher erfolglos geblieben. Es muss mithin dem Einzelnen überlassen bleiben, in wie weit er den Verkehr mit Influenzakranken meiden und dadurch sich gegen die Krankheit schützen kann.

8. Pest.

Die Beulenpest (Bubonenpest) ist in Europa seit dem 6 Jahrhundert bekannt. Im Mittelalter forderte sie in fortgesetzten Epidemien gezählte Opfer; erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts macht sich eine Abnahme bemerklich, von der Mitte des 18. Jahrhunderts ab ist in Europa nur noch der Südosten, die Balkanhalbinsel, häufiger betroffen. Im Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Pest in der Türkei misch und mehrmals von dort aus verschleppt; allmählich erlischt auch dort; 1841 ist sie noch einmal in Constantinopel aufgetreten, um nicht von Europa zu verschwinden. 1843 ist sie zuletzt in Aegypten beobachtet, 1841 in Syrien, so dass seit der Mitte dieses Jahrhunderts nicht die an Europa grenzenden Theile Vorderasiens und Afrikas von ihr frei blieben. Dafür entwickelten sich neue Pestherde in Arabien (1853 und 1874), Tripolis, Persien (1863, 1870, 1876—78), Mesopotamien (1866, 1873—77). Von Mesopotamien aus wurde die Seuche im Oktober 1878 in unaufgeklärter Weise nach Wetlianka und einigen anderen Ortschaften im Gouvernement Astrachan verschleppt, wo sie sich zum Januar 1879 hielt und etwa 600 Opfer forderte. 1893—94 folgte ein Vorstoss an die chinesische Küste und nach Hongkong; 1896 trat die Pest in Bombay, Karachee, Nagpur und anderen Theilen Indiens auf, 1898—99 auf Madagaskar, Mauritius, in Bona, Alexandrien; dann in Südamerika (Santos); ferner wurde sie in den letzten Jahren mehrfach nach Europa eingeschleppt, so nach Porto, Lissabon, Plymouth, Triest, Hamburg etc. — Genauere Nachforschungen haben ergeben, dass 4 endemische Centren seit lange existiren: in Mesopotamien; in Tibet; im Berglande Assir an der Westküste von Arabien und in Kisiba in der äussersten Nordwestecke von Deutsch-Ostafrika. Von diesen Centren aus scheint die Pest immer wieder gelegentlich in die Nachbarländer verschleppt zu werden. Warum in den letzten Jahren eine stärkere und weitere Ausbreitung stattgefunden hat, ob dieselbe nur durch Zufälligkeiten bedingt ist oder ob etwa eine Steigerung der Virulenz der Erreger stattgefunden hat, das lässt sich zur Zeit nicht unterscheiden.

Ueber den Erreger der Pest s. S. 71. — Derselbe dringt in den meisten Fällen von der Haut aus ein, verursacht primäre Pusteln oder Abscessen an der unteren oder oberen Extremität, oder auch an Hals, Kopf, Mund. Von da aus entwickelt sich in den zugehörigen Lymphknoten ein Pestbubo als schmerzhaftes, teigiges, nicht circumscriptes Geschwulst. Diese Form der Erkrankung kann in 30—50 Procent der Fälle in Heilung ausgehen, indem sich der Bubo zertheilt oder auf-

bricht. Auch im letzteren Fall gelangen keine Pestbacillen nach aussen, da im Eiter lebende Erreger stets vermisst werden. — Bei Aufnahme des Contagiums in die Blutbahn (direct oder durch insuffiziente Drüsen) entsteht Pestsepsis, von schlechterer Prognose, oft mit Pneumonie und zuweilen mit Darmpest einhergehend. — Drittens entsteht durch Einathmung der Erreger primäre Pestpneumonie; von schlechter Prognose; Genesung oft mit sehr protrahirter Reconvalescenz.

Während der an Bubonenpest Erkrankte kaum Infektionsquellen liefert, scheidet der septisch Erkrankte in den verschiedenen Exkreten Pestbacillen aus. Vor allem ist aber der an primärer oder sekundärer Pestpneumonie Erkrankte dadurch gefährlich, dass er beim Husten Sputumtröpfchen mit Pestbacillen in die Luft verschleudert. Dasselbe geschieht bei dem terminalen Lungenödem, mit dem tödtlich verlaufende Sepsisfälle zu enden pflegen. Auch im Reconvalescentenstadium vermag der Pneumoniker noch solche Ausstreunung zu bewirken. — Ferner kann das ausgeschiedene Sputum lebende Bacillen enthalten; im Auswurf von Reconvalescenten wurden noch 76 Tage nach Beginn der Erkrankung virulente Erreger nachgewiesen. In Form von flugfähigem Staub kann das Sputum zwar nicht inficirend wirken, da die Erreger die hierfür unerlässliche vollständigste Austrocknung nicht vertragen. Wohl aber kann es in dickeren Schichten an Theilen der Wohnung, an Kleidern, Wäsche u. s. w. haftend noch nach Wochen durch Kontakte inficiren. Auch können z. B. durch Fliegen Sputumtheile auf Nahrungsmittel und Gebrauchsgegenstände verschleppt werden.

Fernere gefährliche Infektionsquellen liefern die Ratten. Dieselben sind für Pestbacillen ausserordentlich empfänglich; sie pflegen fast stets die Ersterkrankten zu sein, und die Erkrankungen von Menschen treten erst auf, wenn bereits eine Rattenepidemie eine Zeit lang bestanden hat. Die Ratten erkranken nicht nur an Pestsepsis, sondern sehr häufig an primärer Darmpest und können per os inficirt werden. Harn und Fäces enthalten reichlich Pestbacillen; die Krankheit verbreitet sich unter den Ratten dadurch, dass die gesunden mit den überall verstreuten Fäces der kranken Thiere in Berührung kommen, dass sie die todtten Thiere annagen, und dass Ungeziefer die Erreger von letzteren auf die gesunden Thiere überträgt. Da die erkrankten Ratten die Scheu vor den Menschen verlieren, kommt es sehr leicht dazu, dass sie Theile der Wohnung, Staub und Schmutz mit ihren gefährlichen Exkreten inficiren.

Die Infektionswege sind 1) Berührungen der genannten Infek-

tionsquellen. Die Berührung der vom Kranken ausgeschiedenen Erreger ist bei einiger Vorsicht sehr leicht zu vermeiden. Beim Wärter- und ärztlichen Personal kommen daher in solcher Weise Uebertragungen überhaupt kaum vor. Viel gefährlicher sind unbewusste Berührungen der von Pestratten verstreuten Erreger. Daher der gute Effekt der Ueberführung der Kranken in Spitäler und der Evakuierung der von Ratten okkupierten Häuser. 2) Einathmung der beim Husten der Pestpneumoniker oder beim Lungenödem der Sterbenden verstreuten Tröpfchen. Uebertragungen auf das Pflegepersonal scheinen fast ausschliesslich in dieser Weise zu Stande zu kommen. — Ein Schutz der Gesunden durch Gazeschleier und Masken führt nicht zum Ziele; eher kann die Lagerstätte des Kranken mit einem schützenden Gazeschleier umgeben werden 3) Stechende Insecten, die vom erkrankten Menschen oder von Ratten aus auf den Gesunden übergehen. — Anscheinend sehr seltener Infektionsmodus.

Die individuelle Disposition zeigt wenig Unterschiede, auch bezüglich des Alters. Nach einmaligem Ueberstehen der Krankheit tritt ausgesprochene Immunität ein; zweimalige Erkrankung ist sehr selten.

Eine örtliche Disposition tritt insofern in ausgeprägter Weise hervor, als die Krankheit Neigung zeigt, sich in einzelnen Häusern festzusetzen. Die Krankheit erlischt unter den Insassen, wenn sie das Haus verlassen; sie tritt wieder auf bei erneuter Bewohnung. Offenbar sind derartige Häuser Rattenhäuser, in denen durch erkrankte Ratten das Contagium stark verbreitet ist und immer wieder neu eingeschleppt wird. Eine gründliche Desinfektion, welche zugleich die Ratten vertilgt und verscheucht, beseitigt die Disposition eines solchen Hauses.

Epidemiologisch ist zu beachten, dass die Einschleppung der Seuche in Europa wohl fast immer durch Schiffe und durch die mit diesen transportierten kranken Ratten erfolgt. Auch Waaren, die mit Excrementen kranker Ratten verunreinigt sind; oder reconvalescente Pestpneumoniker, oder mit deren Sputum verunreinigte Kleider und Waaren können wohl gelegentlich an der Einschleppung beteiligt sein. Meist aber wird eine verdächtige Sterblichkeit unter den Schiffsratten der Uebertragung auf Menschen vorausgehen. — Die weitere Entwicklung der Seuche ist stets ein langsame; nicht durch Explosionen, wohl aber durch zähes Haften und häufiges Wiederaufflackern ist sie ausgezeichnet. — Zwischen Ansteckung und neuer Erkrankung liegt eine Inkubationszeit von 7—10 Tagen.

Die Prophylaxe muss eine Hinderung der Einschleppung namentlich auf dem Seewege ungefähr wie bei der Cholera ins Auge fassen.

Die Untersuchung der aus verseuchten Gegenden kommenden Schiffe hat sich ausser auf den Gesundheitszustand des Menschen auch auf todte und kranke Ratten zu erstrecken. — Zu Lande ist eine Ueberwachung des Reiseverkehrs nicht angezeigt, ausgenommen den kleinen Grenzverkehr mit verseuchten Gebieten des Nachbarlandes. Durch die Venediger Conferenz ist ferner vereinbart, dass die Einfuhr von Lumpen und getragener Wäsche verboten werden kann.

Nach erfolgter Kinschleppung eines verdächtigen Falls hat strenge Isolirung und sofortige bakteriologische Sicherung der Diagnose zu erfolgen. Letztere wird in besonderen, den hygienischen Instituten angegliederten Pestlaboratorien in der im Anhang beschriebenen Weise ausgeführt. Das Material zur Untersuchung ist nicht einzusenden, sondern vom Leiter oder Assistenten des Instituts selbst zu entnehmen. Auch bei weiteren verdächtigen Erkrankungen hat die bakteriologische Untersuchung die Diagnose zu sichern.

Das Pflegepersonal ist passiv oder, wenn Serum nicht zur Hand ist, und sicherer aktiv zu immunisiren (siehe S. 612). Häuser mit mehrfachen Erkrankungen sind zu evakuiren. — Die Desinfektion ist nach den oben gegebenen Vorschriften durchzuführen. Zum Schutze des Personals kann eventuell eine Einleitung reichlicher Formaldehydmengen in den inficirten Raum durch das Schlüsselloch der Thür, ohne dass vorher eine Abdichtung und überhaupt ein Betreten des Raumes stattgefunden hat, der eigentlichen Desinfektion vorausgehen.

9. Malaria.

Die Malaria ist von jeher als typisches Beispiel einer nicht contagiösen, ektogenen Infektionskrankheit aufgeführt. Nach allen Beobachtungen wird die Krankheit niemals vom Kranken auf den Gesunden direct übertragen, es sei denn durch Ueberimpfung von Blut. Die natürliche Infektion erfolgt vielmehr nur durch den Aufenthalt an einem Malariaorte; und man hat daher von jeher den örtlichen Verhältnissen, unter welchen Malaria vorkommt, besonderes Interesse zugewandt.

Die Malaria ist weitaus am verbreitetsten in der tropischen und subtropischen Zone, wo sie als die verheerendste unter allen Krankheiten auftritt; in der kalten Zone fehlt sie gänzlich, in der gemässigten zeigt sie theilweise noch sehr starke Verbreitung. Innerhalb Europas herrscht Malaria besonders in Süd-Russland, den Donau-Niederungen Ungarns und der Donaufürstenthümer, in der Po-Ebene und am grössten Theil der Westküste Italiens von Pisa abwärts, im Weichsel-delta und in den Marschen Ostfrieslands und Hollands. Namentlich

der letztgenannten Gegend wie überhaupt in ganz Europa ist die Krankheit in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen.

Ausgedehnte Landstrecken in Europa und ebenso in der tropischen Zone sind völlig frei von Malaria; so z. B. fast ganz Mittel- und Süd-Deutschland, England, ein grosser Teil Frankreichs u. s. w.

Manche Gegenden sind nicht dauernd immun, sondern werden nur zeitweilen von Malaria-Epidemien betroffen, die sich über weite Strecken verbreiten. Nicht selten wird auch beobachtet, dass im Laufe längerer Jahrzehnte Malariaherde zu immunen Orten umgewandelt und umgekehrt früher unempfindliche Gegenden für Malaria disponirt werden. In solchen Fällen liegen meist Änderungen der Bodenoberfläche (Ackerlegung, Entwaldung u. dgl.) vor.

Vergleichende Untersuchungen über die Eigenschaften des Malariabodens haben alle früheren Beobachter zu der Anschauung geführt, dass nur ein Boden von relativ hoher Feuchtigkeit, von mässiger Wärme und von einem beträchtlichen Gehalt an organischen Stoffen für Malaria disponirt sei. Von diesen Bodeneigenschaften nahm man früher an, dass sie für das Gedeihen der Malariaerger selbst erforderlich seien, während man sie jetzt als die Entwicklungsbedingungen der Zwischenwirthe der Erreger, Anopheles, anspricht.

Die nöthige Feuchtigkeit findet sich niemals auf kompaktem Lehmboden, selten auf zerklüftetem Felsboden, häufig dagegen in porösem Schwemmboden. Hier kann sie theils durch hohen Stand des Grundwassers, theils durch Austreten von Flüssen, theils dadurch bewirkt werden, dass die schwer durchlässigen oberen Bodenschichten die Niederschläge lange zurückhalten. Oft bietet geradezu sumpfiges Terrain, wie es sich auf Ebenen oder in muldenförmigen Thälern entwickeln kann, Malariaefahr; oft ist der betreffende Boden während eines Theils des Jahres trocken und besitzt nur zeitweise den erforderlichen hohen Feuchtigkeitsgrad. Dauernd trockener Boden ist stets frei von Malaria; ebenso ein ständig mit Wasser überfluthetes Terrain. — Mancher scheinbar disponirte feuchte Boden lässt trotzdem Malaria vermissen; vielleicht nur, weil zufällig keine Anopheles dorthin gelangt sind, oder weil irgend einer anderen Lebensbedingung derselben nicht entsprochen ist, oder weil ihnen keine Gelegenheit zur Aufnahme von Parasiten gegeben war.

Die für einen Malariaboden erforderliche Wärme beträgt mindestens 15—16°. Gegenden, in welchen die Lufttemperatur im Mittel des wärmsten Monats diese Höhe nicht erreicht, sind immun. Auch eine Maximalgrenze für die Temperatur scheint zu existiren, doch ist dieselbe nicht genauer ermittelt.

Der Gehalt des Bodens an organischen Stoffen kann stark variiren; ein Mehr oder Weniger scheint von geringem Einfluss auf die Malaria-disposition zu sein.

Neben der örtlichen Disposition giebt sich in den meisten Malaria-gegenden eine deutliche zeitliche Disposition zu erkennen. In der nördlichen gemässigten Zone zeigt die Malaria zwei Maxima, im Frühling und im Herbst; in südlicheren Ländern ist nur ein Maximum ausgeprägt, das den Sommer und Herbst umfasst; in tropischen Malaria-gegenden treten häufigere Erkrankungen erst mit dem Beginn der Regenzeit auf, erreichen mit dem Nachlass derselben ihr Maximum und nehmen dann wieder ab. — In der kälteren Zone ist es vorzugsweise die Wärme, welche variirt und die zeitliche Disposition bestimmt, während die Feuchtigkeit weniger schwankt, in der heissen Zone fehlt es dagegen nie an der erforderlichen Wärme und der zeitlich schwankende Faktor ist die Feuchtigkeit. — Die Witterung der einzelnen Jahre ist oft von sehr entschiedenem Einfluss auf die Malariafrequenz, aber die gleiche Witterung wirkt an verschiedenen Orten sehr ungleich. Bei sehr feuchtem Terrain bringt anhaltender Regen Ueberfluthung und damit ein Erlöschen der Epidemie zu Stande, bei trockenerem Boden wirkt er auslösend auf dieselbe. Trockenere Wetter kann bei sehr feuchtem Terrain die Malaria begünstigen, bei weniger feuchtem derselben ein Ende bereiten.

Diese Beobachtungen über die örtliche und zeitliche Disposition decken sich im Allgemeinen mit dem, was wir über die Lebens- und Fortpflanzungsbedingungen von *Anopheles claviger* wissen. Dass die Malaria-parasiten selbst in einem Boden von bestimmter Beschaffenheit saprophytisch wuchern können, dafür haben wir bis jetzt keine Anhaltspunkte. Man hat früher behauptet, dass in geeignetem Terrain Wasser und Luft die im Boden wuchernden Krankheitserreger verbreiten könne. Frühere kritische Untersuchungen und neuerdings Versuche von CELLI lassen aber eine Uebertragung durch Wasser als völlig unerwiesen erscheinen. Wasser aus exquisiten Malaria-gegenden in malariafreie Gegend transportirt und hier von Gesunden getrunken, hat keine Erkrankung ausgelöst; und die Zuleitung einwandfreien Trinkwassers zu Malaria-gegenden hat dort die Malaria-Verbreitung nicht vermindert. Gegen eine Uebertragung der Keime durch Luft spricht die scharfe vertikale und horizontale Begrenzung des Infektionsbereichs, so zwar dass z. B. eine gewisse Erhebung der Wohnungen über das Terrain bereits ausreicht, um Schutz gegen Infektion zu gewähren; ferner spricht dagegen der Wechsel der Infektiosität mit der Tageszeit und die sehr erhebliche Steigerung zur Abend- und Nachtzeit.

Alle Erfahrungen über die Verbreitung der Malaria lassen sich mehr verstehen, sobald man als einzigen Uebertragungsmodus die Einverleibung der Parasiten durch deren Zwischenwirth *Anopheles claviger*, gelten lässt.

Die Beschreibung dieser Stechmückenart siehe S. 89. Die *Anopheles*-Mücken deponiren ihre Eier in seichten Gewässern, sumpfigen Orten; aus jedem Ei kriecht eine circa 1 cm lange Larve aus, die auf ihr Leben im Wasser angewiesen ist. Dann folgt die Verpuppung, schließlich das Ausschlüpfen des Insekts. Für den ganzen Entwicklungsprozess bedarf es bei 20—25° Wärme etwa 30 Tage.

Eine endemische Ausbreitung von Malaria kommt nach allen früheren Beobachtungen nur da vor, wo *Anopheles claviger* seine oben beschriebene Entwicklung fortdauernd durchmachen kann. Sumpfiges Terrain fand KOCH z. B. im Tengger-Gebirge auf Java; dorthin wird auch Kranke, die von den ausgedehnten Malariaherden der Insel kommen, wiederholt Malaria eingeschleppt, es findet aber keine Verbreitung auf abgelegene Bewohner statt, weil es dort an *Anopheles* fehlt.

Endemische Malaria hat also nach unseren heutigen Vorstellungen drei Voraussetzungen:

Erstens: Malariakranke mit Parasiten; aus dem Blut dieser Kranken müssen die *Anopheles*-Mücken die Parasiten aufnehmen. — KOCH hat festgestellt, dass im Gebiet der tropischen Malaria bei neu gereisten Erwachsenen die Krankheit nach 3—4 Jahren zur Immunität zu führen pflegt, falls nicht der Tod eingetreten ist. Die Erwachsenen unter der ansässigen Bevölkerung sind sämtlich immun und haben keine Parasiten mehr im Blut. Dagegen finden sich diese bei den Kindern bis zum Alter von 5—10 Jahren, wo auch sie Immunität erworben zu haben pflegen.

Zweitens: *Anopheles*-Mücken müssen reichlich vorhanden sein, so gute Lebensbedingungen vorfinden; diese müssen Blut von Malariakranken aufnehmen können und die Parasiten (innerhalb 10—12 Tagen) zur Bildung freier Sichelkeime zur Entwicklung bringen.

Drittens: Empfängliche Menschen müssen von *Anopheles*, welche 10—12 Tage oder länger vorher von Malariakranken Blut aufgenommen hatten, gestochen und beim Stich mit Sichelkeimen inficirt werden.

Die Prophylaxis kann eine dieser drei Bedingungen auszuhalten versuchen.

Erstens lässt sich versuchen, die Malariaparasiten im erkrankten Menschen zu vertilgen. Dies gelingt nach KOCH dadurch, dass man bei den Kindern Blutuntersuchungen vornimmt (ebenso bei kürzlich gereisten Erwachsenen). Alle, bei denen Parasiten gefunden werden

sind einer konsequenten Chininbehandlung bis zur Tilgung der Parasiten zu unterwerfen. Sie sollen in den fieberfreien Intervallen täglich 1 g Chinin bekommen, bis keine Parasiten mehr gefunden werden; dann erhalten sie 7 Tage kein Chinin, dann 2 Tage je 1 g Chinin und so fort mindestens 2 Monate.

Zweitens: Das Eingreifen von *Anopheles* lässt sich dadurch ausschalten, dass man die Stechmücken mit parasitentragenden Menschen nicht in Berührung kommen lässt. Dies ist bei bettlägerigen Patienten wohl durchführbar, nicht aber für die weit grössere Zahl der ambulanten Parasitenträger. — Eher wird man vielleicht mit einer Vertilgung der Stechmücken bezw. ihrer Larven zum Ziele kommen. Zur Larventödtung in Wasser und Boden sind z. B. schweflige Säure, Salzsäure, Kaliumpermanganat, Ammoniak empfohlen, in neuerer Zeit besonders Petroleum, Formalin und gewisse Anilinfarben (Malachitgrün, Larvicid). Die ausgeschlüpften Mosquitos können in der Luft durch schweflige Säure, Ammoniak, Leuchtgas, Formaldehyd, ferner durch stark riechende Substanzen wie Terpentin, Jodoform, Menthol, Kampher getödtet werden. Sehr kräftige Wirkung kommt auch dem Tabakrauch und dem Rauch von einem Pulver, bestehend aus *Chrysanthemumblüthen*, *Pyrethrum*, *Eukalyptusblättern*, *Quassiaholz* u. a. w. zu. — Auf der Gefangeneninsel Asinara soll eine Vertilgung der Stechmücken dadurch gelungen sein, dass alle Wasserflächen mit Petroleum übergossen und gleichzeitig die Wohnungen stark ausgeräuchert sind.

In den meisten Malariagebieten wird indess eine Mosquitovertilgung mit diesen Mitteln nicht vollständig gelingen. Es wird aussichtsvoller sein, den Stechmücken ihre Existenzbedingungen dadurch zu beschränken, dass der Boden trocken gelegt wird. Insbesondere kleine Wassertümpel sind zu beseitigen; Unterholz ist zu entfernen. Drainage und die sonstigen S. 349 aufgeführten Mittel kommen ferner in Frage. In Städten kann auch durch dichte glatte Pflasterung von Strassen und Höfen und gute Entfernung alles auf die Oberfläche gelangenden Wassers Abhilfe geschaffen werden.

Drittens: Die empfänglichen Gesunden können gegen die Mückenstiche geschützt werden; z. B. durch Mosquitonetze, die an den Oeffnungen der Wohnungen ausgespannt sind und die unbedeckten Stellen des Körpers bedecken. GRASSI und CELLI haben in dieser Weise einen Malariaschutz bei dem Bahnpersonal in *Malariaterrains* angeblich mit Erfolg durchgeführt. Auch durch Dämpfe von *Pyrethrum*-pulver u. dgl. kann der Einzelne innerhalb der Wohnung sich gegen Stiche zu schützen suchen.

Einreiben der Haut zum Schutz gegen Mückenstiche hat man mit

alkenöl, Terpentin- und Camphersalben versucht, jedoch keine sichere Wirkung erzielt.

Sehr wichtig wäre es, wenn man die Empfänglichkeit der Genden künstlich beseitigen könnte. Durch fortgesetzte prophylaktische Chininbehandlung, alle 3 Tage 0,5 g, gelingt eine gewisse Immunisierung; doch ist dieselbe kaum in weitesten Kreisen durchführbar. Eine einfache zuverlässige Immunisierung gegen Malaria bleibt nach wie vor dringendes Desiderat.

10. Tuberkulose.

Die Tuberkulose ist in der gemässigten Zone die verbreitetste Infektionskrankheit; 12 % aller Todesfälle, etwa 30 % aller Todesfälle im Alter von 15—60 Jahren sind durch Phthise bedingt; zahlreiche Todesfälle kommen ausserdem durch Darmtuberculose, Hirntuberculose etc. r. In Deutschland sterben auf 10000 Lebende im Alter von 0—2 Jahren = 23, im Alter von 2—15 Jahren = 9, im Alter von 15—40 Jahren = 26, im Alter von 50—70 Jahren = etwa 60 an Tuberkulose. Die Zahl der vom Tuberkelbacillus Inficirten ist noch viel bedeutender; in mehr als der Hälfte aller Leichen — bei einem wissen Industriebetrieben entstammenden Sektionsmaterial sogar in 100 % — findet man neuerdings tuberculöse Herde, darunter aber die Mehrzahl in ausgeheiltem Zustand. Die Krankheit ist für die sozialen Verhältnisse um so bedeutsamer, als sie chronisch verläuft und gewöhnlich bereits sehr lange Zeit vor dem Tode die Kranken erwerbsunfähig macht. — Der ursprüngliche Erreger der Tuberculose ist stets der Tuberkelbacillus. In vorgeschrittenen Stadien der Phthise sind andere Bakterien, namentlich Streptokokken, Influenzabacillen, Pneumokokken etc., an dem Zerstörungswerk und an den Symptomen (heftiges Fieber) wesentlich theilhaftig.

Abgesehen von der Vererbung der Keime, die sehr selten Ursache der Erkrankung zu sein scheint, fungiren als Infektionsquellen: vor allem das Sputum der Phthisiker, das in grösster Menge verbreitet wird; sehr selten Darmausleerungen bei Darmtuberculose; ferner die mit Sputum beschmutzte Wäsche, Kleidung, Theile der Wohnung, Accessorien; insbesondere aber die mit ausgehusteten Tröpfchen oder mit schaumförmigem Sputum erfüllte Wohnungsluft. — Als wichtige Infektionsquelle kommt ausserdem die Milch perlsüchtiger Kühe, die gewöhnlich in grösseren Städten sehr oft zum Verkauf gelangt, seltener das Fleisch perlsüchtiger Thiere in Betracht, falls die neuerdings von manchen angezweifelte Identität der Krankheitserreger der Perlsucht und der menschlichen Tuberkulose dennoch vorhanden sein sollte.

Die Transportwege für den Infektionserreger sind — abgesehen von dem Genuss roher Milch und namentlich der Butter (vgl. S. 262) — Kontakte und Einathmung. Durch Berührung phthisischen Sputums oder mit Sputum beschmutzter Kleider etc. kommen im Kindesalter vermuthlich sehr zahlreiche Uebertragungen zu Stande. Phthisische Mütter inficiren die Kinder durch Küsse, durch ihre Finger, an denen Sputumtheile haften; die Kinder berühren mit ihren Händen den mit Sputum verunreinigten Fussboden und führen dann die Finger in den Mund. Zahllose Möglichkeiten dieser Art werden dazu führen, dass Kinder in einer Umgebung von Phthisikern sich Kontaktinfektionen zuziehen. — Beim Erwachsenen werden die Kontakte zurücktreten, weil die Hände nicht mit dem Fussboden in Berührung kommen und nicht so leicht ungereinigt in den Mund geführt werden. Immerhin werden auch hier durch Berührung inficirter Kleider, Wohnungstheile, Utensilien (Bücher, Akten) zuweilen vereinzelte Tuberkelbacillen in Mund und Nase gelangen. Von da können sie — selten und wohl nur unter besonderen begünstigenden Umständen beim Erwachsenen, häufig dagegen beim Kinde — auf den Lymphbahnen in Lymphdrüsen und von diesen aus oft erst nach Jahren an disponirten Stellen des Körpers zur Ansiedlung und Wucherung gelangen.

Der offenbar häufigere und für Erwachsene fast ausschliesslich in Betracht kommende Weg zur Infektion der Lunge besteht in der Einathmung von Tuberkelbacillen. Experimentell ist an den verschiedensten Versuchsthieren dieser Infektionsmodus als ein ganz besonders gefährlicher festgestellt; sowohl feinste mit Tuberkelbacillen beladene Tröpfchen, als feiner Sputumstaub rufen, der Inspirationsluft beigemengt, schon in sehr kleinen Dosen tödtliche Infektion hervor. Es ist kein Grund anzunehmen, dass beim Menschen mit seinem grösseren Athemvolum und seinem kräftigeren Inspirationsstrom eine Infektion nicht erfolgen sollte, wenn Tuberkelbacillen in Form feinsten Tröpfchen oder feinsten Staubes in der eingeathmeten Luft schweben.

Eine Beladung der Luft mit infektiösen Tröpfchen kommt sehr oft in Wohnungen zu Stande, in welchen Phthisiker stark husten. Jeder Phthisiker verspritzt gelegentlich, in gewissen Phasen seiner Krankheit, derartige Tröpfchen; viele produciren dieselben dauernd; manche in ausserordentlicher Menge. Die Hauptmenge der Tröpfchen erfüllt nur in der Nähe des Kranken die Luft und setzt sich bald zu Boden; in 80 cm Entfernung sind nur noch selten in solcher Weise verschleuderte Tuberkelbacillen nachweisbar; in vereinzelten Fällen verbreiten sich die Tröpfchen bis $1\frac{1}{2}$ Meter in horizontalem Abstand vom

stenden, oder auch $\frac{1}{2}$ Meter aufwärts. Die Menge der in dieser Form der Luft schwebenden Tuberkelbacillen ist um so grösser, je mehr der Kranke hustet, je reicher das Sputum und die im Munde verbleibenden Sputumreste an Tuberkelbacillen sind und je mehr die Art der Patienten, zu husten, eine Verstreuung unterstützt. — Die in den gesetzten Tröpfchen enthaltenen Tuberkelbacillen haben eine kurz begrenzte Lebensdauer. Durch Licht und völliges Austrocknen gehen sie um so rascher zu Grunde, je feiner die Tröpfchen waren. Eine Verwandlung der angetrockneten Tröpfchen in flugfähigen Staub mit lebenden Tuberkelbacillen scheint daher kaum je vorzukommen.

Die Gefahr, Tröpfchen mit Tuberkelbacillen durch Inhalation aufzunehmen, muss sehr erheblich für diejenigen Menschen sein, welche längere Zeit dauernd in der Nähe eines stark hustenden und verspritzenden Phthisikers befinden. Bei Ehegatten, bei Mutter und Kind, bei Arbeitern und Bureaubeamten, die in nächster Nähe eines Phthisikers beschäftigt sind, bei Schülern, die in der Nähe des phthisischen Lehrers sitzen, wird die Uebertragung sich in dieser Weise im Laufe längerer Zeit häufig vollziehen. Kurzes, gelegentliches Zusammensein mit einem Phthisiker wird in keinem Falle ernstere Chancen für eine Uebertragung bieten, weil dafür die Zahl der in der Luft schwebenden infektiösen Tröpfchen stets zu gering ist; freilich lässt sich die Möglichkeit einer Infektion nie ganz ausschliessen.

Trockener Sputumstaub mit lebenden Tuberkelbacillen kann sich dann in der Einathmungsluft finden, wenn das Sputum so zertheilt ist, dass feinste flugfähige Stäubchen daraus entstehen. Bei einem Auswurf, welcher in irgend einem Spucknapf aufgefangen wird, findet eine solche Zerkleinerung niemals. Dieselbe erfolgt vielmehr erst dann, wenn das Sputum auf den Fussboden oder Teppich geräth, wo es eintrocknet, von den Füßen fein zerrieben und dann durch Wippen, Fegen u. dgl. aufgewirbelt wird; oder dadurch, dass Sputumtheile in Taschentücher oder an Kleider gerathen, hier antrocknen und durch Hantirungen, an leichtesten Stofffasern haftend, abgelöst werden und in die Luft übergehen. Sehr selten sind diese infektiösen Stäubchen so leicht, dass sie längere Zeit in der Luft schweben; eine dauernde Beladung der Luft kommt nur da zu Stande, wo mechanische Erschütterungen und stärkere Luftbewegung immer wieder die Staubpartikel in die Luft überführen. Eine erhebliche Infektionsgefahr wird daher von dieser Seite nur drohen in einer Wohnungsluft mit viel sichtbarem Staub, der sich bis zu Kopfhöhe erhebt; fehlt es an solcher Staubbildung, so ist der Gehalt der oberen Luftschichten an trockenen Sputumtheilchen selbst in Räumen, in denen sich Phthi-

siker aufhalten, gering und bietet wenig Infektionschancen. Von grosser Bedeutung ist das aus sehr zahlreichen Untersuchungen hervorgehende Ergebniss, dass tuberkelbacillenhaltiger Staub trotz der grossen Verbreitung der Phthise nicht etwa ubiquitär in der Luft aller Strassen, Verkehrsmittel, Arbeitsräume sich findet, wo sich Phthisiker eigentlich aufhalten. Strassenstaub kann zweifellos Tuberkelbacillen enthalten; aber hier tritt, wenn Staubaufwirbelung erfolgt, im Allgemeinen zugleich eine solche Verdünnung ein, dass die Passanten einer ernstlichen Gefahr nicht ausgesetzt sind (siehe S. 167). Durch eine Häufung von Phthisikern auf begrenztem Terrain (Kuranstalten) und reichliche Entleerung des Sputums auf den Boden können allerdings die Infektionschancen gesteigert werden. — In geschlossenen, der Staubaufwirbelnden Kraft des Windes entzogenen Räumen mit starkem Menschenverkehr ist die Luft in Kopfhöhe selten infektiv. Es geht dies aus der Untersuchung des in Kopfhöhe abgelagerten lockeren Staubes derartiger Räume mit aller Bestimmtheit hervor. Zahlreiche Proben aus Wartesälen, Bureaus, Baonzen, Strassenbahnwagen u. s. w. ergaben durchaus negative Resultate bezüglich des Gehalts an Tuberkelbacillen. Selbst in Wohnungen von Phthisikern wurden unter 60 Proben von Staub, der in mindestens 1 Meter Höhe abgelagert war, keine Tuberkelbacillen gefunden; und nur in Phthisiker-Krankensälen war unter 60 Proben 3mal der Staub tuberkelbacillenhaltig. — Wischt man die unteren Regionen des Zimmers nicht trocken, sondern mit feuchten Schwämmchen ab, so ist natürlich die Ausbeute erheblich grösser. Aber selbstverständlich bekommt man bei dieser Entnahme vorzugsweise Sputumtheile, welche die Eigenschaft besaßen, bis zu Kopfhöhe flugfähig zu sein, sondern höchstens für eine Kontaktinfektion in Frage kommen können.

Die individuelle Empfänglichkeit des Menschen gegenüber dem Tuberkelbacillus ist eine sehr ausgedehnte; wir sehen dies aus dem enormen Procentsatz der an Tuberkulose Sterbenden und aus dem noch viel höheren Procentsatz, in welchem gewisse, durch Tuberkelbacillen verursachte Veränderungen bei den Sektionen gefunden werden. Andererseits zeigen uns gerade diese letzteren Beobachtungen, sowie die Erfahrungen über Verlauf und Dauer der Erkrankung bei den verschiedenen Phthisikern, dass offenbar eine sehr mannigfaltige Abstufung der individuellen Disposition vorliegt. Ob überhaupt ein Mensch dauernd jeder Art der Infektion mit Tuberkelbacillen zu widerstehen vermag, ist zweifelhaft. Meist begegnen wir einer graduell variirenden Disposition, welche bewirkt, dass bei dem Einen nur kurze Erkrankung und Ausheilung eintritt, bei dem Anderen sehr protrahierte

Erkrankung, die erst durch Complicationen zum Ende führt, beim Dritten eine akut tödtlich verlaufende Affektion. Gerade diese graduelle Ungleichheit bei verschiedenen Individuen, sowie der zeitliche Wechsel der Disposition bei demselben Individuum erschweren die Beurtheilung der Mitwirkung dieses Faktors ausserordentlich.

Wann die Altersdisposition am grössten ist, das ergibt sich einigermaßen aus der oben angeführten Sterblichkeit der verschiedenen Altersklassen. Jedoch ist auch hier zu berücksichtigen, dass unerkannte Anzeichen der Erkrankung oft um viele Jahre hinter dem Tode zurückliegen.

Im übrigen ist über diejenigen Körperverhältnisse, welche es nach der Infektion zu einer ausgedehnteren Erkrankung kommen lassen, noch wenig bekannt. Manche Autoren begnügen sich mit der Annahme, dass ein möglichst gesunder, nach den Regeln der allgemeinen Hygiene gepflegter Körper für Phthise nicht empfänglich sei. Andere sehen in chronischen Katarrhen gewisser Bronchien (Spitzenkatarrhe) eine besondere Disposition. BREHMER hat aus seinen reichen Erfahrungen die Ansicht entnommen, dass Menschen mit relativ kleinem Herzen und voluminöser Lunge, mit langem Thorax, ferner solche, die als letzte einer längeren Kinderreihe geboren wurden, und solche, die in der Jugend schlechte Esser waren und in der Pubertät an Herzpalpitationen litten, für Phthise disponirt seien.

Bezüglich der örtlichen und zeitlichen Disposition ist bereits S. 141 und 144 die völlige Immunität grosser Höhen, die relative Immunität mässiger Höhen und der Seeküsten, sowie die Akme der Todesfälle im Winter und Frühjahr hervorgehoben und erläutert. Im übrigen treten zwischen einzelnen Ländern, Provinzen und Städten noch vielfach Differenzen hervor, die aber keineswegs auf Einflüsse der Bodenbeschaffenheit etc. hindeuten, sondern in Verschiedenheiten der Dichtigkeit der Bewohnung, der Wohlhabenheit, der Beschäftigungsweise etc. ihre volle Erklärung finden.

Prophylaktische Maassregeln. Nachdem die neueren Untersuchungen mit voller Deutlichkeit gezeigt haben, dass — abgesehen von Milch und Butter, deren Unschädlichmachung als Infectionsquellen bereits früher besprochen wurde — vorzugsweise der Kranke durch die von ihm beim Husten verspritzten Tröpfchen und durch sein unter Umständen in flugfähigen Staub verwandeltes Sputum die wesentlichste Infectionsgefahr bietet, muss auch die Bekämpfung der Phthise sich in erster Linie gegen den Kranken wenden.

Wie bei anderen contagiösen Krankheiten kommt zunächst die Meldepflicht und die Isolirung des Kranken in Frage. Nun würde es zwar undurchführbar sein, in jedem Fall von beginnender, oft

wieder ausheilender oder sich über viele Jahre hinziehender Phthise die Meldepflicht und die Isolirung des Kranken zu verlangen. Aber andererseits wäre es von allergrösster Wichtigkeit, wenn wir eine gesetzliche Handhabe bekämen, um in solchen Fällen, wo der Phthisiker in evidentem Maasse eine Gefahr für seine Umgebung bildet, besondere Vorsichtsmaassregeln in Anwendung zu ziehen. Diese könnten in zeitweiser Isolirung bestehen; oder in dem Untersagen einer Thätigkeit, durch welche er zahlreiche Menschen mit Ansteckung bedroht (Lehrer); oder wenigstens darin, dass der Kranke angehalten wird, das Auhusten seiner Mitbewohner zu unterlassen und das Sputum vorschriftsmässig zu sammeln und zu desinficiren; endlich darin, dass die von dem Phthisiker verlassene Wohnung und dessen Kleidung desinficirt wird. Zu einem Theil sind derartige Maassregeln bereits verwirklicht durch die zahlreichen Lungenheilstätten, die einen grossen Prozentsatz der infektiösen Kranken aussondern, den Verlauf der Erkrankung günstig beeinflussen und die Kranken zu einem Verhalten erziehen, durch das die Gefahr für die Umgebung erheblich herabgemindert wird. — Ausser der segensreichen Thätigkeit der Lungenheilstätten wird es aber auch erforderlich sein, Asyle für vorgeschrittene Stadien zu gründen und durch deren Ausscheidung die schlimmsten Infektionsquellen nach und nach zu beseitigen. In Norwegen hat ein solches, durch ein besonderes Gesetz sanktionirtes Vorgehen bereits begonnen, das voraussichtlich einen wichtigen Schritt zur Tilgung der Tuberculose in jenem Lande bedeuten wird.

Bei den nicht isolirten Kranken kommt vor allem eine Beseitigung des Sputums und die Verhütung der Tröpfcheninfektion in Betracht. — Der Auswurf soll nie auf den Fussboden entleert werden (auch nicht in Restaurants, Wartehallen, Bahnwagen etc.), sondern stets in einen Spucknapf. Meistens schreibt man die Füllung der Spucknapfe mit Wasser, Carbolwasser u. dgl. vor und warnt vor trockener Füllung. Diese Warnung ist unbegründet; zu einem Verstäuben von Tuberkelbacillen aus einem Spucknapf heraus kommt es auch bei Füllung mit Sand, Kaffeesatz, Lohe, Holzwolle u. dgl. niemals, ausser wenn man unnatürliche Versuchsbedingungen einführt. Trockene Füllung ist aus praktischen Gründen sogar meist vorzuziehen. — Die Entleerung, Desinfektion und Reinigung der Spucknapfe bereitet viel Schwierigkeiten. Eine wirksame Desinfektion erfolgt nur durch starke (5 p. m.) Sublimatlösung; ferner durch Kochen (KIRCHNER's Sputumdesinfektor). Einfacher, billiger und für das Personal angenehmer ist die Verwendung von verbrennbaren Carton-Spucknapfen (von FINGERHUT & Co. in Breslau zu verschiedensten Preisen

geliefert). — Ist ein Spucknapf nicht erreichbar, so soll der Kranke entweder ein Spuckfläschchen (nach KNOPF oder DETTWEILER) bezw. ein verbrennbares Cartonspuckfläschchen benutzen; oder der Auswurf ist ausnahmsweise in das Taschentuch zu entleeren. Die hierzu verwendeten Taschentücher, ebenso die Tücher, welche bei heftigem Husten vor den Mund gehalten oder mit welchen Sputumreste von Mund und Bart abgewischt waren, sind höchstens einen Tag zu benutzen, weil sonst solches Austrocknen stattfinden kann, dass sich Fasern mit trockenen Sputumtheilchen leicht ablösen. Die Taschentücher sind lemnächst zu desinficiren. Empfehlenswerth ist die thunlichste Benutzung von Papiertaschentüchern (bei FINGERHUT & Co. 10 Stück für 3 $\frac{1}{2}$ Pfg.), die nach dem Gebrauch verbrannt werden. — Sputumreste finden sich bei den meisten Kranken noch an den Kleidern (Tascheneingang) und an den Fingern. Letztere sind so häufig als möglich (unbedingt nach merklicher Beschmutzung mit Sputum) zu reinigen; die Kleider sind von Zeit zu Zeit zu desinficiren. — Selbstverständlich ist ferner Staubentwicklung in Räumen mit Phthisikern nach Möglichkeit zu vermeiden; die Reinigung ist stets feucht vorzunehmen; statt der Teppiche sollen abwaschbare glatte Auflagen den Fussboden bedecken. — Von Phthisikern verlassene Wohnungen (Bureaux) sind nach den oben S. 581 gegebenen Vorschriften zu desinficiren.

Die Tröpfcheninfektion soll dadurch vermieden oder möglichst eingeschränkt werden, dass der Phthisiker sich während der Hustenstösse auf Armlänge von anderen Menschen fernhält, den Kopf von diesen abwendet und wo möglich das Taschentuch vor den Mund hält. In Arbeitsräumen, Bureaux u. dgl. betrage der Abstand zwischen den Köpfen der Arbeitenden mindestens 1 Meter. An Schreibpulten lässt sich eine trennende Glaswand von $\frac{1}{2}$ Meter über Kopfhöhe zwischen den einander gegenüberstehenden Schreibenden anbringen, zwischen benachbarten Arbeitern seitlich trennende Zwischenwände. Auch im Krankenzimmer ist die Abgrenzung des Bettes durch einen durchsichtigen oder undurchsichtigen glatten Vorsetzer oft von grossem Vortheil. Die Hauptsache bleibt indess immer die richtige Erziehung des Kranken zu einem die Umgebung möglichst wenig gefährdenden Hustenmodus und zu vorschriftsmässiger Beseitigung des Sputums.

In dieser Weise kann der Kampf gegen die Ausstreuerung des Contagiums zweifellos ausserordentlich wirksam geführt werden; und die Vorstellung, als ob man wegen der zu grossen Verbreitung der Infektionsquellen auf deren Bekämpfung besser ganz verzichten müsse, ist eine durchaus irrite.

Dagegen lässt sich einstweilen keine praktische Prophylaxis auf-

Die parasitären Krankheiten.

... auf eine Verminderung der Disposition. Die noch sehr wenig ... lässt sich höchstens insofern be- ... mit chronischem Bronchialkatarrh ... pathischen Habitus vor Infektion ... in einem gegen ... etc. — Mit der Empfehlung ... zum Zweck der Erhöhung der all- ... gegen Infektionskrankheiten ist bei ... als eine fast das ganze Leben ... durch das Contagium vorliegt und also ... oder Schutzvorrichtungen des Körpers ... gründliche Besserung der Gesund- ... breitesten Schichten der Bevölkerung ... socialen Lage und auch dann nur ... Abhilfe gegen eine einzelne Infektions- ... innerhalb absehbarer Zeit ... nur die spezifische Bekämpfung des ... Immunisirung.

Specielle Aetiologie der Infektionskrankheiten: HIRSCH, *Topographische Pathologie*, I—III, 1881 ff. — v. ZERNESSE, *Therapie*, 2. Band. **Akute Infektionskrankheiten.** — v. FLÜGGE, „Krankheitserregung“ in *FLÜGGE, Die Mikroorganismen*, Die Bekämpfung der Infektionskrankheiten.

Die neueren Arbeiten von BEHRING, BRIEGER, EHRLICH, ... in der *Zeitschr. f. Hyg.*; von BUCHNER, KNOEL, ... *med. Wochenschrift* und *Arch. f. Hygiene*; von ... in *VIRCHOW'S ARCHIV* und *Annales de l'Inst. Pasteur*; EHRLICH, *Schlussbetrachtungen* in Bd. XIII von ... Wien 1901. — METSCHNIKOFF, *Immunität*, im ... Paris 1901. — DÖNITZ, *Klinisches* ...

Verh. d. Ver. f. öff. Ges. in Braunschweig 1890. — ... 1901. — FLÜGGE, *Klinisches Jahrb.* Bd. VII. — BOSCH, *Ber. des internat. Hygiene-Congresses zu* ... d. Kaiserl. Ges.-Amt, Bd. IV, 1888. — BEH- ... MEINERT, *Deutsche medic. Wochenschr.* 1888. — KOCH u. GAFFKY, *Bericht über die Thätigkeit der zur* ... 1887. — KOCH, *Zeitschr. f. Hyg.*, Bd. XIV u. ... v. PETTENKOFER, *Zum gegenwärtigen Stand der* ... Bd. V u. VI. — ... d. Kaiserl. Ges.-Amt, Bd. II. — BERL. ... BEHRING, *Geschichte der Diphtherie* 1893. — ... d. Ges. in Kiel 1896.

Influenza: WUTZDORFF, Arbeiten a. d. Kaiserl. Ges.-Amt Bd. IX 1894. —
FRIEDRICH, ebenda. — Die Grippe-Epidemie im deutschen Heere 1889/90. be-
arbeitet von der Medicinalabth. des Kgl. Preuss. Kriegsminist., 1890.

Pest: Bericht etc. der Kommission. Arbeiten a. d. Kaiserl. Ges.-Amt
Bd. XVI. 1899. — MÜLLER und PÖCH, die Pest, in NOTHNAGEL's Spec. Path. und
Ther. Wien 1900.

Malaria: R. KOCH, Berichte, Deutsche med. Wochenschr. 1899 u. 1900. —
ZIEHMANN, Malaria und andere Blutparasiten, Jena 1898. — CELLI, die Malaria,
in BEHRING's Beitr. zur exp. Therapie 1900.

Tuberkulose: KOCH, Arbeiten a. d. Kaiserl. Ges.-Amt, Bd. II. — CORNET,
Zeitschr. f. Hygiene, Bd. V. — Die Tuberkulose; In NOTHNAGEL's Spec. Path.
u. Ther. Wien 1900. — Berichte der Tuberkulose-Congresse in Berlin und
London 1899 u. 1901.

Anhang.

Die wichtigsten hygienischen Untersuchungsmethoden.

I. Allgemeine Methodik der bakteriologischen Untersuchung.

A. Mikroskopische Untersuchung.

1. *Das Untersuchungsmaterial* (Eiter, Blut u. dergl., Organstückchen, künstliche Culturen) kann je nach seiner Concentration unverdünnt oder mit 0.7 procentiger Kochsalzlösung verdünnt verwendet werden. Ueber die Präparation von zähflüssigem oder breiigem Material sowie Organstückchen siehe unter 3.

2. *Reagentien*: a) Einfache Farblösungen: 1 bis 2 g Gentianaviolett oder Fuchsin oder Methylenblau oder Bismarckbraun in 100 ccm Wasser gelöst; vor jedem Gebrauch frisch filtrirt. — Oder man hält sich gesättigte alkoholische Lösungen in Vorrath („Stammlösungen“) und setzt davon 20 ccm zu 80 ccm destillirten Wassers.

b) LÖFFLER's Methylenblau. Zu 100 ccm destillirten Wassers giebt man 2 Tropfen einer 10 procentigen Kalilauge, mischt gut und setzt dann 30 ccm einer gesättigten alkoholischen Methylenblau-Lösung zu. Vor dem Gebrauch zu filtriren; spätestens nach 1 Woche neu anzufertigen.

c) Carbofuchsin (ZIEHL-NEELSEN'sche Lösung): 100 ccm 5 procentiger Carbonsäure und 10 ccm gesättigte alkoholische Fuchsinlösung werden gemischt. Die klare Lösung hält sich sehr lange gebrauchsfähig. Ausser der concentrirten Lösung wird auch die 10 fach verdünnte vielfach benutzt.

d) Anilinwasser-Gentianaviolett: 5 ccm Anilinöl werden mit 100 ccm destillirten Wassers einige Minuten kräftig geschüttelt, dann durch ein angefeuchtetes Filter filtrirt; in 100 ccm des klaren Filters wird 1 g Gentianaviolett gelöst; oder man fügt zu 100 ccm Anilinwasser 11 ccm concentrirte alkoholische Gentianalösung. Erst nach 24 stündigem Stehen wird die Lösung unter Absetzen eines Niederschlages völlig klar und soll erst dann (nach Filtration) benutzt werden.

e) Picrocarmin: gebrauchsfertig von GRÜBLER, Leipzig, zu beziehen.

f) Eosin: 2 g in 96 procentigem Alkohol lösen und zum Gebrauch mit 96 procentigem Alkohol 1 + 4 verdünnen.

g) Jodjodkaliumlösung nach GRAM: 1 g Jod und 2 g Jodkalium in 10 bis 20 ccm destillirten Wassers lösen, dann bis 300 ccm mit destillirtem Wasser nachfüllen.

ferner: 60 procentiger und 96 procentiger Alkohol. — Salzsaurer Alkohol: 100 ccm 90 procentiger Alkohol + 20 Tropfen concentrirte Salzsäure. — Essigsäure: 0.5 bis 1 procentige wässrige Lösung. — Xylol. — Canada-balsam, am bequemsten in Blechtuben von GRÜBLER, Leipzig.

3. Anfertigung von Deckglas-Präparaten.

a) Ungefärbte Präparate. Von Flüssigkeiten wird, event. nach Verdünnung mit 0.7 procentiger Kochsalzlösung, ein Tröpfchen auf den Objectträger gebracht, ein Deckglas aufgelegt und bei enger Blende das Präparat durchmustert.

Sollen Organe oder Culturen auf festem Nährboden untersucht werden, so bringt man zunächst auf den Objectträger ein Tröpfchen 0.7 procentiger Kochsalzlösung. Dann entnimmt man mit geglühtem Platindraht eine kleine Menge der Cultur oder ein kleines Partikelchen des Organs und zerreibt dasselbe in der Kochsalzlösung, legt ein Deckglas auf und untersucht.

Soll die Beobachtung von Mikroorganismen in ungefärbtem, lebendem Zustande längere Zeit fortgesetzt werden, so geschieht dies „im hängenden Tropfen“. In die Mitte eines gut gereinigten Deckgläschens wird ein kleiner Tropfen der zu untersuchenden Flüssigkeit gebracht, sodann auf das Deckgläschen ein Objectträger mit Hohlschiff, dessen Rand mit Vaseline umzogen ist, aufgedrückt, so dass das Deckglas fest an dem Objectträger haftet. Nach dem Umdrehen des Präparats hängt dann der Tropfen vor Verdunstung geschützt in der Höhlung des Objectträgers. Handelt es sich um die Untersuchung von Culturen auf festem Nährboden, so bringt man einen Tropfen 0.7 procentiger Kochsalzlösung oder neutrale Bouillon auf das Deckgläschen, impft ihn mit der geglühten Platinnadel am Rande mit einer Spur Culturmasse und verfährt dann wie oben. Besichtigung im abgedunkelten Gesichtsfeld (tiefstehender Condensor bezw. enge Blende).

b) Gefärbte Präparate. Von Flüssigkeiten entnimmt man mit der Platinöse ein kleines Tröpfchen, bringt es in die Mitte des eingeputzten Deckglases und breitet es mit Hülfe des Platindrahtes in möglichst dünner Schicht aus.

Von zähflüssigem oder breiigem Material, z. B. Sputum, entnimmt man ein kleines Partikelchen und bewirkt die Vertheilung in dünner Schicht auf dem Deckglas entweder ebenfalls mit Hülfe des Platindrahtes oder, wo dieses nicht angängig, in der Weise, dass man das Partikelchen zunächst auf die Mitte eines Deckglases bringt, dann ein anderes Deckglas auflegt und andrückt und nun die beiden Deckgläser in horizontaler Richtung auseinanderzieht.

Aus Organen (Leber, Milz, Lunge, Niere) entnimmt man mit geglühter Pincette ein kleines Stückchen von einer frischen Schnittfläche, und wischt damit einige Male über das Deckglas (Ausstrichpräparat).

Zur Untersuchung von Culturen auf festem Nährboden bringt man zunächst auf die Mitte des Deckglases ein ganz kleines Tröpfchen Kochsalzlösung mit der Platinöse; entnimmt dann mit der Spitze eines geglühten Platindrahtes eine sehr kleine Menge der Cultur und vertheilt dieselbe in dem Flüssigkeitstropfen. Der Tropfen wird dabei in sehr dünner Schicht über die Oberfläche des ganzen Deckglases ausgebreitet.

Die so hergestellte dünne Ausbreitung irgend eines beliebigen zu untersuchenden Materials muss nun zunächst vollständig lufttrocken werden. Am

besten erreicht man dies dadurch, dass man das Präparat mit der bestrichenen Seite nach oben auf den Tisch legt und ruhig trocknen lässt. — Soll das Antrocknen etwas beschleunigt werden, so erwärmt man das Deckglas gelinde, indem man es zwischen den Fingern ca. 50 cm über der Spitze der Flamme hin- und herbewegt. Keinesfalls darf dieses Erwärmen so stark sein, dass die auf dem Deckglas befindliche Flüssigkeit heiss wird oder gar anfängt zu sieden.

Die angetrocknete Schicht muss nun noch auf dem Deckglas fixirt werden, damit sich dieselbe bei der nachfolgenden Behandlung mit Farbstoff- und Waschflüssigkeiten nicht wieder ablöst. Es geschieht dies durch starkes Erwärmen der Schicht. Während das nasse Präparat nicht erhitzt werden darf, verträgt das trockene Präparat relativ hohe Hitzegrade, ohne dass die Zellen und Bakterien eine Formveränderung erleiden.

Am sichersten wird die Fixirung erreicht, indem man die lufttrockenen Deckgläser im Trockenschrank 2—10 Minuten auf 120—130° erhitzt. — Für die meisten Fälle aber genügt folgendes Verfahren: Man fasst das Deckglas mit einer Pincette und zieht es, die bestrichene Seite nach oben, dreimal in horizontaler Richtung durch die Flamme eines Bunsenbrenners, etwa mit der Schnelligkeit, mit der man Brot schneidet. Es ist hier etwas Uebung erforderlich, damit das Durchziehen weder zu langsam (dann verbrennt das Präparat) noch zu schnell geschieht (dann wird keine Fixation erreicht).

Das so präparirte Deckglas wird nunmehr gefärbt. Man giebt mit einer Tropfpipette einige Tropfen Farblösung darauf und lässt dieselbe einige Minuten einwirken; oder man lässt das Glas auf der in Schälchen gegossenen Farblösung schwimmen. — Will man die Färbung verstärken und beschleunigen, so fasst man das Deckglas mit der Pincette und erwärmt es über der Flamme so lange, bis die Farbflüssigkeit anfängt zu dampfen.

Hat der Farbstoff lange genug eingewirkt, so wird derselbe mit Wasser gut abgespült. Dann legt man das Deckglas mit der Präparatseite nach oben auf ein Blatt Filterpapier und drückt einen Objectträger so auf, dass das Deckglas an letzterem haftet. Von der oberen Fläche des Deckglases sind noch die letzten Spuren Wasser durch Abtupfen mit einem Bäschchen Filterpapier zu entfernen. Dann setzt man einen Tropfen Immersionsöl darauf und untersucht bei hellem Licht (hochstehender Condensor, offene Blende).

Ist das Präparat gelungen und soll dasselbe aufbewahrt werden, so wischt man zunächst das Öl von der Oberfläche des Deckglases ab und bringt mit einem Glasstabe rings um dasselbe auf den Objectträger reichlich Wasser. Das Deckglas wird bald auf dem Wasser schwimmen und kann dann, ohne dass das Präparat beschädigt wird, vom Objectträger abgezogen werden. Darauf legt man das Deckglas zwischen zwei Blätter Filterpapier und drückt sanft an, um das Wasser aufzusaugen; schliesslich lässt man das Deckglas an der Luft vollends trocken werden. Die Trockenheit muss eine absolute sein, da sonst mit dem Canadabalsam Trübungen entstehen. Nachdem man dann auf den Objectträger einen kleinen Tropfen Canadabalsam (der eventuell mit Xylol zu verdünnen ist) gebracht hat, drückt man das Deckglas vorsichtig auf, so dass sich der Balsam bis zum Rande verbreitet. In diesem Zustand muss das Präparat 8—14 Tage liegen bleiben, bis der Canadabalsam erstarrt ist und der Ueberschuss desselben mit dem Messer und Nachwischen mit Xylol entfernt werden kann.

4. *Behandlung von Schnitten.* Die Organstücke werden entweder mittelst friermikrotoms frisch geschnitten und gefärbt; oder erst in Alkohol bzw. einem Gemisch von 80·0 Chloroform, 10·0 Eisessig und 80·0 Alkohol (96 procentig) aufbewahrt. — Von den in absolutem Alkohol gehärteten Organen werden kleine Stücke abgeschnitten, der Alkohol mit Fliesspapier entfernt; dann bringt man auf obere Fläche eines für die Klemme des Mikrotoms passend geschnittenen Korks einen Tropfen käuflichen flüssigen Leim, drückt das Organstückchen hinein und setzt wieder in Alkohol. (Statt des Leims kann man eine Auflösung von 10 g Latex in 20 g Wasser und 40 g Glycerin benutzen). Nach 1—2 Stunden ist der Leim völlig erstarrt.

Von zarterem Material erhält man bessere Schnitte, wenn man die Organstückchen erst in dem Eisessig-Chloroform-Alkohol-Gemisch (s. oben) mindestens einige Stunden konserviert, dann 4—6 Stunden in 96 procentigem Alkohol unter stündlichem Wechsel desselben nachhärtet und in Paraffin einbettet. Die Stückchen kommen zunächst auf 2 Stunden in Xylol, sodann auf einige Stunden in ein Gemisch von Xylol und Paraffin (vom Schmelzpunkt 51°) aa, das man nach Einstellen in den Brutschrank (37°) flüssig hält, hierauf in reines, ebenfalls dauernd flüssig zu haltendes Paraffin auf mindestens 2 Stunden. Dann füllt man ein Deckglasschälchen mit flüssigem Paraffin, bringt das paraffindurchtränkte Organstückchen hinein und lässt nun das Paraffin in einer Schale mit kaltem Wasser schnell zu einem festen Block erstarren, den man nun von der Schachtel befreit, für das Mikrotomtischchen passend zurechtschneidet und auf demselben durch etwas zwischengebrachtes flüssiges Paraffin festigen kann.

Die Schnitte können in Spiritus gebracht und unbeschadet ihrer Färbbarkeit ungeachtet darin aufbewahrt oder sogleich auf Objectträger aufgeklebt werden. Hierzu legt man sie zunächst auf $\frac{1}{4}$ Stunde in Xylol, sodann auf einige Minuten in 96 procentigem Alkohol, dann in warmes Wasser von 45° C., wo sie sich leicht ausbreiten und leicht auf einem untergeschobenen Objectträger aufgefangen werden können. Man entfernt nun vorsichtig rings um den Schnitt und von der Unterseite des Objectträgers das überschüssige Wasser mit Fliesspapier und lässt den Rest des Wassers durch Einlegen des Objectträgers in den Brutschrank (37°) auf 24 Stunden verdunsten, wobei eine zur Vornahme nachfolgender Färbungen ausreichende Fixirung des Schnittes erreicht wird.

Für die Färbung wählt man die dünnsten, wenn auch kleinen, Schnitte aus. Man fasst dieselben mit einer rechtwinklig gebogenen Glas- oder Platinnadel auf und überträgt sie direct aus dem Alkohol in die Färbeflüssigkeit. Nachdem der Farbstoff eine halbe bis 24 Stunden eingewirkt hat, fischt man die Schnitte mit derselben Glas- oder Platinnadel wieder heraus und überträgt sie in die Entfärbungsflüssigkeit, wo sie mit der Nadel etwas hin- und herbewegt werden. Nachdem die Entfärbung vollendet, so überträgt man mit der Nadel den Schnitt in ein Schälchen mit nicht zu wenig reinem Alkohol, um das Wasser zu entziehen. Nach 5 Minuten überträgt man den Schnitt in Xylol oder erst in Nelkenöl und dann in Xylol. Hier breitet er sich von selbst aus und wird bald durchsichtig. Nach 1 Minute schiebt man einen Spatel unter den Schnitt und hebt ihn vorsichtig aus dem Xylol, wobei darauf zu achten ist, dass er auf dem Spatel flach, ohne Falten und Knicke liegt. Nunmehr setzt man den Spatel mit seiner scharfen Kante auf die Mitte eines reinen Objectträgers und zieht den Schnitt vorsichtig mit der Nadel herüber. Er soll dann auch hier glatt ausgebreitet liegen.

Mit Filterpapier saugt man das überschüssige Xylol sorgfältig ab, giesst dann auf den Schnitt einen Tropfen Canadabalsam und legt das Deckglas auf.

3. *Spezielle Färbemethoden.* 1) **GRAM'sche Methode.** Die Anstrichpräparate auf Deckgläsern bezw. die Schnitte kommen 2 Minuten in Anilinwassergentiana-Lösung, dann (ohne vorher abzuspülen) in Jod-Jodkalium-Lösung, bestehend aus 1 g Jod, 2 g Kal. jod. und 300 ccm destillirtem Wasser. In dieser Lösung bleiben sie 2 Minuten, werden dann $\frac{1}{2}$ Minute in 96 procentigem Alkohol bewegt, bis sie farblos oder blassblau erscheinen. Dann Balsam bezw. Xylol, Balsam. — Die Bakterien treten im Präparat schwarzblau gefärbt auf farblosem Grunde hervor.

Sollen die Zellkerne des Gewebes mit einer Contrastfarbe (roth) gefärbt werden, so legt man die Schnitte vor der GRAM'schen Färbung einige Minuten in Wasser, dann 30 Minuten in Pikrokarmilösung; dann Auswaschen in Wasser, darauf in Alkohol und von da in die Gentianalösung wie oben. — Bei Anstrichpräparaten auf Deckgläsern gelingt die Gegenfärbung auch dadurch, dass man die nach GRAM fertig behandelten Deckgläser in dünne alkoholische Eosinlösung, wozu man in Alkohol abspült und trocknet.

Unfärbbar auf: Eiterkokken, Diploc. pneumoniae, Micr. tetragenus; **Wassermilch:** Diphtherie, Mäusesepsis, Schweinerothlauf, Tuberkel, Lepra bacillen u. s. — Es färben sich nicht nach dieser Methode: Typhus, Rotz, **Kultur:** Pest, Hühnercholera bacillen; Cholera bacillen; Gonokokken; Recurrenzen.

2) **Doppelfärbung nach WEIGERT (für Schnitte).** Die Schnitte zunächst 10 Minuten in Gentianalösung, dann Abspülen in Alkohol, den Alkohol durch Eintauchen in destillirtes Wasser entfernen; darauf für 1—24 Stunden in Pikrokarmilösung, Auswaschen in Alkohol, Nelkenöl, Xylol, Balsam. Die Mikroorganismen erscheinen blau, die Zellkerne roth. — Sehr geeignet für Milzbrand, **Kultur:** Schweinerothlauf u. s. w.

3) **Sporenfärbung.** Die Bedingungen reichlicher Sporenbildung und **Kultur:** sind vorher für die betreffende Bakterienart und Cultur zu bestimmen und das Material vor Anfertigung eines gefärbten Präparats im hängenden Tropfen auf seinen Gehalt an Sporen prüfen. Sodann Deckglas reichlich mit Culturmasse von der Oberfläche oder den Randpartieen beschicken, trocknen, brennen (Milzbrand 3 Mal durch die Flamme ziehen, Subtilis 10 Mal u. s. w., für die einzelnen Bakterienarten verschieden); dann Einlegen in frische, dampfende Anilinwasser-Fuchsinlösung (100 Anilinwasser + 11 ccm conc. alkohol. Fuchsinlösung), vorsichtig bis zur Blasenbildung erhitzen, dann absetzen und kurze Zeit warten, dann wieder bis zur Blasenbildung erhitzen u. s. f. im Ganzen 3—4 Minuten; dann eintauchen in absoluten Alkohol, ganz kurzes Eintauchen (1—2 Sekunden) in salzsauren Alkohol (siehe oben) und längeres Abspülen in 60 procentigem Alkohol, bis das Präparat Rosafärbung zeigt. Abtrocknen mit Fliesspapier; Nachfärben mit wässriger Methylenblaulösung 5—15 Sekunden; Abspülen in Wasser, trocknen, Canadabalsam.

4) **Reisselfärbung (nach PEPPER).** Reinigung der Deckgläser. Die Deckgläser resp. Objectträger werden in einer Porzellanschale mit einer 1 procentigen Kaliumpermanganatlösung unter öfterem Umrühren mit Holzstab $\frac{1}{2}$ Stunde gekocht. Die Flüssigkeit wird abgossen und die Schale kommt unter die Wasserleitung, bis das Spülwasser ungefärbt abläuft, dabei öfter umgerührt und geschüttelt, damit die auf einander liegenden Deckgläser gut ge-

ilt werden. Nach Beseitigung des Spülwassers werden sie unter dem Absug Stunde mit einem Theil Salzsäure und 4 Theilen destillirtem Wasser gekocht, gegossen und so lange gespült, bis sich Lackmuspapier nicht mehr röthet. n 3—4 Mal in 96procentigem Alkohol gespült, mit Pincette herausgeholt, n Alkohol etwas abtropfen lassen und senkrecht in der Flamme abbrennen. Glasschalen werden dieselben vor Staub geschützt aufbewahrt. Auch trüb vordene Deckgläser liefern noch gute Präparate.

Beize. Einer durch gelinde Erwärmung im Wasserbade bereiteten und 20° abgekühlten Lösung von 20·0 Tannin in 80·0 destillirtem Wasser werden 0 einer wässrigen schwefelsäurefreien Chromsäurelösung 2·5:100·0 langsam in inen Portionen unter fortwährendem Umschütteln zugefügt. Nach 4—6 tägigem hen bei Zimmertemperatur nicht unter 18° oder bei kalter Jahreszeit entechend weniger lange im Brütschrank von 20° wird die Beize durch doppeltes ltenfilter filtrirt, wobei starke Abkühlung zu vermeiden ist. Die fertige Beize eine klare, dunkelbraune Flüssigkeit, welche, ohne an Heizkraft zu verlieren, ; der Zeit einen geringen, an der Glaswand haftenden Niederschlag ausfallen st. Sie wird bei Zimmertemperatur verschlossen aufbewahrt und vor Geuch filtrirt.

Farbstofflösung. Carbolgentianalösung: concentr. alkohol. Gennaviolettlösung (5:100·0) 10·0, Acid. carbolic. liquef. 2·5, Aq. dest. ad 100·0. e Lösung bleibt einige Tage ruhig stehen und wird ohne zu schütteln rirt oder

conc. alkohol. Fuchsinlösung 10·0, Acid. carbolic. liquef. 2·5,
Aq. dest. ad 100·0.

Anfertigung des Präparats: Man entnimmt drei Deckgläschen mit Pincette und versieht Nr. 1 u. 2 mit je einem Tropfen Leitungswasser, pft den Tropfen Nr. 1 mit einer Spur Culturmasse (junge Cultur, Typhus stündig) und bringt hierauf von 1 eine kleine Oese zum Tropfen 2 und hier- 1 wiederum eine kleine Oese auf das noch leere Deckglas 3, auf dem das 5pfchen sehr vorsichtig ohne Reiben etwas ausgebreitet wird. Nachdem selbe lufttrocken geworden ist, hält man (zur Fixirung) einen in der Flamme ; Bunsenbrenners erwärmten Objectträger in einer Entfernung von 2—3 cm —1 Minute über das Präparat und übergiesst es dann mit filtrirter Beize. ch 3—5 Minuten das Deckgläschen (beiderseits!) mit einem Strahl destillirten assers abspülen und das Wasser von selbst abfließen lassen (nicht zwischen esspapier abtrocknen!). Darauf für 2 Minuten in die Farblösung (ohne Er- rmen), dann wie oben abspülen mit destillirtem Wasser, letzteres möglichst aufen lassen und vorsichtig hoch über der Flamme völlig trocknen.

B. Culturverfahren.

Die Isolirung von Bakterien mittelst der Plattencultur.

Das Untersuchungsmaterial (Dejektionen, Wasser, Leichentheile, utum, Eiter u. dgl.) wird in einem sterilisirten Reagensglas in's Laboratorium racht. Man kann die Reagensgläser sterilisiren, indem man zunächst den schliessenden Wattepfropfen tief hinein schiebt, das Glas mit der Pincette st und mit der Gas- oder Spiritusflamme in seiner ganzen Ausdehnung kräftig

erhitzt; wenn der Wattepfropf leicht gebräunt ist, zieht man ihn an die Mündung des Röhrchens vor. — Die Untersuchung muss stets sobald als möglich erfolgen, da sonst durch Vermehrung der Saprophyten das Auffinden der Krankheitserreger erschwert oder unmöglich wird.

Utensilien und Nährsubstrat. Als sog. Platten benutzt man flache Glasschalen mit Deckel (PERRI'sche Schalen). Fehlt es an den im Laboratorium üblichen Sterilisations-Apparaten, so kann man die Schalen für 1 Stunde in Sublimatlösung (1:2000) einlegen und durch wiederholtes Uebergiessen mit gekochtem und wieder abgekühltem Wasser das Sublimat sorgfältig entfernen; oder man kocht sie in schwacher Sodalösung 1 Stunde und lässt in derselben erkalten.

Zum Einbringen des Materials verwendet man Platindrähte, die in ein Glasrohr eingeschmolzen und am Ende zu einer 2 mm im Durchmesser haltenden Oese umgebogen sind. Die Drahtenden werden durch Ausglühen in der Flamme sterilisirt.

Die Bereitung der Nährgelatine geschieht gewöhnlich nach folgendem Recept: 500 g fettfreies gehacktes Rindfleisch lässt man 24 Stunden kühl stehen, dann wird colirt und in der Fleischpresse der Saft vollends ausgepresst. Zu 1 Liter Saft kommen dann 100 g Gelatine, 10 g Pepton und 5 g ClNa ; unter Erwärmen wird Alles gelöst und dann so viel concentrirte Sodalösung zugesetzt, bis auf blauem Lackmuspapier nur noch schwache Rothfärbung, dagegen auf rothem deutliche Blaufärbung eintritt. Zu 1 Liter braucht man im Mittel ungefähr 25 ccm einer 10procentigen Sodalösung. Nach der Neutralisation wird (zur leichteren Klärung) das Weisse eines Hühnereies zugesetzt und nun das ganze Gemisch 1 Stunde im kochenden Wasserbad oder Dampftopf (Soxhlet-Topf) auf 100° erhitzt. Nach dem Kochen ist nochmals die Reaktion zu prüfen. Dann wird filtrirt und die klare Gelatine in sterilisirte Reagensgläsern eingefüllt. Die Röhrchen werden am folgenden und am dritten Tage nochmals je 20 Minuten im Dampftopf erhitzt.

Die Bereitung des Nähragars geschieht in ganz ähnlicher Weise durch Zusatz von 13 g klein geschnittener Agar-Fäden zu 1 Liter Fleischsaft. Für gewisse Culturen werden eventuell 5 Procent Glycerin oder 2 Procent Traubenzucker zugefügt. — Zum Gewinnen eines klaren Filtrats bedient man sich passender Colirtücher aus Barchentstoff.

Die Nährsubstrate können in Reagensgläsern oder Vorrathskolben fertig bezogen werden, z. B. von GRÜBLER in Leipzig, ROHRBECK oder LAURENSCHLÖSSER in Berlin. Unbedingt sollte man sich von der richtigen Reaktion solcher gekaufter Gelatine vor dem Gebrauch überzeugen.

Das Plattengiessen. Drei Röhrchen mit Nährgelatine werden in warmes Wasser von 35° gesetzt, bis die Gelatine flüssig geworden ist. Dann entnimmt man mittelst der Platinöse dem Untersuchungsmaterial eine kleine Probe (bei Wasseruntersuchung Tropfen mittelst kleiner Pipette, s. S. 212) und bringt dieselbe in eines der Röhrchen *a*, nachdem man dessen Wattepfropfen abgenommen, aber zwischen den Fingern behalten hat. Die Platinöse wird sofort ausgeglüht und bei Seite gelegt, dann der Wattepfropfen in das Röhrchen geschoben und die flüssige Gelatine durch vorsichtiges Neigen und Drehen (es soll sich kein Schaum bilden und nicht zu viel Gelatine in den Wattepfropf eindringen) gründlich mit dem Untersuchungsmaterial gemischt. Nun setzt man das Röhrchen wieder in warmes Wasser, nimmt den Wattepfropfen ab und wirft letzteren in eine Schale mit HCl . Dann nimmt man ein Röhrchen *b* in die

ke Hand und dessen Wattepfropfen zwischen die Finger, taucht die frisch glühende Platinöse in das offene Röhrchen *a* und dann in Röhrchen *b* und wiederholt dies fünf Mal; darauf schliesst man *b* mit dem Wattepfropfen, mischt wieder durch, setzt es in warmes Wasser neben *a* und wirft auch diesen Wattepfropfen in HCl. Nun nimmt man Röhrchen *c* und füllt in dasselbe in genau gleicher Weise fünf Oesen aus dem Röhrchen *b* über. Darauf stellt man *a* mit Deckel versehene Petri'sche Schälchen neben einander auf den Tisch *a* warmem Zimmer auf ein mit kaltem Wasser gefülltes flaches Blechgefäss), nirt sie mit *a*, *b*, *c* und giesst nun unter theilweisem vorsichtigen Aufheben des Deckels den Inhalt von Röhrchen *a* in Schale *a*, den von *b* in Schale *b*, den von *c* in Schale *c*. Nach 5—15 Minuten ist die Gelatine vollkommen erstarrt, und die Schälchen werden dann in den Brütöfen gesetzt.

Das Ausgiessen der mit dem Untersuchungsmaterial und dessen Verunreinigungen beschickten Röhrchen mit Gelatine in Petri'sche Schälchen lässt sich umgehen in der Form der ESMARCH'schen Rollplatten. Die Ausbreitung der Gelatine zur Platte wird dann dadurch erreicht, dass die verflüssigte Gelatine an der inneren Wandung des Röhrchens in dünner Schicht vertheilt wird. Man schliesst zu diesem Zweck die (nicht zu engen) Röhrchen mit Kautschukstopfen, legt jedes einzelne auf kaltes Wasser und fixirt es lose mit der linken Hand, während man es mit der rechten Hand in rotirende Bewegung versetzt, die Gelatine erstarrt ist.

Die Feststellung des Resultats erfolgt nach 24—48—72 Stunden zunächst durch Betrachtung der Platte mit blossen Auge, dann mit 60facher Vergrösserung. Gestalt, Farbe, Verflüssigung der Colonieen, und zwar der tieferen wie der oberflächlichen, ist zu notiren. Zu genauerem Studium ist nur eine Platte geeignet, während die anderen zu zahlreiche oder zu wenig Colonieen enthalten. Genauere Feststellung der Zahl erfolgt mittelst einer in 10 Quadrate getheilten Glasplatte; man ermittelt ein für allemal, wie viel Colonien in der Fläche eines Petri'schen Schälchens enthalten sind und multiplicirt letzteres mit 167. Eine bequemere und bei reichlichem Keimgehalt genauere Methode besteht nach M. NEISSER in der mikroskopischen Auszählung von 60 Gesichtsfeldern und hieraus an der Hand von Tabellen die Bestimmung der Gesamtcolonieenzahl auf der ganzen Platte unter Berücksichtigung der Grösse der Platte und des mikroskopischen Gesichtsfeldes. — Verunreinigende Colonieen sind möglichst früh in Reagensgläser mit Gelatine einzupipfen, d. h. man taucht einen vorher geprühten spitzen Platindraht eventuell unter Leitung der Lupe oder des Mikroskops in die Colonie und macht mit demselben dann einen Einstich in ein Gelatineröhrchen, dessen Wattepfropfen man vorher genommen und zwischen die Finger geschoben hat und das man mit der linken Hand nach unten in der Hand hält. Unmittelbar nach dem Einstich setzt man den Wattepfropfen wieder auf.

Eine unter Umständen empfehlenswerthere Methode der Plattenaussaat besteht in der Isolirung von Bakterien besteht im Ausstrich auf Platten. Man giesst die verflüssigte Gelatine zunächst in sterile Schalen aus, lässt erstarren und giebt dann von dem Untersuchungsmaterial (direkt oder nach vorheriger Verunreinigung in steriler Bouillon) mittels eines Platinpinsels¹ (Krause) oder geputzten Glasstabes parallele Ausstriche auf einer oder mehreren Platten an.

II. Specielle parasitologische Diagnostik.

1. Abdominaltyphus.

a) Gussplatten mit Nährgelatine. Die zum Plattengiessen benutzte Nährgelatine sei weniger als sonst mit Soda versetzt; pro Liter höchstens 20 ccm 10procentige Sodälösung. Auch wird zuweilen mit Vortheil Carbolgelatine (mit 0.05 Procent Carbol) verwendet.

Die Platten werden 48 Stunden bei 22° gehalten und dann mit schwacher Vergrößerung durchmustert. Sind oberflächlich ausgebreitete Colonien mit scharfer weinblattartiger Zeichnung vorhanden, so wird jede dieser Colonien (bei grosser Zahl mindestens 10) in je ein Röhrchen mit Zuckeragar (gewöhnlicher Nähragar mit 2 Procent Traubenzucker-Zusatz) durch tiefen Einstich überimpft. Die Röhrchen bleiben 24 Stunden bei 37°. Dann ist die Diagnose mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Typhusbacillen zu stellen, wenn entlang dem ganzen Impfstich deutliches Wachsthum, aber ohne Gasbildung stattgefunden hat. Dagegen liegt kein Typhus vor, wenn der Agar von Gasblasen durchsetzt ist, oder wenn das Wachsthum nur mit oberflächlicher Ausbreitung erfolgt, oder ganz ausgeblieben ist.

b) Gussplatten mit Harngelatine (nach PIORKOWSKI): Alkalischer Harn wird mit 0.5 Procent Pepton und 3.3 Procent Gelatine versetzt, 40 Minuten im Wasserbade gekocht, sofort (ohne Erwärmung) filtrirt, in Reagensröhrchen gefüllt und im Dampftopf 15 Minuten, am folgenden Tage noch 10 Minuten sterilisirt. — Die in der üblichen Weise angelegten Platten sind bei 21.5–22° aufzubewahren. Besichtigung nach 15–20 Stunden mit schwacher Vergrößerung: Typhuscolonien klein, durchscheinend, mit zahlreichen Ausläufern versehen; Colicolonien grösser, rund, scharfrandig, gelbbraun und granulirt. — Da nicht alle Typhuscolonien das charakteristische Wachsthum aufweisen und andererseits auch Coliarten beobachtet sind, welche typhusähnliche Colonien auf der Harngelatine bilden, so ist es nicht statthaft, auf Grund der Harngelatineplatten allein eine Diagnose zu stellen, sondern man muss, wie bei 1 und 2 die verdächtigen Colonien isoliren und mit den unten aufgeführten Methoden weiter prüfen.

c) Ausstrich auf Platten mit Lackmus-Nutrose-Agar (nach v. DRUGALSKI und H. CONRAD): 3 Pfund zerkleinertes Rindfleisch mit 2 Liter Wasser 24 Stunden stehen lassen, das abgepresste Fleischwasser 1 Stunde kochen, filtriren, mit 20.0 g Pepton sicc. Witte, 20.0 g Nutrose, 10.0 g Kochsalz 1 Stunde kochen, filtriren, dazu 60 g feinsten Stangenagar, 3 Stunden kochen (bezw. 1 Stunde im Autoklaven) schwach alkalisiren (Lackmuspapier), filtriren, $\frac{1}{2}$ Stunde kochen. Inzwischen 260 ccm Lackmuslösung (nach KUBEL und TIEMANN) 10 Minuten kochen, dazu 30 g chemisch reinen Milchezucker setzen und 15 Minuten zusammen kochen, sodann zu dem flüssigen heissen Agar zusetzen, gut schütteln, die schwach alkalische Reaktion event. wieder herstellen. Darauf zusetzen: 4.0 ccm heisse sterile Lösung von 10 Procent wasserfreier Soda, ferner 20 ccm einer frisch bereiteten Lösung von 0.1 g Krystallviolett B Höchst in 100 g warm. Aq. dest. steril. Einen Theil sofort in sterile Doppelschalen grossen Formats (Durchmesser 15–20 cm) derart ausgiessen, dass die Agarschicht noch etwas durchscheinend ist, nie aber an Dicke unter 2 mm beträgt; die Schalen bleiben dann mindestens noch 1 Stunde offen, bis der Wasserdampf sich ganz verzogen hat und der Agar erstarrt ist. Den Rest des Agars bewahrt man in Kölbchen von etwa 200 ccm Inhalt auf.

Die Auftragung des Materials auf die Agarfläche geschieht mit einem im dicken, rechtwinklig gebogenen Glasstab, dessen kürzerer Schenkel in das Material hineingetaucht wird und dann über mindestens 4 Platten hintereinander hin und her gemischt wird. Sodann die Platten noch $\frac{1}{2}$ Stunde offen lassen; darauf umgekehrt in den Brutschrank (37°).

Von Stuhlproben sind stets mehrere Plattenserien anzulegen. Dünne Stühle von breiiger oder flüssiger Beschaffenheit werden auf einer Plattenserie dünn, auf einer zweiten mit der 10—20fachen Menge steriler, 0.85 procentiger Kochsalzlösung verdünnt ausgestrichen. Feste Stühle werden mit wenig steriler Kochsalzlösung gleichmässig verrieben und eine Plattenserie von dieser Schwemmung, eine zweite nach nochmaliger Verdünnung angelegt.

Von frischem trübem Harn sofort einen Tropfen zu einer Plattenserie arbeiten; ferner einen Theil centrifugiren und den Bodensatz auf Platten streichen. Frischen klaren Harn centrifugiren; nach 15 Minuten von der Oberfläche mehrere Tropfen (bis 1 ccm) entnehmen und auf einer Plattenserie streichen, nach 10 Minuten event. nach weiteren 10 Minuten desgleichen, wie schliesslich auch vom Sediment.

Von Wasserproben möglichst grosse Mengen centrifugiren, von dem Sediment 1 Ccse auf einer Plattenserie verreiben; ferner noch 1 oder 2 ccm des Wassers direct auf Platten vertheilen.

Besichtigung nach 20—24 Stunden; Typhus-Colonien blau (mit einem Stich ins Violette), 1—3 mm Durchmesser (selten grösser), glasig, nicht doppelt contourirt, thautropfenähnlich. — Coli-Colonien: 2—6 mm und mehr Durchmesser, leuchtend roth (manchmal nur hellroth oder nur von einem rothen Hof umgeben), nicht durchsichtig. — Colonien von *Bacillus subtilis*: blau, Grösse 1 Struktur bisweilen wie bei den vorigen, manchmal doppelte Contour und piliges, speckiges Wachsthum, manchmal zwar glasige Struktur, aber in der Mitte einen dunklen Knopf. — Colonien von *Bacillus faecalis alcaligenes*, von *cillus fluorescens* und von zur Proteusgruppe gehörigen Bacillen, besonders fötiden oder nicht mehr frischen Stühlen, in länger gestandenem Urin und weilen im Wasser: Oft den Typhusbacillen-Colonien so ähnlich, dass weitere Befolgung der verdächtigen Colonien nöthig, wie unter 1 ausgeführt.

Von der verdächtigen Stichcultur bezw. verdächtigen Colonien ist sodann weitere Bestätigung der Diagnose:

1) auf die eine Hälfte einer Kartoffel zu impfen, deren andere Hälfte mit verlässiger Reincultur von Typhusbacillen geimpft wird. Beide Culturen zeigen keinen Unterschied.

2) in einigen Röhrchen mit sterilisirter (frischer, nicht schon vorher durch Entwicklung von Milchsäurebakterien angesauerter Milch) zu impfen. Die Milch nach mehrtägigem Aufenthalt bei 35° nicht coagulirt.

3) in einige Röhrchen mit Peptonlösung (2 Procent Pepton und 0.5 Procent Cl) zu übertragen. Nach 48 Stunden Aufenthalt bei 35° sind 20 Tropfen der Kaliumnitritlösung (0.02 Procent) und einige Tropfen reine Schwefelsäure zufügen; in Typhusculturen fehlt die Indolbildung, und es tritt daher keine Indolfärbung ein.

4) Am sichersten gelingt die Differentialdiagnose durch die Agglutinationsprobe und durch die Pfeiffer'sche Reaction. Erforderlich ist dazu weder Serum von Typhusreconvalescenten; oder Serum von gegen Typhus immunisirten Thieren, am besten Ziegen (auch Hunden), die mit steigenden Dosen ender oder bei 65° abgetödteter Typhuscultur subkutan injicirt waren. Für

Es ist in Zögung, die Reaktion auf Agglutinine aufzustellen (bisher die typische Cultur auf Agar 18stündig) und daneben zu vergleichen. Eine typische Typhuscultur wird in 1 ccm Bouillon aufgeschwemmt und mit 1/2, 1/4, 1/10 Tropfen Serum (1 Tropfen Serum mit 1 ccm Bouillon, mit 8 ccm und mit 20 ccm gemischt) versetzt (1 ccm zu 100 Tropfen Aufschwemmung). Dann wird bei 37° h. 24 Stunden ruht. Vollständige Klärung der Bouillon, wenn Typhusbacillen in die Flüssigkeit schon nach 5' zu constatiren (v. Meerschweinchenkörper. Die Bauchhaut des Meerschweinchens angewendet. 1 cm langer Schnitt; dann abgestumpfte Canüle in die Bauchhöhle gestossen und 1 ccm einer Mischung von Bouillon, 1 Dosis Cultur und eine Dosis Serum enthält. 24 Stunden ruht. Die gegen die Dosis Typhusbacillen noch sich bewegend, aber andererseits erheblich unter der für normales Serum geltenden Zahl bleibt. Sind die Typhusbacillen, so lassen Proben, die nach 60—120' mittelst 1 ccm Bouillon entnommen sind, keine Bakterien, sondern nur vereinzelte, unbewegliche Bacillen. Die Temperaturabfall und bleiben am Leben. — Versuch mit anderen Typhusculturen anzustellen; ferner mit den anderen von Meerschweinchen Serum. Letztere Versuche ergeben in den 24 Stunden ruht. Proben reichliche bewegliche Bacillen, das Typhusbacillen zeigen Mächtigkeits. Temperaturabfall bis 30°, Tod 24 Stunden nach 24 Stunden.

Die Typhusculturen des Abdominaltyphus am Lebenden gelingt: 1. Nach der von Widal angegebenen Methode folgende: 1/2 ccm Typhusculturen in die Fingerbeere wird dem Kranken 1/2 ccm Typhusculturen Serum wird in verschiedenem Verhältniss, und 2. Typhusculturen (18stündige Cultur) in Bouillon, 1 ccm des Gowerschen Hämoglobinometers oder einer ähnlichen Flüssigkeit, und man sich auch auf die Entnahme von 1 Tropfen Blut bei 24 Stunden nach 24 Stunden. Serum von Gesunden bewirkt

2. Cholera.

Untersuchung von Dejektionen (oder Inhalt von Darmschlingen, resp. mit Dejektionen beschmutzte Wäsche).

Ein Schleimflockchen wird mittelst gekrümmten Platindrahts aus dem in der Schale ausgebreiteten Darminhalt herausgefischt und auf einige Deckser ausgestrichen. Nach dem Trocknen und Erhitzen (s. S. 673) lässt man Chinsinlösung (S. 671, Farblösung Nr. 2b) 1—2 Minuten oder 10 fach verdünnte Bolfuchsinlösung 5 Minuten einwirken, spült in Wasser ab und untersucht. — Ist Cholera vor, so findet man oft an den Stellen, wo strichförmig ausgeene Schleimmassen liegen, Schwärme und Züge von Kommabacillen, in denen die einzelnen Bacillen alle die gleiche Richtung haben. Derartig geordnete Kommabacillen (Fischzüge) gestatten mit grösster Wahrscheinlichkeit Diagnose auf Cholera.

Einige weitere Schleimflockchen werden gleichzeitig in 3—5 Röhrchen mit 0 ccm Peptonwasser (2 Procent WIRRE'sches Peptonum siccum und 1 Procent Na) gebracht und die Röhrchen bei 37° aufbewahrt. Nach 6—10 Stunden taucht man eine Platinöse in die oberflächliche Schicht einer der geimpften Peptonungen und stellt aus der Probe ein gefärbtes Deckglaspräparat her. Lag Cholera vor, so ist im Präparat meist eine Reincultur von Kommabacillen zu sehen. Sind noch wenig Kommabacillen vorhanden, so muss man nach weiteren 8 Stunden abermals eine Probe untersuchen. — Das massenhafte Auftreten der Kommabacillen im Peptonwasser macht die Diagnose fast sicher; in die mikroskopisch in Darminhalt etwa beobachteten choleraähnlichen Kriterien wachsen fast sämtlich im Peptonwasser nicht. Nur zweimal scheinen jetzt in der Peptonwassercultur Bacillen vom Habitus der Cholera-bacillen beobachtet zu sein, die nicht wirkliche Cholera-bacillen waren.

Drittens wird gleichzeitig mit dem Ansetzen der Peptonwasserculturen eine Schleimflocke in ein Röhrchen mit Gelatine gebracht und unter den gleichen 3 Verdünnungen auf Platten vertheilt. Bei ersten verdächtigen Fällen sind mehrere solche Plattensätze anzulegen. Die benutzte Gelatine muss stärker als gewöhnlich alkalisch sein. Ferner ist es zweckmässig, den Gehalt an Gelatine auf 15 Procent zu erhöhen und zur Herstellung nicht frisches Fischinfus, sondern LIEBIG'schen Fleischextrakt zu benutzen; die Cholera-colonien entwickeln sich in solcher Gelatine genau so gut und es lässt sich der Gleichmässigkeit des Materials eher ein constanter Grad von Alkalinität stellen. Auf 1 Liter Extraktgelatine mit 1½ Procent Fleischextrakt und 15 Procent Gelatine müssen 60 ccm 10 procentige Sodalösung zugesetzt werden. Die aus dieser Gelatine bereiteten Platten halten eine Temperatur von 24° aus, ohne sich zu werden. Man hält sie bei 22—24° 20—24 Stunden. Nach dieser Zeit lässt man vorhandene Cholera-colonien an ihren S. 76 geschilderten Eigenschaften leicht heraus und kann die Diagnose durch ein Klatschpräparat (Aufklappen eines Deckglases auf die Colonie, Abheben, Trocknen und Färben) bestätigen.

Da es vorkommen kann, dass vereinzelte Cholera-colonien unter zahlreichen Colonien anderer Darmbakterien nicht herauszufinden sind, legt man ausserdem von der achtstündigen Peptonwassercultur Gelatineplatten an. Waren überhaupt Cholera-bacillen zugegen, so wachsen nun grösserer Anzahl Cholera-colonien, und zwar sind dieselben schon nach achtstündigem Aufenthalt der Platten bei 22—24° deutlich diagnosticirbar. Das

Resultat der Peptonwasserplatten wird also ungefähr zur gleichen Zeit bekannt wie das Ergebnis der direct aus dem Darminhalt angelegten Platten.

Auf Grund des Ansehens der Colonien auf den Platten ist die Diagnose mit voller Bestimmtheit zu stellen. Die Frist vom Beginn der Untersuchung bis zur definitiven Feststellung des Resultates dauert im Mittel 24 Stunden, selten bis zu 30 Stunden. Eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose kann fast immer schon nach 7 Stunden gestellt werden. — Unterstützt kann die Diagnose eventuell auch werden durch die Choleraerotherie, die indess nur an einer Reincultur angestellt werden darf. Fehlt die Rothfärbung, so spricht dies gegen Cholera. — In zweifelhaften Fällen ist die PRUEFFER'sche Reaction anzuschliessen.

2) Untersuchung von Wasser.

Man nimmt dem Wasser mehrere (mindestens 3) Proben von je 50 ccm in Sterilisirgefässen; rügt von einer Lösung von 10 Procent Pepton und 10 Procent Kochsalz jedem Kölbchen 5 ccm zu und hält 16—24 Stunden bei 37°. Die beschriebenen Wasser findet man dann im mikroskopischen Präparat kommissurige Bacillen, ohne dass es sich um Choleraerotherie handelt. Es müssen diese von der Peptonwassercultur Gelatineplatten angelegt werden und zwar mit der oben beschriebenen stark alkalischen Gelatine. Manche Wasservibrionen wachsen sehr rasch oder sehr langsam, oder sie bilden Colonien von ganz anderer Aussehen und namentlich dunklerer Färbung wie die Choleraerotherie. Einige zeigen keine Choleraerotherie; einige zeigen Phosphoreszenz; alle von der Cholera durch die PRUEFFER'sche Reaction zu unterscheiden.

3) Choleraerotherie durch die PRUEFFER'sche Reaction.

Die richtige Vibrionensart muss in 18 stündiger Reincultur auf Agar vorliegen. Zur Prüfung ist erforderlich Serum von hoch gegen Cholera immunisirten Meerschweinchen, Kaninchen oder Ziegen. Von ersteren nimmt man Thiere, die nach 10—14 Tagen nach Chloroformdämpfen abgetödtet worden sind. In Dosen, welche eine deutliche Intoxikation mit Temperatursteigerung hervorrufen, nach 10—14 Tagen folgt intraperitoneale Injektion zunächst 1 ccm, dann nach 3—10 Tagen 1/2, Oese und so fort, bis mehrere Oesen ertragen werden. Das gewonnene Serum wird in derselben Weise wie das Typhusserum auf seinen Wirkungswerth (Titre) geprüft; gewöhnlich beträgt der Titre der bactericide Wirkung mindestens 0.001. Für die Agglutination liegt die Grenze der Verdünnung meist bei 1:100 und mehr; doch kann die Verdünnung nicht so weit getrieben zu werden, da normales Serum ebenfalls bei 1:10 noch verklebende Wirkung erkennen lässt.

Die Prüfung auf Agglutinine wird wie oben beim Typhus ausgeführt.

Wichtig ist die Prüfung auf bactericide Wirkung im Meerschweinchen. Dazu wird in putenden Cultur wird mit 1 ccm Bouillon und einer Serumportion von dem schwebenden der kleinsten wirksamsten Dosis (bei einem Titre von 0.01) entspricht, gemischt und einem Meerschweinchen von 100 g Körpergewicht intraperitoneal injicirt. Nach 20 Minuten entnimmt man mittelst steriler Spritze Tropfen des Bauchhöhleninhalts und untersucht im hängenden Tropfen und im gefärbten Präparat. Werden noch zahlreiche bewegliche Vibrionen gefunden, so liegt keine Cholera vor, vorausgesetzt, dass die Vibrionen im Serum in echter Cholera frisch geprüft war. — Sind in den Proben nur vereinzelte unbewegliche Vibrionen, so handelt es sich um Cholera.

sich zweifellos um Cholera, wenn andererseits ein ebenso behandeltes Thier, r mit dem Unterschied, dass der injicirten Mischung 0.01 normales Serum gesetzt ist, das Fortleben der Vibrionen zeigt und unter den S. 77 beschriebenen mptomen zu Grunde geht.

3. Diphtherie.

Zur Entnahme von diphtherieverdächtigem Material aus dem Rachen nutzt der Arzt eine Stahlsonde mit festgedrehtem Wattebausch, die im Kork des Reagensglases steckt; er fährt mit dem Wattebausch über Mandeln und weichen Gaumen hin, steckt die Sonde sofort in das Glas, letzteres kommt in ein Eisfutteral und dieses in ein festes Couvert, in welches zugleich die Notizen über die Entnahme gelegt werden. Die Entnahme-Apparate lagern zweckmässig in den Apotheken, werden nach der Beschickung dahin zurückgegeben und von dort der Untersuchungsstation übermittelt.

Reagentien zur Untersuchung: 1) Zur Färbung der mikroskopischen Apparate: a) Fuchsinlösung (s. oben), b) Reagentien zur GRAM'schen Färbung (s. oben), c) Reagentien zur Doppelfärbung nach M. NEISSER: Methylenblau, pulverförmiges Methylenblau (GRÜBLER) in 20 ccm 96procentigem Alkohol löst; dazu 950 ccm Wasser und 50 ccm Eisessig. Ferner Vesuvín, 2 g in 100 ccm kochendem Wasser gelöst. Beide Lösungen filtrirt. Zur Färbung wird das Präparat zuerst 1—3 Sekunden in die Methylenblaulösung getaucht, dann Abspülen mit Wasser, Aufgiessen der Vesuvínlösung für 3—5 Sekunden, dann Abspülen mit Wasser. Der Leib der Diphtheriebacillen erscheint schwach braun gefärbt; in demselben zeigen sich dunkelblau gefärbte ovale Körnchen, in der Regel an jedem Ende des Bacillus ein Korn, manchmal nur ein Korn, zuweilen in der Mitte und an den Enden. (ERNST'sche Körner.) Alle Kokken und einzelne Bacillen zeigen ähnliche Färbung, aber nicht die Bacillen, welche den Diphtheriebacillen morphologisch ähnlich sind. Letztere zeigen die Doppelfärbung jedoch nur, wenn sie auf LOEFFLER'schem Serum bei mindestens 9 Stunden und nicht länger als 24 Stunden gezüchtet sind.

2) Zur Cultur: Petrischalen (Platten) mit erstarrter LOEFFLER'scher Serumgallerte (3 Theile Rinderserum + 1 Theile Dextrose-Peptonbouillon).

Verfahren bei der Untersuchung: Mit dem Wattebausch werden 8—10 Striche auf einer Serumplatte gemacht; diese bei 34—35° gehalten. Sodann werden Deckgläser bestrichen und gefärbt. Finden sich zahlreichere charakteristisch geformte und gelagerte Bacillen und fällt die Gram- und Doppelfärbung in einem Theil der Bacillen positiv aus, so lässt sich schon aus dem Präparat die Diagnose auf Diphtherie stellen. Sind nur vereinzelte verdächtige Bacillen vorhanden, so ist es besser, das Resultat der Cultur abzuwarten.

Die Serumplatten sind nach 6—8 Stunden durch Klatschpräparate mit Fuchsin- und Gramfärbung zu untersuchen. Häufchen typischer Bacillen gestatten eine sichere positive Diagnose; nur bei Entnahmen von der Conjunctiva oder von Nasen- und Ohrenkrankungen ist einer Verwechslung mit ähnlichen Bacillen durch vorzubeugen, dass nach ca. 18stündiger Cultur Ausstrichpräparate mit Doppelfärbung gemacht werden. — Findet man nach 6—8 Stunden in 6 Präparaten ausschliesslich Kokken, so ist die Diagnose negativ zu stellen. Nochmalige Entnahme ist dann unter Umständen angezeigt. — Finden sich nach 8—10 Stunden vereinzelte verdächtige Bacillen, so sind die Platten nach erneutem 12stündigen Aufenthalt im Brütöfen nochmals zu untersuchen, und

liner, sandartiger Beschlag besonders an den Wänden des Gefässes, seltener kleine Flöckchen; oft ein feines Häutchen auf der Oberfläche. Meist starke Säurebildung; die Zunahme des Alkaliverbrauchs bis zum 2. Tage beträgt bei Diphtherie im Mittel 0.3 ccm 1 procentiger NaOH. — PDb schnelle, diffuse, kräftige Trübung. Massenhafter, schleimiger Bodensatz. Meist nur geringe Säurebildung, sogar Steigerung der Alkalescentz. — Xb meist gar keine Trübung der Bouillon. Feine kleine Flöckchen an den Wänden und auf dem Boden des Gefässes. Meist geringere Säurebildung wie Db, sehr selten Steigerung der Alkalescentz.

Thierversuch: Db fast stets Tod innerhalb 2 Tagen; bei der Sektion an der Impfstelle solziges Oedem, auf der Pleura Exsudat, Nebennieren geschwollen und hyperämisch. — PDb keine Reaktion. — Xb manchmal an der Impfstelle Eitrige Infiltration und Tod der Thiere unter chronischem Marasmus nach einigen Tagen. Diphtherie-Antitoxin-Behandlung ohne Wirkung.

4. Tuberkulose.

Zum Nachweis von Tuberkelbacillen in Sputum dienen folgende Methoden:

1) Originalausstrichpräparate: Das Sputum (womöglich Morgensputum) auf schwarzlackirten Tellern ausgießen und die verdächtigen gelbweissen Partikel („Linsen“) auf Deckgläsern dünn verstreichen, lufttrocknen lassen, dann färben mit conc. Carbolfuchsin unter Erwärmen in einem Uherschälchen oder Porzellantiegel über kleiner Flamme, bis die Farblösung zu dampfen fängt; dann noch einige Minuten in der Farbe belassen, für einige Sekunden in salzsaurem Alkohol (s. oben), darauf $\frac{1}{2}$ Minute in reinen Alkohol; wenn das Präparat noch nicht genügend farblos ist, nochmals für einige Sekunden in salzsaurem Alkohol und in Alkohol. Nachfärben mit wässriger Methylenblauung (s. oben), Abspülen in Wasser, Trocknen zwischen Fliesspapier, Einschluss in Canadabalsam.

Statt der Entfärbung in salzsaurem Alkohol u. s. w. und der Nachfärbung Methylenblau kann man das Präparat ohne Abspülen aus der Carbolfuchsinlösung sogleich in Corallin-Methylenblau (1 Theil Corallin-Rosolsäure, 1 Theile absol. Alkohol mit 6 g Methylenblau gemischt, dazu 20 Theile Glycerin) übertragen, 1 Minute darin bewegen (zur Entfärbung und Nachfärbung), mit Wasser abspülen, trocknen, Einschluss in Canadabalsam. — Die Tuberkelbacillen erscheinen nach beiden Methoden roth auf blauem Grunde.

Der Nachweis von Tuberkelbacillen im Eiter, Stuhl sowie von Organstückchen (nach Zerkleinerung derselben in sterilen Mörsern) kann ganz ähnlich bei Sputum geführt werden. Urin sedimentirt man in Spitzgläsern oder stellt der Centrifuge und untersucht das Sediment. Für Organstückchen kommt noch die

Schnittfärbung in Betracht. Die am besten auf dem Objectträger bereits aufgeklebten (s. oben) Schnitte werden unter vorsichtigem Erwärmen in conc. Carbolfuchsin 10 Minuten lang gefärbt, dann 3—5 Sekunden in salzsaurem Alkohol getaucht, dann so lange in 60 procentigen Alkohol, bis keine Farbe mehr abgeht. Nach vorsichtigem Trocknen mit Fliesspapier wässrige Methylenblaulösung aufträufeln und 15 Sekunden einwirken lassen, sodann auf 15 Sekunden in 96 procentigen Alkohol, dann trocknen zwischen Fliesspapier, Aufhellen mit Xylol, Einbetten in Canadabalsam. — Tuberkelbacillen blass, Gewebe blau.

Gelingt der Nachweis durch Originalausstrichpräparate in Sputum (Eiter, Stuhl u. dgl.) nicht, so bewirkt man eine Concentrirung des Materials durch das

2) Sedimentirungsverfahren. Man verdünnt das Material zur Hälfte oder mehr mit 3procentiger Carbolsäure in einem hohen, mit eingeschliffenem Glasstopfen versehenen Messcylinder, homogenisirt durch mehrere Minuten dauerndes, kräftiges Schütteln, bis milchige Flüssigkeit ohne größere Partikel entsteht. Flüssigkeit hierauf in ein Becherglas ausgießen, ca. $\frac{1}{10}$ reines Glycerin zusetzen und nach tüchtigem Verrühren bis auf 100° C. im Wasserbade erhitzen, bis (meist erst nach $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Stunde) ein Niederschlag entsteht, der oft direct zu Deckelglasausstrichen verwendbar ist. Tritt trotz längeren Kochens keine ordentliche Abscheidung ein, so setzt man noch von 3 zu 3 Minuten vorsichtig einige Tropfen 0.2procentiger Natronlauge unter weiterem Erhitzen zu, wodurch dann meist schnell ein Niederschlag ausfällt, welcher durch Centrifugiren der gekochten Masse, Verreiben und event. Abdampfen noch concentrirt und dann zu Ausstrichpräparaten benützt werden kann.

Gelingt auch durch die Sedimentirung der Nachweis von Tuberkelbacillen nicht, so kommen weiter in Betracht

3) Culturverfahren: Ausstriche von Linsen nach mehrmaligem Abwaschen in sterilem Wasser auf Glycerinserum-, Glycerinagarröhrchen oder auf Platten mit Hesse's Nährboden (5 g Nährstoff Heyden aus der Fabrik H. in Radebeul bei Dresden) in 50.0 dest. Wassers unter Umrühren lösen, dann eine Mischung von 5.0 g Kochsalz, 30 ccm Glycerin, 10—20 g Agar, 5 ccm Normalsodalösung und 950 dest. Wasser zusetzen und zusammen unter stetem Umrühren 15 Minuten kochen. Röhrchen und Platten durch Gummikappen und Einstellen in feuchte Kammern sorgfältig vor Austrocknung hüten. Manchmal schon einigen Tagen (auf Heydenagar) makroskopisch sichtbare Colonien; von den Platten event. Klatschpräparate; meist jedoch sehr langsames Wachstum, manchmal gar kein Wachstum selbst nach Ausstrich mit sicher tuberkelbacillenhaltigem Materiale. Daher in wichtigsten Fällen als zuverlässigste Methode heranziehen:

4) Der Thierversuch: Meerschweinchen subkutan oder intraperitoneal mit Injektionsspritze impfen. Wenn Tuberkelbacillen vorhanden, so Tod der Thiere nach 4—8 Wochen. Inguinal-, Mesenterial- und andere Drüsen stark geschwollen und verkäst; in der stark vergrößerten Milz, in Leber, Lunge und in dem strangförmig verdickten Netz meist sehr zahlreiche, zum Theil verkäste Tuberkel. Zum Nachweis von Tuberkelbacillen nehme man die noch nicht verkästen Parthieen des tuberculösen Gewebes.

5. Pest.¹

I. Gewinnung des zur Untersuchung geeigneten Materials.

A. Vom Lebenden.

1) Aus erkrankten Drüsen, besonders noch nicht vereiterten (in letzteren sind die Pestbacillen nur noch selten nachzuweisen), mittelst breiter Incision (unter aseptischen Kautelen) oder durch Punktion mittelst Pravaz'scher Spritze.

¹ Auszug aus der von einer Kommission von Sachverständigen gearbeiteten und vom Bundesrath für ganz Deutschland genehmigten Anweisung zur bakteriologischen Feststellung der Pestfälle. (S. KOSSEL u. OVERBECK, Arb. a. d. Kais. Gsdhtsamt. Bd. XVIII. 1901.)

2) Blut mittelst Stich mit sterilisirter Lanzette in die vorher mit Seife, Alkohol und Aether gereinigte Haut (Fingerspitze, Ohrfläppchen u. s. w.); grössere Mengen durch Venenpunktion am Vorderarm oder sterilen Schröpfkopf.

3) Von erkrankten Hautstellen: primäre Pestpustel, Furunkel, pustulöses Erythem; mittelst Glaspillaren, Platinöse, schmalen Platinspatels, Messerspitze u. dergl.

4) Ausscheidungen: Auswurf bei primärer Lungenpest, Pneumonie und minalem Lungenödem schwerer Septikämien; bei krankhaften Zuständen der Harnorgane Abstriche von der Oberfläche der Schleimhaut; Harn.

B. Von der Leiche.

Vorbemerkung: Am besten wird zunächst an Ort und Stelle eine makroskopische Untersuchung von Drüsen- oder Milz- oder Lungensaft ausgeführt. Bei positivem Ergebniss ist möglichst auf die weitere Sektion zu verzichten, andernfalls, bei der nun folgenden vollständigen Autopsie, besonders das Verhalten der Harnorgane, sowie aller, auch der versteckt liegenden Drüsengruppen, ferner auf das Vorhandensein von Blutungen (besonders in der Schleimhaut des Verdauungscanals und in den serösen Ueberzügen des Herzens), ferner auch auf das Bestehen einer Hirnhautentzündung zu achten. Es empfiehlt sich, auch eine bakteriologische Untersuchung der Galle in diesen Fällen vorzunehmen. — In jedem Falle werden Organe zur weiteren Verarbeitung mittelst des Culturverfahrens bezw. Thierversuchs in gut verschlossenen Gefässen genommen, ebenso kleine Organstückchen in Alkohol oder Sublimatalkohol.

1) Aus Mund und Nase hervorgequollene Flüssigkeit. 2) Pusteln und Furunkel der Haut. 3) Drüsen, besonders blutig infiltrirter Saft, Eiter oder Oedemflüssigkeit aus der Umgebung der Drüse, Drüsenstückchen. 4) Herzblut. 5) Lunge. Abstrich von der Schnittfläche bei ödematöser oder pneumonisch infiltrirter Lunge; Inhalt der Luftröhre und ihrer Verzweigungen; Lungenstückchen. 6) Milz. Saft und Stückchen. 7) Gehirn. Krankhaft veränderte Stellen des Parenchyms und der Häute. Herdförmige Erkrankungen der Harnorgane (metastatische Abscesse, Infarkte, Blutungen u. s. w.).

II. Gang der Untersuchung.

Ausser der Untersuchung durch das Mikroskop und die Cultur auf Agar und Gelatine ist, wenn irgend möglich, auch der Thierversuch heranzuziehen. Derselbe ist unerlässlich, wenn es sich um die Feststellung des ersten Falles einer Ortschaft handelt.

A. Mikroskopische Untersuchung. Von dem zu untersuchenden Material sind zunächst reichlich Deckglaspräparate anzufertigen. Ein Theil derselben wird unfixirt und ungefärbt in einem Deckglasschächtelchen aufbewahrt, die übrigen nach einer der folgenden Methoden gefärbt und nach der Färbung gleichfalls aufgehoben. Färbung: Mit LÖFFLER's Methyleneblau oder Raxmethyleneblau (5 Procent Borax, 2 Procent Methyleneblau in Wasser), dünnter ZIEHL'scher Lösung, Gentianaviolett. Charakteristische Polfärbung: Deckglaspräparat 25 Minuten in absolutem Alkohol oder für wenige Sekunden in einer Mischung von Alkohol und Aether zu härten, dann mit einer der genannten Farbstoffe färben.

B. Cultur. 1) Fleischwasseragar: (0.5 Procent Kochsalz, 1 Procent Pepton). Schwach alkalisch, nicht trocken, zu Platten ausgegossen oder in kleinen Reagensgläsern schräg erstarrt; Temperaturoptimum etwa 30°. — Anwenden bei Blut und anderem möglichst reinem Untersuchungsmaterial.

2) Blutserum nach LÖFFLER: Rinder Serum mit dem 4. oder 5. Theile einer 1 Procent Traubenzucker enthaltenden alkalisirten Peptonbouillon in weiten Röhrchen schräg oder in Platten erstarrt. Anwendung wie 1.

3) Fleischwassergelatine: 0,5 Procent Kochsalz, 1 Procent Pepton; schwach alkalisch; Plattengiessen oder Ausstrich auf der Oberfläche der erstarrten Platte. — Anwendung in jedem Falle erforderlich, bes. werthvoll bei Material, das mikroskopisch andere Bakterien neben Pestbacillen enthält, z. B. Sputum, Urin, Koth, Leichentheile. Bei stark verunreinigtem Material ist die Züchtung auf Gelatine bei niedriger Temperatur (Eisschrank) zu versuchen.

Aus den Originalausstrichen sind die Pestbacillen rein zu züchten und Reinculturen derselben auf Agar oder LÖFFLER'schem Blutserum zur Nachprüfung aufzubewahren.

Zur genaueren Bestimmung einer herausgezüchteten, verdächtigen Reincultur dient Prüfung auf Beweglichkeit (unbeweglich), Färbung nach GRAM (Entfärbung), Züchtung auf Agar mit 3 Procent Kochsalzgehalt (zur Darstellung der Involutions- und Degenerationsformen), in schwach alkalischer Bouillon (zur Darstellung der Ketten), event. Gährungsprobe (keine Gasentwicklung); Thiersversuch s. C.; Agglutinationsprobe s. D.

C. Thiersversuch. 1) Zur Erleichterung der Diagnose: Impfung von Ratten durch subcutane Injektion von Gewebssaft oder Einbringung eines Stückchens des verdächtigen Materials in eine Hauttasche unter aseptischen Kautelen; bei stark verunreinigtem Ausgangsmaterial daneben noch Verimpfung auf die unverletzte Konjunktiva und Verfütterung. — Neben den Ratten können Meerschweinchen, am besten durch Einreiben des Untersuchungsmaterials auf die rasirte Bauchhaut, zur Impfung benutzt werden.

2) Zur Bestimmung einer aus verdächtigem Material gezüchteten Reincultur: Impfung von Ratten.

Als Rattenkäfige hohe, in Wasserdampf sterilisierbare Glasgefäße mit Drahtumhüllung und fest anschliessendem Drahtdeckel mit Watteabschluss. — Sektion unter peinlicher Beobachtung von Vorsichtsmassregeln gegen Verspritzen des Materials. Mikroskopische und culturelle Untersuchung von Blut, Milk, Drüsensaft, Peritonealexsudat. — Vernichtung der Kadaver durch längere Einwirkung von Wasserdampf oder durch Verbrennung oder Auflösung in conc. Schwefelsäure. Sterilisierung der Käfige sammt Streumaterial und Futterresten durch Wasserdampf.

D. Agglutinationsprobe. 1) Zur Bestimmung einer gezüchteten Cultur: Wirksames Serum immunisirter Thiere wird in den entsprechenden Verdünnungen zu einer frisch bereiteten, möglichst homogenen Aufschwemmung zweitägiger Agarculturen in Bouillon oder Kochsalzlösung hinzugefügt. Beobachtung der eintretenden Agglutination am besten in kleinen Reagensröhrchen mit Hülfe der Lupe. In dem Röhrchen die Probe mit dem Serum gut durchschütteln und dann bei Bruttemperatur $\frac{1}{2}$ Stunde lang ruhig stehen lassen. Positiver Ausfall der Reaktion (an dem Auftreten zu Boden sinkender Flöckchen mit Klärung der überstehenden Flüssigkeit erkennbar) spricht mit grösster Wahrscheinlichkeit für Pestbacillen.

2) Zur Prüfung des Blutserums eines unter verdächtigen Erscheinungen erkrankt gewesenen Menschen: In Verdünnung des Serums 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, in 0.6procentiger Kochsalzlösung wird je eine Oese einer zweitägigen

Agarcultur von Pestbacillen auf 1 ccm der Serummischung gut vertheilt und gut umgeschüttelt. Die so hergestellten Proben werden, wie bei 1 angegeben, weiter behandelt. Tritt makroskopisch sichtbare Agglutination auf, so handelt es sich mit grösster Wahrscheinlichkeit um einen abgelaufenen, in Reconvalescenz befindlichen Pestfall. Ein negativer Ausfall der Probe spricht nicht gegen die Diagnose Pest.

6. Malaria.

Die Blutentnahme erfolge nicht während des Fieberanfalls bzw. kurz nach demselben, sondern am besten 6—12 Stunden vor dem neuen Anfall. Man macht mittelst Nadel oder Impflanzette in die gereinigte Fingerkuppe einen Einstich und tupfe den ersten Tropfen Blut unverzüglich mit einem sorgfältig gereinigten Deckgläschen auf, lege dann dieses mit der Blutseite auf ein zweites und ziehe beide (nur mit Pincetten fassen!) ohne erheblicheren Druck seitlich von einander ab; falls beide noch mit einer dickeren Schicht bedeckt sind, wiederhole man rasch darauf die Manipulation mit neuen Deckgläschen. Die auf diese Weise mit dünner Blutschicht versehenen Deckgläschen lässt man an der Luft 10 Minuten trocknen und kann sie dann, vorsichtig in einem Deckglasschächtelchen über einander geschichtet, bis zur Färbung verwahren. Zum Schutze vor Feuchtigkeit (bes. in den Tropen) ist es nach Koch's Vorschrift zweckmässig, das Schächtelchen noch in Fließpapier einzuhüllen und in ein Glas mit weitem Hals und Glasstöpsel zu legen, in welchem sich einige Chlorcalciumstücke befinden. Unter solchen Vorsichtsmaassregeln bleiben die Blutaussstriche wochen-, selbst jahrelang verwertbar.

Die Fixirung der Präparate geschieht (nach Koch's Empfehlung nach vorhergehendem schwachen Erwärmen des Gläschens zwischen den Fingern über einer Flamme) durch Einlegen in absoluten Alkohol oder Alkohol und Aether aa auf 10—20 Minuten. Sodann lässt man den überschüssigen Alkohol durch Hochstellen des Gläschens auf Fließpapier möglichst ablaufen und das Präparat an der Luft (nicht zwischen Fließpapier) trocken werden. Darauf färben entweder mit 1. Färbung nach Koch mit Borax-Methylenblaulösung (5 Procent Borax, 2 Procent Methylenblau medicinale Höchst, zur Färbung so weit mit Wasser verdünnt, dass sie in einer Schicht von 1 cm Dicke eben durchscheinend wird). Das vollkommen trockene Präparat einige Male eintauchen und mit gewöhnlichem Wasser spülen, bis es einen grünlich-blauen Farbton angenommen hat. Zwischen Fließpapier trocknen, in Cedernöl untersuchen. — Rothe Blutkörperchen hellgrünblau, Leucocytenkerne dunkelblau, Plasmodien ebenfalls kräftig blau, auf den blassen Blutkörperchen sehr deutlich zu sehen. — Färbung besonders für Massenuntersuchungen geeignet. 2. Färbung nach ROMANOWSKY-ZIEMANN: 1 procentige wässrige Lösung von Methylenblau medic. puriss. (Höchster Farbwerke), in der durch häufiges Schütteln das Farbstoffpulver vollständig gelöst ist, mindestens 24 Stunden alt, wird mit 0.1 procentigem in heissem Wasser gelöstem Eosin BA oder HG (Hoechst Farbwerke) in kleinen Blockschälchen in gewissem Verhältniss (im Allgemeinen 1:4 bis 1:7, jedoch stets für jede neue Vorrathslösung neu an gewöhnlichen Blutpräparaten auszuprobieren) bei jeder Färbung frisch gemischt. Nach dem Zusammenbringen beider Lösungen entsteht an der Oberfläche ein metallisch glänzendes Häutchen, welches mittelst Glasstäbchens in die Mischung hereingerieben wird und zwar

mehrmals nach seiner schnell eintretenden Neubildung. Nach Entfernung des letzten Häutchens durch vorsichtiges, oberflächliches Ueberwischen der Farbmischung mit Fliesspapier bringt man die Präparate mit der Blutseite nach unten (aber nicht schwimmen lassen) hinein, deckt die Schälchen zu und entnimmt nun, von $\frac{1}{2}$ zu $\frac{1}{2}$ Stunde ein Präparat, spült es mit dem dünnen Strahl der Wasserleitung oder einer Spritzflasche beiderseits sorgfältig ab, trocknet zwischen Fliesspapier und prüft die Farbwirkung. Erscheint dieselbe anreichend, so verfährt man mit den übrigen Präparaten in gleicher Weise und legt sie in Canadabalsam ein. An gelungenen Präparaten sind die rothen Blutkörperchen rosa, die Kerne sämtlicher Leucocyten und etwa vorhandener, kernhaltiger, rother Blutkörperchen carminviolett, der Protoplasmaleib der Lymphocyten blau, der grossen mononukleären Leucocyten blassblau, der neutrophilen Leucocyten blassviolett bis blassblau; das Protoplasma der Plasmodien blau, das Chromatin leuchtend carminroth bis carminviolett.

III. Bestimmung der Luftfeuchtigkeit mittelst des Schleuderpsychrometers.

Man schwingt zunächst das trockene Thermometer in der S. 92 angegebenen Weise, liest nach $\frac{1}{2}$ Minute ab, schwingt wieder $\frac{1}{2}$ Minute und wiederholt dies so lange als noch eine Aenderung der Temperatur eintritt. Sodann nimmt man die gleiche Bestimmung mit dem Thermometer vor, dessen Kugel mit befeuchtetem Mousselin umhüllt ist. Die Temperatur des trockenen Thermometers sei t ; die des feuchten t_1 ; man berechnet daraus die Differenz $t - t_1$ und findet dann die absolute Feuchtigkeit F_0 nach der Gleichung:

$$F_0 = F_1 - k \cdot B \cdot (t - t_1),$$

wo F_1 die maximale Feuchtigkeit (Sättigungsmaximum) bei der Temperatur t_1 bedeutet; zu entnehmen aus der umstehenden Tabelle 1. Spannungstafel
 k = eine Constante, bei der vorgeschriebenen Geschwindigkeit des Schwingens ermittelt zu = 0.0007;

B = Barometerstand, hat geringen Einfluss; kann innerhalb 15 mm Schwankung als constant angesehen werden.

Nimmt man einen mittleren Barometerstand von 745 mm an, so ist der Werth des Faktors $k \cdot B \cdot (t - t_1)$ für Barometerstände zwischen 730 und 760 mm nur von dem für $(t - t_1)$ gefundenen Werth abhängig und lässt sich daher aus der umstehenden Tabelle 2 entnehmen.

In derselben sucht man zunächst in der ersten Columne die ganzen Grade von $t - t_1$ auf, und geht dann horizontal weiter bis zu der Columne, welche mit der Zahl der Zehntelgrade überschrieben ist. Man findet so den Werth $k \cdot B \cdot (t - t_1)$, zieht diesen gemäss der oben gegebenen Gleichung von dem Werth für F_1 ab und hat damit F_0 (in mm Hg). — Für stark abweichende Barometerstände muss die Rechnung ohne Benutzung einer Tabelle ausgeführt werden.

Um die Sättigungsprocente zu finden, rechnet man $\frac{100 \cdot F_0}{F}$, wo F die maximale Feuchtigkeit bei der Temperatur t bedeutet (zu entnehmen aus Tabelle 1). Das Sättigungsdeficit ergibt sich aus $F - F_0$. Um den Thau-

1. Spannungstafel.

Celsius	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
- 9	2.27	2.25	2.23	2.21	2.19	2.18	2.16	2.14	2.13	2.11
- 8	2.45	2.43	2.41	2.39	2.38	2.36	2.34	2.32	2.30	2.28
- 7	2.65	2.63	2.61	2.59	2.57	2.55	2.53	2.51	2.49	2.47
- 6	2.87	2.85	2.83	2.81	2.78	2.76	2.74	2.72	2.70	2.68
- 5	3.11	3.08	3.06	3.04	3.01	2.99	2.96	2.94	2.92	2.90
- 4	3.36	3.34	3.31	3.28	3.26	3.23	3.21	3.18	3.16	3.13
- 3	3.64	3.61	3.58	3.55	3.53	3.50	3.47	3.44	3.42	3.39
- 2	3.93	3.90	3.87	3.84	3.81	3.78	3.75	3.72	3.69	3.67
- 1	4.25	4.22	4.19	4.16	4.12	4.09	4.06	4.03	4.00	3.96
- 0	4.60	4.56	4.53	4.49	4.46	4.42	4.39	4.36	4.32	4.29
+ 0	4.60	4.63	4.67	4.70	4.73	4.77	4.80	4.84	4.87	4.91
+ 1	4.94	4.98	5.01	5.05	5.08	5.12	5.16	5.19	5.23	5.27
+ 2	5.30	5.34	5.38	5.42	5.45	5.49	5.53	5.57	5.61	5.65
+ 3	5.69	5.73	5.77	5.81	5.85	5.89	5.93	5.97	6.01	6.06
+ 4	6.10	6.14	6.18	6.23	6.27	6.31	6.36	6.40	6.45	6.49
+ 5	6.53	6.58	6.63	6.67	6.72	6.76	6.81	6.86	6.90	6.95
+ 6	7.00	7.05	7.10	7.14	7.19	7.24	7.29	7.34	7.39	7.44
+ 7	7.49	7.54	7.60	7.65	7.70	7.75	7.80	7.86	7.91	7.96
+ 8	8.02	8.07	8.13	8.18	8.24	8.29	8.35	8.40	8.46	8.52
+ 9	8.57	8.63	8.69	8.75	8.81	8.87	8.93	8.99	9.05	9.11
+10	9.17	9.23	9.29	9.35	9.41	9.47	9.54	9.60	9.67	9.73
+11	9.79	9.86	9.92	9.99	10.05	10.12	10.19	10.26	10.32	10.39
+12	10.46	10.53	10.60	10.67	10.73	10.80	10.88	10.95	11.02	11.09
+13	11.16	11.24	11.31	11.38	11.46	11.53	11.61	11.68	11.76	11.83
+14	11.91	11.99	12.06	12.14	12.22	12.30	12.38	12.46	12.54	12.62
+15	12.70	12.78	12.86	12.95	13.03	13.11	13.20	13.28	13.37	13.45
+16	13.54	13.62	13.71	13.80	13.89	13.97	14.06	14.15	14.24	14.33
+17	14.42	14.51	14.61	14.70	14.79	14.88	14.98	15.07	15.17	15.26
+18	15.36	15.45	15.55	15.65	15.75	15.85	15.95	16.05	16.15	16.25
+19	16.35	16.45	16.55	16.66	16.76	16.86	16.96	17.07	17.18	17.29
+20	17.39	17.50	17.61	17.72	17.83	17.94	18.05	18.16	18.27	18.38
+21	18.50	18.61	18.72	18.84	18.95	19.07	19.19	19.31	19.42	19.54
+22	19.66	19.78	19.90	20.02	20.14	20.27	20.39	20.51	20.64	20.76
+23	20.91	21.02	21.14	21.27	21.41	21.53	21.66	21.79	21.92	22.05
+24	22.18	22.32	22.45	22.59	22.72	22.86	23.00	23.14	23.27	23.41
+25	23.55	23.69	23.83	23.98	24.12	24.26	24.41	24.55	24.70	24.84
+26	24.99	25.14	25.29	25.44	25.59	25.74	25.89	26.05	26.20	26.35
+27	26.51	26.66	26.82	26.98	27.14	27.29	27.46	27.62	27.78	27.94
+28	28.51	28.27	28.43	28.60	28.77	28.93	29.10	29.27	29.44	29.61
+29	29.78	29.96	30.13	30.31	30.48	30.65	30.83	31.01	31.19	31.37

2. Tabelle für den Faktor $k \cdot B \cdot (t - t_1)$.

$t - t_1$	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0	0.00	0.06	0.11	0.16	0.21	0.26	0.32	0.37	0.42	0.48
1	0.53	0.58	0.63	0.69	0.74	0.79	0.84	0.90	0.95	1.00
2	1.05	1.11	1.16	1.21	1.26	1.31	1.37	1.42	1.47	1.52
3	1.58	1.63	1.68	1.74	1.79	1.84	1.89	1.95	2.00	2.05
4	2.10	2.16	2.21	2.26	2.31	2.37	2.42	2.47	2.52	2.57
5	2.63	2.69	2.74	2.79	2.84	2.90	2.95	3.00	3.05	3.10
6	3.16	3.21	3.26	3.32	3.37	3.42	3.47	3.52	3.58	3.63
7	3.68	3.73	3.79	3.84	3.89	3.95	4.00	4.05	4.10	4.15
8	4.21	4.26	4.31	4.37	4.42	4.47	4.52	4.57	4.63	4.68
9	4.73	4.79	4.84	4.89	4.94	5.00	5.05	5.10	5.15	5.20
10	5.26	5.31	5.36	5.42	5.47	5.53	5.58	5.63	5.68	5.73
11	5.79	5.84	5.89	5.94	6.00	6.05	6.10	6.16	6.21	6.26
12	6.31	6.37	6.42	6.47	6.52	6.57	6.63	6.68	6.73	6.78
13	6.84	6.89	6.94	6.99	7.05	7.10	7.15	7.21	7.26	7.31
14	7.36	7.42	7.47	7.52	7.57	7.63	7.68	7.73	7.78	7.83
15	7.89	7.94	7.99	8.05	8.10	8.16	8.21	8.26	8.31	8.36
16	8.42	8.47	8.52	8.57	8.63	8.68	8.73	8.79	8.84	8.89
17	8.94	8.99	9.05	9.10	9.15	9.21	9.26	9.31	9.36	9.41
18	9.47	9.52	9.57	9.63	9.68	9.73	9.78	9.83	9.89	9.94
19	9.99	10.04	10.10	10.15	10.20	10.26	10.31	10.36	10.41	10.46

punkt zu finden, sucht man den Werth von F_0 unter den Spannungswerthen der Tabelle 1 und findet daneben in der ersten Columnne die zugehörige Thaupunkttemperatur.

Beispiel: t wird gefunden zu 20.5° ; t_1 zu 15.4° ; $t - t_1 = 5.1^\circ$.

In Tabelle 1 findet man $F = 17.94$ mm; $F_1 = 13.03$ mm. Aus obestehender Tabelle entnimmt man $k \cdot B \cdot (t - t_1) = 2.69$, indem man in der ersten Columnne ($t - t_1$) die Zahl 5 aufsucht und von dieser aus horizontal weiter geht bis zu der 0.1 überschriebenen Columnne; als den der Temperaturdifferenz 5.1° zugehörigen Werth findet man hier = 2.69. Folglich hat man:

$$F_0 = 13.03 - 2.69 = 10.74 \text{ mm.}$$

Die Sättigungsprocente sind $= \frac{100 \cdot 10.74}{17.94} = 59.8$ Procent; das Sättigungsdeficit $= 17.94 - 10.74 = 7.20$ mm; der Thaupunkt $= 12.4^\circ$.

IV. Bestimmung des CO_2 -Gehalts der Luft.

A. Genaue Bestimmung.

Man bezieht aus der Apotheke: 1. in mit Glasstopfen verschlossener Flasche eine verdünnte Schwefelsäure, 2·227 g SO_4H_2 im Liter enthaltend; 1 ccm derselben entspricht 1 mg CO_2 . 2. eine Strontiumhydratlösung von solcher Concentration, dass 1 ccm durch 1 ccm der vorgenannten Schwefelsäure gerade neutralisirt wird. Die Flasche muss im Verschluss ein mit Natronkalk gefülltes U-Rohr enthalten, so dass bei der Entnahme (mittels Pipette) nur von CO_2 befreite Luft in die Flasche nachströmen kann; andernfalls verändert sich der Titre der Lösung zu rasch. 3. Lösung von 1 Procent Phenolphthalein in 70procentigem Alkohol.

Vor der Bestimmung ist der Titre des Strontiumwassers nochmals zu controliren. Man nimmt dazu ein 60 ccm fassendes Erlenmeyer'sches Kölbchen, dass mit doppelt durchbohrtem Kautschukstopfen verschlossen wird. Durch die eine Bohrung lässt man 25 ccm Strontiumwasser und dann mittelst Tropfpipette 1 bis 2 Tropfen Phenolphthaleinlösung einlaufen; die Bohrung wird dann sofort mit einem Glasstäbchen geschlossen. Durch die andere Bohrung steckt man gleich darauf eine Glashahnbürette mit lang ausgezogener Spitze, die bis zur äussersten Spitze mit der Schwefelsäure gefüllt ist. Man lässt nun die Säure langsam zum Strontiumwasser zulaufen und lockert von Zeit zu Zeit das Glasstäbchen, um die gespannte Luft entweichen zu lassen. Nach jedem Säurezusatz schüttelt man vorsichtig um. Sobald die Mischung farblos wird, liest man die bis dahin verbrauchte Säuremenge ab.

Zur Ausführung der CO_2 -Bestimmung nimmt man einen langhalsigen Kolben von 3—4 Liter Inhalt, dessen Capacität vorher durch Ausmessen mit Wasser genau bestimmt war. In diesen wird die Luft des Untersuchungsraumes mittelst eines Blasebalges mit langem Ansatzrohr hineingeblasen. Gleichzeitig wird die Lufttemperatur und der Luftdruck abgelesen. Dann wird der Kolben mit einem doppelt durchbohrten Kautschukstopfen verschlossen, in dessen Bohrungen Glasstäbe stecken. Man misst dann in eine Pipette 50 ccm Strontiumwasser ab, nimmt den einen Glasstab heraus, lässt das Strontiumwasser durch diese Bohrung einfließen, und schliesst sofort wieder. Darauf schwenkt man das Strontiumwasser vorsichtig im Kolben hin und her und lässt den Kolben schliesslich 12 Stunden stehen, um vollständige Absorption der CO_2 zu erreichen. (Für annähernde Bestimmungen genügt einstündiges Stehenlassen.) Nun wird die früher benutzte Glashahnbürette mit Schwefelsäure gefüllt, der eine Glasstab entfernt, zunächst 2 Tropfen Phenolphthalein eingelassen, dann die Bürette durchgesteckt und wiederum unter zeitweisem Lüften des anderen Glasstabs bis zur Entfärbung titirt.

Waren z. B. bei der Titrestellung des Strontiumwassers auf 25 ccm derselben 24 ccm Schwefelsäure, also auf 50 ccm 48 ccm Schwefelsäure verbraucht, dagegen für die mit der untersuchten Luft geschwenkten 50 ccm Strontiumwasser nur 40 ccm Schwefelsäure, so kommen 8 ccm auf Rechnung der CO_2 jener Luft, und diese entsprechen = 8 mg CO_2 . Um die Milligramme CO_2 in Cubikcentimeter zu verwandeln, muss man erstere durch das Volumgewicht

der CO_2 dividiren, das bei verschiedenen Temperaturen und verschiedenen Luftdruck folgenden Werth hat:

1 Liter CO_2 wiegt Gramm:

	740 mm	744 mm	748 mm	752 mm	756 mm	760 mm	764 mm	768 mm
10°	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	1.87	1.88	1.89
12°	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	1.87	1.88
14°	1.79	1.80	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86
16°	1.78	1.79	1.79	1.81	1.82	1.82	1.83	1.84
18°	1.76	1.77	1.77	1.79	1.80	1.81	1.82	1.83
20°	1.74	1.75	1.75	1.77	1.78	1.79	1.80	1.81
22°	1.73	1.73	1.74	1.75	1.76	1.77	1.78	1.79
24°	1.71	1.72	1.73	1.74	1.75	1.76	1.76	1.77

Hatte man zur Zeit des Versuchs z. B. 15° und 760 mm Barometerstand, so sind die 8 mg CO_2 durch 1.83 zu dividiren, und man findet so 4.37 ccm CO_2 . Enthielt die Sammelflasche beispielsweise 3420 ccm Luft, so war der Gehalt der Luft an CO_2 : $\frac{4.37}{3420} = \frac{x}{1000}$ also 1.28 pro mille.

B. Approximative Bestimmung.

Der LUXEN-ZACKENBORFF'sche Apparat wird entweder von CRAMER in Zürich fertig bezogen, oder man stellt sich den Apparat folgendermaassen zusammen: Zu einem Pulverfläschchen von ca. 80 ccm Capacität wird ein passender doppelt durchbohrter Kautschukstopfen ausgesucht. Die eine Bohrung trägt ein gerades, bis zum Boden des Fläschchens reichendes Glasrohr und an dessen äusserer Spitze ein Stück Gummischlauch; durch die andere Bohrung ist ein kurzes gekrümmtes Glasrohr gesteckt, dessen äusseres Ende durch einen Kautschukschlauch mit einem Gummiballon von etwa 70 ccm Capacität verbunden ist. Ein Längsschlitz in dem letzterwähnten Kautschukschlauch liefert ein Ventil, das beim Comprimiren des Ballons die Luft vollständig austreten lässt, wenn gleichzeitig der Kautschukansatz auf dem geraden Glasrohr zugeklemmt wird; lässt man aber dann den Ballon los und hebt gleichzeitig jenen Verschluss auf, so geht alle Luft nur durch das gerade Glasrohr und das Pulverfläschchen in den Ballon, während das Ventil keine Luft passiren lässt.

In das Fläschchen bringt man 10 ccm einer dünnen mit Phenolphthalein roth gefärbten SodaaLösung: man hält sich zweckmässig eine Lösung von 5.3 g wasserfreier Soda in 1 Liter = 1000 ccm, NormalsodaaLösung vorrätig, in welcher man 0.1 g Phenolphthalein aufgelöst hat. Von dieser Lösung verdünnt man am Versuchstage 2 ccm mit 100 ccm destillirten, angekochten und wieder abgekühlten Wassers). Sodann lässt man mit Hilfe des Ballons und der beschriebenen Ventilwirkung eine Ballonfüllung Luft des Untersuchungsraumes nach der anderen durch die SodaaLösung streichen; nach jeder frischen Füllung schliesst man mit dem Finger den offenen Kautschukschlauch und schüttelt das Gläschen eine volle Minute lang, damit alle CO_2 der Luft absorbirt wird. In dieser Weise fährt man fort, bis die SodaaLösung entfärbt ist. Aus der bis dahin verbrauchten Zahl von

Ballonfüllungen lässt sich der CO_2 -Gehalt der Luft annähernd entnehmen. Im Mittel braucht man

in einer Luft von 0.3 p. m CO_2	48 Ballonfüllungen
" " " " 0.4 " " "	35 "
" " " " 0.5 " " "	27 "
" " " " 0.6 " " "	21 "
" " " " 0.7 " " "	17 "
" " " " 0.8 " " "	13 "
" " " " 0.9 " " "	10 "
" " " " 1.0 " " "	9 "
" " " " 1.2 " " "	8 "
" " " " 1.4 " " "	7 "
" " " " 1.5 " " "	6 "

Geht der CO_2 -Gehalt der Luft über 1.5 p. m hinaus, so ist es besser, den Versuch mit einer doppelt so starken Sodalösung (2 ccm der Stammlösung mit 50 ccm Wasser verdünnt) zu wiederholen. Bei Verwendung dieser Lösung zeigen an:

1.2 p. m. CO_2	16 Ballonfüllungen
1.5 " " "	22 "
2.0 " " "	8 "
2.2 " " "	7 "
2.5 " " "	6 "
3.0 " " "	5 "
3.7 " " "	4 "

Jeder Apparat liefert je nach der Capacität des Ballons, des Fläschchens u. s. w. verschiedene Resultate. Obige Tabellen geben daher nur Mittelwerthe. Will man einigermaassen sichere Resultate haben, so muss man in Luft von verschiedenem CO_2 -Gehalt die CO_2 mittelst der oben angegebenen genauen Methode bestimmen, und gleichzeitig sehen, wie viel Ballonfüllungen mit einem bestimmten Apparat auf diesen bekannten CO_2 -Gehalt verbraucht werden. Für den in dieser Weise in 2 oder 3 Luftarten geachteten Apparat entwirft man eine korrigirte Tabelle und erhält dann sehr befriedigende Resultate.

V. Chemische Trinkwasser-Analyse.

1. Organische Stoffe (Sauerstoffverbrauch).

Reagentien) 1. Oxalsäurelösung, 0.63 g in Liter gelöst. 10 ccm dieser Lösung verbrauchen 0.8 mg Sauerstoff zur Oxydation. Die Lösung ist etwa 2 Wochen haltbar. 2. Lösung von 0.35 g Kaliumpermanganat (KMnO_4) in 1 Liter Wasser. Diese Lösung ist in folgender Weise auf die Oxalsäure genau einzustellen: In einen Kochkolben von 300 ccm Capacität kommen 100 ccm reines destillirtes Wasser und 5 ccm verdünnte Schwefelsäure (1 Säure + 3 aq.). Man erhitzt und hält 5 Minuten im Sieden; fügt dann zur Zerstörung etwa noch vorhandener organischer Substanzen so viel KMnO_4 zu, bis bei weiterem Erhitzen schwache Rosafärbung bestehen bleibt. Dann fügt man 10 ccm der Oxalsäurelösung zu, und lässt in die heisse Flüssigkeit aus der auf den Nullpunkt wieder aufgefüllten Bürette Chamäleonlösung zufließen, bis eben schwache Röthung eintritt. Die bis zu diesem Punkte verbrauchten Cubikcentimeter

Chamäleonlösung vermögen dann gerade jene 0.8 mg Sauerstoff abzugeben, welche die 10 ccm Oxalsäure zur Oxydation erfordern. Die Chamäleonlösung wird eventuell der einfacheren Rechnung wegen noch weiter verdünnt, bis 10 ccm genau 0.8 mg O entsprechen.

Ausführung: In dem vorhin gebrauchten Kochkolben werden 100 ccm des zu untersuchenden Wassers + 5 ccm verdünnte Schwefelsäure zum Sieden erhitzt; man fügt 7—8 ccm Chamäleonlösung und kocht genau 10 Minuten während des Siedens die Farbe erheblich blässer, so setzt man einige weitere Cubikcentimeter Chamäleonlösung zu. Nach Ablauf der 10 Minuten lässt man 10 ccm der Oxalsäurelösung einlaufen, worauf sofort Entfärbung eintritt, nimmt den Kolben von der Flamme fort und fügt nun tropfenweise Chamäleonlösung zu, bis schwache Rosafärbung bestehen bleibt. — Von den Gesamtverbrauch an Chamäleonlösung zieht man die zur Oxydation der 10 ccm Oxalsäure verbrauchten Cubikcentimeter ab und erhält so die Menge Chamäleon, welche von den organischen Stoffen der 100 ccm Wasser zur Oxydation consumirt sind.

Beispiel: Titer der Chamäleonlösung: 9.4 ccm = 10 ccm Oxalsäurelösung = 0.8 mg Sauerstoff: 1 ccm Chamäleon also = 0.085 mg Sauerstoff. — 100 ccm Wasser verbrauchten im Versuch im Ganzen 17.6 ccm Chamäleonlösung: davon gehen 9.4 auf Rechnung der zugesetzten Oxalsäure: es bleiben = 8.2 ccm = 8.2×0.085 mg Sauerstoff. 100 ccm Wasser verbrauchen folglich = 0.697 mg, 1 Liter = 6.97 mg Sauerstoff. — Will man auf Verbrauch von Permanganat umrechnen, so ist die Sauerstoffmenge mit 3.44 zu multipliciren.

2. Ammoniak.

Das Nessler'sche Reagens erzeugt mit den fast stets in Wässern vorhandenen Kalksalzen einen Niederschlag, der die Abschätzung der mit NH_3 entstehenden Färbung hindert. Zur Entfernung der Kalksalze versetzt man daher zunächst 50 ccm des zu untersuchenden Wassers in einem hohen Cylinder mit 1 ccm Natronlauge (1:4) und 2 ccm Sodaaugment (1:3). Nach 6—12 stündigem Stehen und vollständigen Absetzen des Niederschlages nimmt man von der klaren Flüssigkeit 20 ccm und versetzt mit 1 ccm des Nessler'schen Reagens. Derart Gefärbung oder gelblich-schwarzer Niederschlag ist NH_3 nachgewiesen.

Für quantitative Abschätzung löst man 3.141 g Salmiak (= 1 g NH_3 in 1 Liter Wasser. Davon entnimmt man 50 ccm und verdünnt auf 1 Liter, so dass 1 ccm dieser Lösung 1 mg NH_3 enthält. Nun füllt man in 3 gleiche Cylinder je 10 ccm dest. Wasser, setzt dem einen 4–1 ccm, dem zweiten 0.5 ccm und dem dritten 1 ccm der NH_3 -Lösung zu, einem NH_3 -Gehalt von 0.005, von 0.025 und von 1 mg in 10 ccm entsprechend. In jeden Cylinder gießt man weiter 1 ccm Nessler'schen Reagens. Füllt man einen vierten Cylinder mit 10 ccm des zu untersuchenden Wassers, versetzt auch dieses mit 1 ccm Nessler und vergleicht die Färbung der Proben, indem man von oben durch die Mitte der Schicht gegen eine weiße Unterlage sieht. Ist die Farbe des Wassers kleiner die Proben vom bestimmten NH_3 -Gehalt gleich, so werden weitere Subst. von anderem herges. aus das untersuchte Wasser und eine Probe von bestimmtem Gehalt hinzugef..

3. Salpeter zu Salpatrik.

In dem Wasser werden in einem Cylinder mit 1–2 ccm verdünnter H_2SO_4 und mit ungefähr 1 ccm Na_2CO_3 -Lösung versetzt. Blaufärbung zeigt Nitrat an.

Quantitative Abschätzung erfolgt durch colorimetrische Vergleichung, e bei der Bestimmung des NH_3 . Als Vergleichsflüssigkeit dient eine Lösung n 1.815 g NaNO_2 (= 1 g N_2O_5) in 1 Liter; zum Gebrauch werden 10 ccm f 1 Liter verdünnt, so dass 1 ccm = 0.01 mg N_2O_5 enthält. Von dieser usung fügt man zu je 100 ccm 0.2, 1.0 und 5.0 ccm, und schaltet nach B- rf weitere Vergleichsstufen ein.

Oder: 100 ccm Wasser werden mit 1–2 ccm verdünnter Schwefelsäure d 1 ccm Lösung von Diamidobenzol (5 g Metadiamidobenzol unter Zu- z von verdünnter SO_4H_2 in Wasser gelöst, zum Liter aufgefüllt, und falls e Lösung stärker gefärbt ist, durch Thierkohle filtrirt). Es entsteht gelbbraune rbung, wenn N_2O_5 zugegen ist. — Quantitativ-colorimetrische Bestimmung e oben.

4. Salpetersäure.

Qualitativ: 2 ccm Wasser werden im Reagensglas mit einigen Tropfen ucinlösung versetzt; dann lässt man bei schräger Haltung des Glases vor- htig concentrirte Schwefelsäure am Rande herunterfließen. An den Berüh- agstellen der beiden über einander geschichteten Flüssigkeiten entsteht vor- ergehend ein rosafarbener Ring.

Oder: von einer Lösung von circa 1 g Diphenylamin in concentrirter H_2SO_4 giesst man 2–3 ccm in ein Reagensglas, setzt tropfenweise das zu un- terchende Wasser zu und schüttelt; bei starkem Nitratgehalt tritt schon nach Tropfen, bei mässigem Gehalt erst nach 5–10 Tropfen bleibende Blau- bung ein.

Quantitativ: Eine vom Apotheker zu bereitende Indigolösung von cher Stärke, dass ungefähr 8 ccm durch 1 mg N_2O_5 entfärbt werden, wird t Salpeterlösung von bekanntem Gehalt genau titirt. Letztere bereitet man durch, dass 7.484 g Kaliumnitrit (= 4.0 g N_2O_5) in 1 Liter Wasser gelöst rden; davon werden 10 ccm zu 1 Liter aufgefüllt; 1 ccm der Lösung enthält an 0.04 mg, 25 ccm enthalten 1 mg N_2O_5 . 25 ccm dieser Lösung werden lann in einem Kolben von 150 ccm Capacität mit 50 ccm concentrirter Schwefel- re versetzt, und Indigolösung aus der Bürette zugelassen, bis flaschengrüne rbung mehrere Minuten bestehen bleibt. Der Versuch wird sogleich wieder- lt und diesmal die Indigolösung bis nahe an die gefundene Grenze in einem ahle zugesetzt, und dann wieder bis zur Färbung titirt, die jetzt etwas iter einzutreten pflegt. Sind beispielsweise 9 ccm Indigolösung verbraucht, zeigt ein Cubikcentimeter der Lösung $\frac{1}{9} = 0.11$ mg N_2O_5 an.

Um den Nitratgehalt eines Wassers zu bestimmen, nimmt man 25 ccm, ssetzt mit 50 ccm concentrirter SO_4H_2 und verfärbt genau wie oben. Wird sentlich mehr als 8 ccm Indigolösung verbraucht, so ist das Wasser mit stillirtem Wasser entsprechend zu verdünnen und der Versuch zu wiederholen.

5. Chloride.

Reagentien: 1. $\frac{1}{10}$ Normal-Silberlösung (17.0 g AgNO_3 = 10.8 g Ag in Liter Wasser gelöst); 1 ccm der Lösung sättigt 3.55 mg Cl resp. 5.85 mg Na. 2. Neutrale Kaliumchromatlösung, ca. 3 Procent.

Ausführung: 100 ccm Wasser werden in einem Wasserglas mit 3 bis Tropfen der Kaliumchromatlösung versetzt. Dann fügt man aus der Bürette e Silberlösung zu, bis nach Umrühren mit einem Glasstabe die gelbe Farbe

der ganzen Flüssigkeit sich in einem gelbrothen Farbenton verwandelt hat. Die Zahl der bis dahin verbrauchten Cubikcentimeter Silberlösung giebt, multiplicirt mit 3.55, die Milligramme Chlor, die in 100 ccm Wasser enthalten waren.

6. Härte.

Seifenlösung, durch Auflösen von 20 g reiner Seife in Liter Alkohol von 56 Volumprocenten bereitet, wird gegen eine Kalk- oder besser Baryumlösung von bekanntem Gehalt titirt. Man löst zu dem Zweck 0.523 g BaCl₂ in 1 Liter Wasser; diese Lösung entspricht 12 (deutschen) Härtegraden, d. h. 100 ccm enthalten eine 12 mg BaO äquivalente Ba-Menge. Man füllt dann 100 ccm Baryumlösung in eine Glasstopfenflasche von 200 ccm Capacität, fügt Seifenlösung aus einer Bürette zu, setzt den Stopfen auf und schüttelt kräftig, fährt dann mit dem Zusatz der Seifenlösung fort und zwar so lange, bis nach dem Schütteln ein feinblasiger Schaum auf der ganzen Oberfläche der Flüssigkeit circa 5 Minuten stehen bleibt. Je nach dem Ausfall des Versuchs wird dann die Seifenlösung mit 56procentigem Alkohol so weit verdünnt, dass gerade 45 ccm derselben bis zur Schaumbildung erforderlich sind.

Von dem zu untersuchenden Wasser werden ebenfalls 100 ccm in eine Stöpselflasche gefüllt und allmählich mit Seifenlösung titirt, bis bleibender Schaum auftritt. Werden mehr als 45 ccm verbraucht, so ist das Wasser zu verdünnen. Der Verbrauch an Seifenlösung ist dann nicht etwa der Härte des Wassers einfach proportional, sondern letztere ergibt sich aus folgender Tabelle:

Verbrauch an Seifenlösung.		Härte in deutschen Härte- graden (Milligramm CaO in 100 ccm Wassers).	
3.4	0.4 ccm Seifenlösung entsprechen einer Härtezunahme um 0.1°	{	0.5
5.4			1.0
7.4			1.5
9.4			2.0
11.3	0.38 ccm Seifenlösung entsprechen einer Härtezunahme um 0.1°	{	2.5
13.2			3.0
15.1			3.5
17.0			4.0
18.0			4.5
20.8			5.0
22.6	0.36 ccm Seifenlösung entsprechen einer Härtezunahme um 0.1°	{	5.5
24.4			6.0
26.2			6.5
28.0			7.0
29.8			7.5
31.6			8.0
33.3	0.34 ccm Seifenlösung entsprechen einer Härtezunahme um 0.1°	{	8.5
35.0			9.0
36.7			9.5
38.4			10.0
40.1			10.5
41.8			11.0
43.4	0.32 ccm Seifenlösung entsprechen einer Härtezunahme um 0.1°	{	11.5
45.0			12.0

VI. Die Bestimmung des Milchfetts mittelst des Laktobutyrometers.

In das Laktobutyrometer füllt man 10 ccm der gut durchgemischten Milch und giebt 1—2 Tropfen Natronlauge (1:3) zu; dann lässt man aus einer anderen Pipette 10 ccm reinen Aether zufließen, verschliesst das Laktobutyrometer mit einem gut passenden Kork und schüttelt, unter zeitweisem vorsichtigen Lüften des Korks, kräftig durch, bis eine homogene Mischung entstanden ist. Hierauf fügt man mittelst einer dritten Pipette 10 ccm 91procentigen Alkohol zu und schüttelt nach dem Aufsetzen des Korks wieder einige Male kräftig und stossweise, aber nicht zu anhaltend, bis die Kaseinklumpchen sich einigermaßen vertheilt haben. Nun kommt die Röhre in einen Cylinder mit 40° warmem Wasser für 15—20 Minuten, darauf in Wasser von 20° für 5 Minuten; und dann wird die Höhe der oben abgeschiedenen Aetherfettlösung an der Skala des Laktobutyrometers abgelesen. Die Fettmenge ist aus der gefundenen Menge von Aetherfettlösung nach folgender Tabelle zu berechnen.

Aetherfettlösung	Fett	Aetherfettlösung	Fett
ccm	Procente	ccm	Procente
0.1	1.34	1.1	3.38
0.2	1.54	1.2	3.58
0.3	1.75	1.3	3.79
0.4	1.95	1.4	3.99
0.5	2.16	1.5	4.20
0.6	2.36	1.6	4.40
0.7	2.56	1.7	4.63
0.8	2.77	1.8	4.96
0.9	2.97	1.9	5.31
1.0	3.18	2.0	5.66

Register.

- ABCprocess** 454.
Abdeckereien 487.
Abdominalthypus, Diagnose 679.
— Prophylaxe 642; Schutzimpfung 611;
Verbreitungsweise 638.
Abfälle der Nährstoffe 239.
Abfallstoffe, Beschaffenheit ders. 439;
Entfernung ders. 438.
Abfuhrsysteme 445.
Abschwächung der Bakterien 52. 609.
Absorptionswirkungen des Bodens 177.
Absterbebedingungen der Bakterien 46.
Abwässer als Infektionsquelle 441; ge-
werbliche 547; Infektionsgefahr der
558.
Abwässerreinigung, elektrolytische 481.
Acclimatisation 145.
Acetylgas 431.
Actinomyces 79.
Adipocirebildung 489.
Aëroben, fakultative 38; obligate 38.
Aerzte, Desinfektion ders. 587.
Aetzkalk als Desinficiens 566; zur
Reinigung von Canalwasser 480. 453.
Agarkultur 677.
Agglutination 598; der Cholera bacillen
683; der Pest bacillen 689; der Ty-
phus bacillen 681.
Agglutinine 598.
Aitken's Methode 161.
Aktive Immunisirung 607.
Albumosen, Nährwert 233; von Fleisch
316.
Alcoholica 326.
Aleuronatbrot 320.
Alexine 603.
Algen im Wasser 210.
Alkoholmissbrauch, Bekämpfung dess.
238.
Alluvium 172.
Amboceptoren 602.
Amidoverbindungen 233.
Ammoniak im Grundwasser 199; im
Wasser 207; im Wasser, Bestimmung
697.
Ammoniumcarbonat in der Luft 156.
Amoeba coli 82.
Amoeba dysenteriae 82.
Anaëroben, fakultative 38; obligate 38.
Anchylostomum, duodenale 210.
Anemometer 120. 415.
Animale Lymphe 648.
Animalische Kost 251.
Anopheles bei Malaria 662.
Anopheles claviger 89.
Anoxyhémie 119.
Anthrakosis 526.
Anticyclonen 122.
Antitoxine 594.
Anchylostomum duodenale im Wasser
205.
Anzeigepflicht bei Infektionskrank-
heiten 562.
Aq. Cresoli zur Desinfektion 579.
Arbeiterbäder 346.
Arbeiterernährung 257.
Arbeitergefährdung durch Contagien
539.
Arbeiter, jugendliche 545.
Arbeiterkrankheiten 518.
Arbeiternahrung 519.
Arbeiterversicherungen 520.
Arbeitsleistung, Einfluss auf den Nähr-
stoffbedarf 240.
Arbeitsräume 521.
Argandbrenner 430.
Argon 151.
Arktische Zone 138.
Armeeekost 261.
Arsen im Wasser 204. 207.
Arsenvergiftung, gewerbliche 539.
Arthrosporen 37.
Asbestkleidung 343.
Aschencloset 452.
Ascus 26.
Aspergillus 28.
Aspirationssystem 407.
Atmometer 107.
Auer's Glühlicht 430.
Ausstrichpräparate 673.
Augen, Schädigung ders. 420.
Bachwasser 201.
Bacillaceae 60.
Bacillus 33; aërogenes 64; der blauen
Milch 74; botulinus 304; coli 64; der
Hühnercholera 73; der Geflügeltuber-
culose 67; der Kaninchenseptikämie
73; des malignen Oedems 72; der
Mäusesep tikämie 73; der Perlsucht

levans 319; oedematis maligni
 Boden 194; phosphorescens 74.
 moniae 59; proteus fluorescens
 proteus vulgaris 74; prodigiosus
 pyocyaneus 74; suttilis 74; tetani
 Boden 194.
 aus'sche Milch 290.
 icide Antikörper 611.
 rkung des Serums 602.
 ien 32; im Eis 228; in der
 er 292; in Kleidern 343; in
 ensaurem Wasser 229; in Staub-
 165; in Tröpfchenform 164; im
 ser 213.
 ienproteine 44.
 iolysine 601.
 346.
 idium coli 83.
 ürmer 299.
 en 509.
 sportable 515.
 eter 115.
 aterial, Durchlässigkeit für Luft
 Durchlässigkeit für Wasser 369;
 leitung 370.
 volle 335.
 vollenstaub 527.
 lung 356.
 tz, Wahl und Herrichtung 348.
 ise 340. 357; hygienische Schäden
 ungspläne 353.
 ea 315.
 toa 80.
 onissplätze 491.
 htung 419; der Wohnung 419.
 Schulen 497; indirekte 499.
 stliche 427.
 htungsmaterial 428.
 erke 541.
 eld'sches Kieselguhrfilter 227.
 elung zur Reinigung des Canal-
 wassers 467.
 und Beschäftigung 516.
 rungen, Infektion durch 584.
 t's Rahmgemenge 290.
 26.
 uckapparate 328.
 Fälschungen 327.
 ammensetzung 327.
 isches Verfahren 470.
 myceten 29.
 ein-Verfahren 471.
 n Wasser 205. 207.
 bre in Wasserleitungen 226.
 rgiftung durch Brot 322; gewerb-
 533.
 issfabriken 534.
 1 Gebrauchsgegenständen 533.

Blutnachweis 601.
 Boden 171; Absorptionswirkungen 177.
 Bodenbakterien 193.
 Bodencapillarität 177.
 Boden, chemisches Verhalten 180.
 Bodenfiltration zur Reinigung des Canal-
 wassers 466.
 Boden, Flächenwirkungen 176.
 Bodenluft 182; in Häusern 368.
 Bodenoberfläche 171.
 Bodenporosität 174.
 Bodenprofile 189.
 Boden, Temperatur 179; und Infektions-
 krankheiten 195. 622; Verhalten des
 Wassers im 184.
 Bodenverunreinigung durch Abfallstoffe
 443.
 Bodenverunreinigungen 181.
 Bogenlicht 431.
 Borax als Zusatz zur Milch 267.
 Botriocephalus 300.
 Brandpilze 321.
 Branntwein 331.
 Brennmaterialien 382.
 Brot 317. 318 f.
 Brotöl 323.
 Breslauer Apparat 569.
 Breslauer Desinfektion 580.
 Brunnen, Desinfektion 219. 228.
 — Lokalinspektion 216.
 Budenberg's Desinfektionsofen 575.
 Butter 291.
 Buttermilch 295.
 Buttersäurebazillen 265.
 Butyrometer 272.
 Cacao 322.
 Calorifer 393.
 Campbell'scher Autograph 126.
 Canäle, Material 457; Spülung 458;
 Canalinhalt, Zusammensetzung 464.
 Canalluft 442, 461.
 Canalwasser, Reinigung 466.
 Capillarität des Bodens 177.
 Carbofuchsin 671.
 Carbonsäure als Desinficiens 566.
 — als Desodorans 451.
 Carbonsatronofen 392.
 Carne pura 259.
 Centrale Wasserversorgung 220.
 Centralheizung 393.
 Cercomonas 83.
 Chamottesteine zur Formaldehydver-
 dampfung 569.
 Chemotaxis 35.
 Chlamydosporen 27.
 Chlor, im Gewerbebetrieb 530.
 — in der Luft 155.
 Chloride im Grundwasser 199.

- Chloride im Wasser 208.
 — —, Bestimmung 698.
 Chlorkalk als Desinficiens 481,
 Chokolade 332.
 Cholera asiatica, Verbreitungsweise 692.
 und Wasser 205.
 Cholerabacillen im Wasser 212; -diagnose
 682; -epidemien durch Wasser 631;
 -Prophylaxe 636; -roth 76; -Schutz-
 impfung 611; -Spirillen 75.
 Cholera und Diarrhoea infantum 623;
 — und Grundwasser 634.
 Chytridiaceen 81.
 Cladothrix 80.
 Classification der Spaltpilze 53.
 Claviceps purpurea 321.
 Clostridium 34.
 Coccaceae 56.
 Coccidida 84.
 Coks-Filter 471.
 Complemente 601.
 Comprimierte Luft zur Ventilation 414.
 Condensierte Milch 277.
 Covidien 26.
 Kontakte, Infektion durch 584.
 Conservesalz 304.
 Conservierungsmethoden 313.
 Consumvereine 259.
 Contagien in Arbeitsräumen 539.
 Contagiöse Infektionskrankheiten 553.
 Continentalklima 139.
 Corridorsystem in Krankenhäusern 509.
 Cremometer 271.
 Crenothrix 80. 203.
 Culex-Arten 89.
 Cyclonen 122.
 Cytolysine 601.
 Cytoxyctes variolae 82.
 Cysticercus 300.
 Dach 373.
 Dampfheizung 400.
 Dauerbrandöfen 388.
 Degenerationsformen 34.
 Degener-Rothe's Verfahren 479.
 Desinfektion 564; durch Lüftung 419.
 Desinfektions-Anstalten 572.
 Desinfektionsapparate, Aufstellung der-
 selben 576.
 — mit gespanntem Dampf 575.
 Desinfektions-Colonnen 572.
 Desinfektionsmittel, gasförmige 565.
 Desinfektionsöfen 575; improvisierte
 573; Prüfung 577.
 Desinfektion von Brunnen 219. 228;
 von Grubeninhalt 451; von Koch-
 geschirren 249; von Wasser 227;
 während der Krankheit 579.
 Desinfectoren-Dienstanweisung 580.
 Desinficientien 47.
 Desodorisirung von Grubeninhalt 451.
 — von Tonneninhalt 451.
 Diatomeen im Wasser 210.
 Dibdin's Verfahren 472.
 Differentialmanometer 415.
 Diluvium 172.
 Diphtherie-Antitoxin 614; -bacillus 68;
 -diagnose 684; -Immunisirung 614;
 Prophylaxe 628; Verbreitungsweise
 627.
 Diplococcus intracellularis menin-
 gitis 59; pneumoniae 58.
 Diplokokken 33.
 Disposition bei Phthise 666. 670; des
 Körpers 26; individuelle 589; Ur-
 sachen 590.
 Distoma 210. 501.
 Drainage auf Rieselfeldern 468.
 Durchgangszone 190.
 Durchlässigkeit des Bodens 175.
 Dysenterie-Amöben im Wasser 210.
 Dysenterie und Wasser 205.
 Ectogene Infektionskrankheiten 554.
 Edison's Glühlichtlampe 431.
 Ehrlich'sche Theorie 594.
 Eier 316.
 Einathmung, Infektion durch 585.
 Einleitung von Canaljauche in die
 Flüsse 464.
 Einsteigschachte 459.
 Eis, Bakteriengehalt 228.
 Eisschrank 310.
 Eis zur Kühlung von Wohnungen 382.
 Eisen im Wasser 203. 207.
 Eisenchlorid - Behandlung des Canal-
 inhalts in Leipzig 479.
 Eisengehalt der Nahrung 236.
 Eisensalze zur Reinigung von Canal-
 wasser 480.
 Eisenvitriol als Desodorans 451.
 Eiweissansatz 242.
 Eiweissbedarf 231.
 Eiweissstoffe 231.
 Eiweissverarmung 243.
 Eiweisszerfall im Körper 231.
 Elektrizität der Luft 126.
 Elektrisches Glühlicht 431.
 Elektrisches Licht 431.
 Endoblastoderma 32.
 Endosporen 36.
 Enteisung des Wassers bei Brunnen
 219.
 Enteisungsanlage des Wassers nach
 Piefke 221.
 Energie, Einfluss auf den Nährstoff-
 bedarf 240.
 Entflammungspunkt des Petroleums 436.

ttungskuren 244.
 icklungshemmung der Bakterien

671.
 oset 452.
 rungen 102.
 tung 102.
 rung 230; der Säuglinge 278.
 pel nach Impfung 647.
 ema solare 127.
 334.
 schirre 249.
 istoren 529.
 sionsgefahr durch Leuchtgas 487;
 ch Petroleum 436;
 sionen in Sprengstofffabriken 543.

abwässer 464. 549.
 kinspektoren 550.
 ien, Präparation ders. 451.
 reste im Wasser 210.
 methode 673. 675.
 iss 44.
 jelm's Glühlicht 430.
 ünste 542.
 hr 461.
 des Wassers 203.
 n, giftige für Kleider 343.
 28.
 um 472.
 er 358. 373; in Schulen 497.
 erventilation 411.
 entbildung der Bakterien 43.
 ressinduktor 397.
 zone 471.
 satz 243.
 233.
 halt der Milch, Bestimmung 700.
 ilch 284.
 uren 234; flüchtige, in der Luft
 erlust 244.
 te Wohnungen 373.
 tigkeit, absolute, relative 106.
 s Baugrundes 348.
 259.
 zucht, Beeinträchtigung durch
 alinhalt 465.
 ches Filter 162.
 kost 242.
 nlagen, Ueberwachung 225.
 steine 225.
 tion von Abwässern 471; von
 sser 222.
 n 299.
 entilation 411.
 yphus 651.
 h 296; Aufbewahrung 309; Aus-

boek, Grundriss. V. Aufl.

nutzung des 297; Conservirung 313;
 Extract 315; Präparate für Kranke
 315; Wassergehalt 250; Zubereitung
 312.
 Fleischbeschau 306.
 Fleischfasern im Wasser 210.
 Fleischvergiftung 302.
 Fliegen, Infektion durch 586.
 Fluid beef 316.
 Flussverunreinigung durch gewerbliche
 Abwässer 547.
 Flusswasser 201.
 Formaldehyd-Desinfektion 567.
 Formalinpastillen 568.
 Formochlorol als Desinficiens 588.
 Fractionirte Cultur 39.
 Frauenmilch, Bakteriengehalt 280. 283.
 Friedrich's Verfahren 454.
 Früchte 324.
 Füllöfen 388.
 Fungi 26.
 Fuselöl 331.

Gährung 30.
 Galton-Kamin 387.
 Gas zur Beleuchtung 429.
 — — Heizung 391.
 Gasflammen zur Ventilation 413.
 Gasförmige Verunreinigungen in der
 Luft 155.
 Gasglühlicht 430.
 Gase, giftige 530.
 Gasöfen 391.
 Gefängniskost 262.
 Geisseln 35.
 Geisselfärbung 675.
 Gemässigte Zone 139.
 Gemmen 87.
 Gemüse 324.
 Gentianaviolett 671.
 Genussmittel 236. 326.
 Geognostischer Charakter des Bodens.
 172.
 Geschlecht, Einfluss auf den Nährstoff-
 bedarf 240.
 Geschmack des Wassers 202.
 Geruch des Wassers 202.
 Getreide 317.
 Gewerbehygiene 516.
 Gewürze 333.
 Giftige Farben 323.
 Gifte in der Milch 269.
 Gill'sches Filter 223.
 Gipsdielen 371.
 Giessfieber 537.
 Glanz von Lichtquellen 433.
 Gonococcus 59.
 Gradient, barometrischer 121.

Gräber 491.
 Gram'sche Färbung 672. 675.
 Gravidität, Einfluss auf den Nährstoffbedarf 240.
 Gregarinida 84.
 Grenzsperren 560.
 Grubenräumung 446.
 Grubensystem 445.
 Grundwasser 185. 198; Mikroorganismen 199; -veredelung beim Bodendurchgange 198; -verunreinigungen 198; -niveau, zeitliche Schwankungen 193.
 Gullie 459.
 Gummiwaaren, bleihaltige 537.

Hämolysine 601; 605.
 Hämogregarinida 85.
 Hämogregarina ranarum 85.
 Härte des Wassers 204. 207.
 Härtestimmung im Wasser 699.
 Halteridium 85.
 Hanf 335.
 Haus, Bau und Fundamentierung 367; Mauerstärke 371.
 Hausschwamm 29. 374.
 Häuser, Abstände 357; Höhe 358.
 Hautpflege 345.
 Hefe in der Brotbäckerei 319.
 Heidelberger Tonnen 448.
 Heilstätten für Phthisiker 668.
 Heisswasserheizung 398.
 Heizanlagen 386.
 Heizkammer 393.
 Heizluftkanäle 395.
 Heizvorrichtungen 383.
 Heizung in Krankenhäusern 512; in Schulen 499.
 Helligkeits-Einheit 424.
 Helligkeitsmessung mit Spiegelapparat 422; nach Cohn 425; nach Förster 420; nach L. Weber 423. 424; nach Wingen 426.
 Helligkeitsprüfer nach Wingen 425.
 Helminthencier im Wasser 210.
 Herpes tonsurans 28.
 Herpetomonas 83.
 Hesse'sches Verfahren 162.
 Heubacillen in Milch 266. 268.
 Heubacillus 74.
 Histogene Immunität 597.
 Hitzschlag 99.
 Hochdruckwasserheizung 398.
 Hochreservoir bei Wasseranlagen 225.
 Höhenklima 142.
 Holzkohle 452.
 Hühnercholera, Schutzimpfung 609.
 Hüttenrauch 533.

Hüttenwerke 547.
 Hulwa's Verfahren 478.
 Hundswuth, Schutzimpfung 610.
 Humanisirte Lymphe 644.
 Humus 173.
 Hygiene, Aufgabe derselben 8; Geschichte derselben 9.
 Hygrometer 107.
 Hyphen 26.

Immunisirung, aktive 607; passive 613. combinirte 615; Immunität, angeborene, 592. 603.
 —, Ursachen 590.
 —, erworbene 593. 603.
 Immunkörper 603.
 Impferysipel 647.
 Impfrothlauf 647.
 Impfung gegen Pocken 644.
 Impfwang 644.
 Imprägnirte Kleiderstoffe 341.
 Individuelle Disposition 589.
 Indol in der Luft 156.
 Industriesabwässer, Reinigung der 548.
 Infektionserreger auf Gemüsen 324.
 Infektion durch den Boden 195.
 — —, Verhütung derselben 197.
 — durch Kleidung 343; durch Milch 268; durch Wasser 205.
 Infektionsgefahr in Wohnungen 352.
 Infektionskrankheiten 551.
 —, Verbreitung durch Rieselfelder 469.
 Infektionsquellen 557.
 Infektionswege 584.
 Influenzabacillus 70.
 Influenza, Prophylaxe 654.
 —, Verbreitungsweise 652.
 Infusorien 83.
 — im Wasser 210.
 Insulationswärme der Mauern 378.
 Interdiurne Veränderlichkeit 96.
 Invasionsstätten für Parasiten 586.
 Involutionsformen 34.
 Isobaren 116.
 Isolirspitäler 514.
 Isolirung Contagiöser 562.
 Isothermen 93.

Jaeger's Wollstoff 342.
 Jahreschwankung, mittlere 95.
 Jute 335.

Kachelöfen 391.
 Kälberlymphe 648.
 Kälte als Conservierungsmittel 313.
 Käse 295.

- Kaffee 331.
 Kafilidesinfektor 487.
 Kaliumpermanganat als Desodorans 451.
 Kalk im Wasser 200. 204; Bestimmung 699.
 Kamine 387.
 Kaltluftkanal 393.
 Kartoffeln 323.
 Kefyr 296.
 Kehrriht 439. 441. 486.
 Kellerwohnungen 376.
 Kesselbrunnen 218.
 Kieselguhrfilter nach Berkefeld 227.
 Kinderarbeit 545.
 Kinderbewahranstalten 546.
 Kindermehle 290.
 Kindermilch 283.
 Kindermilchanstalten 283.
 Kinder, Nährstoffbedarf ders. 278.
 Kindersterblichkeit 623.
 Kirchhöfe 489.
 Klärbecken 474.
 Klärgruben 453.
 Klärung, chemische von Abwässern 474; mechanische von Abwässern 473.
 Kleber 317.
 Kleiderstoffe, chemisches Verhalten 336; mikroskopische Eigenschaften 334; physikalisches Verhalten 337.
 Kleidung 334; Abkühlung durch feuchte 340; Beziehung zur Wasserdampfabgabe 342; Eigenschaften 337; Permeabilität für Luft 338; Porenvolum 338; Wärmeabstrahlung 338; Wärmeleitungsvermögen 338.
 Klima 90. 134; Einfluss auf den Nährstoffbedarf 241.
 Kochen als Desinficiens 566; des Fleisches 312; der Milch 285; der Nahrungsmittel 249.
 Kochgeschirre 249.
 Kochsalz im Wasser 208.
 Kohlehydrate 234.
 Kohlenoxydgas 155; durch Heizanlagen 384; im Leuchtgas 435.
 Kohlenoxydvergiftung durch Leuchtgas 435 gewerbliche 532.
 Kohlensäure 153.
 Kohlensäurebestimmung in der Luft 694.
 Kohlensäure, Bestimmung zur Prüfung von Ventilationsanlagen 415; der Bodenluft 183.
 Kohlensäuregehalt der Wohnungs-Luft 464.
 Kohlensäureproduction durch künstliche Beleuchtung 436.
 Kohlensäurevergiftung 532.
 Kohlenwasserstoffe in der Luft 155.
 Körpergrösse, Einfluss auf den Nährstoffbedarf 240.
 Körperhaltung, Schädigung durch 522.
 Kossätze 261.
 Korngrösse des Bodens 173.
 Kornrade 322.
 Krankenhäuser 508.
 Krankenkost 242.
 Kreissägen, Unfälle durch 544.
 Kresolwasser zur Desinfektion 579.
 Küchenausgüsse 461.
 Kühlhallen 311.
 Kühlung von Wohnräumen 381.
 Küstenklima 139.
 Kugelmühlen 528.
 Kuhexcremente in der Milch 266.
 Kuhmilch 263; Präparate als Säuglingsnahrung 284.
 Kuhpocken 644.
 Kumis 296.
 Kunstbutter 294.
 Labferment 272.
 Lahmann's Reformbaumwolle 341.
 Laktation, Einfluss auf den Nährstoffbedarf 241.
 Laktobutyrometer 271; Anwendung 700.
 Laktoskop 271.
 Lampenglocken 433.
 Latrineninhalt, Desinfektion des 567.
 Lebensalter, Einfluss auf den Nährstoffbedarf 240.
 Lebensäusserungen der Spaltpilze 42.
 Lebensbedingungen der Spaltpilze 37.
 Leber-Egel 301.
 Lecithine, Nährwerth 233.
 Leguminosen 250. 251. 323.
 Leichenbestattung 488.
 Leichenhallen 491.
 Leichen, Infektionsgefahr der 559.
 Leichenverbrennung 492.
 Leim, Nährwerth 233.
 Leimsiedereien 547.
 Leinen 335.
 Leprabacillus 67.
 Leuchtgas 429.
 Leuchtmaterialien 428.
 Leydenia gemmipara Schaudin 82.
 Licht, Einfluss auf den Menschen 126; in Wohnungen 420.
 Lichtmessung 420.
 Lichtprüfer nach Cohn 425.
 Lichtqualität 433.
 Lichtstärke 432.
 Liebig'sche Suppe 291.

- Liernurs System 483.
 Linde's Eismaschine 311.
 Liquor Cresoli als Desinficiens 566.
 Localheizung 387.
 Localinspektion bei Wasserbegutachtung 215.
 Localisten 622.
 Loefflund'sche Milch 290.
 Logirhäuser, städtische 360.
 Luft als Infektionsquelle 167; Bakterien 161; gasförmige Verunreinigungen 155; geheizter Wohnräume 385; CO₂-Bestimmung 694; chemisches Verhalten 149.
 Luftbewegung 120.
 Luftdruck 115; Einfluss auf den Menschen 117.
 Luftfeuchtigkeit 106; Bestimmung 691.
 Luftheizung 398.
 Luftinfektion 167.
 Luftkeime, Entstehung ders. 164; Zahl u. Arten ders. 167.
 Luftkubus 405.
 Luftraum der Wohnungen 358. 405.
 Luftstaub 161.
 Luftverunreinigung durch Abfallstoffe 442; durch Gewerbebetriebe 546.
 Lüftung, künstliche 407; natürliche 406.
 — s. Ventilation 403.
 Lumpen, Ansteckungsgefahr durch 540.
 Lumpenwolle 336.
 Lungenheilstätten 668.
 Lympe, animale u. humanisirte 644.

 Magnesia im Wasser 200, 204.
 Mästung 244.
 Mahlen 318.
 Mahlzeiten 260.
 Mairich's Verfahren 479.
 Mais, Krankheiten durch 321.
 Malariaaboden 659.
 Malariadiagnose 690.
 Malaria hominis 87.
 Malariaparasiten des Affen 87.
 Malaria, Verbreitungsweise 661.
 Malzextract 325.
 Malzsuppe 291.
 Mannlöcher 459.
 Mantelöfen 388.
 Mantel-Regulir-Füllöfen 388.
 Margarine 294.
 Marktpolizei gegen Milch 270.
 Maschinenbetrieb Unfälle durch 543.
 Maschinen-Ventilatoren 414.
 Masern 651.
 Mastigophoren 83.
 Manganchlorür als Desodorans 451.

 Maul- und Klauenseuche 269.
 — —, Schutzimpfung 615.
 Megastoma 83.
 Mehl 317; Fälschungen 321; Zusätze zu 322.
 Menschenblut-Nachweis 601.
 Merista 33.
 Meraptane in der Luft 156.
 Metallvergiftungen, gewerbliche 533.
 Meteorwasser 198.
 Meterkerze 424.
 Methylenblau nach Loeffler 671.
 Miasmen 159.
 Micrococcus tetragenus 60.
 — ureae 60.
 Mikrosporidien 84.
 Mikrokokken 83.
 Mikroorganismen des Bodens 193; Erreger der Gährung und Fäulnis 31; Infektionskrankheiten 24.
 Milch 263; abgerahmte 291; als Säuglingsnahrung 278; als Krankheitsursache 268; Aufbewahrung 285; blaue 266; bittere 266; -Centrifuge 291; Conservierungsmittel 267. 272; Fälschungen 267; Fettbestimmung 700; gelbe oder rothe 266; -koche 286; Präparation 274. 278; -Präparation im Hause 285; Untersuchung 270; Verdaulichkeit und Ausnutzung 283; Zersetzungen 265.
 Milchsäurebakterien 265.
 Milchsäuregährung 265.
 Milchwagen 271.
 Milchwirtschaften 274.
 Milchzersetzen, Nachweis 272.
 Milzbrandbacillen 60.
 Milzbrandiges Fleisch 302; Schutzimpfung 609.
 Mineralisirung im Boden 178.
 Miquel's Methode 161.
 Mischkanal bei Luftheizung 396.
 Mitteldruckwasserheizung 400.
 Moeller's Filtertuch 394.
 Moertel 374.
 Molken 295.
 Molkereiprodukte 259.
 Monatsmittel 92.
 Monertafern 371.
 Mortalität und Witterung 131.
 Motoren für Ventilation 409.
 Mosquitos bei Malaria 662.
 Mucor 28.
 Mücken bei Malaria 662; Infektion durch 585.
 Müller-Nahnsen's System 477.
 Mumification 488.
 Muskelarbeit, Schädigung durch 522.
 Muttermilch 280.

Mycoderma cerevisiae et vini 31.
 Myel 26.
 Myopie bei Schulkindern 495.
 Myxomyceten 81.
 Myxosporidien 84.

Nährboden 40.
 Nähragar 677.
 Nährgelatine 677.
 Nährgeldwerth der Nahrungsmittel 255.
 Nährlösung 39.
 Nährstoffbedarf, 230. 239. 240; des Kindes 278; Deckung dess. 245.
 Nahrung in öffentlichen Anstalten 261; Verteilung auf Mahlzeiten 260; Temperatur 250.
 Nahrungsmittel 230; Aufbewahrung 248; Ausnutzbarkeit 245; Auswahl 245; Calorienwert dess. 251; chem. Zusammensetzung 252; Infektion durch 585; Preis 255; Volum 250; Zubereitung 248.
 Nebel 124.
 Nernst's Glühlichtlampe 431.
 Niederdruckdampfheizung 402.
 Niederdruckwasserheizung 398.
 Niederschläge 124.
 Nitrate in der Milch 272; im Grundwasser 199.
 — — im Wasser 208; Bestimmung 698.
 Nitrite im Grundwasser 199; im Wasser 208.
 Nitrifikation im Boden 178.
 Nitrobakterien 38.
 Normalkerze 424.
 Noth-Auslässe 458.
 Nucleine, Nährwerth 233.
 Nucleinsäuren, mikrobicide 593.

Obergährung 30.
 Öle, fette, zur Beleuchtung 428.
 Oelverschluss 453.
 Öfen 388.
 Oertliche Disposition zu Infektionskrankheiten 616.
 Ofenklappen 384.
 Oidium 27.
 Oosporen 26.
 Organische Stoffe im Grundwasser 199. 200; im Wasser, Bestimmung 207. 697.
 Oxydation im Boden 178.
 Oxydationskörper 471.
 Oxydationsverfahren 470.
 Oxyuris vermicularis 210.
 Ozon 151.

Paraffinkerzen 428.
 Parasiten im Fleische 297; facultative 45; auf Gemüsen 324; des Getreides 321; obligate 45; Wirkungsweise der bei Infektionskrankheiten 551.
 Passive Immunisirung 613.
 Pasteur-Chamberland'sches Thonfilter 227.
 Pasteurisirapparat 290.
 Pasteurisieren der Milch 275.
 Pavillonsystem in Krankenhäusern 509.
 Pellagra 321.
 Penicillium glaucum 27.
 Peptone von Fleisch 316; Nährwerth 233.
 Peptonisirung der Milch 266.
 Perlsucht 269. 301.
 Permeabilität des Bodens 175.
 Pestbacillus 71.
 Pestdiagnose 687.
 Pesthäuser 656.
 Pest, Prophylaxe 657; Schutzimpfung 612. 615; Verbreitungsweise 655.
 Petrographischer Charakter des Bodens 172.
 Petroleum 428.
 Petri's Verfahren 162. 454.
 Pfeffer 333.
 Pfeiffer'sche Reaktion 680. 683.
 Pferdefleisch, Erkennung 304.
 Pflanzenkost 254.
 Pflanzenphänologie 134.
 Pflanzungen auf Rieselfeldern 467.
 Pfleger, Desinfektion ders. 587.
 Phagocytose 592.
 Phosphorvergiftung, gewerbliche 538.
 Photometer nach L. Weber 424.
 Phthise, Prophylaxe 667; Verbreitungsweise 663.
 Picrocarmin 672.
 Pigmentbildung der Bakterien 43.
 Pilze, essbare 324.
 Pityriasis versicolor 28.
 Plattengiessen 678.
 Pocken, Prophylaxe 644.
 Pockenschutzimpfung 644.
 Pocken, Verbreitung 646; Verbreitungsweise 642.
 Polarite 471.
 Polarklima 138.
 Polizeivorschriften für Wohnungen 359.
 Porengrösse im Boden 175.
 Porenventilation 406.
 Porenvolum des Bodens 174.
 Poudrettefabrikation 448.
 Porosität des Bodens 174.
 Präcipitine 598.
 Preis der Beleuchtungsmittel 437.
 Preis der Nahrungsmittel 255.

- Presskopf 412.
 Proskowetz' Verfahren 473.
 Proteosoma 86.
 Protozoen 81; im Wasser 211.
 Prüfung der Ventilationsanlagen 415.
 Pseudodiphtheriebacillen 70. 685.
 Pseudoinfluenzabacillen 71.
 Psychrometer 107.
 Pulsionsystem 407.
 Pumpstation 468.
 Pyocyanase 605.
 Pyrosoma bigeminum 85.

 Quarantänen 561.
 Quartana-Parasit 89.
 Quecksilbervergiftung 537.
 Quellwasser 200.

 Rabbitzputz 371.
 Radiatoren 399.
 Räuchern des Fleisches 314.
 Rahmgemenge 290.
 Rahm, Pasteurisieren des 292.
 Rauch 163. 386.
 Raumwinkelmesser nach L. Weber 423.
 Ratten und Pest 656.
 Rauschbrandbacillus 73.
 Rezeptoren 595.
 Recknagel's Differentialmanometer 183.
 Reconvalescenten, Infektionsgefahr der 560.
 Reconvalescentenkost 243.
 Regen 124.
 Regenerativbrenner nach Siemens 432.
 Regenrohre 461.
 Reichsgewerbeordnung 545.
 Reif 124.
 Reihenhäuser 364.
 Reinigung, mechanische inficirter Räume 563.
 Reizmittel 236.
 Resorbirbarkeit der Nahrungsmittel 247.
 Resistenz gegen Infektionskrankheiten 606.
 Recurrens-Spirillen 74.
 Respiratoren 530.
 Revisionssystem 560.
 Rhizopoden im Wasser 210.
 Rinderpest, Schutzimpfung 615.
 Riensch'scher Rechen 474.
 Rieselfelder 467. 468.
 Rippenheizkörper 399.
 Röckner-Rothe's System 476.
 Röhrenbrunnen 219.
 Rollplatten 678.
 Romanowsky-Färbung 690.
 Rotzbacillus 68.
 Rotz bei Schlachtthieren 302.
 Ruhr-Amöben 210.
 Russ 163.

 Sättigungsdeficit 106. 113.
 Säuglingsernährung 278.
 Säuglingssterblichkeit 623.
 Säurebestimmung in Milch 272.
 Säurebildung der Bakterien 42.
 Säurefeste Bacillen 67.
 Saccharomyces 30.
 Salicylsäure als Zusatz zur Milch 267. 272.
 Salpetersäure im Wasser 200; Bestimmung 699.
 Salpetrige Säure im Gewerbebetrieb 531; in der Luft 155; im Wasser 200; im Wasser, Bestimmung 698.
 Salze der Nahrung 236.
 Salzen des Fleisches 314.
 Salzsäure in der Luft 155.
 Salzsäuregas im Gewerbebetrieb 531.
 Sandfang 468.
 Saprophyten 45.
 Saprophytische Bacillen 74.
 Sarcina 33.
 Sarcodinen 82.
 Sarcosporidien 84.
 Sauerstoff der Luft 150; in Wohnungsluft 416.
 Sauerteig 319.
 Saugkappe 410.
 Scarlatina 650.
 Schachtbrunnen 218.
 Schachtöfen 389.
 Scharlach 650.
 Schimmelpilze 26.
 Schizomyceten 32.
 Schlachthaus 306.
 Schleifstaub 527.
 Schleimige Gährung der Bakterien 43.
 Schleuderpsychrometer, Anwendung 691.
 Schnee 124.
 Schnittfärbung 674.
 Schornsteinaufsatz 410.
 Schreibkrampf 522.
 Schweder's Verfahren 472.
 Schuhwerk 344.
 Schulbäder 346.
 Schulbänke 500.
 Schulbücher 502.
 Schulkrankheiten 495.
 Schulen 494.
 Schumburg'sche Wasserdesinfektion 227.

- Schutzbrillen 523.
 Schutzimpfung gegen Pocken 644.
 Schutzimpfungen 607.
 Schwefelammonium in der Luft 156.
 Schwefelsäure im Wasser 200.
 Schwefelwasserstoff in der Luft 156.
 Schwefelwasserstoffvergiftung 532.
 Schweflige Säure als Desinficiens 565;
 im Gewerbebetrieb 532; in der Luft
 155.
 Schweinerothlauf, Schutzimpfung 610.
 615.
 Schweinerothlaufbacillen 73. 303.
 Schweineseuche 303.
 Schwemmanalisation 455.
 Schwungräder, Sicherungen ders. 544.
 Seeklima 139.
 Seewasser 201.
 Seide 336.
 Seitenketten 595.
 Selbstreinigung der Flüsse 466.
 Selterwasser, Bakteriengehalt 229.
 Senf 333.
 Separationssysteme 481.
 Serumwirkung, baktericide 602.
 Sesamöl 294.
 Sheringham's Lüftungsklappe 411.
 Shone's System 483.
 Sicherheitslampen 542.
 Sicherheitsvorrichtungen an Gasbren-
 nern 437.
 Siderosis 527.
 Siemens'scher Regenerativbrenner 432.
 Sinkstoffe 464.
 Skatol in der Luft 155.
 Skoliose, habituelle 494.
 Soda als Zusatz zur Milch 267.
 Solanin 324.
 Soldatenkost 261.
 Sommertemperatur in Wohnräumen 378.
 Sommerventilation 408.
 Sommerdiarrhoe 623.
 Sonnenbrenner 414.
 Sonnenscheindauer 126.
 Sonnenstübchen 164.
 Sonnenstich 100.
 Soorpilz 32.
 Soxhlet's Milchkocher 286.
 Soxhlet's Säurebestimmung der Milch
 272.
 Soxhlet'sche Fettbestimmung 271.
 Spaltpilze 32.
 Spannungsdeficit 106.
 Spezifische Toxine 45.
 Sperrmaassregeln 560.
 Spiegelfabriken 537.
 Spirillen 34. 74.
 Spirillum Metschnikoff 78; Finkler 78;
 tyrogenum 78.
 Spiritusglühlicht 430.
 Spirochaete 34.
 Sporangien 26.
 Sporen 34.
 Sporenfärbung 676.
 Sporozoen 83; im Wasser 210.
 Springfield'sche Ketten 569.
 Sprosspilze 29.
 Spucknäpfe für Phthisiker 668.
 Sputum der Phthisiker 665.
 Stärkezucker 328.
 Stallprobe 273.
 Staphylococcus 33; pyog. aureus 56;
 pyogenes albus 56.
 Staub 163.
 Staubentfernung durch Luftströme 417.
 Staubexplosion 543.
 Staub der Wohnungsluft 417.
 Staub, gewerblicher 526.
 Stearinlichter 428.
 Stechmücken bei Malaria 662; In-
 fektion durch 585.
 Sterilisierung der Milch 276.
 Stickstoff der Luft 151.
 Stoffwechselprodukte der Spaltpilze 42.
 Strassen 354; Breite 357; Pflasterung
 355; Reinigung 356; Richtung 355.
 Strassenstaub 168.
 Strassenwassereinläufe 459.
 Streptococcus 33; pathog. brevis 58;
 pathog. longus 57; conglomeratus 58.
 Streptothricheae 78.
 Stubenkehricht als Infektionsquelle 441.
 Sturmwarnungen 124.
 Sublimat als Desinficiens 566; — Koch-
 salzlösung zur Desinfektion 578.
 Subsellien 500.
 Succus carnis 316.
 Suckow's Gasregulator 199.
 Süvern's Verfahren 454.
 Sulfate im Grundwasser 372.
 Superatorpappe 372.
 Suppen 312. 325.
 Surrogate 259.
 Swan's Glühlichtlampe 431.
 Syphon 449. 460. 463.
 Systeme zur Entfernung der Abfall-
 stoffe 445.
 Tabak 532.
 Tabakstaub 527.
 Taenia solium 210.
 Taenia 299.
 Tageslicht 419; Messung 420.
 Tagesmittel 92.
 Tagesschwankung, mittlere 95.
 Talglichter 428.
 Taschentücher für Phthisiker 669.
 Taucherglocke 524.

- Taumellole 322.
 Temperatur der Atmosphäre 92; der Kleiderschichten 340; der Mauern 378; der Nahrung 250; der Wohnungen 378; des Bodens 179.
 Temperaturen, hohe in Gewerbebetrieben 525; in Wohnungen 352.
 Temperaturmessung des Wassers 206.
 Temperatur-Schwankungen, interdiurne 184.
 Tension des Wasserdampfes 106.
 Tertiana-Parasit 89.
 Tetanus-Antitoxin 614.
 Tetanusbacillus 72.
 Thau 134.
 Thaupunkt 106.
 Thee 332.
 Thermometer 92.
 Thermophile 290.
 Thiercadaver 439; 486.
 Tierische Parasiten im Wasser 210.
 Thierkost 254.
 Thonerdesalze zur Reinigung von Canalwasser 480.
 Thonfilter nach Pasteur-Chamberland 227.
 Thursfield's Desinfektionssofen 574.
 Tilletia caries 321.
 Töpferwaaren, bleihaltige 534.
 Tödtung der Bakterien 46.
 Tonnen-system 448.
 Torffilter 471.
 Torfmüll 452.
 Torfstreu-closet 452.
 Torula-Arten 29.
 Toxinbildung der Bakterien 44.
 Toxine, Struktur 595.
 Toxinwirkung der Bakterien 592.
 Toxoide 596.
 Toxone 598.
 Transportwege für Infektionserreger 584.
 Transmissionen-Sicherungen 544.
 Trennung von Harn und Fäces 453.
 Treppen 373.
 Trichinen 298.
 Trichomonas 83.
 Trinkwasser, chemische Analyse 696.
 Tröpfcheninfektion 169; bei Influenza 652; bei Pest 656; bei Phthise 664.
 Trog-closet 460.
 Tropenanämie 101.
 Tropenzone 135.
 Tropon 259.
 Tropische Malaria 89.
 Trypanosoma 83.
 Tuberkelbacillen-Nachweis 686.
 Tuberkelbacillus 65;
 Tuberkulose, Prophylaxe 667; Sta-
 tistik 663; Uebertragung durch Fleisch 301; Uebertragung durch Milch 269; Verbreitungsweise 663; Verbreitung unter den Arbeitern 539.
 Typhus abdominalis und Wasser 205; -bacillus 62.
 Typhusbacillen im Wasser 212.
 Typhusdiagnose 679.
 Typhusepidemien bei Grubenarbeitern 540.
 Typhusinfektion durch Milch 269.
 Typhus, örtliche und zeitliche Disposition 641.
 Typhusverbreitung 638.

 Unfälle 541.
 Untergährung 30.
 Ustilago carbo 321.

 Vaccinekörperchen 82.
 Vaccins durch Abschwächung 609.
 Variola 642.
 Variolation 608.
 Vegetabilische Kost 251. 252; Nahrungsmittel 317.
 Ventilation 462; von Abortgruben 445; des Closetraumes 461; als Desinfectiens 419; der Krankenhäuser 513; der Schulen 499; der Wohnung 403.
 Ventilationsanlagen, Leistung 416.
 Ventilationsbedarf 404.
 Ventilationsöffnungen 408.
 Ventilator 414.
 Verbreitung von Infektionserregern durch Abfallstoffe 443.
 Verbrennen als Desinfectiens 565.
 Verbrennungssofen für Leichen 492; für Thiercadaver 487.
 Verbrennungsproducte der Beleuchtungsmaterialien 435.
 Verbrennungswärme der Nährstoffe 230.
 Verdaulichkeit der Nahrungsmittel 245.
 Verdunstungszone im Boden 190.
 Vergiftung durch Leuchtgas 435.
 Vergiftungen durch Wasser 204.
 Verpilzung durch Abwässer 549.
 Verunreinigung der Flüsse durch Canalinhalt 464; der Luft durch Beleuchtung 435.
 Verunreinigungen des Wassers 203.
 Verzweigungen bildende Bacillen 66. 68. 79.
 Vibrio 34.
 Vibrio Nordhafen 78.
 Vierhäuser 363.
 Villensystem 349.
 Vodel's Tricotstoff 341.

- Volksbäder 346.
 Volksküchen 259; Kost 262.
 Voltmer'sche Milch 290.
- Waldungen, Einfluss auf das Klima**
 139
 Warings System 483.
 Wärmeabgabe in Kleidung 339.
 Wärmecapazität der Mauern 380.
 Wärmeleitung durch Mauern 370.
 Wärmeproduction durch Leuchtflammen 434.
 — durch Nahrungsmittel 230.
 Wärmeregulirung des Körpers 97.
 Wärmestauung 98. 158.
 Wärmestrahlen, Schutz gegen 342.
 Warmwasserheizung 398.
 Wärter, Desinfektion ders. 587.
 Wäschestücke, Infektionsgefahr der 558.
 Wash-out-Closet 460.
 Wasser 197; als Krankheitsursache 204;
 Anforderungen 202; bakteriologische
 Untersuchung 211; chemische Be-
 standtheile 200; der oberen Boden-
 schichten 190; Desinfektion von
 Schachtbrunnen 228; Filtration im
 Hause 227; Kochapparate 227; mikro-
 skopische Untersuchung 210; in Milch
 267. 272; Reinigung 227; und Cho-
 lera 631; und Typhusepidemien 639.
 Wasseranalyse 697.
 Wasseraufnahme durch Kleidung 340.
 Wasserbakterien 213; Vermehrungs-
 fähigkeit 213; Zahl 214.
 Wasserbedarf des menschlichen Körpers
 235.
 Wasserbewegung im Boden 185.
 Wassercapazität des Bodens 176.
 Wasserclosets 460.
 Wasserdampfabgabe des Körpers 110.
 Wasserdampf der Luft 106.
 Wasserfilter 224.
 Wassergas 383.
 — zur Beleuchtung 430.
 Wassergehalt der Nahrungsmittel 250.
 Wasserheizung 398.
 Wasserleitung 226.
 Wassermenge 206.
 Wasserscheier 394.
 Wasserstoffsuperoxyd 151.
 Wassertemperatur 203.
 Wasseruntersuchung 206.
 — auf Cholera bacillen 683.
 Wasserverschluss 452.
 Wasserversorgung 217
 — Kosten 226.
 Weil'sche Krankheit und Wasser 206
 Wein 329; Fälschungen 329; Zusam-
 mensetzung 329.
 Wetter, schlagende 542.
 Widal'sche Probe 682.
 Wilhelmy's Verfahren 454.
 Windrichtung 120.
 Windstärke 120.
 Wintertemperaturen in Wohnräumen
 382.
 Winterventilation 408.
 Witterung 90. 128.
 —, Einfluss auf den Nährstoffbedarf 241.
 Witterungskarte, synoptische 122.
 Wohnhaus, Bauplan 360; Form des
 349; für Arbeiterfamilien 362; für
 einzelne Familien 361.
 Wohnung 347; Beleuchtung 419; Heiz-
 anlagen 386; Ventilation 403; Wasser-
 dampfproduction in 377.
 Wohnungseontrolle 356.
 Wohnungsdesinfektion mit Formalde-
 hyd 567; Vortheile derselben 571.
 Wohnungstaub 170.
 Wolle 336.
 Wurstvergiftung 304.
- Xerosebacillen** 686.
- Zeitliche Disposition zu Infektionskrank-**
heiten 616.
 Zinkvergiftung durch Brot 322; gewerb-
 liche 537.
 Zone des capillar gehobenen Grund-
 wassers 191.
 Zonenbauordnung 354.
 Zubereitung der Nahrungsmittel 248.
 Züchtungsmethoden 39.
 Zugluft 415.
 Zwischenböden 371; als Infektionsquelle
 372.
 Zygosporen 26.

Errata.

- S. 74. Ueberschrift: statt „Spirillen“ lies „Spirillaceae“.
- S. 89. Fig. 56 a stellt den Tertianaparasiten dar, Fig. 56 b den Quartanaparasiten.
- S. 220. Bei Figg. 71 u. 72 fehlt der Zusatz „nach DUNBAR“.
- S. 483. Zeile 16 v. oben lies „1 Cubikmeter“ statt 1 ccm.
-

Verlag von VEIT & COMP. in Leipzig.

LEHRBUCH
DER SPEZIELLEN
PATHOLOGIE UND THERAPIE
MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER THERAPIE.

Für Studierende und Ärzte

von

Dr. Theodor von Jürgensen,

o. ö. Professor der Medizin und Vorstand der Poliklinik an der Universität Tübingen.

= Vierte, = neu bearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit zahlreichen Abbildungen im Text.

Roy. 8. 1902. geh. 15 *M*, geb. in Halbfranz 17 *M* 50 *P*.

„In der letzten Zeit sind so zahlreiche, große und mehrbändige Handbücher auf dem Gebiete der inneren Medizin erschienen, dass gar manchem Arzte es unbegreiflich erscheinen dürfte, wie es möglich sei, die gesamte Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten in einem Bande vollständig abzuhandeln. Der Verfasser des vorliegenden Werkes hat die Möglichkeit bewiesen; in seiner knappen und prägnanten Ausdrucksweise, die allem Phrasenhaften abhold ist, sagt er in wenigen Zeilen mehr als andere auf ganzen Seiten. Man findet daher in Jürgensen's Lehrbuch nicht etwa bloß oberflächliche Skizzierungen der Krankheiten; er bringt vielmehr gar manches, was selbst in den Handbüchern nicht ausgeführt ist.

Ganz besonders wertvoll sind seine einleitenden Bemerkungen zu einzelnen Kapiteln. Wir heben in dieser Beziehung die allgemeinen Bemerkungen zu den Erkrankungen der peripherischen Nerven und zu den Krankheiten des Gehirns hervor. Er versteht es, das Wichtige und für den Arzt Bemerkenswerte hervorzuheben, und er verschweigt auch nicht die zahlreichen Gebiete, deren Dunkel die Forschung noch nicht erhellt hat. So sorgt er dafür, daß der Leser positives Wissen in sich aufnimmt.

Das Lehrbuch Jürgensen's ragt in Folge seiner Eigenart aus der Fülle ähnlicher Werke hervor. Es wird seinem Besitzer eine wertvolle Stütze und ein treuer Berater sein, den er niemals vergebens um Rat fragen wird.“

Neue medic. Presse 1902. Nr. 12.

„... Aber der Schüler und der Arzt, welche über irgend einen Gegenstand der inneren Klinik sich belehren wollen, finden in diesem Buche die präzise formulierte Meinung eines unserer bewährtesten Praktiker und Forscher; und das ist hundertmal mehr wert, als die weitläufige, sterile Objektivität so mancher dickleibiger Kompilationen.“

H. Curschmann.

Durch sparsame Satzeinrichtung unter Anwendung verschiedener Schriftarten ist Jürgensen's Lehrbuch inhaltreicher, als dieses bei einem einbändigen Werke von 900 Seiten größten Oktavformates vermutet wird. Ohne dabei unhandlich geworden zu sein, wird die rasche Orientierung dadurch wesentlich erleichtert, daß nur ein Register nachgeschlagen zu werden braucht.

Verlag von VETT & COMP. in Leipzig.

GRUNDRISS DER TOXIKOLOGIE.

Mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Therapie.

Für Studierende und Aerzte, Medicinal- und Verwaltungsbeamte.

Von

Dr. Heinrich Kionka,

Professor der Pharmakologie an der Universität Jena.

Mit einer Spektraltafel.

gr. 8. 1901. geh. 11 *M.*, geb. in Ganzleinen 12 *M.*

Kionkas „*Grundriss der Toxikologie*“ zeichnet sich durch klare Darstellung und übersichtliche Disposition des Stoffes aus. Das Buch will der Praxis dienen. Deshalb wird der Schwerpunkt auf die *Therapie der Vergiftungen* gelegt; sie ist im allgemeinen Teil wie in den speziellen Abschnitten mit grösster Sorgfalt behandelt. Die am häufigsten vorkommenden Vergiftungen werden besonders eingehend besprochen. Die charakteristischen klinischen Symptome und der pathologisch-anatomische Befund finden ebenso wie die mikroskopische und spektroskopische Untersuchung ausgiebige Berücksichtigung.

LEHRBUCH

DER

ALLGEMEINEN UND SPECIELLEN CHIRURGIE

einschliesslich der modernen Operations- und Verbandlehre.

Von

Dr. Hermann Tillmanns,

Professor an der Universität Leipzig und Generalarzt à la suite des Kgl. sächs. Sanitätscorps.

Zwei Bände in drei Teilen.

Mit 1674, zum Teil farbigen Abbildungen im Text.

Roy. 8. geh. 55 *M.* 50 *g.*, geb. in Halbfranz 61 *M.* 80 *g.*

Das „Lehrbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie“ von H. Tillmanns ist infolge seiner allgemein anerkannten Vorzüge, der strengen Wissenschaftlichkeit, der klaren Darstellungsweise und der reichen Anzahl erläuternder Abbildungen, bei Ärzten und Studierenden zur Zeit das geschätzteste Werk der modernen Chirurgie. Der erste Band behandelt die allgemeine, der aus zwei Teilen bestehende zweite Band die spezielle Chirurgie.

Die Bände sind auch einzeln käuflich unter nachstehenden Titeln:

LEHRBUCH DER ALLGEMEINEN CHIRURGIE.

Allgemeine Operations- und Verbandtechnik. Allgemeine Pathologie und Therapie.

Achte, verbesserte und vermehrte Auflage.

Mit 561, zum Teil farbigen Abbildungen im Text.

1901. geh. 17 *M.* 50 *g.*, geb. in Halbfranz 19 *M.* 80 *g.*

LEHRBUCH DER SPEZIELLEN CHIRURGIE.

Siebente, verbesserte und vermehrte Auflage.

== *Zwei Teile.* ==

Mit 1113, zum Teil farbigen Abbildungen im Text.

1901. geh. 38 *M.*, geb. in Halbfranz 42 *M.*



I425	Flügge, K.	105979
F646	Grundriss der	
1902	Hygiene.	

[illegible]

